• 研究论文 •

淫羊藿炮制前后 UPLC-PDA-MS 的指纹图谱研究

朱粉霞^a 赵永刚^b 贾晓斌^{*,a} 韦英杰^a
张振海^a 古丽娜尔·吾拉孜汗^a

(^a 江苏省中医药研究院国家中医药管理局中药释药系统重点研究室 南京 210028)

(^b 江苏省环境监测中心 南京 210036)

摘要 建立了朝鲜淫羊藿和柔毛淫羊藿药材的超高效液相色谱(UPLC)指纹图谱分析方法, 实验结果表明, 两个品种的指纹图谱差别较大, 朝鲜淫羊藿标出 35 个共有峰, 质谱鉴定了 26 个峰, 柔毛淫羊藿标出 13 个共有峰, 质谱鉴定了 9 个峰; 研究了朝鲜淫羊藿和柔毛淫羊藿炮制前后 UPLC 指纹图谱的变化规律, 指纹图谱发生了五处变化。该法快速、简便, 重现性好, 从整体上显示淫羊藿药材和炮制品的特征, 为淫羊藿的生品和炮制品的质量控制提供了有效手段。

关键词 淫羊藿; UPLC-PDA-MS; 炮制; 指纹图谱

Study on Fingerprint of Crude and Processed *Epimedium* by UPLC-PDA-MS

Zhu, Fenxia^a Zhao, Yonggang^b Jia, Xiaobin^{*,a} Wei, Yingjie^a
Zhang, Zhenhai^a Wulazihan, Gulinaer^a

(^a Key Laboratory of New Drug Delivery System of Chinese Materia Medica, Jiangsu Provincial Academy of Chinese Medicine, Nanjing 210028)

(^b Jiangsu Environmental Monitoring Center, Nanjing 210036)

Abstract The fingerprint chromatograms of *E. koreanum* Nakai and *E. pubescens* Maxim were established by UPLC. The results showed that the fingerprints of two species were significantly different. There were 35 common peaks in crude drug of *E. koreanum* Nakai in which 26 peaks were identified, and 13 common peaks in crude drug of *E. pubescens* Maxim in which 9 peaks were identified, by MS respectively. Additionally, there were 5 differences in fingerprint between crude drug and processed product. This method with desirable rapidness, simplicity and repeatability can be used for the quality evaluation of crude and processed *Epimedium*.

Keywords *Epimedium*; UPLC-PDA-MS; processed; fingerprint

淫羊藿具有补肾助阳、祛风除湿之功效, 为中医临床常用的中药之一。淫羊藿临床多以炮制入药, 目前对其炮制的研究主要集中于总黄酮和淫羊藿苷的变化^[1,2]。历届《中国药典》中关于淫羊藿的炮制规定是在加热条件下进行, 本课题组在前期研究中以淫羊藿苷为主要考

察指标, 考察了加热温度和时间对淫羊藿苷含量变化的影响^[3]。然而中药的药效不是来自单一活性化学成分, 而是来自多种活性成分之间的协同整体作用。中药指纹图谱能全面、综合地反映所含成分的相对关系, 较好地体现中药成分的复杂性和相关性。淫羊藿的主要化学成

* E-mail: xiaobin_jia_nj@126.com

Received May 27, 2011; revised September 5, 2011; accepted November 22, 2011.

Project was supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 20973944).

国家自然科学基金(No. 20973944)资助项目。

分为黄酮类化合物, 其指纹图谱研究多以高效液相色谱(HPLC)^[4-6]为工具, 加热炮制前后黄酮类化合物整体指纹图谱的变化规律目前尚无文献报道。

超高效液相色谱仪(Ultra Performance Liquid Chromatography, UPLC)具有超高压、超高灵敏度、超高分离度等特点, 在中药等复杂体系的分离分析上有明显优势。UPLC 与 MS 联用可以进一步鉴定化合物的结构, 能够全面快速地阐明中药的化学物质基础, 是目前分析中药复杂系统的最有力工具之一。淫羊藿是药用来源种类最多的中药之一, 《中国药典》中收录了 5 种之多, 本工作以目前药材市场上流通较多的朝鲜淫羊藿和柔毛淫羊藿为对象, 以 UPLC 研究其加热炮制前后指纹图谱的差异性, 并结合 UPLC-MS 技术, 对主要共有峰的结构进行了鉴定, 揭示了炮制前后化学成分的种类和含量的变化规律, 为进一步研究淫羊藿的炮制机理提供实验数据, 对于揭示中药炮制的科学内涵和化学物质基础具有重要的理论意义和应用价值。

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

Waters Acquity UPLC 超高效液相色谱仪, 包括二元梯度泵、恒温自动进样器、柱温箱、二极管阵列检测器(DAD)以及 Waters Empower2 软件(Waters 公司)。UV-2802 型紫外分光光度计(上海尤尼柯仪器有限公司)。Mettler Toledo 分析电子天平(Mettler Toledo 分析仪器有限公司); Anke 离心机 TGL216G (上海安亭科学仪器有限公司)。KQ5200DE 型数控超声仪(昆山市超声仪器有限公司)。电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9070A 型(上海精宏实验设备有限公司)。

乙腈(美国, Merck 公司)、乙酸(美国, Tedia Company 公司)和甲醇(美国, Tedia Company 公司)均为色谱纯。

新绿原酸、绿原酸、隐绿原酸、木兰碱、淫羊藿苷和金丝桃苷购自中国药品生物制品检定所。朝藿定 A、朝藿定 B、朝藿定 C、宝藿苷 I 对照品为江苏省中医药研究院中药制剂室自制(纯度均高于 98%)。10 批朝鲜淫羊藿药材和 14 批柔毛淫羊藿药材分别来自辽宁、吉林、重庆等地。

1.2 测定方法

1.2.1 色谱条件

色谱条件 1: 色谱柱为 Waters BEH C18 (2.1 mm × 50 mm, 1.7 μm); 流动相: 乙腈(A)和 0.1% 乙酸水溶液(B), 梯度洗脱程序: 0~7 min, 15%~25% A; 7~11 min, 25% A; 11~17 min, 25%~35% A; 17~24 min, 35%~

70% A; 24~26 min, 70%~100% A; 运行时间: 26 min; 检测波长: 270 nm; 流速: 0.2 mL/min; 柱温: 30 °C; 进样量: 2.5 μL。

色谱条件 2: 色谱柱为 Waters BEH C18 (2.1 mm × 50 mm, 1.7 μm); 流动相: 甲醇(A)和 0.1% 乙酸水溶液(B), 梯度洗脱程序: 0~10 min, 5%~15% A; 10~11 min, 15%~30% A; 11~14 min, 30% A; 运行时间: 14 min; 流速: 0.4 mL/min; 检测波长: 310 nm; 柱温: 35 °C; 进样量: 2.5 μL。

1.2.2 质谱条件

Waters 质谱仪, 电喷雾离子源, TQ 检测器(Manchester, UK), 扫描质量范围为 50~1000 (质荷比)。从超高效液相流出来的样品直接进入质谱, 负离子模式, 离子源温度和脱溶剂化温度分别是 120 和 380 °C, 毛细管电压为 3.00 kV, 锥孔电压为 -30 V, 脱溶剂化气流和锥孔气流分别是 650 和 50 L/h。

1.2.3 对照品溶液的制备

测定总黄酮对照品溶液的制备: 精密称取淫羊藿苷 2.00 mg 置于 10 mL 容量瓶中, 加甲醇定容, 得 200 μg/mL 淫羊藿苷储备液。取此储备液分别加甲醇稀释成不同浓度的对照品溶液, 作为测定总黄酮的标准系列溶液。

指纹图谱对照品溶液的配制: 分别称取金丝桃苷、朝藿定 A、朝藿定 B、朝藿定 C、淫羊藿苷和宝藿苷-I 适量, 置于 10 mL 容量瓶中, 以 50% 的甲醇溶解并定容, 过 0.22 μm 微孔滤膜, 待用。以色谱条件 1 进样。

1.2.4 供试品溶液的制备

将淫羊藿叶片混匀, 分成三份, 一份粉碎过 50 目筛, 用于生品研究; 一份置恒温箱内加热炮制(炮制温度为 170 °C, 时间 7 min)后, 粉碎过 50 目筛, 作为叶片炮制品; 第三份粉碎过 50 目筛后, 置恒温箱内加热炮制(炮制温度为 170 °C, 时间 7 min), 作为粉末炮制品。称取淫羊藿生品粉末、叶片炮制品粉末和粉末炮制品粉末各 0.1 g, 分别加入甲醇 10 mL, 称重, 超声提取 1 h, 放至室温, 补足失重, 离心 10 min (3000 r·min⁻¹)。

精密吸取上述离心后上清液 0.5 mL, 置 50 mL 容量瓶中, 加甲醇至刻度, 摇匀, 作为测定总黄酮的供试品溶液。

精密吸取上述离心后上清液 2.00 mL, N₂ 吹干, 残渣以 50% 的甲醇定容于 5 mL 的容量瓶中, 过 0.22 μm 微孔滤膜, 待用, 分别以色谱条件 1 和色谱条件 2 进样测定指纹图谱。

2 结果与讨论

2.1 UPLC 方法学考察

2.1.1 精密度实验

精密度实验按 1.2.4 节方法操作制备生品供试液, 取同一供试液, 连续进样 6 次, 按 1.2.1 节色谱条件 1 测定, 选择图 1 中的 6 个共有峰进行比较, 结果表明, 各共有峰相对保留时间 $RSD < 0.05\%$, 各共有峰相对峰面积 $RSD < 0.5\%$, 表明进样的精密度良好。

2.1.2 重复性实验

取同一批淫羊藿药材, 按 1.2.4 方法平行操作, 制备 6 份生品供试液, 按 1.2.1 色谱条件 1 测定。结果表明, 图 1 中的 6 个共有峰相对保留时间 $RSD < 0.05\%$, 各共有峰相对峰面积 $RSD < 2.0\%$, 表明其重现性较好。

2.1.3 稳定性实验

取同一生品供试品溶液, 分别于 0, 3, 6, 9, 12, 24 h 以色谱条件 1 进样测定 UPLC 色谱图, 对图 1 中的 6 个

共有峰进行比较, 结果各共有峰相对保留时间 $RSD < 0.05\%$, 各共有峰相对峰面积 $RSD < 1.5\%$, 表明供试品溶液在 24 h 内稳定性良好。

2.2 指纹图谱分析

2.2.1 指纹图谱的建立

将制备的指纹图谱对照品溶液、10 批朝鲜淫羊藿药材和 14 批柔毛淫羊藿药材按上述色谱条件 1 测定, 获得二者的指纹图谱(图 2 和图 3)。将图 2 和图 4 指纹图谱导入国家药典委员会研发的中药色谱指纹图谱相似度评价系统 A 版(2004 A), 朝鲜淫羊藿和柔毛淫羊藿分别自动生成各自的对照指纹图谱(图 4 和图 5); 采用中位数法分别计算朝鲜淫羊藿药材和柔毛淫羊藿药材之间的相似度, 结果见表 1 和表 2, 二者相似度均大于 92%, 符合指纹图谱要求。

2.2.2 指纹图谱分析

分别比较了 10 批朝鲜淫羊藿药材指纹图谱(图 2)和 14 批柔毛淫羊藿药材指纹色谱图(图 3), 标定 35 个峰作

图 1 混标的 UPLC 谱图

Figure 1 The UPLC chromatograms of mixed standard compounds

6: Hyperin; 12: epimedin A; 13: epimedin B; 14: epimedin C; 16: icariin; 31: baohuoside I

图 2 10 批朝鲜淫羊藿药材指纹图谱

Figure 2 The UPLC fingerprint chromatograms of 10 batches of *E. koreanum* Nakai

图3 13批柔毛淫羊藿药材指纹图谱

Figure 3 The UPLC fingerprint chromatograms of 13 batches of *E. pubescens* Maxim

图4 朝鲜淫羊藿药材指纹图谱的35个共有峰

Figure 4 35 common peaks of fingerprint of *E. koreanum* Nakai

图5 柔毛淫羊藿药材指纹图谱的13个共有峰

Figure 5 13 common peaks of fingerprint of *E. pubescens* Maxim

为朝鲜淫羊藿药材的共有指纹峰(图4)和13个峰作为柔毛淫羊藿药材(图5)的共有指纹峰. 10批朝鲜淫羊藿指纹图谱类似, 皆为16号峰(淫羊藿苷)的含量最高, 药材比较稳定; 14批柔毛淫羊藿中, 1批药材存在变异现象,

与郭宝林等^[4]报道一致, 即柔毛淫羊藿种内存在少许变异, 其余13批色谱峰类似, 都为14号峰(朝藿定C)含量最高.

表1 朝鲜淫羊藿药材 UPLC 指纹图谱相似度

Table 1 The similarities of chromatograms of *E. koreanum* Nakai samples

编号	产地	相似度	编号	产地	相似度
S1	辽宁	1	S6	东北	0.99
S2	吉林	0.955	S7	重庆	0.944
S3	吉林	0.954	S8	东北	0.972
S4	山西	0.977	S9	吉林	0.973
S5	重庆	0.998	S10	辽宁	0.969

表2 柔毛淫羊藿药材 UPLC 指纹图谱相似度

Table 2 The similarities of chromatograms of *E. pubescens* Maxim samples

编号	产地	相似度	编号	产地	相似度
S1	四川	1	S8	吉林	0.985
S2	甘肃	0.991	S9	黑龙江	0.996
S3	东北	0.991	S10	台江	0.995
S4	贵州	0.995	S11	巫山	0.975
S5	江苏	0.997	S12	山东	0.981
S6	四川	0.923	S13	陕西	0.982
S7	三都	0.996			

由图4和图5指纹图谱可知,朝鲜淫羊藿和柔毛淫羊藿药材指纹谱图差别很大,柔毛淫羊藿由13个共有峰构成其特征指纹图谱,而朝鲜淫羊藿由35个共有峰构成其特征指纹图谱;柔毛淫羊藿中的13个共有指纹峰几乎构成其全部峰面积,而这13个峰在10批朝鲜淫羊藿的指纹图谱中,占其总峰面积的54.45%~61.15%,表明朝鲜淫羊藿和柔毛淫羊藿所含成分的种类及含量比例差别较大。

2.2.3 生品与炮制品指纹谱图的比较

由图6和图7淫羊藿药材(A)和炮制品(B)的指纹图谱可知,淫羊藿在加热炮制过程中指纹图谱发生了五处变化。第一处:朝鲜淫羊藿和柔毛淫羊藿都为16号峰(淫羊藿苷)含量增加,统计23批淫羊藿(除1批变异外)淫羊藿苷含量增加倍数,在1.31~2.04之间;同时朝鲜淫羊藿中的15号峰在炮制品中消失。第二处:朝鲜淫羊藿17,18,19,20号峰均有不同程度减少;柔毛淫羊藿中仅有的19和20号峰在炮制品中也同样减少。第三处:朝鲜淫羊藿26号峰(MS鉴定为宝藿苷-II)炮制品与药材相比,含量增加;柔毛淫羊藿药材无26号峰,炮制品出现26号峰。第四处:两种淫羊藿品种的炮制品中均出现了36和37号峰。第五处:两种淫羊藿的炮制品中31号峰(宝藿苷-I)含量增大,且增加较多,统计23批淫羊藿(除1批变异外)增加倍数在1.18~2.30之间。

以色谱条件1进样,淫羊藿中的黄酮类化合物分离较好,但是指纹图谱上6号峰(金丝桃苷)之前极性较大的化合物并未完全分开,为了全面地比较淫羊藿炮制前后的差异,以色谱条件2进样,将前面极性较大的化合物完全分离。柔毛淫羊藿前面几乎没有化合物,朝鲜淫羊藿前面化合物相对较多,色谱图见图8,据文献[6]报道,前面极性较大的化合物有酚酸类成分等,化学对照品比对上五个。由图8知朝鲜淫羊藿药材和炮制品色谱图基本无变化,说明炮制仅仅是影响黄酮类化合物,对前面极性较大的化合物没有影响。

2.2.4 指纹峰的质谱确认

采用UPLC-MS技术,在负离子模式下,对淫羊藿药材和炮制品主要共有指纹峰的结构进行鉴定,结果见表3和图9。其中6个色谱峰经与对照品对比,保留时

图6 朝鲜淫羊藿药材(A)和炮制品(B)的 UPLC 谱图

Figure 6 The UPLC chromatograms of crude drug (A) and processed products (B) of *E. koreanum* Nakai

图7 柔毛淫羊藿药材(A)和炮制品(B)的 UPLC 谱图

Figure 7 The UPLC chromatograms of crude drug (A) and processed products (B) of *E. pubescens Maxim*

图8 朝鲜淫羊藿药材(A)和炮制品(B)强极性组分的 UPLC 谱图

Figure 8 The UPLC chromatograms of strong hydrophilic components of crude drug (A) and processed products (B) of *E. koreanum Nakai*

1: Neochlorogenic acid; 2: chlorogenic acid; 3: cryptochlorogenic acid; 4: magnoflorine; 5: hyperin

表3 指纹图谱共有峰的 LC-DAD-ESI/MS 结构确认

Table 3 Identification of chemical compounds in *Epimedium* by LC-DAD-ESI/MS

Peak no.	t_R /min	Mass data	$\lambda_{\max}$ /nm	Compound
1	0.616	—	277	Unknown
2	0.790	—	—	Unknown
3	1.024	353 [M-H] ⁻	325	Chlorogenic acid
4	1.419	—	312	Unknown
5	1.641	—	269, 301	Unknown
6	2.685	463 [M-H] ⁻	256, 353	Hyperin
7	4.615	677 [M-H] ⁻ , 513 [M-H-glu] ⁻	271, 332	Hexandraside E
8	5.152	794 [M-H] ⁻ , 632 [M-H-glu] ⁻	269, 323	D4 ^[6]
9	5.528	808 [M-H] ⁻ , 662 [M-H-glu] ⁻ , 517 [M-H-glu-rha] ⁻	271, 348	D5 ^[6]
10	7.230	838 [M-H] ⁻ , 515 [M-H-2glu] ⁻ , 367 [M-H-2glu-rha] ⁻	282, 312	Hexandraside F
11	7.989	—	270, 322	Unknown
12	8.412	838 [M-H] ⁻ , 676 [M-H-glu] ⁻	270, 320	Epimedin A
13	8.734	808 [M-H] ⁻ , 646 [M-H-glu] ⁻	271, 320	Epimedin B
14	9.188	821 [M-H] ⁻ , 659 [M-H-glu] ⁻ , 513 [M-H-glu-rha] ⁻	270, 320	Epimedin C

续表

Peak no.	t_R /min	Mass data	λ_{max} /nm	Compound
15	9.310	820 [M-H] ⁻ , 659 [M-H-glu] ⁻ , 513 [M-H-glu-rha] ⁻	271, 323	A7 ^[6]
16	9.552	722, 676 [M-H] ⁻ , 513 [M-H-glu] ⁻	270, 320	Icariin
17	10.738	—	271, 316	Unknown
18	11.125	—	270, 324	Unknown
19	11.491	821 [M-H] ⁻ , 657 [M-H-glu] ⁻ , 514 [M-H-glu-rha] ⁻	270, 320	A9 ^[6]
20	11.964	—	270, 320	Unknown
21	12.675	880 [M-H] ⁻ , 717 [M-H-glu] ⁻	270, 320	Korepimidoside C
22	14.066	—	271, 298	Unknown
23	14.610	922 [M-H] ⁻ , 760 [M-H-glu] ⁻	270, 317	Epimedokoreanoside I
24	15.318	922 [M-H] ⁻ , 760 [M-H-glu] ⁻ , 617 [M-H-glu-rha] ⁻	270, 318	A16 ^[6]
25	15.830	922 [M-H] ⁻ , 760 [M-H-glu] ⁻	271, 319	A18 ^[6]
26	16.352	499 [M-H] ⁻	269, 323	Baohuoside II
27	17.026	964 [M-H] ⁻ , 802 [M-H-glu] ⁻ , 760 [M-H-glu-OAc] ⁻	270, 315	Caohuoside A/B
28	17.268	964 [M-H] ⁻ , 802 [M-H-glu] ⁻ , 759 [M-H-glu-OAc] ⁻	271, 318	Korepimidoside B
29	19.056	645 [M-H] ⁻	271, 313	Sagittoside B
30	19.170	659 [M-H] ⁻	271, 313	2-O-Rhamnosylcaside II
31	19.729	513 [M-H] ⁻	270, 316	Baohuoside I
32	20.144	659 [M-H] ⁻ , 514 [M-H-rha] ⁻	271, 304	A35 ^[6]
33	20.595	759 [M-H] ⁻ , 572, 352	270, 315	A37 ^[6]
34	21.014	801 [M-H] ⁻ , 367	282	A39/A40 ^[6]
35	23.082	351 [M-H-CH ₃] ⁻ , 296 [M-H-C ₃ H ₇] ⁻	271	Anhydroicaritin
36	18.711	—	271, 320	Unknown
37	18.864	—	271, 327	Unknown

Peak No.	R¹	R²	R³	Compound
7	glu	glu	H	Hexandraside E
8	rha-xyl	glu	H	D4 ^[6]
9	rha-rha	glu	H	D5 ^[6]
10	rha-(1-3) glu	glu	H	Hexandraside F
12	rha-(1-2) glu	glu	CH ₃	Epimedin A
13	rha-(1-2) xyl	glu	CH ₃	Epimedin B
14	rha-(1-2) rha	glu	CH ₃	Epimedin C
15	rha-(1-4) rha	glu	CH ₃	A7 ^[6]
16	rha	glu	CH ₃	Icariin
19	rha-(1-4) furan acid	glu	CH ₃	A9 ^[6]
21	rha(1-4)(OAc)-(1-3) glu	glu	CH ₃	Korepimidoside C
23	rha(1-4)(OAc)-(1-3) glu(1-4) (OAc)	glu	CH ₃	Epimedokoreanoside I
24	rha (OAc)-(1-3) glu(OAc)	glu	CH ₃	A16 ^[6]
25	rha (OAc)-(1-3) glu(OAc)	glu	CH ₃	A18 ^[6]
26	rha	H	H	Baohuoside II
27	rha(1-4)(OAc)-(1-3) glu(1-3) (OAc) (1-6) (OAc)	glu	CH ₃	Caohuoside A
	rha(1-4)(OAc)-(1-3) glu(1-4) (OAc) (1-6) (OAc)	glu	CH ₃	Caohuoside B
28	rha(1-4)(OAc)-(1-3) glu(1-4) (OAc) (2-6) (OAc)	glu	CH ₃	Korepimidoside B
29	rha-(1-2) xyl	H	CH ₃	Sagittoside B
30	rha-(1-2) rha	H	CH ₃	2-O"-rhamnosylcaridide II
31	rha	H	CH ₃	Baohuoside I
32	rha	rha	CH ₃	A35 ^[6]
33	rha(1-4)(OAc)-glu(1-4OAc)	H	CH ₃	A37 ^[6]
34	rha (OAc)-glu (2OAc)	H	CH ₃	A39/40 ^[6]
35	H	H	CH ₃	Anhydroicaritin

图9 淫羊藿中黄酮的化学结构图

Figure 9 The structures of flavonoids in *Epimedium*

间、紫外吸收和 MS 数据均一致, 分别是金丝桃苷(6)、朝藿定 A (12)、朝藿定 B (13)、朝藿定 C (14)、淫羊藿苷(16)和宝藿苷-I (31)。其他色谱峰以保留时间、紫外吸收和 MS 数据, 结合文献[6~8]研究结果, 推导了 20 个化合物的结构。

由表 3 可知, 37 个色谱峰中, 30 个峰的最大紫外吸收波长在 270 和 319 nm 左右, 说明淫羊藿中大部分化合物都具有类似的结构, 对照品结合质谱鉴定结果为 8-异戊烯基黄酮类(图 9)。淫羊藿中的化合物主要为黄酮苷类化合物, 据质谱数据可知, 黄酮苷类化合物在质谱裂解过程中主要是苷类物质失去糖基, 葡萄糖比鼠李糖更容易失去。

3 结论

淫羊藿叶片炮制后粉碎和粉碎后炮制其指纹图谱相同, 表明粉碎和炮制的先后顺序对指纹图谱没有影响。

以 UPLC 建立朝鲜淫羊藿和柔毛淫羊藿药材的指纹图谱, 二者指纹图谱差别比较大。朝鲜淫羊藿所含成分种类繁多, 不仅含有丰富的黄酮类, 而且还含有酚酸类、木兰碱等化合物; 柔毛淫羊藿所含黄酮类化合物种类相对较少, 且基本不含极性较大的酚类化合物, 二者所含成分的种类及含量比例差别很大, 提示临床上应将朝鲜淫羊藿和柔毛淫羊藿分开使用。

从指纹图谱角度整体上显示朝鲜淫羊藿和柔毛淫羊藿的炮制特征, 二者炮制前后总黄酮测定无变化, 而指纹图谱上炮制品和药材相比发生了五处变化, 此五处的化合物最大紫外吸收均在 270 nm 左右, 皆为异戊烯基黄酮类, 推测可能是淫羊藿的黄酮类成分之间发生了相互转化。指纹图谱上的第一处变化: 16 号峰淫羊藿苷含量增加, 同时朝鲜淫羊藿 15 号峰消失, 柔毛淫羊藿色谱图上没有 15 号峰, 统计 13 批柔毛淫羊藿炮制前后 14 号峰的变化, 其峰面积都在减少, 而 10 批朝鲜淫羊藿的 14 号峰基本没有变化, 推测由于柔毛淫羊藿 14 号峰含量较大, 将 15 号峰包裹进去, 所以柔毛淫羊藿的 15 号峰含量也减少或消失。根据质谱裂解规律, 淫羊藿黄酮上的鼠李糖和葡萄糖都很容易脱去, 变为次级糖苷, 15 号峰的消失或含量减少可能发生的转化为脱掉鼠李糖和葡萄糖, 变成次级糖苷(例如淫羊藿苷以及宝藿苷-I 等)。淫羊藿药材在炮制过程中, 14 号峰没变化, 15 号峰

含量减少或消失, 二者结构类似, 为同分异构体, 仅仅是 R¹ 上的两个鼠李糖之间的连接位置不同, 这提示 14 号峰的 rha-(1-2) rha 连接比 15 号峰的 rha-(1-4) rha 连接更为稳定。

指纹图谱上的其他四处变化: 炮制品中 26 号峰、31 号峰、36 号峰和 37 号峰含量都增大, 17 号峰、18 号峰、19 号峰和 20 号峰含量都减少。根据质谱裂解规律, 淫羊藿黄酮上的鼠李糖和葡萄糖都很容易脱去, 变为次级糖苷。而 17 号峰、18 号峰、19 号峰和 20 号峰在 26 号峰、31 号峰、36 号峰和 37 号峰之前出峰, 极性相对较大, 推测 17 号峰、18 号峰、19 号峰和 20 号峰上的糖基脱去, 转化为相应的次级糖苷。

淫羊藿炮制品的药效强于生品, 提示炮制品中成分含量增加的部分很有可能与药效活性相关, 为进一步研究药效提供实验依据。

References

- 1 Lu, T.-L.; Zhang, Y.-S.; Mao, C.-Q.; Ye, D.-J. *China J. Chin. Mater. Med.* **2002**, 27, 6 (in Chinese).
(陆兔林, 张余生, 毛春芹, 叶定江, 中国中药杂志, **2002**, 27, 6.)
- 2 Gao, X.-M.; Li, F.; Zhou, Y.-X. *J. Beijing Univ. Trad. Chin. Med.* **2005**, 28, 3 (in Chinese).
(高希梅, 李飞, 周玉新, 北京中医药大学学报, **2005**, 28, 3.)
- 3 Zhao, Y.-H. *M.S. Thesis*, Jiangsu University, Zhenjiang, **2007** (in Chinese).
(赵艳红, 硕士论文, 江苏大学, 镇江, **2007**.)
- 4 Pei, L.-K.; Guo, B.-L.; Huang, W.-H. *China J. Chin. Mater. Med.* **2008**, 33, 14 (in Chinese).
(裴利宽, 郭宝林, 黄文华, 中国中药杂志, **2008**, 33, 14.)
- 5 Wang, L.-X.; Wang, C.-Z.; Geng, X.-D. *Acta Chim. Sinica* **2006**, 64, 6 (in Chinese).
(王丽霞, 王超展, 耿信笃, 化学学报, **2006**, 64, 6.)
- 6 Zhao, H.-Y.; Sun, J.-H.; Fan, M.-X. *J. Chromatogr. A* **2008**, 1190, 157.
- 7 Dou, J.-P.; Song, F.-R.; Liu, Z.-Q.; Liu, S.-Y. *Acta Chim. Sinica* **2009**, 67, 22 (in Chinese).
(窦建鹏, 宋凤端, 刘志强, 刘淑莹, 化学学报, **2009**, 67, 22.)
- 8 Lü, L.; Zhang, H.; Zhao, L. *Acad. J. Second Military Med. Univ.* **2011**, 32, 3 (in Chinese).
(吕磊, 张海, 赵亮, 第二军医大学学报, **2011**, 32, 3.)

(A1105271 Zhao, C.)