• 研究简报 •

3-取代硫基-5-(2-羟基苯基)-4*H*-1,2,4-三唑类化合物 抑菌活性的定量构效关系和结构修饰的理论研究

冯长君*

(徐州工程学院化学化工学院 徐州 221111)

摘要 用 DFT-B3LYP 方法, 在基组 6-31G 水平, 对 24 种 3-取代硫基-5-(2-羟基苯基)-4*H*-1,2,4-三唑类化合物分子进行几何优化, 并计算了 E_{HOMO} , E_{LUMO} , E_{NHOMO} , E_{NLUMO} , $Q_{\text{C1}} \sim Q_{\text{C8}}$, $Q_{\text{N1}} \sim Q_{\text{N3}}$, Q_{O} , Q_{S} 和 ΔE_1 , ΔE_2 , ΣQ 等量子化学描述符(q_c). 通过最佳变量子集回归建立 13 种上述化合物对大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌等抑菌活性(A_j : A_e , A_m 和 A_s) 的 QSAR 模型. 对于大肠杆菌的 A_e 模型的相关系数(R^2)和逐一剔除法交叉验证系数 R_{cv}^2 依次为 0.930 和 0.871, 相应白色念珠菌 A_m 模型为 0.926 和 0.869, A_s 模型为 0.781 和 0.572. 通过 R_{adj}^2 , F , R_{cv}^2 , VIF, AIC, FIT 等检验, 上述模型具有令人满意的稳健性和预测能力. 结果显示 ΔE_1 和 ΣQ 直接影响这些化合物的生物活性: ΣQ 增大, 其抑菌活性增强; ΔE_1 越高, A_j 下降. 据此提出三唑类化合物分子可能的抑菌机理. 由此发现, 在三唑类化合物分子的 R 中合适部位选用吸电子能力较强的取代基团进行结构修饰, 有利于提高被修饰后分子的抑菌活性. 根据对 R 进行结构修饰(共提出 11 种化合物), 得出 4 种抑菌活性均超出 100% 的三唑类化合物(质量分数为 0.01%), 希望将来得到生物实验的证实.

关键词 3-取代硫基-5-(2-羟基苯基)-4*H*-1,2,4-三唑; 密度泛函理论(DFT); 量化参数; 大肠杆菌; 白色念珠菌; 金黄色葡萄球菌; 抑菌活性; 抑菌机理; 定量构效关系(QSAR)

Theoretical Studies on Quantitative Structure-Activity Relationship and Structural Modification for 3-Substituted Sulfur-5- (2-Hydroxyphenyl)-4*H*-1,2,4-Triazole Compounds

Feng, Changjun*

(School of Chemistry & Chemical Engineering, Xuzhou Institute of Technology, Xuzhou 221111)

Abstract The DFT-B3LYP method, with the basis set 6-31G, was employed to calculate the molecular geometries and electronic structures of 24 3-substituted sulfur-5-(2-hydroxyphenyl)-4*H*-1,2,4-triazole compounds. E_{HOMO} , E_{LUMO} , E_{NHOMO} , E_{NLUMO} , $Q_{\text{C1}} \sim Q_{\text{C8}}$, $Q_{\text{N1}} \sim Q_{\text{N3}}$, Q_{O} , Q_{S} , ΔE_1 , ΔE_2 , ΣQ were selected as quantum chemical descriptors (q_c). The quantitative structure-activity relationships (QSAR) were established by using leaps-and-bounds regression analysis for the antibacterial activities (A_j : A_m , A_e and A_s) of 13 compounds to *Escherichia coli*, *Monilia albican* and *Staphylococcus aureus* along with the q_c . The correlation coefficients (R^2) and the leave-one-out (LOO) cross validation R_{cv}^2 for the A_e , A_m and A_s models were 0.930 and 0.871; 0.926 and 0.869; 0.781 and 0.572 respectively. The QSAR models have both favorable estimation stability and good prediction capability by R_{adj}^2 , F , R_{cv}^2 , VIF, AIC, FIT tests. The results indicate that the ΔE_1 and ΣQ are main factors which can affect the bioactivities of these compounds directly. The antibacterial activities of the compounds increase with the increase of the ΣQ ; however the higher the ΔE_1 is, the

* E-mail: fengcjxzn@xzn.edu.cn

Received July 5, 2011; revised October 31; accepted November 23, 2011.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21075138), the Foundation of Science and Technology Bureau of Xuzhou City (No. XZZD1104), and Foundation of Science and Technology Bureau of Jiawang County (No. XM10A05).

国家自然科学基金(No. 21075138)、徐州市科技局基金(No. XZZD1104)和贾汪区科技局基金(No. XM10A05)资助项目.

lower the A_j is. The possible mechanism has been given for the antibacterial of the triazole compounds. It is known that the suitable structural modifications of R group in triazole compounds with the strong electron-attracting one are beneficial to the antibacterial activities. According to the results (11 compounds) obtained from the structural modifications, the antibacterial activities of four modified molecules are over 100% when mass fraction is 0.01%, and it is expected to be confirmed by using biologic experiments.

Keywords 3-substituted sulfur-5-(2-hydroxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole; density functional theory (DFT); quantum chemical descriptor; *Escherichia coli*; *Monilia albican*; *Staphylococcus aureus*; antibacterial activity; antibacterial mechanism; quantitative structure-activity relationship (QSAR)

物质定量结构-活性相关性(quantitative structure-activity relationship, QSAR)^[1~4]研究主要通过理论计算和各种统计分析工具的结合来探讨若干化合物的结构与其生物学性质之间的数学关系, 以此预测其它化合物的相关性质; 并在分子水平上揭示微观结构对化合物各种生物活性的影响, 推测其可能的作用机理. 目前, 三唑类杀菌剂因具有高效、广谱、低毒、持续时间长的优点, 有良好的内传导兼具保护和治疗作用的杀菌特性, 已成为新农药开发的重要领域^[5~7]. 因此, 利用 QSAR 方法研究与开发新颖三唑类杀菌剂具有重要意义. 最近朱姗姗等^[8]依据邻羟基二苯醚及三唑类化合物的抗菌特性及生物活性叠加原理, 将邻羟基苯基和 1,2,4-三唑分子片断有机结合, 设计合成了 13 种新型 3-取代硫基-5-(2-羟基苯基)-4H-1,2,4-三唑类化合物(Triazoles, Tz). 抑菌测试表明, 这些化合物对大肠杆菌、白色念珠菌和金黄色葡萄球菌具有较强的抑菌活性^[8]. 为进一步提高上述三唑类化合物的抑菌活性, 本文对其进行构效关系研究. 随着计算科学和量子理论的飞速发展, 量子化学方法以其快速有效的特点在 QSAR 研究中发挥着越来越重要的作用. 量子化学参数物理意义明确, 将其引入 QSAR 增加了模型的可解释性. 有些 QSAR 研究中的量子化学计算采用半经验分子轨道(Molecular orbital, MO)方法(如 AM1, PM3 等)或未考虑电子相关的 Hartree-Fock 从头算方法等, 这些方法所得分子的结构参数及电子参数不够精确^[9~11], 对化合物性质进行 QSAR 研究易出现偏差. 本文使用第一性原理(First Principle)的包含电子相关的密度泛函理论(density functional theory, DFT)的 B3LYP (beckes three parameters hybrid method using the LYP correlation functional)方法对分子的几何构型进行全面优化, 并计算出较为可靠的量子化学参数(q_c). 采用最佳变量子集回归(Leaps-and-Bounds regression, LBR)程序建立了上述 13 种分子对大肠杆菌(*Escherichia coli*)、白色念珠菌(*Monilia albican*)和金黄色葡萄球菌(*Staphylococcus aureus*)抑菌活性(Antibacterial activities, A_j)^[8]的 3 个二元

数学模型, 它们的判定系数(R^2)依次为 0.930, 0.926, 0.781, 逐一剔除法(leave-one-out, LOO)的交叉验证相关系数(R_{cv}^2)依次为 0.871, 0.869, 0.572. 并从分子结构水平探讨影响其抑菌活性的主要结构因素, 进而推测其与受体作用的抑菌机理. 最后设计出 4 个对上述三种真菌的抑菌活性的计算值均超过 100% 的新颖三唑类化合物, 期望能为将来相关的生物实验所证实. 该项研究可为新颖、高效三唑类杀菌剂的先导化合物的合理设计及其筛选提供理论参考.

1 理论与方法

1.1 抑菌活性数据

13 种三唑类化合物的基本结构是 3-取代硫基-5-(2-羟基苯基)-4H-1,2,4-三唑(见图 1), 相应取代基(R, 即分子中可变部分)见表 1, 其中后 11 个为新设计的化合物, 加“*”号. 前 13 种化合物在质量分数为 0.01% 及作用时间为 20 min 对大肠杆菌、白色念珠菌和金黄色葡萄球菌的抑菌活性(A_j)来源于文献[8], 具体数据见表 1. 其中 A_e , A_m , A_s 依次代表对大肠杆菌、白色念珠菌和金黄色葡萄球菌的抑菌活性.

图 1 标题化合物的基本结构

Figure 1 The basic structure of title compounds

1.2 分子几何结构优化及量子化学参数计算

由于该类化合物分子均无任何对称性, 为节省计算机时, 先用 Chem3D 程序构建分子, 再用其中 MOPAC 的 AM1 程序对各化合物分子结构进行初步几何优化. 然后运用 G98 量子化学程序包, 在密度泛函理论(DFT)的 B3LYP 方法和 6-31G 基组水平上, 按闭壳层单重态进行全几何优化及量化参数计算. 同时经振动分析, 所得稳定构型均无虚频, 表明对应于各自势能面

表 1 三唑类化合物的抑菌活性(A_j)与量化参数(q_c)Table 1 Antibacterial activities (A_j) and quantum chemical parameters (q_c) of 3-substituted sulfur-5-(1-hydroxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole compounds

No.	R	ΔE_1	ΣQ	A_e		A_m		A_s	
				Exp.	Cal.	Exp.	Cal.	Exp.	Cal.
1	C ₆ H ₅ COCH ₂	0.15563	0.07213	0.971	0.962	0.941	0.945	0.880	0.845
2	4-ClC ₆ H ₄ COCH ₂	0.13954	0.06116	0.982	0.974	0.992	0.962	0.951	0.898
3	4-BrC ₆ H ₄ COCH ₂	0.15109	0.08163	0.980	0.975	0.976	0.963	0.902	0.864
4	4-CH ₃ C ₆ H ₄ COCH ₂	0.14808	0.06144	0.961	0.964	0.934	0.947	0.829	0.868
5	2,4-diCH ₃ C ₆ H ₃ COCH ₂	0.14942	0.05768	0.950	0.959	0.923	0.941	0.817	0.862
6	4-NH ₂ C ₆ H ₄ COCH ₂	0.15864	0.05016	0.942	0.942	0.915	0.918	0.815	0.827
7	4-CH ₃ OC ₆ H ₄ COCH ₂	0.15193	0.05973	0.949	0.958	0.921	0.939	0.810	0.854
8	C ₆ H ₅ CH ₂	0.17190	0.00483	0.880	0.893	0.822	0.848	0.756	0.765
9	2-FC ₆ H ₄ CH ₂	0.17272	0.02104	0.883	0.904	0.852	0.863	0.768	0.768
10	3-FC ₆ H ₄ CH ₂	0.17362	0.02134	0.913	0.903	0.890	0.862	0.770	0.764
11	4-FC ₆ H ₄ CH ₂	0.17326	0.01355	0.929	0.897	0.885	0.855	0.751	0.763
12	CH ₃	0.17384	0.00596	0.879	0.891	0.837	0.846	0.782	0.758
13	H	0.17878	-0.10619	0.807	0.804	0.725	0.723	0.709	0.703
14	4-NO ₂ C ₆ H ₄ COCH ₂ *	0.10319	0.09809		1.047		1.062		1.039
15	4-CNC ₆ H ₄ COCH ₂ *	0.13851	0.09071		0.997		0.994		0.912
16	3,4-diClC ₆ H ₄ COCH ₂ *	0.14580	0.09290		0.990		0.983		0.887
17	3-F-4-ClC ₆ H ₄ COCH ₂ *	0.14614	0.09127		0.988		0.981		0.885
18	4-ClC ₆ H ₄ CH ₂ *	0.17451	0.00792		0.892		0.847		0.757
19	3,4-diClC ₆ H ₄ CH ₂ *	0.17451	0.02131		0.902		0.861		0.761
20	4-NO ₂ C ₆ H ₄ CH ₂ *	0.13262	0.09812		1.010		1.011		0.935
21	4-BrC ₆ H ₄ CH ₂ *	0.17428	0.00580		0.891		0.845		0.757
22	4-ClC ₆ H ₄ COCOCH ₂ *	0.09414	0.06983		1.038		1.049		1.061
23	4-BrC ₆ H ₄ COCOCH ₂ *	0.09482	0.06723		1.035		1.046		1.058
24	4-NO ₂ C ₆ H ₄ COCOCH ₂ *	0.08917	0.09631		1.063		1.085		1.087

上的极小点, 不是马鞍点. 此时分子处于几何最优构象, 即最低能量构象(lowest-energy conformation), 由此可得到分子稳定构型的几何结构参数(如键长键角)及电子结构参数.

根据前线分子轨道理论, 电子的跃迁是由反应物分子前线轨道之间的相互作用引起的, 前线轨道对化学反应起决定的作用. 当然, 也对生物体内的生物化学反应发挥主导作用. 因此, 作者选取了最高占据轨道能(the energy of highest occupied molecular orbital, E_{HOMO}), 次最高占据轨道能(energy of the next highest occupied molecular orbital, E_{NHOMO}), 最低空轨道能(lowest unoccupied molecular orbital, E_{LUMO}), 次最低空轨道能(energy of the next lowest unoccupied molecular orbital, E_{NLUMO})以及二者轨道能隙 $\Delta E_1 (= E_{\text{LUMO}} - E_{\text{HOMO}})$ 和 $\Delta E_2 (= E_{\text{NLUMO}} - E_{\text{NHOMO}})$ 作为表征分子间相互作用的参数. 根据传统化学理论, 所有化学反应都是电荷或轨道间相互作用引起的, 分子内的电荷是引起电子相互作用的主要原因, 并考虑构建 QSAR 模型的需要, 选取了所有分子中都共有的原子的电荷. 即邻-羟基苯基与三唑环中所有原子及硫原子上所带电荷, 依次表示为: $Q_{\text{C1}} \sim Q_{\text{C6}}$ (其和为 Q_{B}), $Q_{\text{H1}} \sim Q_{\text{H6}}$, Q_{O} , $Q_{\text{N1}} \sim Q_{\text{N3}}$, $Q_{\text{C7}} \sim Q_{\text{C8}}$, Q_{S} , 其中

$Q_{\text{H1}} \sim Q_{\text{H4}}$ 为苯环上氢原子上的电荷, Q_{H5} 代表酚羟基中氢原子上的电荷, Q_{H6} 代表亚氨基中氢原子上的电荷. 偶极矩(μ)是衡量分子整体极性强弱的重要参数, 也被选中. 由图 1 及表 1 可见, 每个分子分为 2 部分: 可变部分(即取代基 R)与共有部分(以“T”表示). 显然, R 的改变, 必引起 T 中所有原子上所带电荷量的变化, 因此还计算了每个分子中 T 上所有原子的电荷之和(ΣQ). 上述所有量化参数均以“ q_c ”表示.

1.3 统计回归分析

将每种化合物的上述量化参数(q_c)作为自变量集, 相应的 3 种抑菌活性(A_j)分别为因变量, 应用最佳变量子集回归方法进行变量压缩及选择最佳变量组合, 建立相应定量结构-抑菌活性的 QSAR 模型. 采用逐 n 剔除法(leave- n -out, LNO. 其中 $n=1, 2, 3, \dots$)对模型的预测能力及鲁棒性进行检验, 以交叉验证相关系数($R_{\text{cv-}n}^2$)予以评价. 当 $n=1$, 则为逐一剔除法, 一般公认 $R_{\text{cv-1}}^2 \geq 0.5$ ($R_{\text{cv-1}}^2$ 可简称为“ R_{cv}^2 ”), 所建模型具有良好的鲁棒性与预测能力^[12,13]. 对于 $n=2, 3, \dots$ (对应逐二剔除法, 逐三剔除法等), 适合对建立训练集, 测试集的鲁棒性与预测能力予以检验. 用变异膨胀因子(variance inflation factors, VIF)^[14]评价模型中各自变量的多重相

关性, VIF 的定义式为

$$VIF=1/(1-R^2) \quad (1)$$

式中 R^2 为自变量 X 中某一变量与余下变量的判定系数。如 $VIF=1$, 表明各自变量间完全不相干; 当 $VIF<5$ 时, 说明变量间没有明显的自相关性, 所建模型是稳定的; 当 $VIF>5$ 时, 说明变量间存在明显的共线性, 所建模型一般不能用于估算与预测。

为确立最终的 QSAR 模型, 引入 Akaike 信息判据 (Akaike's information criterion, AIC), Kubinyi 函数 (Kubinyi function, FIT)^[15,16], 其计算公式:

$$AIC=RSS \times \frac{N+M}{(N-M)^2} \quad (2)$$

$$FIT=\frac{R^2(N-M-1)}{(N+M^2)(1-R^2)} \quad (3)$$

式中 RSS 为方差和, N 为化合物数(即样本容量), M 为进入模型的变量数。AIC 值越小, FIT 值越大, 所建的模型越稳定, 预测能力越高。

1.4 低能构象与活性构象

实验得到的生物活性数据是各个化合物处于生物体内的药效构象(pharmacophoric conformation)时的表现, 即药物分子作用于靶标受体时所采用的构象, 亦称为活性构象(active conformation)^[17]。然而人们难以捕捉药物分子在受体内的活性构象, 通常以其低能构象予以代替^[18]。这是因为药物分子的活性构象很接近于或稍高于最低能量构象, 且不能过高, 因为生物系统不可能提供过多的能量^[18]。由此可见, 以量化计算得到的最低能量构象代替其活性构象, 不会产生较大误差。即以该构象所呈现出的量化参数建立的生物活性模型具有科学性和合理性, 是可以接受的。

2 A_J 的 QSAR 分析

2.1 A_J 的多元线性回归模型的确立与检验

将 13 种三唑类化合物的自变量(q_c)及因变量(A_J)所构建的数据集输入 MINITAB 统计分析软件, 运用其中

的最佳子集回归程序进行变量压缩及选择最佳变量组合, 建立相应的 QSAR 模型。标题化合物对大肠杆菌抑菌活性 A_e 的最佳变量组合见表 2, 其中 R^2 , R_{adj}^2 , R_{cv}^2 , S , S_{cv} , F , AIC, FIT 分别为判定系数(亦称削减误差比例), 校正判定系数(以消除自变量个数及样本容量对判定系数的影响), LOO 的交叉验证系数, 估计标准误差, LOO 的估计标准误差, Fisher 统计值, Akaike 信息判据, Kubinyi 函数。

由表 2 可见, 随着自变量数目增多, 其 R^2 逐渐增大, 而 F 逐渐减小, 显然不能依据这 2 种指标来确定最终的数学模型。虽然 R_{adj}^2 , R_{cv}^2 , S , S_{cv} , AIC 均在三元数学模型处出现转折点, 好似此模型质量相对最好, 应当选择该模型。在多元回归分析中, 为使所得预测模型具有较高的可信度, 一般遵循如下经验规则: $N/M \geq 5$; 此处, N 是样本容量, M 是引进回归模型中自变量的个数。本研究的样本容量 $N=13$, 其 $M \leq 2$ 。结合 FIT 在二元数学模型处出现转折, 因此本文最终选定该二元数学模型作为对大肠杆菌抑菌活性的最佳 QSAR 模型:

$$A_e=1.105+0.726\Sigma Q-1.254\Delta E_1 \quad (4)$$

$$N=13, R^2=0.930, R=0.964, R_{adj}^2=0.916, P=0.000, R_{cv}^2=0.871, S=0.0148, F=66.167$$

同理建立了对白色念珠菌抑菌活性的最佳 QSAR 模型:

$$A_m=1.142+1.017\Sigma Q-1.735\Delta E_1 \quad (5)$$

$$N=13, R^2=0.926, R=0.962, R_{adj}^2=0.911, P=0.000, R_{cv}^2=0.869, S=0.0213, F=62.314$$

及对金黄色葡萄球菌抑菌活性的最佳 QSAR 模型:

$$A_s=1.369+0.341\Sigma Q-3.522\Delta E_1 \quad (6)$$

$$N=13, R^2=0.781, R=0.884, R_{adj}^2=0.737, P=0.001, R_{cv}^2=0.572, S=0.0345, F=17.829$$

模型(4)~(6)中 R_{adj}^2 用于模型拟合优度的检验, R_{adj}^2 越大, 方程拟合优度越好。显著水平 $P=0.000$ 或 0.001 , 远小于一般给定的 0.05 , 说明三个模型的显著性均很高。 ΣQ , ΔE_1 的 VIF 均为 2.482, 都小于 5, 表明 ΣQ , ΔE_1

表 2 量化参数与 A_e 的最佳变量子集回归结果

Table 2 The results of quantum chemical descriptors (Q_i) and A_e with Leaps-and-Bounds regression

No.	R^2	R_{adj}^2	R_{cv}^2	AIC	FIT	S	S_{cv}	F	Variables
1	0.889	0.879	0.743	0.00078	6.2928	0.0178	0.0270	87.805	ΣQ
2	0.930	0.916	0.871	0.00050	7.8151	0.0148	0.0201	66.167	$\Sigma Q, \Delta E_1$
3	0.948	0.931	0.911	0.00044	7.4580	0.0134	0.0176	54.868	$\Sigma Q, \Delta E_1, Q_B$
4	0.951	0.926	0.395	0.00395	5.3540	0.0138	0.0485	38.656	$\Sigma Q, \Delta E_1, Q_B, Q_{C3}$

几乎不相关, 这些模型中不存在共线性, 是高度稳定的. 又根据 R_{cv}^2 (≥ 0.5), F , AIC, FIT 可知, 它们都具有良好的鲁棒性与预测能力. 上述抑菌活性的实验值与模型估算值均见表 1.

为了进一步验证所建 QSAR 模型的预测能力, 把 13 个化合物分成训练集 10 个化合物和测试集 3 个化合物, 共形成 286 个训练集与测试集. 利用 MATLAB 自编程序计算了这些训练集、测试集的相关系数及逐三剔除法 (leave-three-out, LTO) 的交叉验证相关系数 (R_{cv-3}^2). 对于 286 个 A_e 训练集二元方程的相关系数的平均值为 0.962, 相应 $R_{cv-3}^2=0.872$; 286 个 A_m 训练集二元方程的相关系数的平均值为 0.960, 相应 $R_{cv-3}^2=0.834$; 286 个 A_s 训练集二元方程的相关系数的平均值为 0.893, 相应 $R_{cv-3}^2=0.505$. 它们的相关系数平均值及 R_{cv-3}^2 与模型(4)~(6)均较接近. 如其中剔除序号为 3, 8, 12 这 3 个化合物为测试集, 余下为训练集, 所建立的模型如下:

$$A_e = 1.064 + 0.740\Sigma Q - 0.989\Delta E_1 \quad (7)$$

$$N=10, R^2=0.928, R=0.963, R_{adj}^2=0.907, P=0.000, S=0.0157, F=44.956$$

$$A_m = 1.088 + 1.019\Sigma Q - 1.389\Delta E_1 \quad (8)$$

$$N=10, R^2=0.927, R=0.963, R_{adj}^2=0.906, P=0.000, S=0.0218, F=44.482$$

$$A_s = 1.405 + 0.232\Sigma Q - 3.763\Delta E_1 \quad (9)$$

$$N=10, R^2=0.776, R=0.881, R_{adj}^2=0.712, P=0.005, S=0.0368, F=12.139$$

模型(7)~(9)给出的计算值及测试集的预测值依次见图 2 至图 4, 其实验值与相应的计算值或预测值均较好吻合. 如模型(7)对第 3, 8, 12 号化合物预测的相对误差依次为 -1.5%, 4.0%, 1.9%; 模型(8)为 -0.5%, 2.0%, 2.0%; 模型(9)为 -5.1%, 0.5%, -3.8%; 均在生物实验测定误差以内. 由此表明模型(4)~(6)均为高度鲁棒, 显著相关模型, 不仅可用于标题化合物抑菌活性的估算与预测, 也可用于抑菌机理的解释.

2.2 抑菌机理的分析

三唑类化合物是甾醇生物合成中 C-14 脱甲基化酶抑制剂, 其活性基为三唑环. 此环能够进入到真菌体内, 和菌中的铁卟啉(Porphyrin)的中心铁(简记为“Pr-Fe”)实行原子配对来阻碍铁卟啉铁氧络合物(简记为“Pr-Fe-O”)的形成, 抑制麦角甾醇的合成, 从而达到杀菌目的. 即其抑菌机理可能是三唑类化合物分子与病菌体内靶标分子发生可逆性化学作用, 其实质是三唑类化合物分子对铁卟啉的中心铁原子的配合反应, 形成铁卟

图 2 标题化合物对大肠杆菌抑菌活性的实验值与计算值的关系

Figure 2 Relationship between experimental and calculated antibacterial activities of title compounds to *Escherichia coli*

图 3 标题化合物对白色念珠菌抑菌活性的实验值与计算值的关系

Figure 3 Relationship between experimental and calculated antibacterial activities of title compounds to *Monilia albican*

图 4 标题化合物对金黄色葡萄球菌抑菌活性的实验值与计算值的关系

Figure 4 Relationship between experimental and calculated antibacterial activities of title compounds to *Staphylococcus aureus*

啉与三唑类分子的配合物(简记为“Pr-Fe-Tz”). 它与铁卟啉的中心铁原子的配位能力比氧越强, 相应结合力越大, 越能有效阻止形成铁卟啉铁氧络合物, 而抑制麦角甾醇的合成, 显示高的抑菌活性.

根据进入模型(4)~(6)中的 ΔE_1 , ΣQ 可知, 影响抑菌活性的主要因素是 E_{HOMO} , E_{LUMO} 和每个分子都共有部分所有原子上电荷之和. 福井谦一(K. Fukui)为解释化学反应机理于 1951 年提出前线分子轨道理论(frontier molecular orbital theory), 该理论认为分子在反应过程中优先起作用的是前线分子轨道(如 HOMO, NHOMO, LUMO 和 NLUMO). 即属于分子体系中最敏感部分, 对于分子的化学性质特别是其反应活性有着决定性作用. 一般地讲, HOMO 对电子束缚较为松弛, 具有电子给予体的性质, 表现为 E_{HOMO} 越大, 其上电子受核吸引力越小, 越易失去而引发还原反应. LUMO 对电子的亲合力较强, 具有电子接受体的性质, 表现为 E_{LUMO} 越低, 越易提供空轨道, 接受电子而引发氧化反应. 三唑类化合物分子的 E_{LUMO} 越低, 铁卟啉的中心铁原子上的电子易于进入, 形成“反馈式”配位键. 相应 E_{HOMO} 越高, 此 HOMO 上电子越易进入铁卟啉的中心铁原子上的空轨道, 而形成正常的配位键. 这 2 种键都加强了配合物 Pr-Fe-Tz 的稳定性, 有效阻碍形成铁卟啉铁氧络合物, 从而抑制麦角甾醇的合成, 呈现高的抑菌活性. 即 E_{LUMO} 与 A_j 成负相关, E_{HOMO} 与 A_j 为正相关. 由于 $\Delta E_1 = E_{\text{LUMO}} - E_{\text{HOMO}}$, 所以 ΔE_1 与 A_j 成负相关, 这与模型(4)~(9)中 ΔE_1 前的系数均小于零是一致的.

每个分子的 ΣQ 主要集中在与三唑环直接链接的硫(所带电荷量为 Q_s)、三唑环中与苯酚基链接的碳(所带电荷量为 Q_{C7})及氢(所带电荷量为 $Q_{H1} \sim Q_{H6}$)等原子上. ΣQ (即正电荷量)越大, 对铁卟啉的中心铁原子上电子吸引力越强, 致使其电子主要向硫原子及三唑环上迁移, 引起铁原子的价态升高, 使氧对卟啉铁的配位受阻, 从而抑制病原体合成麦角甾醇, 呈现较高的抑菌活性. 可见, ΣQ 与 A_j 为正相关关系, 此被模型(4)~(9)中 ΣQ 前系数均为正值予以证实.

模型(4)~(9)中的自变量均为 ΔE_1 , ΣQ , 显示了三唑类分子对大肠杆菌、白色念珠菌和金黄色葡萄球菌的抑菌机理的共性: 三唑类分子与铁卟啉中铁原子之间形成正常的配位键与“反馈式”配位键的可逆化学反应, 以及它们之间的电荷转移作用. 但这三种真菌体在生理构造上存在一定的差别, 受到同样剂量的三唑类化合物作用时, 虽然作用机理相同, 但抑菌活性必然呈现出变异性. 此种变异, 模型(4)~(9)是以 ΔE_1 , ΣQ 前的系数互不相同予以表征. ΣQ 的抑菌活性是按白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌顺序递降, ΔE_1 的抑菌活性是按大肠

杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌顺序递增(ΔE_1 前系数的绝对值是递增的). 总体上讲, 能提高 ΣQ 及降低 ΔE_1 的基团引入, 将有利于改善三唑类化合物分子的抑菌活性. 此即对三唑类化合物分子进行结构改造, 以获得高抑菌活性的基本依据.

3 结构修饰

据表 1 中前 13 个化合物可把 R 分为 4 类: $R^1 = X_nC_6H_{5-n}COCH_2$, $R^2 = X_nC_6H_{5-n}CH_2$ (X 为苯环上的取代基), $R^3 = CH_3$, $R^4 = H$. 在 X 相同情况下, R^1 的 ΔE_1 在 0.15 左右, ΣQ 在 0.06 左右; R^2 的 ΔE_1 在 0.17 左右, ΣQ 在 0.02 左右; 二者相差较大. 据模型(4)~(6)可知, R^1 抑菌活性明显好于 R^2 . 因此, 首先以表 1 中抑菌活性最高的, 即第 2 个化合物为例, 尝试对其进行分子结构修饰, 以设计出对大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌等具有更高抑菌活性的新的三唑类杀菌剂. 由表 1 可见, R^1 中的 X 为吸电子基团, 使 ΔE_1 降低, 相应 ΣQ 升高; 如为供电子基团, 则使 ΔE_1 升高, 相应 ΣQ 降低. 因此, X 为吸电子基团或供电子基团, 都有可能使抑菌活性提高, 但前者更优. 基于上述分析, 选用 F, Cl 等供电子基团, 分别进入第 2 个化合物 R^1 中苯环的第 3 位; 选用硝基、氰基等吸电子基团, 分别替代第 2 个化合物中 Cl 原子. 如此设计了 4 个新三唑类化合物, 它们的 ΔE_1 , ΣQ 及计算的抑菌活性见表 1 的第 14~17 个化合物. 由表 1 可见, 分子中硝基、氰基的引入, 使抑菌活性有大幅度提高, 成为预测值中最高的. 如第 14 个化合物对大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌的抑菌活性依次达到 104.7%, 106.2%, 103.9% 以上, 有望开发为新型三唑类杀菌剂. 在 R^2 中苯环的第 3 位, 第 4 位分别选用 Br, Cl 及硝基等作为取代基, 又构建了 4 个新三唑类化合物, 即表 1 的第 18~21 个化合物. 按模型(4)~(6)计算的抑菌活性明显低于前 4 个化合物, 只有硝基的引入使抑菌活性较高, 表明对 R^2 的结构修饰是不可取的.

在 X 相同情况下, R^1 与 R^2 的结构差别在于 R^1 中多 1 个羰基(CO), 致使 R^1 的 ΔE_1 下降了 0.02 左右, ΣQ 升高了 0.04 左右. 按模型(4)~(6)可知, 在 R 中增加 CO 基团, 预示抑菌活性增强(此与文献[8]是一致的). 为此, 在 R^1 基础上进一步提出 $R^5 = X_nC_6H_{5-n}COCOCCH_2$, 其中的 X = Cl, Br, NO_2 , 即表 1 的第 22~24 个化合物. R^5 比 R^1 多 1 个羰基(CO), 使其 ΔE_1 在 0.09 左右, 下降约 0.06; ΣQ 在 0.07 左右, 升高约 0.01. 按模型(4)~(6)计算的抑菌活性有大幅度提高, 它们对大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌的抑菌活性均在 100% 以上. 表明这 3 个化合物可以在质量分数低于 0.01% 或作用时间少于 20 min

情况下, 对这 3 种真菌发挥良好的抑菌作用. 当然, 修饰后的这些化合物的抑菌活性有待生物活性试验予以验证.

根据上述三种结构修饰结果及表 1 中数据, 可归纳出如下规律: R 中引入吸电子基团(如 CO, NO₂, CN), 导致新三唑类分子的 ΔE_1 下降, ΣQ 升高, 相应抑菌活性增强; R 中引入供电子基团(如 Cl, F, Br), 导致新三唑类分子的 ΔE_1 升高, ΣQ 下降, 相应抑菌活性减弱. 因此, 对三唑类杀菌剂进行结构修饰的基本原则是于 R 中引入吸电子能力强的基团有利于提高新化合物的抑菌活性.

4 结论

(1) 采用考虑了电子相关作用的 DFT-B3LYP 方法, 在较高基组 6-31G 水平下获得 24 种三唑类化合物的量化结构参数. 利用最佳变量子集回归方法, 建立了它们对大肠杆菌、白色念珠菌和金黄色葡萄球菌抑菌活性的二元数学模型(4)~(6). 这 3 个模型经 R^2 , R_{adj}^2 , R_{cv}^2 , F , VIF, AIC, FIT 等质量指标检验, 以及 286 个测试集的检验, 不仅显示良好的相关性, 而且具有较强的鲁棒性及预测能力.

(2) 根据模型(4)~(6)可见, 三唑类分子对此三种真菌体的抑菌共性是与铁卟啉中铁原子之间形成正常的配位键与“反馈式”配位键的可逆化学反应, 及其电荷转移作用, 从而阻碍形成铁卟啉铁氧络合物, 抑制真菌体合成麦角甾醇. 又以模型(4)~(6)中 ΔE_1 , ΣQ 前的系数互不相同表征三种真菌体抗药性的差异. 由此表明 ΔE_1 , ΣQ 是影响三唑类杀菌剂抑菌活性的主要因素.

(3) 于 R 中引入能提高 ΣQ 及降低 ΔE_1 的吸电子基团, 将有利于改善三唑类化合物分子的抑菌活性. 如硝基、氰基、羰基的引入, 可使抑菌活性得到显著提高. 希望表 1 中第 14 及 22~24 共 4 个新颖三唑类化合物的抑菌活性能被生物实验所验证.

综上所述, 本研究对优化、改造现有三唑类化合物的分子结构提供理论参考, 也为进一步设计结构新颖、高抑菌活性的三唑类化合物提供理论指导.

References

- 1 Feng, C.-J. *Acta Phys.-Chim. Sin.* **2010**, *26*, 193 (in Chinese).
(冯长君, 物理化学学报, **2010**, *26*, 193.)
- 2 Feng, C.-J.; Yang, W.-H.; Mu, L.-L.; Cai, K.-Y. *Acta Chim. Sinica* **2008**, *66*, 2093 (in Chinese).
(冯长君, 沐来龙, 杨伟华, 蔡可迎, 化学学报, **2008**, *66*, 2093.)
- 3 Nanbo, A.; Nanbo, T. *Quant. Struct.-Act. Relat.* **2002**, *21*, 613.
- 4 Xie, H.-J.; Lei, Q.-F.; Hu, X.-H.; Xuan, G.-D.; Fang, W.-J. *Acta Chim. Sinica* **2011**, *69*, 399 (in Chinese).
(谢湖均, 雷群芳, 胡晓环, 宣贵达, 方文军, 化学学报, **2011**, *69*, 399.)
- 5 Bai, X.; Zhou, C.-H.; Mi, J.-L. *Chem. Res. Appl.* **2007**, *19*, 721 (in Chinese).
(白雪, 周成合, 米佳丽, 化学研究与应用, **2007**, *19*, 721.)
- 6 Sun, X.-H.; Bai, Y.; Liu, Y.-F.; Chen, B. *Acta Chim. Sinica* **2010**, *68*, 788 (in Chinese).
(孙晓红, 白燕, 刘源发, 陈邦, 化学学报, **2010**, *68*, 788.)
- 7 Yang, S.-H.; Zhai, Z.-W.; Xu, L.-Z. *Agrochemicals* **2010**, *49*, 645 (in Chinese).
(杨双花, 翟智卫, 许良忠, 农药, **2010**, *49*, 645.)
- 8 Zhu, S.-S.; Lu, J.-R.; Xin, C.-W.; Lu, B.-W.; Bao, X.-R.; Zou, M.; Liu, Q. *Chem. J. Chin. Univ.* **2010**, *31*, 2228 (in Chinese).
(朱姗姗, 卢俊瑞, 辛春伟, 卢博为, 鲍秀荣, 邹敏, 刘倩, 高等学校化学学报, **2010**, *31*, 2228.)
- 9 Wang, X.-D.; Lin, Z.-F.; Yin, D.-Q.; Liu, S.-S.; Wang, L.-S. *Sci. China, Ser. B-Chem.* **2005**, *48*, 246.
- 10 Zhang, L.; Wan, J.; Yang, G.-F. *Bioorg. Med. Chem.* **2004**, *12*, 6183.
- 11 Wan, J.; Zhang, L.; Yang, G.-F. *J. Comput. Chem.* **2004**, *25*, 1827.
- 12 Douglas, M. H.; Subhash, C. B.; Denise, M. *J. Chem. Inf. Comput. Sci.* **2003**, *43*, 579.
- 13 Clark, M.; Cramer, R. D. *Quant. Struct.-Act. Relat.* **1993**, *12*, 137.
- 14 Wei, D.-B.; Zhang, A.-Q.; Wu, C.-D.; Han, S.-K.; Wang, L.-S. *Chemosphere* **2001**, *44*, 1421.
- 15 Urrea, L. S.; Gonzalez, M. P.; Teijeira, M. *Bioorg. Med. Chem.* **2006**, *14*, 7347.
- 16 Urrea, L. S.; Gonzalez, M. P.; Teijeira, M. *Bioorg. Med. Chem.* **2007**, *15*, 3565.
- 17 Zhang, W.-N. *Modern Drug Design*, China Medical Science and Technology Press, Beijing, **2006**, p. 145 (in Chinese).
(张万年, 现代药物设计学, 中国医药科技出版社, 北京, **2006**, p. 145.)
- 18 Guo, Z.-R. *Molecular Drug Design*, Science Press, Beijing, **2005**, p. 485 (in Chinese).
(郭宗儒, 药物分子设计, 科学出版社, 北京, **2005**, p. 485.)

(A1107052 Cheng, B.)