• 研究论文 •

Brazilin 类似物的合成

潘成学^{a,b} 关一富^b 张洪彬^{*,b}

(^a 广西师范大学化学化工学院 药用资源化学与药物分子工程国家重点实验室培育基地 桂林 541004)

(^b 云南大学化学科学与工程学院 教育部自然资源药物化学重点实验室 昆明 650091)

摘要 以 3-(3,4-二甲氧苯基)丙酸为原料, 经分子内傅-克反应、双羟基化、Lombardo 反应, 高价碘的氧化及类 Pinacol 重排等共 10 步反应, 完成了 brazilin 类似物的合成。

关键词 brazilin; 天然产物类似物; 合成

Synthesis of a Brazilin Analog

Pan, Chengxue^{a,b} Guan, Yifu^b Zhang, Hongbin^{*,b}

(^a State Key Laboratory Cultivation Base for the Chemistry and Molecular Engineering of Medicinal Resources, Guangxi Normal University, Guilin 541004)

(^b Key Laboratory of Medicinal Chemistry for Natural Resource, Ministry of Education, Yunnan University, Kunming 650091)

Abstract In this paper the synthesis of a brazilin analog starting from 3-(3,4-dimethoxy-phenyl)-propionic acid is reported. The synthetic route was finished in 10 steps including intramolecular Friedel-Crafts acylation, dihydroxylation, Lombardo reaction, oxidation with hypervalent iodine compounds, semipinacol rearrangement reaction and so on.

Keywords brazilin; natural product analog; synthesis

天然产物是各种药物先导化合物的重要源泉, 目前在临床上使用的各种药物中, 有近 80%来源于天然产物或受天然产物结构的启发, 仅在抗肿瘤药物方面, 就有超过 60%来自于天然产物^[1]。从活性天然产物骨架中寻找新药及新药研发信息, 依然是今后新药研发的最重要途径^[2]。

(+)-Brazilin 是从药材苏方木中分离^[3]得到一个天然产物(Figure 1), 具有抗菌^[4]、抗炎^[5]、细胞毒性^[6]、降低血液粘度^[7]、端粒酶抑制^[8]及切割 DNA^[9]等活性, 因此其衍生物的合成方法引起了许多课题组的兴趣^[10~13], 最近我们也对其氮杂衍生物的合成及生物活性进行了研究^[14]。在进行三甲醚化 brazilin (1)的合成时, 我们碰到了一些有趣的化学问题, 并得到了 brazilin 的一个类似物 2。以下是我们对 1 的逆合成分析(Scheme 1)。

图 1 (+)-brazilin, 三甲醚 brazilin (1)及其类似物 2 的结构
Figure 1 Structures of (+)-brazilin, trimethylbrazilin (1) and its analog 2

* E-mail: zhanghb@ynu.edu.cn; panling74@163.com

Received September 9, 2011; accepted October 18, 2011.

National Basic Research Program of China (973 Program, No. 2009CB522300).

国家 973 重大基础研究计划子项目(No. 2009CB522300)资助项目。

根据以上逆合成分析, 我们首先以 3-(3,4-二甲氧苯基)丙酸为原料, 经分子内的傅-克反应合成茚酮 **4**, **4** 再经过与 2,4-二甲氧苯基锂加成等 7 步反应得到化合物 **10**. 但试图实现化合物 **10** 中酚羟基与伯醇羟基间形成醚键的很多尝试都没有获得成功, 在大部分情况下反应产物都很复杂, 一些反应条件下得到两个极性非常相近、难以分离的混合物(Scheme 2). 为此我们又改用 4-二甲氧苯基锂与茚酮 **4** 反应, 经过与前面类似的转化后得到中间体 **16**. 然后试图通过二乙氧基碘苯(DIB)氧化等步骤来获得化合物 **1**, 但最终的产物是其类似物 **2** (Scheme 3), 以下是我们对这一研究的报道.

图式 1 Trimethylbrazilin 的逆合成分析

Scheme 1 Retrosynthetic analysis of trimethylbrazilin

Reagents and conditions: (a) i) $(\text{COCl})_2$, DCM, r.t.; ii) AlCl_3 , r.t.; (b) Ar-Li , THF, -78°C ; (c) $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$; (d) NMO/OsO_4 , $V(\text{acetone}) : V(\text{H}_2\text{O}) = 9 : 1$; (e) CeCl_3/NaI , CH_3CN , reflux; (f) Lombardo Reagent, r.t.; (g) $\text{H}_2/\text{Pd/C}$, EtOH, 45°C ; (h) $\text{CH}(\text{OMe})_3/\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$, DCM, 0°C

图式 2 三甲醚化 brazilin 的合成路线 1

Scheme 2 The first route toward the trimethylbrazilin

Reagents and conditions: (a) Ar-Li , THF, -78°C ; (b) $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$; (c) NMO/OsO_4 , $V(\text{acetone}) : V(\text{H}_2\text{O}) = 9 : 1$; (d) CeCl_3/NaI , CH_3CN , reflux; (e) Lombardo Reagent, r.t.; (f) $\text{H}_2/\text{Pd/C}$, EtOH, 45°C ; (g) DIB, CH_3OH , 0°C .

图式 3 三甲醚化 brazilin 的合成路线 2

Scheme 3 The second route toward the trimethylbrazilin

1.2 化合物 4 的合成

将芳基丙酸 **3** (21.0 g, 0.10 mol) 溶解于 200 mL 无水二氯甲烷, 加入 0.5 mL DMF, 室温下慢慢滴加草酰氯 (31.8 g, 21.3 mL, 0.25 mol, 1 h 滴完), 然后继续搅拌 12 h, 在搅拌下将所得芳基丙酰氯与三氯化铝 (27.0 g, 0.20 mol) 各分三批加入到 150 mL 的无水二氯甲烷中 (每次间隔约 7~8 min), 于室温下继续搅拌 3 h. 反应完成后用冰水浴冷却, 小心的往反应混合物中加入 20~30 g 碎冰, 然后再加入 100 mL 水. 分出二氯甲烷层, 水层再用二氯甲烷萃取 (80 mL $\times$ 2); 合并有机层, 用饱和食盐水洗涤三次, 无水硫酸钠干燥. 过滤, 活性炭脱色, 滤去活性炭后减压除去溶剂, 用硅胶柱层析提纯 ($V_{\text{乙酸乙酯}} : V_{\text{石油醚}} = 1 : 4$) 得到 13.1 g 浅黄色液体 **4**, 产率 68%, m.p. 116~117 °C (Lit.^[15]: 118.8~119.5 °C); ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 7.16 (s, 1H, ArH), 6.90 (s, 1H, ArH), 3.98 (s, 3H, OCH_3), 3.90 (s, 3H, OCH_3), 3.03 (s, 2H, CH_2), 2.66 (s, 2H, CH_2); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ : 205.54, 155.27, 150.32, 149.25, 129.75, 107.41, 103.99, 56.11, 55.95, 36.40, 25.46.

1.3 化合物 5 的合成

在氮气保护, -78 °C 下将 13.1 mL (1.6 mol/L, 21.0 mmol) 正丁基锂的正己烷溶液滴加到溶有 2,4-二甲氧基溴苯^[16] (7.36 g, 20.0 mmol) 的 150 mL 无水 THF 溶液中, 滴加完成后, 在 -78 °C 下继续搅拌 1.5 h 制得芳基锂. 然后用注射器把溶解于 30 mL 无水 THF 的茚酮 **4** (3.84 g, 20.0 mmol) 慢慢加到芳基锂溶液中, -78 °C 下继续搅拌 1 h. 反应完成后往反应混合液中加入饱和氯化铵溶液 (10 mL). 将反应瓶拿到室温下, 往其中加入 2 mol/L 硫酸 (40 mL), 室温下继续搅拌 0.5 h. 乙酸乙酯萃取 (2×100 mL), 饱和食盐水洗涤 (50 mL $\times$ 3), 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂后用硅胶柱层析提纯 ($V_{\text{DCM}} : V_{\text{PE}} = 1 : 4$), 得到 5.8 g 白色晶体 **5**, 产率 62%. ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 7.19~7.40 (m, 11H, ArH), 7.04 (s, 1H, ArH), 6.91 (s, 1H, ArH), 6.70 (s, 1H, ArH), 6.62 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, ArH), 6.43 (s, 1H, $\text{C}=\text{CH}$), 5.00 (s, 4H, OCH_2), 3.85 (s, 3H, OCH_3), 3.71 (s, 3H, OCH_3), 3.38 (s, 2H, CH_2); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ : 159.55, 157.25, 147.94, 147.17, 141.55, 138.05, 136.93, 136.86, 136.41, 130.97, 130.70, 128.55, 128.31, 127.98, 127.53, 126.74, 118.96, 107.98, 106.04, 105.10, 101.58, 70.26, 70.13, 56.13, 56.05, 38.17.

1.4 化合物 6 的合成

将化合物 **5** (4.64 g, 10.0 mmol) 溶解于 150 mL 丙酮中, 往其中加入 14 mL 水, 然后再加入氮氧化氮甲基吗

啡啉 (5.85 g, 50 mmol) 及 5 mL 1% 的四氧化锇水溶液, 室温下搅拌 20 h. 待反应完全后, 往其中加入 20 mL 饱和硫代硫酸钠溶液, 继续搅拌 2 h, 乙酸乙酯萃取 (80 mL $\times$ 3), 饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂后用硅胶柱层析提纯 ($V_{\text{乙酸乙酯}} : V_{\text{石油醚}} = 1 : 1$), 得到 3.27 g 白色固体 **6**, 产率 66%. ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 7.25~7.38 (m, 10H, ArH), 6.80 (s, 1H, ArH), 6.75 (s, 1H, ArH), 6.63~6.68 (m, 2H, ArH), 6.43 (dd, $J=8.5, 2.1$ Hz, 1H, ArH), 5.02 (s, 2H, OCH_2), 4.99 (s, 2H, OCH_2), 4.56 (brs, 1H, CHOH), 4.37 (s, 1H, CHOH), 3.86 (s, 3H, OCH_3), 3.78 (s, 3H, OCH_3), 3.17 (s, 1H, CHOH), 2.85 (brs, 2H, CH_2); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ : 159.80, 157.07, 149.97, 148.87, 136.74, 135.84, 135.69, 133.18, 129.46, 128.80, 128.66, 128.36, 128.13, 127.54, 127.41, 124.07, 108.03, 105.43, 101.27, 85.32, 78.42, 70.54, 70.24, 56.09, 56.02, 38.34.

1.5 化合物 7 的合成

将化合物 **6** (4.96 g, 10.0 mmol) 溶解于 100 mL 乙腈中, 再加入无水碘化钠 (3.00 g, 20.0 mmol) 及七水合三氯化铋 (1.10 g, 3.0 mmol), 在氮气保护下回流 4 h. 待反应完全后, 往其中加入 50 mL 水, 用乙酸乙酯萃取 (60 mL $\times$ 3), 酯层用饱和硫代硫酸钠溶液洗涤 (60 mL $\times$ 2), 再用饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂后用硅胶柱层析提纯 ($V_{\text{DCM}} : V_{\text{PE}} = 1 : 1$), 得 3.36 g 白色固体 **7**, 产率 70%. ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 7.24~7.39 (m, 8H, ArH), 6.98~7.10 (m, 3H, ArH), 6.65 (s, 1H, ArH), 6.51~6.56 (m, 3H, ArH), 5.00 (s, 2H, OCH_2), 4.71~4.81 (m, 2H, OCH_2), 4.54 (s, 1H, CH), 3.86 (s, 3H, OCH_3), 3.74 (s, 3H, OCH_3), 3.38 (d, $J=22.2$ Hz, 1H, CH^aH), 3.13 (d, $J=22.2$ Hz, 1H, CH^bH); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ : 159.80, 215.91, 159.72, 156.83, 148.91, 148.73, 136.95, 136.06, 134.33, 131.65, 129.03, 128.63, 128.30, 128.02, 127.58, 121.12, 107.78, 105.66, 101.08, 70.26, 56.69, 56.11, 43.33.

1.6 化合物 8 的合成

Lombardo 试剂的制备^[17]: 将锌粉 (5.75 g, 90 mmol) 和二溴甲烷 (2.0 mL, 5.00 g, 29 mmol) 加入到 50 mL 无水 THF 中, 氮气保护, 冷却至 -40 °C 后搅拌下往其中滴加四氯化钛 (2.3 mL, 4.00 g, 21 mmol), 滴完后在 $0 \sim 5$ °C 下继续搅拌 3 d, 0 °C 以下氮气氛围中密封保存备用.

将化合物 **7** (2.40 g, 5.0 mmol) 溶解于 100 mL 无水二氯甲烷中, 室温下慢慢滴加 2~3 equiv. 的 Lombardo 试剂, 滴完后室温下继续搅拌 2 h. TLC 检测反应完成后, 把反应瓶置于冰水浴中, 小心往其中滴加 50 mL 饱和碳

酸氢钠溶液, 继续搅拌 20 min, 然后静置至清晰分层后, 分出有机层, 水层用二氯甲烷萃取(60 mL $\times$ 2), 合并二氯甲烷层, 饱和食盐水洗 2 次, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂后用硅胶柱层析提纯($V_{\text{乙酸乙酯}}:V_{\text{石油醚}}=1:20$)得 1.48 g 淡黄色固体 **8**, 产率 62%。 ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 7.22~7.33 (m, 10H, ArH), 6.80 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, ArH), 6.63 (s, 1H, ArH), 6.57 (d, $J=1.8$ Hz, 1H, ArH), 6.40~7.45 (m, 2H, ArH), 5.22 (s, 1H, CH), 4.91~4.95 (m, 5H, OCH_2 , $\text{C}=\text{CH}_2$), 4.82~4.84 (m, 1H, $\text{C}=\text{CH}_2$), 3.76 (s, 3H, OCH_3), 3.57~3.60 (m, 5H, OCH_3 , CH_2); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ : 158.62, 157.31, 154.38, 148.56, 148.48, 137.89, 137.13, 137.06, 133.46, 130.10, 128.63, 128.48, 128.04, 127.84, 127.66, 127.35, 126.67, 108.38, 108.03, 107.41, 105.87, 100.81, 70.24, 56.08, 49.74, 38.93.

1.7 化合物 9 的合成

与合成化合物 **6** 的实验操作方法相同, 粗产物用硅胶柱层析提纯($V_{\text{乙酸乙酯}}:V_{\text{石油醚}}=1:1$), 产率 86%。 ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 7.06~7.21 (m, 11H, ArH), 6.63 (s, 1H, ArH), 6.55 (s, 1H, ArH), 6.30 (s, 2H, ArH), 4.83~4.97 (m, 4H, OCH_2), 4.57 (s, 1H, CH), 3.69 (s, 3H, OCH_3), 3.57 (s, 3H, OCH_3), 3.03~3.16 (m, 3H, CH_2OH , OH), 2.89 (d, $J=15.6$ Hz, 1H, $\text{CH}^{\text{a}}\text{H}$), 2.65 (d, $J=15.6$ Hz, 1H, CHH^{b}); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ : 158.89, 156.93, 148.81, 148.68, 136.81, 135.95, 135.55, 133.25, 129.64, 128.92, 128.70, 128.57, 128.17, 127.86, 127.62, 121.71, 108.85, 108.06, 106.80, 101.26, 85.55, 71.28, 70.30, 66.70, 56.09, 53.90, 41.67.

1.8 化合物 10 的合成

将化合物 **9** (1.02 g, 2.0 mmol) 溶解于 100 mL 无水乙醇中, 加入 30 mg 10% Pd/C, 45 $^{\circ}\text{C}$ 下催化氢解 10 h, 待反应完成后过滤, 减压除去溶剂, 粗产物用二氯甲烷重结晶, 得 0.63 g 白色固体 **10**, 产率 98%。 ^1H NMR (CD_3OD , 300 MHz) δ : 6.93 (1H, s), 6.96 (1H, s), 6.73 (1H, s), 6.54 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, ArH), 6.26 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, ArH), 4.70 (s, 1H, CH), 3.90 (s, 3H, OCH_3), 3.79 (s, 3H, OCH_3), 3.64~3.68 (m, 2H, CH_2OH), 2.92 (d, 1H, $J=15.9$ Hz, $\text{CH}^{\text{a}}\text{H}$), 2.68 (d, $J=15.9$ Hz, 1H, CHH^{b}); ^{13}C NMR (CD_3OD , 75 MHz) δ : 158.65, 157.58, 150.02, 149.99, 138.21, 135.56, 230.78, 119.52, 110.76, 109.96, 107.99, 104.01, 86.69, 68.98, 56.78, 56.69, 54.26, 43.65.

1.9 化合物 11 的合成

以对苄氧基溴苯^[18]为原料, 合成方法与化合物 **5** 相同, 粗产物用硅胶柱层析提纯($V_{\text{DCM}}:V_{\text{PE}}=1:2$), 得白

色固体 **11**, 产率 91%。 ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 7.34~7.57 (m, 7H, ArH), 7.09~7.15 (m, 4H, ArH), 6.43 (s, 1H, $\text{C}=\text{CH}$), 5.14 (s, 2H, OCH_2), 3.95 (s, 3H, OCH_3), 3.92 (s, 3H, OCH_3), 3.45 (s, 2H, CH_2); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ : 158.48, 148.28, 147.55, 144.50, 137.41, 137.11, 137.05, 129.30, 128.76, 128.76, 128.69, 128.69, 128.07, 127.56, 127.56, 115.12, 115.12, 108.44, 104.34, 70.19, 56.38, 56.38, 38.02.

1.10 化合物 12 的合成

与化合物 **6** 的合成方法相同, 粗产物用硅胶柱层析提纯($V_{\text{乙酸乙酯}}:V_{\text{石油醚}}=1:1$)得白色固体 **12**, 产率 83%。 ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 7.32~7.44 (m, 5H, ArH), 7.22 (d, $J=8.7$ Hz, 2H, ArH), 6.93 (d, $J=8.7$ Hz, 2H, ArH), 6.80 (s, 1H, ArH), 6.65 (s, 1H, ArH), 5.05 (s, 2H, OCH_2), 4.34 (d, $J=4.2$ Hz, 1H, CHOH), 3.89 (s, 3H, OCH_3), 3.77 (s, 3H, OCH_3), 3.14 (d, $J=15.9$ Hz, 1H, $\text{CH}^{\text{a}}\text{H}$), 2.86 (dd, $J=15.9, 4.2$ Hz, 1H, CHH^{b}); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ : 158.29, 150.36, 149.26, 137.16, 136.90, 136.33, 132.76, 128.72, 128.72, 128.11, 127.64, 127.64, 127.64, 114.64, 114.64, 108.04, 108.04, 84.23, 81.50, 70.21, 56.21, 56.21, 37.97.

1.11 化合物 13 的合成

与化合物 **7** 的合成方法相同, 粗产物用硅胶柱层析提纯($V_{\text{DCM}}:V_{\text{PE}}=1:1$), 得白色固体 **13**, 产率 86%。 ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 7.26~7.38 (m, 5H, ArH), 7.01 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 6.90 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 6.86 (s, 1H, ArH), 6.65 (s, 1H, ArH), 4.97 (d, 2H, OCH_2), 4.50 (s, 1H, CH), 3.86 (s, 3H, OCH_3), 3.73 (s, 3H, OCH_3), 3.52 (s, 2H, CH_2); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ : 213.97, 157.97, 149.18, 149.18, 136.84, 132.97, 130.79, 129.24, 129.24, 128.91, 128.39, 128.39, 127.76, 127.27, 127.27, 114.98, 114.98, 108.48, 107.54, 69.81, 58.80, 55.87, 55.87, 42.51.

1.12 化合物 14 的合成

与化合物 **8** 的合成方法相同, 粗产物用硅胶柱层析提纯($V_{\text{乙酸乙酯}}:V_{\text{石油醚}}=1:20$)得淡黄色固体 **14**, 产率 70%。 ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 7.22~7.36 (m, 5H, ArH), 7.02 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 6.88 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 6.74 (s, 1H, ArH), 6.46 (s, 1H, ArH), 5.07 (s, 2H, OCH_2), 4.93~4.95 (m, 2H, $\text{C}=\text{CH}_2$), 4.78 (s, 1H, CH), 3.79 (s, 3H, OCH_3), 3.67 (s, 2H, CH_2), 3.63 (s, 3H, OCH_3); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ : 157.37, 154.60, 148.58, 148.52, 137.42, 136.97, 136.97, 132.96, 129.30, 129.30, 128.30, 128.30, 127.66, 127.27, 127.27, 114.61,

114.61, 109.10, 107.97, 107.17, 69.75, 55.75, 55.71, 55.34, 38.52.

1.13 化合物 15 的合成

与化合物 9 的合成方法相同, 粗产物用硅胶柱层析提纯($V_{\text{乙酸乙酯}}:V_{\text{石油醚}}=1:1$)得白色固体 15, 产率 81%. ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 7.30~7.42 (m, 5H, ArH), 6.87~6.95 (m, 4H, ArH), 6.80 (s, 1H, ArH), 6.61 (s, 1H, ArH), 5.00 (s, 2H, OCH_2), 4.27 (s, 1H, CH), 3.86 (s, 3H, OCH_3), 3.73 (s, 3H, OCH_3), 3.23~3.27 (m, 2H, CH_2OH), 3.12 (d, $J=16.2$ Hz, 1H, CH^aH), 2.86 (d, $J=16.2$ Hz, 1H, CH^bH); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ : 57.83, 148.78, 148.66, 136.90, 135.93, 132.31, 132.12, 129.63, 129.63, 128.54, 128.54, 127.96, 127.47, 127.47, 114.81, 14.81, 108.65, 108.05, 85.17, 69.99, 66.55, 60.86, 56.00, 55.94, 42.38.

1.14 化合物 16 的合成

与化合物 10 的合成方法相同, 粗产物用二氯甲烷重结晶得白色固体 16, 产率 95%. ^1H NMR (CD_3OD , 300 MHz) δ : 6.62~6.90 (m, 6H, ArH), 4.20 (s, 1H, CH), 3.82 (s, 3H, OCH_3), 3.68 (s, 3H, OCH_3), 3.10~3.31 (m, 3H, CH_2OH , CH^aH), 2.85 (d, $J=15.9$ Hz, 1H, CH^bH); ^{13}C NMR (CD_3OD , 75 MHz) δ : 157.24, 150.10, 149.93, 138.43, 134.49, 132.10, 130.86, 130.86, 116.05, 116.05, 110.25, 109.82, 86.03, 67.72, 62.36, 56.68, 56.57, 43.18.

1.15 化合物 17 的合成

将化合物 16 (0.49 g, 1.5 mmol) 溶解于 50 mL 无水甲醇中, 在氮气保护和冰浴下加入二乙酰氧基碘苯 (0.58 g, 1.8 mmol), 搅拌 0.5 h. 反应完成后, 往其中加入乙酸乙酯 (50 mL) 和饱和碳酸氢钠溶液 (30 mL), 分出有机层, 水层用乙酸乙酯萃取 (50 mL $\times$ 2), 合并有机层, 用饱和食盐水洗 2 次, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 用硅胶柱层析提纯($V_{\text{乙酸乙酯}}:V_{\text{石油醚}}=1:1$)得 0.33 g 白色固体 17, 产率 80%. ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 7.19 (dd, $J=9.9$, 3.0 Hz, 1H, =CH), 6.68 (s, 1H, ArH), 6.48 (dd, $J=9.9$, 3.0 Hz, 1H, =CH), 6.40 (s, 1H, ArH), 6.22 (dd, $J=10.1$, 2.0 Hz, 1H, =CH), 6.13 (dd, $J=10.1$, 2.0 Hz, 1H, =CH), 4.22 (d, $J=10.0$ Hz, 1H, OCH^aH), 4.01 (d, $J=10.0$ Hz, 1H, OCH^bH), 3.87 (s, 1H, CH), 3.84 (s, 3H, OCH_3), 3.75 (s, 3H, OCH_3), 3.31 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH^aH), 3.08 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH^bH); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ : 185.90, 149.92, 149.65, 148.99, 147.39, 132.77, 129.10, 127.80, 126.89, 109.66, 107.85, 91.87, 80.15, 78.05, 67.58, 56.26, 56.13, 43.88.

1.16 化合物 2 的合成

将化合物 17 (0.16 g, 0.5 mmol) 溶解于 25 mL 乙腈中, 再加入无水碘化钠 (0.15 g, 1.0 mmol) 及七水合三氯化铷 (0.10 g, 0.25 mmol), 氮气保护下回流 4 h. 待反应完全后, 往其中加入 20 mL 水, 乙酸乙酯萃取 (40 mL $\times$ 3), 酯层用饱和硫代硫酸钠溶液洗涤 (30 mL $\times$ 2), 再用饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂后用硅胶柱层析提纯($V_{\text{乙酸乙酯}}:V_{\text{石油醚}}=1:2$)得 0.11 g 白色 2, 产率 68%. m.p. 170~171 $^\circ\text{C}$. ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 300 MHz) δ : 8.98 (s, 1H, Ar-OH), 6.96 (s, 1H, ArH), 6.90 (s, 1H, ArH), 6.81 (s, 1H, ArH), 6.65 (d, $J=8.7$ Hz, 1H, ArH), 6.55 (d, $J=8.7$ Hz, 1H, ArH), 5.38 (s, 1H, CH), 3.98 (s, 1H, OH), 3.82 (d, $J=10.8$ Hz, 1H, OCH^aH), 3.68~3.74 (m, 7H, OCH_3 , OCH^bH), 2.93 (s, 2H, CH_2); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 75 MHz) δ : 151.35, 148.53, 147.96, 146.07, 136.16, 132.13, 124.64, 117.07, 115.95, 114.48, 109.09, 108.92, 76.89, 69.81, 55.92, 55.69, 51.31, 42.11.

2 结果与讨论

化合物 6 经 Pinacol 重排合成化合物 7 的过程中, 我们曾经尝试了质子酸如催化量的 TsOH (10 mol%) 于甲苯中回流、0.75 mol/L H_2SO_4 水溶液于 100 $^\circ\text{C}$ 中反应或者路易斯酸如三氯化硼乙醚 (2 equiv.) 在二氯甲烷中于 0 $^\circ\text{C}$ 下反应等条件, 但反应产率都不理想, 后来改用比较温和的路易斯酸三氯化铷为催化剂, 最终以满意的收率得到了化合物 7. 7 到 8 的转化我们首先想通过 Wittig 反应来实现, 但尝试了多种不同的条件, 反应都没有能够发生. 我们推测可能是因为 7 中双苄位上的氢原子酸性比较强, 在碱性条件下很容易烯醇化, 导致 Wittig 反应难以发生. 后来改用了 Lombardo 试剂, 终于以比较好的产率得到了化合物 8.

化合物 10 的分子内醚化, 我们尝试了很多种办法, 包括先对 8 的伯羟基进行甲磺酸酯化, 再脱除酚羟基的苄基保护, 然后再用不同的碱来试图实现分子内的醚化, 但反应产物都很复杂. 后来我们尝试了分子内的 Mitsunobu 反应, 或是用 Borhan 等^[19]发展的酚与醇分子内环化成醚的方法来形成醚键也都没有获得成功, 反应得到的是两个极性非常相近、比例大约为 5:1 的很难分离的混合物.

这两个混合物中含量较多的化合物有一个化学位移在 δ 100.90 的特征季碳, 还有一个氢谱在 4.55, 碳谱在 53.90 的次甲基, 我们推断其结构为下图中的化合物 20. 另一个化合物有一个化学位移为 57.78 的季碳, 还有一个氢谱在 5.91, 碳谱在 94.15 的次甲基, 我们推断

其结构为下图中的化合物 **21**. 其可能的反应历程用 Scheme 4 表示: 化合物 **10** 首先生成环氧化合物 **18**, 接着环氧打开形成碳正离子中间体 **19**, 然后一种情况是碳正离子直接被酚羟基捕获而生成 **20**, 另外一种情况是发生重排, 即芳基迁移到碳正离子上, 形成稳定性更好的苄位碳正离子, 然后苄位碳正离子再被酚羟基捕获而生成 **21**.

图式 4 化合物 **20** 和 **21** 可能的生成历程

Scheme 4 Plausible mechanism for the formation of **20** and **21**

以甲醇为溶剂用二乙酰氧基碘苯(DIB)来氧化化合物 **16**, 我们最初设想是得到化合物 **22**, 然后通过分子内的氧杂 Michael 加成来形成醚键, 最后再芳构化得目标产物. 但实际的氧化产物并不是 **22** 而是 **17** (Scheme 5). 尝试先用 TBDMS 保护化合物 **16** 的伯醇羟基后再用 DIB 氧化, 则是生成成分很复杂的产物.

图式 5 甲醇中 DIB 对化合物 **16** 的氧化反应结果

Scheme 5 The oxidation reaction of **16** with DIB in methanol

对于化合物 **17** 的进一步转化, 我们也尝试了许多方法, 包括在各种强度不同的酸碱条件下的反应. **17** 在碱性下基本不反应, 而在酸条件下则会转化一个新化合物. 我们推测化合物 **17** 在酸性条件下可能会存在以下两种转化途径(Scheme 6). 首先是 **17** 与酸作用得到碳正离子 **23**, 然后一种情况是 **23** 直接经类 Pinacol 重排得到化合物 **2**. 另一种情况是 **23** 正离子被氧上的孤对电子捕获生成中间体 **24**, **24** 再经过一个有效的碳氧键断裂而生成中间体 **25**, 然后失去质子得到我们的目标产物 **26**. 通过对新产物进行甲醚化, 我们发现其核磁共振数据与文献报道的三甲醚化 brazilin 的数据不完全吻合, 经 NMR 二维相关谱提供的结构信息, 证实反应产物为化合物 **2**.

3 结论

我们以 3-(3,4-二甲氧苯基)丙酸为起始原料, 经傅-克酰反应、双羟基化、Lombardo 反应, 高价碘的氧化及类 Pinacol 重排等共 10 步反应, 合成出了三甲醚化的 brazilin 的类似物, 对这个化合物的生物活性研究目前正在进行中.

图式 6 化合物 **17** 在酸性条件下可能的转化历程

Scheme 6 Plausible mechanism for the transformation of **17** under acid condition

References

- (a) Newman, D. J.; Cragg, G. M. *J. Nat. Prod.* **2007**, *70*, 461.
- (b) Harvey, A. L. *Drug Discovery Today* **2008**, *13*, 894.
- (a) Ganesan, A. *Curr. Opin. Chem. Biol.* **2008**, *12*, 306.
- (b) Newman, D. J.; Cragg, G. M. *Future Med. Chem.* **2009**, *1*, 1415.

- 3 (a) Livingstone, R. *Nat. Prod. Rep.* **1987**, 4, 25.
(b) Nagai, M.; Nagumo, S. *Chem. Pharm. Bull.* **1990**, 38, 1490.
- 4 Pratt, R.; Yuzuriha, Y. *J. Am. Pharm. Assoc.* **1959**, 48, 69.
- 5 Bae, I. K.; Min, H. Y.; Han, A. R.; Seo, E. K.; Lee, S. K. *Eur. J. Pharmacol.* **2005**, 513, 237.
- 6 Kim, D. S.; Baek, N. I.; Oh, S. R.; Jung, K. Y.; Lee, I. S.; Lee, H. K. *Phytochem.* **1997**, 46, 177.
- 7 (a) Moon, C. K.; Chuug, J. H.; Choi, S. S.; Lee, S. H.; Hwang, G. S.; Park, K. S.; Mock, M. S.; Kim, S. G.; Kim, J. Y. *Arch. Pharmacol. Res.* **1988**, 11, 145.
(b) Moon, C. K.; Chung, J. H.; Lee, Y. M.; Lee, S. H.; Hwang, G. S.; Park, K. S.; Mock, M. S.; Kim, S. G.; Ahn, Y. S.; Ann, J. H. *Arch. Pharmacol. Res.* **1988**, 11, 149.
- 8 Tolman, R. L.; Chin, A. C. *WO 0193864*, **2001** [*Chem. Abstr.* **2001**, 136, 15230].
- 9 Mar, W.; Lee, H. T.; Je, K. H.; Choi, H. Y.; Seo, E. K. A. *Arch. Pharmacol. Res.* **2003**, 26, 147.
- 10 Kirkiacharian, B. S.; Billet, D.; Durgeat, M.; Heitz, S.; Ad-
jangba, M. K. *Bull. Soc. Chim. Fr.* **1975**, 1770.
- 11 Davis, F. A.; Chen, B. C. *J. Org. Chem.* **1993**, 58, 1751.
- 12 Huang, Y. D.; Zhang, J. S.; Pettus, T. R. R. *Org. Lett.* **2005**, 7, 5841.
- 13 Yen, C. T.; Goto, K. N.; Hwang, T. L.; Wu, P. C.; Natschke, S. M.; Lai, W. C.; Bastowd, K. F. Chang, F. R.; Wu, Y. C.; Lee, K. H. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2010**, 20, 1037.
- 14 Pan, C. X.; Zeng, X. H.; Guan, Y. F.; Jiang, X. L.; Li, L.; Zhang, H. B. *Synlett* **2011**, (3), 425.
- 15 Johnson, W. S.; Glenn, H. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1949**, 71, 1092.
- 16 Khan, R. A.; Kapil, R. S. *J. Heterocycl. Chem.* **2001**, 38, 1007.
- 17 Lombardo, L. *Tetrahedron Lett.* **1982**, 23, 4293.
- 18 Kim, J.; Kim, Y. K.; Park, N.; Hahn, J. H.; Ahn, K. H. *J. Org. Chem.* **2005**, 70, 7087.
- 19 Zheng, T.; Narayan, R. S.; Schomaker, J. M.; Borhan, B. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, 127, 6946.

(A1109091 Yang, X.)