• 研究论文 •

1-乙基-3-甲基咪唑磷酸二甲酯盐+K₃PO₄/K₂HPO₄/K₂CO₃+H₂O 离子 液体双水相体系在 $T=298.15$ K 时相图数据的测量和相关性

王 良^{a,b} 朱 红^{a,b} 闫永胜^{*,c}

(^a 吉林师范大学化学学院 四平 136000)

(^b 环境友好材料制备与应用省部共建教育部重点实验室 四平 136000)

(^c 江苏大学化学化工学院 镇江 212013)

摘要 实验测定了 1-乙基-3-甲基咪唑磷酸二甲酯盐(1-ethyl-3-methylimidazolium dimethyl phosphate, [Emim]DMP)+盐(K₃PO₄, K₂HPO₄ 和 K₂CO₃)+H₂O 体系在 298.15 K 的双节点数据. 用 3 个经验方程与双节点数据关联, 发现 Merchuk 方程简便并且准确性好. 不同盐的分相能力顺序为 K₃PO₄>K₂HPO₄>K₂CO₃, 这与水合离子 Gibbs 自由能($\Delta_{\text{hyd}}G$)有关. 用 Othmer-Tobias 方程、Bancroft 方程和二元参数方程计算此方法和相应系线数据的可靠性. [Emim]DMP 是常见的离子液体, 广泛用于萃取石油燃料中的硫. 报道了[Emim]DMP+盐+H₂O 体系的相图数据.

关键词 相图数据; [Emim]DMP; K₃PO₄/K₂HPO₄/K₂CO₃; 离子液体双水相体系

Measurement and Correlation of the Phase Diagram Data for 1-Ethyl-3-methylimidazolium Dimethyl phosphate+K₃PO₄/ K₂HPO₄/K₂CO₃+H₂O Ionic Liquids Aqueous Two-Phase Systems at $T=298.15$ K

Wang, Liang^{a,b} Zhu, Hong^{a,b} Yan, Yongsheng^{*,c}

(^a Department of Chemistry, Jilin Normal University, Siping 136000)

(^b Key Laboratory of Preparation and Applications of Environmental Friendly Materials, Jilin Normal University, Ministry of Education, Siping 136000)

(^c Department of Chemistry and Chemical Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013)

Abstract Binodal data for the 1-ethyl-3-methylimidazolium dimethyl phosphate ([Emim]DMP)+salt (K₃PO₄, K₂HPO₄, and K₂CO₃)+H₂O systems were experimentally determined at 298.15 K. Three empirical equations were used to correlate binodal data. The Merchuk equation is an uncomplicated one for fine accuracy. The ability of different salts studied for phase separation are in the order of K₃PO₄>K₂HPO₄>K₂CO₃, which may be related to the Gibbs free energy of hydration of the ions ($\Delta_{\text{hyd}}G$). The reliability of the calculation method and the corresponding tie-line data was described by the Othmer-Tobias equation and Bancroft equation, as well as the two-parameter equation. [Emim]DMP is a familiar ionic liquid, which is extensively used for extractive desulfurization of fuel oils. This is the first time to report the data for phase diagrams of [Emim]DMP+salt+water systems.

Keywords phase diagram data; [Emim]DMP; K₃PO₄/K₂HPO₄/K₂CO₃; ionic liquids aqueous two-phase systems

* E-mail: yys@163.com; wangliang7469@yahoo.com.cn

Received July 22, 2011; revised December 2, 2011; accepted December 12, 2011.

液-液萃取(liquid-liquid extraction, LLE)常用于分离分析中^[1]. 双水相体系(aqueous two-phase systems, ATPSs)是由液-液萃取体系改良的, 通常当二种性质相反的聚合物或聚合物与盐在水中超过某一临界浓度时形成^[2~4]. 双水相萃取(aqueous two-phase extraction, ATPE)已经广泛用于分离、预富集及净化生物分子^[5~9]、金属离子^[10,11]、染料分子^[12]、药物分子^[13]、有机小分子^[14,15]和纳米粒子^[16,17].

近年来, 自从 Gutowski 等^[18]证明当磷酸钾加入到水溶液中时亲水性离子液体可以形成 ATPSs, 基于离子液体(ionic liquids, ILs)的 ATPSs 成为一种新型的 LLE 被研究. ILs 是典型的不易燃、不易挥发的化合物, 对环境友好^[19]. 因此, 离子液体双水相体系(ionic liquids aqueous two-phase systems, ILATPSs)已经成功用于分离抗生素^[20~23]、药物^[24,25]和蛋白质^[26].

许多的研究小组研究了离子液体双水相萃取(ionic liquids aqueous two-phase extraction, ILATPE)技术, 发现大多数分相盐由选择性阳离子(铵根、钾离子或钠离子)和阴离子(磷酸根、硫酸根、氢氧根或碳酸根)组成^[27,28]. ILs 和盐的选择对 ILATPSs 很重要. Wu 等^[29,30]研究了 1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼([C₄mim]BF₄) + 糖类 + 水的相图. Pei 等^[31]报道了咪唑离子液体([C₄mim]Cl, [C₆mim]Cl, [C₄mim]Br, [C₆mim]Br, [C₈mim]Br 和 [C₁₀mim]Br) + 盐(KOH, K₂HPO₄, K₂CO₃ 和 K₃PO₄)的液-液平衡数据. Deng 等^[32]测量了 [Amim]Cl + 盐(K₃PO₄, K₂HPO₄, K₂CO₃) + 水的双节点曲线和系线数据, 并将其分别与 Merchuk 方程、Othmer-Tobias 方程和 Bancroft 方程关联, 结果令人满意.

[Emim]DMP 其结构如 Scheme 1 所示. [Emim]DMP 可有效地用于石油燃料的脱硫^[33,34]. 理论上用适当的阴离子盐溶液可以形成 ILATPS. Wang 等^[35]测量了水、甲醇、乙醇以及它们与 [Emim]DMP 二元混合物的蒸气压数据. 然而, [Emim]DMP + 盐 + 水体系的相图目前仍未见报道.

Scheme 1

本实验设计了 [Emim]DMP + 盐(K₃PO₄, K₂HPO₄ 和 K₂CO₃) + H₂O 的 ILATPS. 结果表明, 此体系易形成 ILATPS. 双节点曲线符合 Merchuk 方程, 系线用 Merchuk 方程、Othmer-Tobias 方程和 Bancroft 方程描述. 另外, 研究了 3 种不同盐的分相能力. 数据表明相关性非常好, 这些数据也为实验中没有测得的数据提供了预

测相组成的基础.

1 实验部分

1.1 药品

[Emim]DMP 从上海成捷化学有限公司购买, 纯度大于 0.99, 无需进一步净化. K₃PO₄, K₂CO₃ 和 K₂HPO₄ 为分析纯试剂(GB, 质量分数大于 99%), 由国药集团化学试剂有限公司提供. 实验用二次蒸馏水和去离子水.

1.2 仪器及实验过程

用云点法(滴定法)测定双节点曲线. 从储备液中取出已知浓度的盐溶液至容器中. 然后逐滴加入纯 IL [Emim]DMP 到容器中, 直至混合物变混浊, 此现象说明形成了双水相. 接着向容器中逐滴加入水至得到澄清的一相. 记录每次加入水和 IL 的质量. 反复操作此过程, 直至混浊或澄清现象不明显. 实验过程中, 将容器置于 DF-101S 水浴锅(巩义市予华仪器有限责任公司)内, 保持体系温度恒定, 控制在 ± 0.05 K. 双节点曲线上每点混合物的成分通过 BS 124S 分析天平(精密度 ± 0.0001 g, 北京赛多利斯科学仪器有限公司)测质量计算得到.

混合适量 [Emim]DMP、盐和水置于容器中, 测定一系列至少 3 种不同已知总组分 ATPSs 的系线. 充分振荡 30 min 后, 将体系置于恒温水浴 12 h. 然后用 TDL-4 离心机(上海安亭科学仪器厂)以 2000 r/min 的转速离心 20 min 确保分相完全. 体系再次置于恒温水浴至少 2 h 以分成清晰的二相. 达到相平衡后, 记录上、下相体积. 小心的取出上、下相样品并分析. 用美国瓦里安公司型号 VISTA-MPX 的电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-OES)测定上、下相盐的浓度, 盐质量分数测定的不确定性为 ± 0.00001 . 用 UV-2450 紫外-可见分光光度计(日本岛津公司)在波长 210 nm(最大吸收峰)处测定二相中 [Emim]DMP 的质量分数, [Emim]DMP 质量分数的不确定性为 0.001. 然后计算水的质量分数.

用下面的方程 1 和 2 分别计算不同组分的系线长度(tie-line length, TLL)和系线斜率(S)^[36]:

$$\text{TLL} = [(w_1^t - w_1^b)^2 + (w_2^t - w_2^b)^2]^{0.5} \quad (1)$$

$$S = (w_1^t - w_1^b) / (w_2^t - w_2^b) \quad (2)$$

式中 w_1^t , w_1^b , w_2^t 和 w_2^b 分别为 [Emim]DMP (1) 和盐 (2) 在上相 t 和下相 b 的平衡质量分数.

2 结果和讨论

2.1 双节点数据和相关性

298.15 K 时[Emim]DMP (1)+盐(K₃PO₄, K₂HPO₄和 K₂CO₃) (2)+H₂O (3)体系的双节点数据见表 1, 双结点曲线见图 1. 双结点数据用以下方程关联:

$$w_1 = a \exp(bw_2^{0.5} - cw_2^3) \quad (3)$$

$$w_1 = a + bw_2^{0.5} + cw_2 \quad (4)$$

$$w_1 = \exp(a + bw_2^{0.5} + cw_2 + dw_2^2) \quad (5)$$

图 1 $T=298.15$ K 时[Emim]DMP (1)+盐(2)+水(3) ATPS 的双结点曲线

Figure 1 Binodal curves of [Emim]DMP (1)+salt (2)+water (3) ATPS at $T=298.15$ K

■, K₃PO₄; ●, K₂HPO₄; ▲, K₂CO₃; solid line, obtained by connecting experimental binodal data

式中 w_1 为亲水性 ILs [Emim]DMP 的质量分数, w_2 为盐

的质量分数, a , b , c 和 d 为相应的参数. 15 和 16 h 的双结点数据见表 1, 由分析可以得出 15 和 16 h 的数据相差不大, 说明 15 h 时体系已达平衡. 因此, 本实验选择测定分相 15 h 的数据. Merchuk 方程(3)已经广泛用于关联 IL-盐体系的双节点数据^[27], 方程(4)已经广泛用于关联聚合物-盐体系的双节点数据^[37], 方程(5)用于关联乙醇+K₂HPO₄/NaH₂PO₄ 和甲醇+K₂HPO₄ 体系的双节点数据^[38]. 方程(3~5)的相应参数、相关系数(R)和标准偏差(SD)分别见表 2 和表 3. 从得到的 R 和 SD 来看, 方程(3)和方程(5)表明研究的体系双节点数据准确度好. 相比较而言, 方程(4)的准确度没有方程(3)和方程(5)好. 由于方程(3)简单、参数少, 本实验选择方程(3)画双结点曲线, 见图 2.

图 2 $T=298.15$ K 时[Emim]DMP (1)+盐(2)+水(3) ATPS 的双结点曲线

Figure 2 Binodal curves of [Emim]DMP (1)+salt (2)+water (3) ATPS at $T=298.15$ K

■, K₃PO₄; ●, K₂HPO₄; ▲, K₂CO₃; solid line, obtained by Eq. 3.

表 1 298.15 K 时亲水性[Emim]DMP (1)+盐(2)+水(3)体系的双结点数据

Table 1 Binodal data for the hydrophilic [Emim]DMP (1)+salt (2)+water (3) systems at 298.15 K

[Emim]DMP+K ₃ PO ₄				[Emim]DMP+K ₂ HPO ₄				[Emim]DMP+K ₂ CO ₃			
100w ₂		100w ₁		100w ₂		100w ₁		100w ₂		100w ₁	
15 h	16 h	15 h	16 h	15 h	16 h	15 h	16 h	15 h	16 h	15 h	16 h
1.15	1.16	57.03	57.02	1.76	1.75	62.77	62.78	1.20	1.21	77.12	77.11
1.51	1.52	54.26	54.25	2.75	2.54	54.17	52.18	1.53	1.52	73.21	73.22
1.84	1.83	52.14	52.15	3.79	3.81	48.83	48.81	1.86	1.87	70.36	70.35
2.15	2.16	50.97	50.96	4.70	4.72	44.95	44.93	2.24	2.23	68.29	68.30
2.82	2.83	47.46	47.45	5.64	5.65	41.74	41.73	2.61	2.62	65.97	65.96
3.52	3.50	44.99	45.01	6.56	6.55	39.21	39.22	3.01	3.00	63.18	63.19
5.55	5.56	38.97	38.96	7.59	7.58	36.40	36.41	3.51	3.50	60.95	60.96
4.48	4.47	41.58	41.59	8.61	8.62	34.21	34.20	4.32	4.34	56.74	56.72

续表

[Emim]DMP+K ₃ PO ₄				[Emim]DMP+K ₂ HPO ₄				[Emim]DMP+K ₂ CO ₃			
100w ₂		100w ₁		100w ₂		100w ₁		100w ₂		100w ₁	
15 h	16 h	15 h	16 h	15 h	16 h	15 h	16 h	15 h	16 h	15 h	16 h
6.16	6.14	37.03	37.05	9.54	9.55	32.45	32.44	5.07	5.08	54.07	54.06
7.14	7.13	34.74	34.75	10.58	10.59	30.54	30.53	5.68	5.69	51.57	51.56
8.29	8.28	32.57	32.58	11.64	11.65	28.95	28.94	6.81	6.84	48.09	48.05
9.31	9.32	30.65	30.64	12.68	12.69	27.24	27.23	7.79	7.78	45.29	45.30
10.29	10.28	29.01	29.02	13.46	13.45	26.11	26.12	8.81	8.82	42.94	42.93
11.38	11.35	27.28	27.31	14.90	14.91	24.06	24.05	9.81	9.80	40.58	40.59
12.38	12.39	25.30	25.29	15.41	15.42	23.49	23.48	10.62	10.63	38.98	38.97
13.45	13.46	23.51	23.50	16.68	16.69	21.95	21.94	11.83	11.84	36.76	36.75
14.32	14.33	22.58	22.57	17.57	17.56	20.93	20.94	13.04	13.05	34.70	34.69
15.41	15.42	20.89	20.88	18.56	18.55	19.92	19.93	13.86	13.88	33.23	33.21
16.59	16.58	19.12	19.13	19.71	19.72	18.63	18.62	14.99	14.98	31.69	31.70
17.64	17.63	17.65	17.66	20.29	20.28	18.01	18.02	16.28	16.27	29.81	29.82
18.69	18.68	16.42	16.43	21.92	21.91	16.34	16.35	16.94	16.95	28.49	28.48
19.56	19.57	15.21	15.20	22.73	22.74	15.63	15.62	17.60	17.62	27.46	27.44
20.73	20.72	14.16	14.17	23.60	23.61	14.91	14.90	18.07	18.06	26.70	26.71
21.60	21.61	13.06	13.05	24.97	24.99	13.96	13.94	19.36	19.35	25.10	25.11
22.48	22.50	12.16	12.14	25.90	25.93	13.08	13.05	20.49	20.48	23.38	23.39
23.79	23.78	10.53	10.54	26.99	26.98	12.26	12.27	21.51	21.52	22.23	22.22
24.81	24.82	9.66	9.65	28.15	28.16	11.47	11.46	22.16	22.15	21.38	21.39
26.76	26.77	7.72	7.71	29.33	29.34	10.59	10.58	23.74	23.75	19.24	19.23
28.50	28.51	6.22	6.21	31.67	31.69	9.08	9.06	24.72	24.73	18.34	18.33
29.64	29.63	5.53	5.54	33.41	33.42	7.98	7.97	25.60	25.62	17.18	17.16
30.84	30.83	4.45	4.46	35.04	35.05	7.03	7.02	27.05	27.06	15.28	15.27
32.94	32.93	3.35	3.36	37.04	37.03	6.08	6.09	28.11	28.12	14.40	14.39
34.89	34.88	2.20	2.21	39.14	39.15	5.09	5.08	29.37	29.38	12.99	12.98
								30.88	30.87	11.53	11.54
								33.10	33.12	9.68	9.66
								35.97	35.96	7.20	7.21
								38.06	38.08	5.95	5.93

表 2 298.15 K 时对亲水性[Emim]DMP (1)+盐(2)+水(3)体系利用方程(3)和方程(4)的关联结果

Table 2 Values of parameters of Eqs. (3) and (4) for the hydrophilic [Emim]DMP (1)+salt (2)+water (3) systems at 298.15 K

盐	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>R</i> ²	100 SD
K ₃ PO ₄	78.5560 ^a	−0.2984 ^a	4.0932×10 ^{−5 a}	0.9999 ^a	0.1668 ^a
	72.4039 ^b	−15.6199 ^b	0.6165 ^b	0.9996 ^b	0.3082 ^b
K ₂ HPO ₄	98.8349 ^a	−0.3573 ^a	1.1736×10 ^{−5 a}	0.9995 ^a	0.3045 ^a
	85.6802 ^b	−21.2692 ^b	1.3626 ^b	0.9973 ^b	0.7323 ^b
K ₂ CO ₃	106.4949 ^a	−0.3000 ^a	1.8473×10 ^{−5 a}	0.9999 ^a	0.2443 ^a
	97.1085 ^b	−21.0897 ^b	1.0372 ^b	0.9989 ^b	0.6598 ^b

^a Values of parameters of Eq. 3. ^b Values of parameters of Eq. 4. SD=($\sum_{i=1}^n (w_1^{\text{cal}} - w_1^{\text{exp}})^2 / N$)^{0.5}, where *w*₁ and *N* represent the mass fraction of [Emim]DMP and the number of binodal data, respectively. *w*₁^{exp} is experimental mass fraction of [Emim]DMP listed in Table 1, and *w*₁^{cal} is the corresponding data calculated using Eq. 3 or Eq. 4.

表 3 298.15 K 时对亲水性[Emim]DMP (1)+盐(2)+水(3)体系利用方程(5)的关联结果

Table 3 Values of parameters of Eq. (5) for the hydrophilic [Emim]DMP (1)+salt (2)+water (3) systems at 298.15 K

盐	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>R</i> ²	100 SD
K ₃ PO ₄	4.4587	-0.4369	0.0530	-0.0022	0.9997	0.2541
K ₂ HPO ₄	4.7709	-0.5460	0.0521	-0.0012	0.9999	0.1188
K ₂ CO ₃	4.7662	-0.4243	0.0409	-0.0013	0.9997	0.3304

2.2 盐对双结点曲线的影响

相图见图 2 和图 3, 可以看出形成二相所需要的各组分的浓度和上、下相各组分的浓度. 这表明, 在 [Emim]DMP 的水溶液中加入适量的盐可以形成 ILATPS. 盐的分相能力如下: K₃PO₄>K₂HPO₄>K₂CO₃. PO₄³⁻, HPO₄²⁻ 和 CO₃²⁻ 阴离子与水分子相互作用更强, 易形成 ILATPS. 盐析能力与水合离子 Gibbs 自由能 ($\Delta_{\text{hyd}}G$) 有关^[39,40]. 考虑到这些盐的阳离子相同而阴离子不同, 易得出, 当阴离子的 Gibbs 自由能越负 [Emim]DMP 的盐析能力越好 { $\Delta_{\text{hyd}}G(\text{PO}_4^{3-}) = -2765$

$\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} > \Delta_{\text{hyd}}G(\text{HPO}_4^{2-}) = -1789 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} > \Delta_{\text{hyd}}G(\text{CO}_3^{2-}) = -1315 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ }^[41,42].

2.3 系线

298.15 K 时, 测得[Emim]DMP+盐(K₃PO₄, K₂HPO₄ 和 K₂CO₃)+H₂O 体系的系线组分、TLL 和 *S* 见表 4 和图 4. 用 Othmer-Tobias 方程(6)和 Bancroft 方程(7)计算此方法和相应系线数据的可靠性.

$$[(1-w_1^t)/w_1^t] = k_1[(1-w_2^b)/w_2^b]^n \quad (6)$$

$$(w_3^b/w_2^b) = k_2(w_3^t/w_1^t)^r \quad (7)$$

式中 w_1^t 为上相 ILs 的质量分数, w_2^b 为下相盐的质量分数, w_3^b 和 w_3^t 分别为上、下相水的质量分数, k_1 , n , k_2 和 r 为相应的参数. 近年来, 方程(6)和方程(7)已成功用于计算咪唑类离子液体+盐+水 ATPSs 系线组分的相关性^[43,44]. 以 $\lg[(1-w_1^t)/w_1^t]$ 对 $\lg[(1-w_2^b)/w_2^b]$ 作图, 以 $\lg(w_3^b/w_2^b)$ 对 $\lg(w_3^t/w_1^t)$ 作图, 均成线性关系. 方程的

图 3 298.15 K 时[Emim]DMP (1)+盐(2)+水(3) ATPS 的相图

Figure 3 Phase diagram of the [Emim]DMP (1)+salt (2)+water (3) ATPS at 298.15 K

(a) K₃PO₄; (b) K₂HPO₄; (c) K₂CO₃; ■, binodal curve data; □, tie line data

参数 k_1 , n , k_2 和 r 及相应的相关系数(R)和标准偏差(δ)见表 5. 可见, 方程(6)和方程(7)对研究体系的系线数据相关性令人满意.

本文还用简单的二元参数方程对系线数据进行关联, 该方程来源于双结点理论^[44]. 方程式如下:

$$\ln(w_2^t/w_2^b) = \beta + k(w_1^b - w_1^t) \quad (8)$$

式中 k 为盐析系数, β 为活度系数常量. 上角标“t”和“b”分别代表 IL 相和盐相. 近年来, 方程(8)已成功用于关联聚合物-盐 ATPSs 的系线数据^[46]. 方程(8)的参数及相应的相关系数(R)和标准偏差(δ)见表 6. 由表 6 中数据可以看出, 方程(8)对实验 LLE 数据的精确性良好.

表 4 298.15 K 时[Emim]DMP (1)+盐(2)+水(3)系线数据
Table 4 Tie line data of [Emim]DMP (1)+salt (2)+water (3) at 298.15 K

ATPS	总体系		IL 相		盐相		TLL	S
	100 w_2	100 w_1	100 w_2	100 w_1	100 w_2	100 w_1		
[Emim]DMP+K ₃ PO ₄	21.20	21.00	6.82	34.95	40.61	1.23	47.73	-1.00
	20.03	19.82	7.81	33.50	37.33	1.57	43.49	-1.08
	17.99	25.28	6.08	36.54	45.13	0.80	52.93	-0.92
	25.96	26.98	4.22	44.87	57.04	0.43	69.02	-0.84
[Emim]DMP+K ₂ HPO ₄	22.01	26.43	6.00	39.99	49.66	2.22	57.73	-0.87
	19.99	30.50	5.11	42.57	53.88	1.24	63.93	-0.85
	19.98	35.18	4.98	53.35	48.57	3.45	66.26	-1.14
[Emim]DMP+K ₂ CO ₃	18.07	41.06	3.88	57.48	52.35	2.92	72.98	-1.13
	22.02	40.16	2.77	62.45	55.74	2.33	80.13	-1.14

表 5 298.15 K 时对[Emim]DMP (1)+盐(2)+水(3) ATPS 利用方程(6)和方程(7)的关联结果^a
Table 5 Values of the parameters of Eqs. (6) and (7) for the [Emim]DMP (1)+salt (2)+water (3) ATPS at 298.15 K

盐	Othmer-Tobias 方程				Bancroft 方程			
	k_1	n	R	δ	k_2	r	R	δ
K ₃ PO ₄	1.5994	0.4112	0.9923	0.0015	0.3298	2.8650	0.9976	0.0019
K ₂ HPO ₄	1.4899	0.6708	0.9966	0.0015	0.6144	1.5069	0.9967	0.0019
K ₂ CO ₃	0.8195	1.2988	0.9835	0.0060	1.1928	0.7993	0.9788	0.0050

^a R , corresponding correlation coefficient values; δ standard deviation.

表 6 298.15 K 时对[Emim]DMP (1)+盐(2)+水(3) ATPS 利用方程(8)的关联结果^a

Table 6 Values of parameters of Eq. (8) for the [Emim]DMP (1)+salt (2)+water (3) ATPS at 298.15 K

盐	k	β	R	δ
K ₃ PO ₄	0.1158	2.1294	0.9977	0.0061
K ₂ HPO ₄	0.0733	0.6624	0.9960	0.0089
K ₂ CO ₃	0.0709	1.2645	0.9999	0.0022

^a R , corresponding correlation coefficient values; δ , standard deviation.

3 结论

本文测定了 298.15 K 时[Emim]DMP+盐(K₃PO₄, K₂HPO₄ 和 K₂CO₃)+H₂O 体系的双结点数据. 实验双结点数据直接用三个不同的方程计算, 结果表明 Merchuk 方程最适宜. 此外, 研究了盐的分相能力, 顺序为

K₃PO₄>K₂HPO₄>K₂CO₃, 这可以用水合离子 Gibbs 自由能解释. 并用 Othmer-Tobias 方程、Bancroft 方程和二元参数方程对实验体系的系线相关联, 精确性令人满意.

References

- Lo, T. C. In *Handbook of Separation Techniques for Chemical Engineers*, Ed.: Schwietzer, P. A., McGraw-Hill, New York, **1996**, pp. 45~60.
- Albertsson, P. Å. *Partition of Cell Particles and Macromolecules: Separation and Purification of Biomolecules, Cell Organelles, Membranes, and Cells in Aqueous Polymer Two-Phase Systems and Their Use in Biochemical Analysis and Biotechnology*, 3rd ed., Wiley, New York, **1986**, pp. 22~26.
- Walter, H.; Brooks, D. E.; Fisher, D. *Partitioning in Aqueous*

- ous Two-Phase Systems: Theory, Methods, Uses, and Applications to Biotechnology, Academic Press, New York, **1985**, pp. 342~347.
- 4 Zaslavsky, B. Y. *Aqueous Two-Phase Partitioning, Physical Chemistry and Bioanalytical Applications*, Marcel Dekker, New York, **1995**, pp. 78~83.
- 5 Johansson, H. O.; Magaldi, F. M.; Feitosa, E.; Jr, A. P. *J. Chromatogr. A* **2008**, 1178, 145.
- 6 Salgado, J. C.; Andrews, B. A.; Ortizar, M. F.; Asenjo, J. A. *J. Chromatogr. A* **2008**, 1178, 134.
- 7 Jorge, B.; Oscar, A.; Blanca, H. L. E.; Marco, R. P. *Chem. Eng. Technol.* **2008**, 31, 838.
- 8 Duarte, S. P.; Fortes, A. G.; Prazeres, D. M. F.; Marcos, J. C. *J. Chromatogr. A* **2007**, 1164, 105.
- 9 Ravindra Babu, B.; Rastogi, N. K.; Raghavarao, K. S. M. S. *Chem. Eng. Prog.* **2008**, 47, 83.
- 10 Bulgariu, L.; Bulgariu, D. *J. Chromatogr. A* **2008**, 1196~1197, 117.
- 11 Silva, L. H. M.; Silva, M. C. H. *Sep. Purif. Technol.* **2008**, 60, 103.
- 12 Mageste, A. B.; Lemos, L. R.; Ferreira, G. M. D. *J. Chromatogr. A* **2009**, 1216, 7623.
- 13 Agasøster, T. *J. Chromatogr. B* **1998**, 716, 293.
- 14 Willauer, H. D.; Huddleston, J. G.; Rogers, R. D. *Ind. Eng. Chem. Res.* **2002**, 41, 1892.
- 15 Rogers, R. D.; Willauer, H. D.; Griffin, S. T. *J. Chromatogr. B* **1998**, 711, 255.
- 16 Negrete, A.; Ling, T. C.; Lyddiatt, A. *J. Chromatogr. B* **2007**, 854, 13.
- 17 Braas, G. M. F.; Walker, S. G.; Lyddiatt, A. *J. Chromatogr. B* **2000**, 743, 409.
- 18 Gutowski, K. E.; Broker, G. A.; Willauer, H. D.; Huddleston, J. G.; Swatoski, R. P.; Holbrey, J. D.; Rogers, R. D. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, 125, 6632.
- 19 Koel, M. *Ionic Liquids in Chemical Analysis*, CRC Press, New York, **2009**, p. 244.
- 20 Soto, A.; Arce, A.; Khoshkbarchi, M. K. *Sep. Purif. Technol.* **2005**, 44, 242.
- 21 Jiang, Y.; Xia, H.; Guo, C.; Mahmood, I.; Liu, H. *Ind. Eng. Chem. Res.* **2007**, 46, 6303.
- 22 Li, C. X.; Han, J.; Wang, Y.; Yan, Y. S.; Xu, X. H.; Pan, J. M. *Anal. Chim. Acta* **2009**, 653, 178.
- 23 Liu, Q. F.; Yu, J.; Li, W. L.; Hu, X. S.; Xia, H. S.; Liu, H. Z.; Yang, P. *Sep. Sci. Technol.* **2006**, 41, 2849.
- 24 He, C.; Li, S.; Liu, H.; Li, K.; Liu, F. *J. Chromatogr. A* **2005**, 1082, 143.
- 25 Li, S.; He, C.; Liu, H.; Li, K.; Liu, F. *J. Chromatogr. B* **2005**, 826, 58.
- 26 Du, Z.; Yu, Y. L.; Wang, J. H. *Chem.-Eur. J.* **2007**, 13, 2130.
- 27 Zafarani-Moattar, M. T.; Hamzehzadeh, S. *J. Chem. Eng. Data* **2009**, 54, 833.
- 28 Han, J.; Pan, R.; Xie, X. Q.; Wang, Y.; Yan, Y. S.; Yin, G. W.; Guan, W. X. *J. Chem. Eng. Data* **2010**, 55, 3749.
- 29 Wu, B.; Zhang, Y. M.; Wang, H. P. *J. Chem. Eng. Data* **2008**, 53, 983.
- 30 Wu, B.; Zhang, Y. M.; Wang, H. P. *J. Phys. Chem. B* **2008**, 112, 6426.
- 31 Pei, Y.; Wang, J.; Liu, L.; Wu, K.; Zhao, Y. *J. Chem. Eng. Data* **2007**, 52, 2026.
- 32 Deng, Y. F.; Long, T.; Zhang, D. L.; Chen, J.; Gan, S. C. *J. Chem. Eng. Data* **2009**, 54, 2470.
- 33 Jiang, X. C.; Nie, Y.; Li, C. X.; Wang, Z. H. *Fuel* **2008**, 87, 79.
- 34 Nie, Y.; Li, C. X.; Meng, H.; Wang, Z. H. *Fuel Process. Technol.* **2008**, 89, 978.
- 35 Wang, J. F.; Li, C. X.; Wang, Z. H.; Li, Z. J.; Jiang, Y. B. *Fluid Phase Equilib.* **2007**, 255, 186.
- 36 Chen, J.; Spear, S. K.; Huddleston, J. G.; Holbrey, J. D.; Swatoski, R. P.; Rogers, R. D. *Ind. Eng. Chem. Res.* **2004**, 43, 5358.
- 37 Regupathi, I.; Murugesan, S.; Govindarajan, R.; Amaresh, S. P.; Thanapalan, M. *J. Chem. Eng. Data* **2009**, 54, 1094.
- 38 Katayama, H.; Miyahara, M. *J. Chem. Eng. Data* **2006**, 51, 914.
- 39 Zafarani-Moattar, M. T.; Hamzehzadeh, S. *CALPHAD: Comput. Coupling Phase Diagrams Thermochem.* **2005**, 29, 1.
- 40 Rogers, R. D.; Bond, A. H.; Bauer, C. B.; Zhang, J. H.; Griffin, S. T. *J. Chromatogr. B* **1996**, 680, 221.
- 41 Marcus, Y. *J. Chem. Soc., Faraday Trans.* **1991**, 87, 2995.
- 42 Zafarani-Moattar, M. T.; Zaferanloo, A. *J. Chem. Thermodyn.* **2009**, 41, 864.
- 43 Li, C. X.; Han, J.; Wang, Y.; Yan, Y. S.; Pan, J. M.; Xu, X. H.; Zhang, Z. L. *J. Chem. Eng. Data* **2010**, 55, 1087.
- 44 Han, J.; Yu, L.; Wang, Y.; Xie, X. Q.; Yan, Y. S.; Yin, G. W.; Guan, W. X. *Fluid Phase Equilib.* **2010**, 295, 98.
- 45 Guan, Y.; Lilley, T. H.; Treffry, T. E. *Macromolecules* **1993**, 26, 3971.
- 46 Zafarani-Moattar, M. T.; Seifi-Aghjekohal, P. *CALPHAD: Comput. Coupling Phase Diagrams Thermochem.* **2007**, 31, 553.