铬族金属氢化物中 M—H 键键能的从头计算

唐诗雅 傅尧* 郭庆祥*

(中国科学技术大学化学系 合肥 230026)

摘要 铬族金属氢化物 M—H 键的均裂是在自由基环化反应中的关键过程,它直接影响反应的催化效率和选择性.使用理论方法精确预测铬族金属氢化物 M—H 键键能不仅有助于了解这类催化剂的结构与性能关系,而且对进一步发展高效的自由基环化反应催化剂具有重要的指导意义.为达此目的,我们使用不同的理论方法计算 14 个有可靠实验值的铬族金属氢化物 M—H 键键能,通过比较发现 B3P86/lanl2dz+p 方法表现最佳(计算精度为 1.6 kcal/mol).之后我们运用这个理论方法系统地研究了铬族金属氢化物 M—H 键键能的构效关系.就周期性规律而言,在铬族金属氢化物中,金属对于 M—H 键能的影响大于配体的影响. M—H 键键裂解能的大小顺序为:铬氢络合物<钼氢络合物<钨氢络合物.此外,我们发现含双茂配体的铬氢化合物中 Cr—H 键键能与伸缩振动频率呈良好的线性相关.有趣的是,在含双茂配体的铬族金属氢化物中, M—H 键能与键长呈现出良好的正线性相关性.即“键长越小,键能越弱”.通过自然成键轨道分析,这可能是由于杂化缺失造成原子半径收缩程度比成键变弱引起的扩张程度大.

关键词 过渡金属氢化物; 键能; 从头算; 杂化缺失

Ab Initio Calculation of M—H Bond Dissociation Energies of Cr-Group Metal Hydrides

Tang, Shiya Fu, Yao* Guo, Qingxiang*

(Department of Chemistry, University of Science and Technology of China, Hefei 230026)

Abstract The metal-hydrogen M—H bond homolysis of the Cr-group metal hydrides is a key process in the radical cyclization reactions mediated by these compounds, which directly affects the catalytic efficiency and selectivity of the reactions. Accurate prediction of M—H BDEs (bond dissociation energies) using theoretical methods not only improves our understanding about the structures and properties of the Cr-group metal hydride based catalysts, but also provides important insights into design of new generations of catalysts for radical cyclization reactions. For this purpose, we have calculated the M—H BDEs with different density functional theory methods (including MPW1K, MPW1b95, MPW1PW91, PBE1PBE, B3P86, O3LYP, TPSSH, MPW1KCIS, and TPSS) and compared the theoretical predictions with 14 reliable experimental M—H BDE values recently reported for the Cr-group metal hydrides. It is found that the B3P86/lanl2dz+p method could accurately predict the M—H BDEs with a precision of 1.6 kcal/mol. Using the B3P86/lanl2dz+p method, we next studied the structure-property relationship for the M—H BDEs in Cr-group metal hydrides. As to the periodical trends, we found that the effects of the metals on the M—H BDEs are greater than the effects of the ligands. The M—H BDEs increase in the order: first row metal<second row metal<third row metal. The Cr—H, Mo—H and W—H BDEs are in the ranges of 40~65, 65~75, and 70~80 kcal/mol, respectively. Moreover, only for the chromium hydrides a good correlation is found between the M—H BDEs and the M—H vibration frequencies. Interestingly, the M—H bond strengths and lengths show a good positive linear correlation for the chromium hydrides. That is, weaker bonds are also shorter bonds. With the aid of natural bond orbital analysis of the Cr—H bonds, the reason may be attributed to that the atom size contraction degree caused by hybridization defects is more than the expansion degree caused by the weak bonding.

Keywords transition-metal hydride; bond dissociation energy; *ab initio* calculation; hybridization defects

1 引言

铬族金属氢化物(M—H, M=Cr, Mo, W)是一类新兴的能高效催化自由基环化反应的催化剂^[1]. 与传统方

法(使用等物质的量的剧毒有机锡试剂^[2])相比,这类催化剂可以直接使用具有良好原子经济性的氢气作为氢源,因此在天然产物合成以及精细化工品生产中都有着广泛的应用^[1,3]. 在铬族金属氢化物参与的催化反应中,

* E-mail: fuyao@ustc.edu.cn, qxguo@ustc.edu.cn.

Received July 23, 2012; published August 16, 2012.

Supporting information for this article is available free of charge via the Internet at <http://sioc-journal.cn>.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 20832004, 20972148), Chinese Academy of Science (KJXC2-EW-J02) and the Fundamental Research Funds for the Central Universities. Computations were performed at the Supercomputing Center of USTC and Shanghai.

项目受国家自然科学基金(Nos. 20832004, 20972148), 中国科学院(KJXC2-EW-J02)和中央高校基本科研业务费资助. 计算工作在中国科大和上海超算中心完成.

M—H 键的均裂是一个关键过程, 它直接影响反应的催化效率和选择性(图 1)^[4]. 近几十年来, 国际上一些课题组致力于铬族金属氢化物及其 M—H 键键能(BDE, Bond Dissociation Energy)的研究. 其中, Hoff 课题组^[5]使用量热法获得了一些 Cr—H 与 W—H 键键能. Tilset 小组^[6]运用热力学循环推演法获得一些 Mo—H 与 W—H 键键能. 最近 Norton 小组^[3b]通过动力学方法得到了一些 Cr—H 键键能. 但是, 已测得 M—H 键能实验数据的铬族金属氢化物不多. 比如有 M—H 键能实验值的中性 18e 铬族金属氢化物只有 14 个^[7].

图 1 铬氢化合物催化自由基环化反应的机理示意图

Figure 1 Mechanism of chromium hydride catalyzed radical cyclization

用实验方法测量金属-氢键键能具有一定的局限性, 这是因为一些金属氢化物非常不稳定, 无法通过实验直接测量. 因此, 我们期望发展一套可靠的理论方法, 在不需要进行任何特别的物理近似或实验拟合的条件下, 就能够准确预测不同类型的铬族金属氢化物 M—H 键键能. 在前面的工作中, 我们小组^[8]成功地发展了一些可精确计算过渡金属氢化物酸性、氢负转移能以及 Co—C 键能的方法. 在此基础上, 我们应用这些方法研究铬族金属氢化物的 M—H 键键能. 了解铬族金属氢化物的 M—H 键键能, 不仅可以深入地理解铬族金属-氢键的结构与性质关系, 而且对进一步发展高效的自由基环化反应催化剂有重要的指导意义.

2 计算方法

所有量子化学计算都是在 Gaussian 03 量化软件程序包^[9]下完成的. 每一个分子的几何构型是在非限制条件下的完全优化. 每一个最优构型经过频率计算确认没有虚频, 是势能面上的极小点. 对于存在多种构象的物质, 尽量通过给定多个初始构象进行构象优化, 比较能量找出最低能量点对应的最稳定构象. 几何构型优化使用了 B3P86 方法和赝势基组 lanl2dz + p(在赝势基组 lanl2dz 的基础上, 对 P 原子和过渡金属原子则分别增加了 d 轨道成分和 f 轨道成分. 利用选取的 9 种方法

(MPW1K, MPW1B95, MPW1PW91, PBE1PBE, B3P86, O3LYP, TPSSH, MPW1KCIS 和 TPSS)^[10]进行单点能计算, 赝势基组的使用与结构优化的相同. 我们所用来表示每一个优化结构的能量是单点能加上焓校正. 气相的标准状态是 298 K, 1.013×10^5 Pa.

3 结果与讨论

3.1 铬族金属 M—H 键能的精度计算

键解离能(BDE)即在标准条件(298 K, 1.013×10^5 Pa)下如下均裂反应的焓变.

大多数过渡金属氢化物的结构包含 10 个以上重原子(非氢原子), 高精度理论方法[如 CCSD(T), CBS-Q, G3]模拟这些金属氢化物体系是不实用的. MP2 方法, 由于自旋污染的原因, 不能有效预测键裂解能值. 密度泛函方法是相比上述方法可以省时高效的方法, 广泛应用于化学键键能和其他热力学性质的研究中^[11].

首先, 我们收集到 14 个有可靠实验值的中性 18e 的铬族金属氢化物 M—H 键键能, 其键能实验值跨越了 59.0~72.0 kcal/mol(表 1). 接着, 我们根据密度泛函中的交换相比重(X)选取了 9 种密度泛函方法[MPW1K (42.8), MPW1B95 (31), MPW1PW91 (25), PBE1PBE (25), B3P86 (20), O3LYP (11.61), TPSSH (10), MPW1KCIS (0)和 TPSS (0)](表 2, 图 2). 其中, 不含交换相的 TPSS 曾被成功地运用到 Co—C 键键解离能的预

表 1 铬族金属氢化物 M—H 键的实验键能值和理论值

Table 1 Experimental and theoretical M—H BDE values for Cr-group metal hydrides

Entry	Hydride	BDE(exp.) ^[7] / (kcal·mol ⁻¹)	BDE(calc.) ^a / (kcal·mol ⁻¹)
1	H-CrCp(CO) ₂ (PPh ₃)	59.8	56.9
2	H-CrCp(CO) ₂ (PEt ₃)	59.9	57.4
3	H-Cr(CpPh ₃)(CO) ₃ ^[12a]	59.6	60.6
4	H-CrCp(CO) ₃ ^[12b]	61.4	61.3
5	H-Cr(CpMe)(CO) ₃	62.3	62.4
6	H-CrCp(CO) ₂ [P(OMe) ₃]	62.7	63.6
7	H-Mo(TpMe)(CO) ₃	59.3	59.2
8	H-MoTp(CO) ₃	62.1	61.8
9	H-Mo(CpMe)(CO) ₃	68.6	67.8
10	H-MoCp(CO) ₃	69.3	68.5
11	H-W(TpMe)(CO) ₃	62.1	60.7
12	H-WTp(CO) ₃	65.7	64.7
13	H-WCp(CO) ₃	72.4	72.3
14	H-WCp(CO) ₂ (PMe ₃)	69.6	73.3

^a Calculated with B3P86/lanl2dz + p. Cp = cyclopentadienyl, Tp = hydridotris(pyrazol)-borate.

图2 各种DFT方法在计算铬族金属氢化物M—H键键能上的表现
Figure 2 Performance of theoretical methods in calculating BDEs

测^[8a]。我们用这9种方法计算14个铬族金属氢化物M—H键键能。

通过计算值与实验值的比较,我们发现密度泛函中的交换相的比重对计算精度没有影响。曾经成功运用在Co—C键键能计算的TPSS方法在这里不仅计算值与实验值的线性关系不好($R=0.936$),而且计算偏差达1.9 kcal/mol(表2),因此该方法不适合铬族金属氢化物金属—氢键键能的计算中运用。比较这九种方法的计算偏差,B3P86方法的计算偏差最小,只有1.6 kcal/mol。因此,B3P86/lanl2dz+p是铬族金属氢化物M—H键BDE值精确计算的最优方法。

表2 各种DFT方法在计算铬族金属氢化物M—H键键能上的表现
Table 2 Comparison of the performances of different theoretical methods in the BDE calculations for Cr-group metal hydrides

Entry	Method	RMSE ^a	R ^a
1	MPW1K	3.7	0.919
2	MPW1B95	1.8	0.959
3	MPW1PW91	1.9	0.959
4	PBE1PBE	1.8	0.957
5	B3P86	1.6	0.956
6	O3LYP	2.0	0.908
7	TPSSH	1.7	0.953
8	MPW1KCIS	1.7	0.959
9	TPSS	1.9	0.936

^a Abbreviations: R, correlation coefficient; RMSE, root mean square error. Unit: kcal/mol.

3.2 构效关系

发展出可以精确计算铬族金属氢化物M—H键键能的方法后,我们运用该方法计算了一系列常见的铬族金属氢化物的M—H键键能(表3)。在此基础上,我们可以系统地研究键能的周期性规律,键能与振动频率以及键能与键长的关系。

3.2.1 铬族金属氢化物的结构

从表3中收集的化合物样本中可以看出铬族金属氢化物常见的主要有两种结构形式:单茂型^[12]和双茂型^[13](图3)。

图3 铬族金属氢化物的两种结构形式
Figure 3 Structures of Cr-group hydrides

3.2.2 周期性规律

获得了一系列常见的铬族金属氢化物的M—H键键能之后,我们首先研究铬族金属氢化物键能的周期性规律。如图4所示,M—H键键裂解能的分布范围主要在40~80 kcal/mol。其中,铬氢络合物M—H键键裂解能值主要在40~65 kcal/mol,钼氢络合物M—H键键裂解能值主要分布在65~75 kcal/mol,钨氢络合物M—H键键裂解能值主要分布在70~80 kcal/mol。可见,铬氢络合物M—H键键裂解能范围要比钼氢、钨氢络合物宽很多。另

图4 铬族金属氢化物M—H键键能的周期性规律
Figure 4 Periodical trends for the BDE of Cr-group metal hydrides

表3 各种铬族金属氢化物 M—H 键的理论键能值

Table 3 Theoretical M—H BDE values for Cr-group metal hydrides

Entry	Hydride	M=Cr			M=Mo			M=W		
		BDE(calc.)/ (kcal·mol ⁻¹)	<i>d</i> _{M-H} /Å	<i>v</i> _{M-H} /cm ⁻¹	BDE(calc.)/ (kcal·mol ⁻¹)	<i>d</i> _{M-H} /Å	<i>v</i> _{M-H} /cm ⁻¹	BDE(calc.)/ (kcal·mol ⁻¹)	<i>d</i> _{M-H} /Å	<i>v</i> _{M-H} /cm ⁻¹
1	H-MCp(CO) ₃	61.3	1.580	1863	68.5	1.715	1831	72.3	1.725	1890
2	H-MCp(CO) ₂ (PMe ₃)	58.6	1.586	1832	68.2	1.714	1831	73.3	1.714	1831
3	H-MCp(CO) ₂ (P(OMe) ₃)	63.6	1.588	1833	72.8	1.717	1836	78.3	1.728	1899
4	H-MCp(CO) ₂ (PPh ₃)	56.9	1.584	1846	67.3	1.710	1870	73.2	1.722	1920
5	H-MCp*(CO) ₃	62.4	1.583	1871	67.8	1.717	1841	71.4	1.730	1908
6	H-MCp*(CO) ₂ (PMe ₃)	58.7	1.592	1813	68.2	1.723	1815	73.0	1.734	1883
7	H-MCp*(CO) ₂ (P(OMe) ₃)	64.5	1.593	1831	69.6	1.727	1809	75.6	1.736	1873
8	H-MCp*(CO) ₂ (PPh ₃)	58.2	1.591	1825	65.6	1.721	1824	70.8	1.731	1892
9 ^d	H-MCp(CpPh ₃)H	46.2	1.532	—	66.9	1.670	—	75.0	1.682	—
10 ^d	H-MCp ₂ H ^[14a]	48.2	1.543	—	68.7	1.674	—	76.9	1.692	—
11	H-MCp ₂ Me	43.1	1.530	1932	67.4	1.666	1965	75.4	1.686	2014
12	H-MCp ₂ Et	44.0	1.533	1924	68.1	1.669	1952	75.9	1.689	2005
13	H-MCp ₂ tBu	43.5	1.530	1942	68.4	1.663	1989	76.2	1.680	2046
14	H-MCp ₂ SiH ₃	51.3	1.571	1839	69.7	1.681	1932	77.0	1.695	2002
15	H-MCp ₂ SiMeH ₂	52.2	1.572	1840	70.5	1.680	1928	77.5	1.695	1994
16	H-MCp ₂ (SiH ₂ (C ₅ Me ₄)) ^a	48.3	1.549	1887	69.3	1.675	1956	77.5	1.690	2019
17	H-MCp ₂ (SiH(N ₂ C ₂ tBu)) ^b	49.6	1.567	1902	68.1	1.674	1985	76.1	1.692	2004
18	H-MCp ₂ SiMe ₃	53.5	1.581	1831	70.6	1.683	1933	77.6	1.696	2000
19	H-MCp ₂ (Si(C ₅ Me ₄) ₂ H) ^c	52.9	1.603	1770	70.2	1.678	1954	76.6	1.691	2027
20	H-MCp ₂ SiMe ₂ H ^[14b]	51.9	1.575	1856	70.6	1.680	1938	77.8	1.695	2001
21	H-MCp ₂ SiMe ₂ Cl ^[14b]	52.8	1.586	1805	70.9	1.680	1942	78.1	1.693	2009
22	H-MCp ₂ SiCl ₃	50.8	1.576	1822	70.1	1.674	1953	76.3	1.688	2026
23	H-MCp ₂ Si(<i>t</i> Bu) ₂ H	49.3	1.567	1911	69.6	1.669	1994	76.0	1.686	2053
24 ^d	H-M(CpMe) ₂ H ^[13a]	47.7	1.540	—	68.5	1.672	—	76.8	1.690	—
25	H-M(CpMe) ₂ (Si(<i>t</i> Bu) ₂ H)	48.5	1.560	1945	69.3	1.670	1986	76.9	1.684	2050
26	H-M(CpMe) ₂ (SiMe ₃) ^[14b]	51.5	1.580	1859	70.0	1.675	1954	77.0	1.692	2009
27 ^d	H-M(CptBu) ₂ H ^[13b]	47.6	1.542	—	69.6	1.673	—	76.7	1.691	—
28 ^d	H-M(CpMe ₅) ₂ H ^[14c]	46.5	1.536	—	67.6	1.668	—	76.3	1.686	—
29	H-M(CpMe ₅) ₂ Me	42.6	1.532	1940	67.2	1.663	1973	72.7	1.681	2034
30	H-M(CpMe ₅) ₂ SiH ₃	48.8	1.569	1852	70.4	1.672	1961	77.4	1.686	2027
31	H-M(CpMe ₅) ₂ SiMe ₃	51.2	1.570	1851	70.8	1.677	1940	78.3	1.691	2008
32	H-M(CpMe ₅) ₂ SiMe ₂ H	47.8	1.567	1873	69.7	1.677	1950	76.9	1.690	2018

M—H键, 无法确定对应的频率.

一方面, 我们还发现金属对 M—H 键键裂解能的影响大于配体的影响, M—H 键键裂解能的大小顺序为: 铬氢络合物 < 钼氢络合物 < 钨氢络合物. 这就意味着, 铬氢络合物更容易发生氢转移, 引发自由基反应. 然而, 钼氢、钨氢络合物更容易发生 H₂ 的氧化加成, 完成催化循环, 实现催化剂的高效催化. 因此, 对于难引发自由基

的反应底物, 选择铬氢络合物为催化剂可能有利于发生反应; 对于容易引发自由基的反应底物, 选择钼氢、钨氢络合物为催化剂可能更有利于实现催化剂的高效催化.

此外, 茂环配体对铬氢络合物 M—H 键键能的影响要比对钼氢、钨氢络合物 M—H 键键能大. 含有单茂配

图5 含双茂配体铬族金属氢化物中M—H键键能与伸缩振动频率的相关性

Figure 5 Correlation between M—H bond strengths and stretching vibration frequencies

体的铬氢络合物 M—H 键键能分布在 55~65 kcal/mol, 含有双茂配体的铬氢络合物 M—H 键键能分布在 40~55 kcal/mol. 在钼氢、钨氢络合物中, 配体对 M—H 键的键能影响不大.

3.2.3 M—H 键的振动频率

除了计算各种铬族金属氢化物的 M—H 键键能, 我们还考察了 M—H 键的伸缩振动频率(表 3). 对于 Cr—H 键, 振动频率范围在 1750~1950 cm^{-1} , Mo—H 键振动频率范围在 1925~2000 cm^{-1} , W—H 键振动频率范围在 1975~2050 cm^{-1} .

对于含单茂配体的铬氢化合物, Cr—H 键键能与金属—氢键伸缩振动频率没有相关性. 也就是说, 我们不能通过 Cr—H 键的伸缩振动频率直接推导出该键键能. 然而, 我们发现含双茂配体的铬氢化合物中 Cr—H 键键能与伸缩振动频率呈负的相关性(相关系数 $R = -0.8376$). 这就意味着我们可以通过氢化物中 Cr—H 键的伸缩振动频率直接推导出该键键能(Eq. 1).

$$\text{BDE} = -0.058\nu_{\text{M-H}} + 157.7 \quad (1)$$

对于钼氢、钨氢络合物, 无论是单茂配体体系还是双茂配体体系, 金属—氢键键能与伸缩振动频率均没有相关性. 因此不能通过金属—氢键的伸缩振动频率直接推导出该键键能.

3.2.4 M—H 键能与键长

除了 M—H 键的伸缩振动频率, 我们还得到了一系列铬族金属氢化物 M—H 键键长的计算值(表 3).

在含单茂配体的铬族金属氢化物中, Cr—H 键能在 55~65 kcal/mol, 键长范围在 1.58~1.60 Å(表 3); 钼氢和钨氢化合物金属—氢键长均在 1.71~1.74 Å, 键能在 70~79 kcal/mol 范围(表 3). M—H 键能与键长没有线性相关. 但是, 相同配体条件下, 钼氢和钨氢化合物的 M—H 键能始终比铬氢化合物的大, 并且键长也比铬氢化合物的长.

在含双茂配体的铬族金属氢化物中, 我们发现 M—H 键能与键长呈现了良好的正线性相关性, 相关系数 R 为 0.9842(图 6a). 其中, 铬氢络合物 Cr—H 键键能分布在 40~55 kcal/mol, 键长范围在 1.53~1.58 Å, 键能与键长表现出良好的线性相关(相关系数 $R = 0.9126$)(图 6b). 钼氢和钨氢化合物金属—氢键长均在 1.66~1.70 Å, 键能在 66~78 kcal/mol 范围, 键能与键长也表现出一定的线性相关(相关系数分别为 $R = 0.7721$, 0.6797)(图 5b).

图6 含双茂配体铬族金属氢化物中M—H键键能与键长的相关性
Figure 6 Correlation between M—H bond lengths and strengths

除了 Cr—H 键, Ernst 课题组报道的 $\text{Ti}(\text{2,4-C}_7\text{H}_{11})_2$ ($\text{C}_7\text{H}_{11} = \text{dimethylpentadienyl}$)中的 Ti—PX₃ 键^[15], Kaupp 课题组报道的 $\text{F}_x\text{Sn—SnF}_x$ 键都呈现“键长增长, 键能增强”的特殊性质^[16]. 在 Ti—PX₃ (Ti—PMe₃ < Ti—P(OMe)₃ < Ti—PF₃)体系中, Ernst 等^[15]认为这种特殊性质可能是由取代基 X 的电负性决定的. 类似的情况也出现在 Fe—P^[17], Au—P^[18], Re—O^[19], Ge—O^[20], Sn—O^[20]体系中. 在 CrH 化合物的结构中不存在 F 这样的强极性取代基, 所以取代基的电负性因素不是 Cr—H 这种特殊性质的影响因素.

在 $\text{F}_x\text{Sn—SnF}_x$ 体系中, Kaupp 等通过研究 Sn 上的轨道成分, 发现 p/s 轨道的杂化比与键能成反比关系^[16a].

作者认为F取代基会造成Sn上的杂化缺失(hybridization defects), 即p轨道过大以致于不能与缩紧的s轨道进行有效地杂化. 这种作用影响成键, 使得键能变弱. 虽然键能变弱, 但键长没有变长. 这是因为杂化缺失造成原子半径变小程度比成键变弱引起的扩张程度大, 所以表现出“键能减弱, 键长依然变短”.

对于Cr—H体系, 我们用自然成键轨道分析方法计算了H-CrCp₂Me, H-CrCp₂SiH₃, H-CrCp₂SiMe₃这3个化合物的Cr—H成键轨道, 其中Cr的成键轨道主要是p轨道和d轨道杂化, 与Sn—Sn体系不完全相同. 我们可以类似得到p/d轨道成分比(表4), 对于H-CrCp₂SiMe₃, H-CrCp₂SiH₃, H-CrCp₂Me, 所占比例分别为1.3, 1.5, 3.8. p轨道不能与d轨道有效地杂化, 导致键能减弱, 键能分别为53.5, 51.3, 43.1 kcal/mol. 我们推测类似的这种杂化缺失也会引起原子半径收缩, 并且成键减弱引起的原子大小扩张比杂化缺失引起的收缩的程度小^[21]. 所以这就形成了Cr—H键的“键长增长, 键能增强”.

图7 Cr—H键中Cr的p/d轨道成分比与键能的关系

Figure 7 Correlation between Cr—H bond strengths and p/d ratio of Cr

表4 铬氢化合物Cr—H键中Cr的p/d轨道成分比

Table 4 p/d ratio of Cr—H bond in chromium hydrides

Hydride	BDE(calc.)/(kcal·mol ⁻¹)	d _{M-H} /Å	p/d ratio
H-CrCp ₂ Me	43.1	1.530	3.8
H-CrCp ₂ SiH ₃	51.3	1.571	1.5
H-CrCp ₂ SiMe ₃	53.5	1.581	1.3

4 结论

铬族金属氢化物M—H键的均裂是自由基环化反应中的关键过程, 它直接影响反应的催化效率和选择性. 使用理论方法精确预测铬族金属氢化物M—H键键能不仅有助于了解这类催化剂的结构与性能关系, 而且对进一步发展高效的自由基环化反应催化剂具有重要的指导意义. 我们发现B3P86/lanl2dz+p方法可以精确预测铬族金属氢化物M—H键键能. 接着, 我们运用这个理论方法系统地研究了铬族金属氢化物M—H键键

能的构效关系. 就周期性规律而言, 铬氢络合物M—H键裂解能值主要在40~65 kcal/mol, 钼氢络合物M—H键裂解能值主要分布在65~75 kcal/mol, 钨氢络合物M—H键裂解能值主要分布在70~80 kcal/mol. 金属对于M—H键能的影响大于配体的影响. M—H键键裂解能的大小顺序为: 铬氢络合物<钼氢络合物<钨氢络合物. 此外, 我们发现含双茂配体的铬氢化合物中Cr—H键键能与伸缩振动频率呈现一定的线性相关性, 并且通过铬氢化合物中Cr—H键的伸缩振动频率能直接推导出键能. 有趣的是, 在含双茂配体的铬族金属氢化物中, 我们发现M—H键能与键长呈现了良好的正线性相关性, 即“键长越长, 键能越大”. 通过自然成键轨道分析, 这可能是因为杂化缺失造成原子半径变小程度比成键变弱引起的扩张程度大.

References

- [1] Smith, D. B.; Pulling, M. E.; Norton, J. R. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 770.
- [2] Jasperse, C. P.; Curran, D. P.; Fevig, T. L. *Chem. Rev.* **1991**, *91*, 1237.
- [3] (a) Choi, J.; Tang, L. H.; Norton, J. R. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 234; (b) Tang, L. H.; Papish, E. T.; Abramo, G. P.; Norton, J. R.; Baik, M. H.; Friesner, R. A.; Rappe, A. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, *125*, 10093; (c) Eisenberg, D. C.; Lawrie, C. J. C.; Moody, A. E.; Norton, J. R. *J. Am. Chem. Soc.* **1991**, *113*, 4888; (d) Pleune, B.; Morales, D.; Meunier-Prest, R.; Richard, P.; Collange, E.; Fettingier, J. C.; Poli, R. *J. Am. Chem. Soc.* **1999**, *121*, 2209; (e) Studer, A.; Amrein, S. *Synthesis* **2002**, 7, 835.
- [4] O'Connor, J. M.; Friese, S. J. *Organometallics* **2008**, *27*, 4280.
- [5] Hoff group: (a) Kiss, G.; Zhang, K.; Mukerjee, S. L.; Hoff, C. D. *J. Am. Chem. Soc.* **1990**, *112*, 5657; (b) Lang, R. F.; Ju, T. D.; Kiss, G.; Hoff, C. D.; Bryan, J. C.; Kubas, G. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1994**, *116*, 7917.
- [6] Tilset group: (a) Tilset, M. *J. Am. Chem. Soc.* **1992**, *114*, 2740; (b) Skagestad, V.; Tilset, M. *J. Am. Chem. Soc.* **1993**, *115*, 5077; (c) Tilset, M.; Hamon, J. R.; Hamon, P. *Chem. Commun.* **1998**, 765.
- [7] Luo, Y.-R. *Comprehensive Handbook of Chemical Bond Energies*, 1st ed., CRC Press, **2007**.
- [8] (a) Qi, X.-J.; Li, Z.; Fu, Y.; Guo, Q.-X.; Liu, L. *Organometallics* **2008**, *27*, 2688; (b) Qi, X.-J.; Fu, Y.; Liu, L.; Guo, Q.-X. *Organometallics* **2007**, *26*, 4197; (c) Qi, X.-J.; Liu, L.; Fu, Y.; Guo, Q.-X. *Organometallics* **2006**, *25*, 5879.
- [9] Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. R.; Montgomery, Jr. J. A.; Vreven, T.; Kudin, K. N.; Burant, J. C.; Millam, J. M.; Iyengar, S. S.; Tomasi, J.; Barone, V.; Mennucci, B.; Cossi, M.; Scalmani, G.; Rega, N.; Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; Hada, M.; Ehara, M.; Toyota, K.; Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, M.; Nakajima, T.; Honda, Y.; Kitao, O.; Nakai, H.; Klene, M.; Li, X.; Knox, J. E.; Hratchian, H. P.; Cross, J. B.; Bakken, V.; Adamo, C.; Jaramillo, J.; Gomperts, R.; Stratmann, R. E.; Yazyev, O.; Austin, A. J.; Cammi, R.; Pomelli, C.; Ochterski, J. W.; Ayala, P. Y.; Morokuma, K.; Voth, G. A.; Salvador, P.; Dannenberg, J. J.; Zakrzewski, V. G.; Dapprich, S.; Daniels, A. D.; Strain, M. C.; Farkas, O.; Malick, D. K.; Rabuck, A. D.; Raghavachari, K.; Foresman, J. B.; Ortiz, J. V.; Cui, Q.; Baboul, A. G.; Clifford, S.; Cioslowski, J.; Stefanov, B. B.; Liu, G.; Liashenko, A.; Piskorz, P.; Komaromi, I.; Martin, R. L.; Fox, D. J.; Keith, T.; Al-Laham, M. A.; Peng, C. Y.; Nanayakkara, A.; Challacombe, M.; Gill, P. M. W.; Johnson, B.; Chen, W.; Wong, M. W.; Gonzalez, C.; Pople, J. A. *Gaussian 03*, Revision C. 02, Gaussian, Inc., Wallingford CT, **2004**.
- [10] Zhao, Y.; Schultz, N. E.; Truhlar, D. G. *J. Chem. Theory Comput.* **2006**, *2*, 364.
- [11] (a) Feng, Y.; Liu, L.; Wang, J.-T.; Huang, H.; Guo, Q.-X. *J. Chem. Inf. Comput. Sci.* **2003**, *43*, 2005; (b) Cheng, Y.-H.; Zhao, X.; Song, K.-S.; Liu, L.; Guo, Q.-X. *J. Org. Chem.* **2002**, *67*, 6638; (c) Song, K.-S.; Liu, L.; Guo, Q.-X. *J. Org. Chem.* **2003**, *68*, 262; (d) Feng, Y.

- Liu, L.; Wang, J.-T.; Zhao, S.-W.; Guo, Q.-X. *J. Org. Chem.* **2004**, *69*, 3129; (e) Fu, Y.; Liu, L.; Lin, B.-L.; Mou, Y.; Cheng, Y.-H.; Guo, Q.-X. *J. Org. Chem.* **2003**, *68*, 4657.
- [12] (a) Hoobler, R. J.; Hutton, M. A.; Dillard, M. M.; Castellani, M. P.; Rheingold, A. L.; Rieger, A. L.; Rieger, P. H.; Richards, T. C.; Geiger, W. E. *Organometallics* **1993**, *12*, 116; (b) Goh, L.-Y.; D'aniello, M. J.; Slater, S.; Muetterties, E. L.; Tavanaiepour, I.; Chang, M. I.; Fredrich, M. F.; Day, V. W. *Inorg. Chem.* **1979**, *18*, 192.
- [13] (a) Stender, M.; Oesen, H.; Blaurock, S.; Hey-Hawkins, E. Z. *Anorg. Allg. Chem.* **2001**, *627*, 980; (b) Shin, J. H.; Savage, W.; Murphy, V. J.; Bonanno, J. B.; Churchill, D. G.; Parkin, G. *J. Chem. Soc., Dalton Trans.* **2001**, 1732.
- [14] Crystal structures: (a) Schultz, A. J.; Stearley, K. L.; Williams, J. M.; Mink, R.; Stucky, G. D. *Inorg. Chem.* **1977**, *16*, 3303; (b) Koloski, T. S.; Pestana, D. C.; Carroll, P. J.; Berry, D. H. *Organometallics* **1994**, *13*, 489; (c) Shin, J. H.; Churchill, D. G.; Bridgewater, B. M.; Pang, K.; Parkin, G. *Inorg. Chim. Acta* **2006**, *359*, 2942.
- [15] (a) Hylakryspin, I.; Waldman, T. E.; Melendez, E.; Trakarnpruk, W.; Arif, A. M.; Ziegler, M. L.; Ernst, R. D.; Gleiter, R. *Organometallics* **1995**, *14*, 5030; (b) Vos, D.; Arif, A. M.; Ernst, R. D. *J. Organomet. Chem.* **1998**, *553*, 277.
- [16] (a) Kaupp, M.; Metz, B.; Stoll, H. *Angew. Chem.-Int. Ed.* **2000**, *39*, 4607; (b) Kaupp, M.; Riedel, S. *Inorg. Chim. Acta* **2004**, *357*, 1865.
- [17] GonzalezBlanco, O.; Branchadell, V. *Organometallics* **1997**, *16*, 5556.
- [18] Bowmaker, G. A.; Schmidbaur, H.; Kruger, S.; Rosch, N. *Inorg. Chem.* **1997**, *36*, 1754.
- [19] Gisdakis, P.; Antonczak, S.; Rosch, N. *Organometallics* **1999**, *18*, 5044.
- [20] Tandura, S. N.; Shumsky, A. N.; Ugrak, B. I.; Negrebetsky, V. V.; Bylikin, S. Y.; Kolesnikov, S. P. *Organometallics* **2005**, *24*, 5227.
- [21] (a) Feng, Y.; Liu, L.; Wang, J.-T.; Li, X.-S.; Guo, Q.-X. *Chem. Commun.* **2004**, 88; (b) Fang, Y.; Fan, J.-M.; Liu, L.; Li, X.-S.; Guo, Q.-X. *Chem. Lett.* **2002**, 116; (c) Li, X.-S.; Liu, L.; Schlegel, H. B. *J. Am. Chem. Soc.* **2002**, *124*, 9639.

(Qin, X.)