功能化烯胺的合成(I): 混合溶剂中硫脲催化 α,β -邻位氨基溴转变成 α,β -脱氢氨基

陈战国* 王丹 李亚男 王英杰 胡均利 夏伟

(陕西省大分子科学重点实验室 陕西师范大学化学化工学院 西安 710062)

摘要 建立了一种简单有效的合成功能化烯胺的新方法. 在有机小分子硫脲的催化下(50 mol%), 在混合溶剂中 [$\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{DMF}=1:1(V/V)$], 室温下各种 α,β -邻位氨基溴的酮和 α,β -邻位氨基溴的酯均能几乎定量的转变成相应的 α,β -脱氢氨基类化合物(收率 90%~99%). 硫脲催化邻位氨基溴转变成 α,β -脱氢氨基类化合物的新方法, 具有反应条件温和、操作简便、收率高、催化剂廉价易得等特点. 全文共考察了 32 种不同结构 α,β -邻位氨基溴的酮和 α,β -邻位氨基溴的酯反应情况, 证明该方法具有广泛的适应性. 实验中发现, α,β -邻位氨基溴的酮和 α,β -邻位氨基溴的酯在发生消除反应时, 要经过一个形成氮丙啶的中间过程, 再由氮丙啶的开环反应形成最终产物(α,β -脱氢氨基类化合物). 因此不论反应底物为 α -氨基- β -溴结构还是 α -溴- β -氨基结构, 通过分子内的亲核取代反应所形成的氮丙啶结构单元具有相似的立体结构, 而氮丙啶的开环具有区域专一性, 因此所得到的最终产物也具有区域专一性(烯键上的氨基均处在羰基的 α -位). 所提出的硫脲催化邻位氨基溴转变成 α,β -脱氢氨基的可能机理, 很好地解释了该反应的区域专一性. 所有的产物结构均经过了 $^1\text{H NMR}$, $^{13}\text{C NMR}$ 及高分辨质谱的确定.

关键词 烯胺; 硫脲; 催化; α,β -邻位氨基溴; α,β -脱氢氨基

Synthesis of Functionalized Enamines (I): the α,β -Vicinal Bromoamine Compounds Converted into α,β -Dehydroamino Derivatives Catalyzed by Thiourea in Mixture Solvent

Chen, Zhanguo* Wang, Dan Li, Yanan Wang, Yingjie Hu, Junli Xia, Wei

(Key Laboratory of Macromolecular Science of Shaanxi Province, School of Chemistry and Chemical Engineering, Shaanxi Normal University, Xi'an 710062)

Abstract An easy and efficient new method for the synthesis of functionalized enamines from α,β -vicinal bromoamine ketones and esters has been developed. A series of α,β -vicinal bromoamine ketones and esters can be smoothly converted into corresponding α,β -dehydroamino derivatives catalyzed by thiourea (50 mol%) in mixture solvents [$\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{DMF}=1:1(V/V)$] at room temperature in nearly quantitative yield (90%~99%). This new method, the conversion of α,β -vicinal bromoamine ketones and esters into α,β -dehydroamino derivatives, has many advantages such as mild conditions, easy handling, nearly quantitative yields *etc.* 32 structurally different substrates were investigated. The results indicated that the protocol has applicability in a large scope of vicinal bromoamine compounds including α,β -vicinal bromoamine ketones and esters. During the elimination process of HBr from vicinal bromoamine compounds to generate corresponding functionalized enamines with assistance of thiourea, the corresponding intermediate aziridines must be formed firstly. The final products (α,β -dehydroamino derivatives) were formed via ring-open reaction of the aziridines. Herein, no matter the substrate was α -amino- β -bromo or α -bromo- β -amino in structurally, the aziridines skeleton in structurally was similar to each other formed from the intramolecular nucleophilic replacement reaction fashion. Because of ring-open reactions of aziridines have full regiospecificity, the obtained final products are full regiospecificity, too. A possible mechanism was proposed and it can explain well the full regiospecificity of the reaction. All functionalized enamines were obtained by following experimental procedure. Unless otherwise stated, all reagents were purchased from commercial sources and used without further purification. A mixture of a α,β -vicinal bromoamine ketones or esters (1.0 mmol), anhydrous K_2CO_3 (0.5 mmol), thiourea (0.5 mmol) was put into a dried convenience vessel. Then, 10 mL of commercial and not degassed mixture solvent [$\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{DMF}=1:1(V/V)$] was added to the vessel with stirring at room temperature without protection of inert gas. The reaction progress was monitored by TLC until the starting material was consumed, and the spot of final product was not changed (The first spot represented a corresponding aziridine. Subsequently, this aziridine spot was disappeared, and the final product spot was

* E-mail: chzhg@snnu.edu.cn; Tel.: 029-81530726; Fax: 029-81530727

Received August 11, 2012; published September 12, 2012.

Supporting information for this article is available free of charge via the Internet at <http://sioc-journal.cn>.

Project supported by the the Natural Science Foundation of Shaanxi Province (No. 2009JM2011) and the Innovation Foundation of Postgraduate Cultivation of Shaanxi Normal University (No. 2008CXB009).

项目受陕西省自然科学基金(No. 2009JM2011)和陕西师范大学研究生创新基金(No. 2008CXB009)资助.

formed which was stable). After completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with EtOAc (15 mL) and washed with water (15 mL $\times$ 3) and brine (15 mL $\times$ 3). The organic layer was dried by anhydrous Na_2SO_4 and concentrated under reduced pressure to give crude product, which was purified by column chromatography packed with silica gel with petroleum ether and EtOAc as eluent to afford pure product. The structures of all products were confirmed by their ^1H NMR, ^{13}C NMR and HRMS analysis.

Keywords enamine; thiourea; catalyze; α,β -vicinal bromoamine; α,β -dehydroamino

1 引言

功能化的烯胺是制备许多杂环化合物、生物活性物质的重要反应中间体^[1-7]。 α -氨基烯酮类化合物的骨架常存在于生物碱、天然及合成的抗生素药物中^[8,9]。 α,β -脱氢氨基酸衍生物常常是制备特种氨基酸的重要前体。该类化合物特殊的结构使它们在反应中既体现出胺的性质,又体现出烯烃的性质,在有机合成中占有重要的地位:如能发生取代反应^[10-13];自由基加成反应^[14];Sonogashira 偶联反应^[15];Suzuki 偶联反应^[16];复分解反应^[17];环加成反应^[18];环氧化反应^[19,20];氢化反应^[21-23]和迈克尔加成反应^[24-26]等。因此有关 α,β -脱氢氨基化合物(功能化烯胺)的合成方法长期以来已成为有机界关注的热点之一。目前已报道的 α,β -脱氢氨基化合物的合成方法,归纳起来有以下几种:基于 Claisen-Schmidt 缩合反应^[27];基于 2-吗啉代环丙醇的开环反应^[28];基于 α -叠氮酮类化合物的氮分子消去反应^[29];基于氮丙啶的开环反应^[30-32]。但以上方法存在反应收率相对较低、反应条件苛刻等缺陷。近年来,烯胺的氨卤加成反应研究趋于成熟,由烯胺的氨卤加成产物合成该类化合物已有文献报道^[31],该方法是在乙腈溶剂中,在特殊碱 1,4-二氮二环[2.2.2]辛烷(DABCO)的促进下,顺利地把 α,β -邻位氨基氯的芳酮和 α,β -邻位氨基氯的芳酯(氨氯加成产物)转化成相应的 α,β -脱氢氨基,但这种碱的用量要达到底物的 2 倍量。在此基础上,该法从 α,β -不饱和芳酮和 α,β -不饱和芳酯出发,先进行氨氯加成反应,再在 5 倍量 DABCO 的促进下实现了一锅法合成 α,β -脱氢氨基,但最高收率不超过 73%,而且 α,β -不饱和脂肪酮和酯在此条件下不能反应。我们课题组在烯胺氨卤加成反应研究的基础上^[33-37],对氨卤加成产物的应用研究也进行了深入探索,发现硫脲可方便而有效地将氨卤加成产物转化成相应的功能化烯胺(α,β -脱氢氨基)。作为我们的研究结果之一,本文首先报道混合溶剂中硫脲催化具有邻位氨基溴结构化合物转变成 α,β -脱氢氨基的新方法。研究结果表明,在混合溶剂中(二氯甲烷/*N,N*-二甲基甲酰胺),在 50 mol% 硫脲的催化下,各种氨溴加成产物(邻位氨基溴的酮和邻位氨基溴的酯)在室温可被顺利地转变成相应的脱氢氨基(Scheme 1),收率在 90%~99%。

2 结果与讨论

2.1 反应条件的优化

受文献^[31]的启示,我们意识到有些胺类化合物有

Scheme 1

可能催化氨卤化产物转变成 α,β -脱氢氨基类化合物的反应。于是,我们以 3-溴-1,3-二苯基-2-(对甲苯磺酰氨基)-1-丙酮 **29a** 为模板,对一些酰胺及胺类化合物的催化作用进行了研究,实验结果表明,在二氯甲烷中,尿素、硫脲、丁二酰亚胺、乙酰胺、苯甲酰胺、三乙胺等各种酰胺及胺类化合物独立作为催化剂时均不能实现邻位氨基溴的消除反应得到相应的脱氢氨基,但在碱(K_2CO_3)的帮助下,只发现硫脲对此反应有特殊的催化作用。同时也发现,溶剂对此反应有重要的影响作用。因为在常用的溶剂中,如二氯甲烷、氯仿、乙腈、甲苯和丙酮等,即使在碱的帮助下,发现硫脲还不能充分发挥催化作用(表 1, Entries 1~5),甚至有的溶剂根本不能使反应发生(表 1, Entries 1, 2, 4);而在 DMF 溶剂中,虽然有明显的反应发生,但产物十分复杂(表 1, Entry 6)。非常有趣的是,当把二氯甲烷和 DMF 混合起来作溶剂时,却顺利得到了高收率的产物,但 DMF 与氯仿、DMF 与乙腈组成混合溶剂时,在无水 K_2CO_3 和硫脲存在下该反应却不能顺利进行。为了进一步优化反应条件,本文对硫脲和 K_2CO_3 的用量进行了考察,其优化结果也列于表 1 中。

由表 1 可以看出,在混合溶剂中,不加碱的条件下,即使硫脲的用量为底物的 200 mol% 时,48 h 内该反应也不能发生(Entry 7)。在 200 mol% K_2CO_3 存在下,但却无硫脲的条件下,同样 48 h 内也不能得到预期的产物(Entry 8)。说明硫脲作催化剂,必须有碱的帮助才能发挥它的催化作用。通过对碱和硫脲使用量的优化(Entries 9~16),发现在 50 mol% 的 K_2CO_3 和 50 mol% 的硫脲的联合催化下,该反应可以给出几乎定量的反应收率(Entry 15, 收率 98%)。然而,在混合溶剂中,其他胺类物质对该反应却没有催化作用(Entries 17~21)。因此优化的反应条件是:反应温度为室温,溶剂[CH_2Cl_2 :DMF = 1:1 (V/V)], 50 mol% K_2CO_3 , 50 mol% NH_2CSNH_2 。

表1 催化剂和溶剂对 α,β -邻位氨基溴的酮(查耳酮衍生物)消除反应的影响^aTable 1 The effect of catalyst and solvent on the elimination reaction of α,β -vicinal bromoamine ketone (chalcone derivative)^a

Entry	Solvent	K ₂ CO ₃ (mol%)	Catalyst (mol%)	Time	Yield ^b /%
1	CH ₂ Cl ₂	200	Thiourea (200)	24 h	NR ^c
2	CHCl ₃	200	Thiourea (200)	24 h	NR ^c
3	CH ₃ CN	200	Thiourea (200)	24 h	60
4	toluene	200	Thiourea (200)	24 h	NR ^c
5	CH ₃ COCH ₃	200	Thiourea (200)	24 h	45
6	DMF	200	Thiourea (200)	24 h	mix.
7	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	0	Thiourea (200)	48 h	NR ^c
8	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	200	Thiourea (0)	48 h	NR ^c
9	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	200	Thiourea (200)	20 min	98
10	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	100	Thiourea (200)	45 min	97
11	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	100	Thiourea (100)	2 h	98
12	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	100	Thiourea (50)	4 h	98
13	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	50	Thiourea (200)	1 h	98
14	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	50	Thiourea (100)	2.5 h	98
15	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	50	Thiourea (50)	5 h	98
16	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	50	Thiourea (20)	48 h	46
17	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	50	Urea (50)	48 h	NR ^c
18	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	50	Succinimide(50)	48 h	NR ^c
19	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	50	Acetamide (50)	48 h	NR ^c
20	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	50	Benzoylamine (50)	48 h	NR ^c
21	CH ₂ Cl ₂ : DMF = 1 : 1 (V/V)	50	Triethylamine (50)	48 h	mix.

^a Conditions: α,β -vicinal bromoamine ketone (1.0 mmol), K₂CO₃, catalyst (amides and amine), solvent 10 mL, 25 °C; ^b isolated yield after chromatography separation; ^c NR: no reaction.

2.2 底物结构对反应活性的影响

为了探索该反应的适应范围,在上述优化的条件下,对各种邻位氨基溴的酮和邻位氨基溴的酯的消除反应进行了考察,其结果见表2。由表2可知,在以硫脲为催化剂,CH₂Cl₂/DMF为溶剂时,各种邻位氨基溴的酮和邻位氨基溴的酯均能顺利进行溴化氢消除反应,高产率的得到相应的脱氢氨。然而,实验结果表明,上述各种邻位氨基溴的酮和邻位氨基溴的酯,由于其结构不同,表现出不同的反应活性。

不论是邻位氨基溴的酮还是邻位氨基溴的酯,处于羰基 β 位苯环对位有强供电子基的底物,反应速率普遍较快,反应完成的时间为 4~6 h,可得到 95%~99% 的收率(表2, Entries 1~23),对于 β 位苯环对位有吸电子基的底物,反应速率普遍较慢,反应要在 15~30 h 内才能完成,但仍然可以得到 90%~96% 的收率(Entries 24~32)。相对而言,邻位氨基溴的酯的反应活性要高于邻位氨基溴的酮,因为前者完成反应的时间较短(4~

6 h, Entries 1~13)。

2.3 反应的区域选择性

反应的区域选择性表现出很强的规律性,不论是 α -氨基- β -溴结构还是 α -溴- β -氨基结构的邻位氨基溴化合物,其产物都是 α -取代的脱氢氨(即氨基取代基处在羰基的 α -位)。因为对所有产物的结构确证中发现,所有产物的氢谱中都能观察到苯基位(sp² 碳)上氢峰的存在。为了进一步证实氨基取代基是处在羰基的 α -位,我们对其中的一个产物 **4c** 进行了单晶培养, **4c** 单晶结构可以直观的看出氨基取代基处在羰基的 α -位(见图1),证明该反应具有区域专一性。

2.4 反应机理的探讨

实验中发现,随着反应的进行(TLC 跟踪),底物完全消失,同时出现单一的斑点。随着反应时间的推移,这个斑点也会完全消失,最后又出现单一的新斑点(最终产物的斑点)。因此我们认为,所有产物都经历了一个中间转换过程。为了探索该反应的可能机理,我们重

表2 硫脲催化各种 α,β -邻位氨基溴化合物的消除反应^aTable 2 Thiourea-catalyzed elimination reaction of various α,β -vicinal bromoamine compounds^a

$ \begin{array}{c} \text{R}^1 \text{---} \text{CH}(\text{Br}) \text{---} \text{CH}(\text{NHTs}) \text{---} \text{R}^2 \quad \text{or} \quad \text{R}^1 \text{---} \text{CH}(\text{NHTs}) \text{---} \text{CH}(\text{Br}) \text{---} \text{R}^2 \\ \text{a} \end{array} \xrightarrow[\text{CH}_2\text{Cl}_2:\text{DMF (1:1), r.t.}]{\text{K}_2\text{CO}_3 (50 \text{ mol\%}), \text{NH}_2\text{CSNH}_2 (50 \text{ mol\%})} \begin{array}{c} \text{R}^1 \text{---} \text{CH} \text{---} \text{CH}(\text{NHTs}) \text{---} \text{R}^2 \\ \text{c} \end{array} $					
Entry	Substrate	Product	Time/h	Yield ^b /%	m.p./°C
1			6	96	152~154
2			6	95	109~111
3			6	96	117~118
4			6	99	133~135
5			6	99	121~123
6			6	96	161~163
7			6	99	145~147
8			6	98	162~164
9			6	96	128~130

续表

Entry	Substrate	Product	Time/h	Yield ^b /%	m.p./°C
10	10a	10c	6	99	161~162
11	11a	11c	6	99	113~114
12	12a	12c	6	99	116~117
13	13a	13c	6	98	128~130
14	14a	14c	4	98	178~180
15	15a	15c	4	97	180~181
16	16a	16c	4	98	202~204
17	17a	17c	4	96	200~201
18	18a	18c	4	97	144~146

续表

Entry	Substrate	Product	Time/h	Yield ^b /%	m.p./°C
19	19a	19c	6	99	169~171
20	20a	20c	6	99	176~178
21	21a	21c	6	97	146~148
22	22a	22c	6	98	140~141
23	23a	23c	6	99	181~183
24	24a	24c	15	96	162~164
25	25a	25c	30	94	172~174
26	26a	26c	15	96	160~162
27	27a	27c	30	91	186~188
28	28a	28c	15	96	171~173

续表

Entry	Substrate	Product	Time/h	Yield ^b /%	m.p./°C
29			30	90	162~164
30			30	92	161~162
31			30	92	161~162
32			15	96	169~170

^a Conditions: α,β -vicinal bromoamine ketone or esters (1.0 mmol), K_2CO_3 (50 mol%), thiourea (50 mol%), solvent [CH_2Cl_2 /DMF=1:1 (V/V), 10 mL], 25 °C;

^b isolated yield after chromatography separation.

图1 产物4c的单晶结构

Figure 1 X-ray crystal structure of product 4c

复了底物 **29a** 的反应, 并且当底物完全消失而第一个斑点完全形成时, 猝灭反应, 分离出该组分. 经结构鉴定为相应的氮丙啶 **29b**, 其 1H NMR、 ^{13}C NMR 和熔点与文献值^[38]完全相同, 预示在合成 α,β -脱氢氨时要经历一个氮丙啶的转换过程(Scheme 2).

为了进一步确证产物 **29c** 来自于化合物 **29b**, 我们用纯净的 **29b** 作为反应底物, 在相同条件下反应 5 h 得到了产物 **29c**, 说明合成 α,β -脱氢氨时要经过两步才能完成, 但这两步是在同一体系下连续进行的(Scheme 3).

为了验证反应(ii)在相同反应条件下所具有的普遍性, 我们选取不同结构的氮丙啶进行扩展试验, 实验结果证明, 各种不同结构的氮丙啶几乎能定量地转化为相应的脱氢氨, 结果见表 3.

根据以上实验结果, 本文提出了硫脲催化反应的可

Scheme 2

Scheme 3

能机理(Scheme 4). 首先邻位氨基溴化合物在碱和硫脲的作用下转变成相应的氮丙啶, 这一过程与文献^[38]相似. 此后硫脲以它的互变异构体 **A** 参与反应, 此时 **A** 与碱(K_2CO_3)作用产生一个 $[NH_2C=NHS^-]$ 负离子 **B**, **B** 的

表3 各类不同氮丙啶转化成 α,β -脱氢氨基衍生物的反应^aTable 3 The reaction of various aziridines converted into corresponding α,β -dehydroamino derivatives^a

$ \begin{array}{c} \text{Ar} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{N} \\ \\ \text{Ts} \end{array} \begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{C} \\ \\ \text{R} \end{array} \xrightarrow[\text{CH}_2\text{Cl}_2:\text{DMF} = 1:1 \text{ (V/V), r.t.}]{\begin{array}{c} \text{K}_2\text{CO}_3 \text{ (50 mol\%)} \\ \text{NH}_2\text{CSNH}_2 \text{ (50 mol\%)} \end{array}} \begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{C} \\ \\ \text{R} \\ \\ \text{NHTs} \end{array} $					
Entry	Substrate	Product	Time/h	Yield ^b /%	m.p./°C
1	 6b	 6c	3	97	161~163
2	 10b	 10c	3	98	161~162
3	 14b	 14c	1	98	178~180
4	 15b	 15c	2	99	180~181
5	 16b	 16c	2	99	202~204
6	 17b	 17c	2	98	200~201
7	 19b	 19c	4	98	169~171
8	 20b	 20c	4	98	176~178

续表

Entry	Substrate	Product	Time/h	Yield ^b /%	m.p./°C
9			6	98	162~164
10			2	99	160~162
11			5	98	176~178
12			5	98	162~164
13			13	98	161~162

^a Conditions: aziridines (1.0 mmol), K₂CO₃ (50 mol%), thiourea (50 mol%), solvent [CH₂Cl₂/DMF = 1 : 1 (V/V), 10 mL], 25 °C; ^b isolated yield after chromatography separation.

Scheme 4

一个氨基氢与氮丙啶结构中的羰基氧形成氢键, 同时 [NH₂C=NHS⁻] 的硫负离子以亲核试剂的角色进攻氮丙啶三元环. 在打开三元环的同时形成一个八元环结构 **C**, 这样保证了羰基氧始终与 Ar 处在反位. 如结构式 **C** 那

样, 接着发生羰基 α -位氢向苯磺酰氨基氮负离子上的转移(即 1,2-迁移), 产生中间体 **D**, 中间体 **D** 中羰基 α -位的碳负离子可以被羰基的吸电子性能所稳定. 由于 **D** 有形成共轭体系的潜在趋势, 促使所形成的八元环破裂, 形成一个中间过渡态 **E**, 由 **E** 转变成所需要的产物 **F**, 其构型保持不变. 同时, 在生成产物的同时, 产生的硫脲负离子 [NH₂C=NHS⁻] **B** 参与下一个循环反应.

3 结论

本文建立了硫脲催化具有邻位氨基溴结构化合物转变成功能化烯胺(α,β -脱氢氨)的新方法, 在 CH₂Cl₂ : DMF = 1 : 1 (V/V) 的混合溶剂中, 各种不同结构的邻位氨基溴化合物包括邻位氨基溴的芳酮和邻位氨基溴的芳酯均能几乎定量的转化成 α,β -脱氢氨类化合物(收率 90%~99%). 该方法操作简单, 催化剂易得、稳定, 价格低廉, 为合成 α,β -脱氢氨类化合物提供了一个有效的途径. 实验结果证明, 不论底物具有 α -氨基- β -溴结构还是 α -溴- β -氨基结构, 在反应的过程中都要经过一个氮丙啶过程, 而氮丙啶的开环具有区域专一性, 因此产物也具有区域专一性. 本文提出的可能反应机理能很好解释这一区域选择性.

4 实验部分

4.1 底物的合成

各种邻位氨基溴的酮和邻位氨基溴的酯, 参考文献^[33,37]合成. 合成路线见 Scheme 5.

Scheme 5

4.2 α,β -脱氢氨合成通用方法

邻位氨基溴的芳酮或邻位氨基溴的芳酯(1.0 mmol), 无水 K_2CO_3 (0.5 mmol, 50 mol%), 硫脲(0.5 mmol, 50 mol%)置于干燥的容器内, 加入 10 mL 混合溶剂 [CH_2Cl_2 :DMF=1:1(V/V)], 于室温且无需氮气保护的条件下搅拌反应, 反应进程用 TLC 跟踪直到原料全部消耗完毕且产物斑点不再改变. 反应结束后, 向反应混合物中加入乙酸乙酯 15 mL, 依次用蒸馏水(15 mL $\times$ 3), 饱和食盐水(15 mL $\times$ 3)洗涤. 有机相用无水硫酸钠干燥过夜, 减压蒸除有机溶剂得粗产物, 后经柱分离得纯品(用适当体积比的石油醚和乙酸乙酯作洗涤液).

以产物 **1c** 合成过程为例: 在 25 mL 圆底烧瓶中依次加入 3-苯基-2-(4-甲基苯磺酰胺基)-3-溴丙酸甲酯 **1a** 0.411 g (1.0 mmol), 碳酸钾 0.0690 g (0.5 mmol), 硫脲 0.038 g (0.5 mmol), CH_2Cl_2 :DMF (体积比 1:1)的混合溶剂 10 mL. 室温下搅拌, TLC 跟踪反应直到产物斑点不再改变(需 6 h). 在反应液中加入乙酸乙酯 15 mL, 依次以蒸馏水(15 mL $\times$ 3), 饱和食盐水(15 mL $\times$ 3)洗涤. 将有机相用无水硫酸钠干燥过夜, 过滤除去干燥剂, 减压蒸馏得粗产品. 柱分离得产品 0.3180 g, 收率为 96%. **1c**: white solid, m.p. 152~154 °C (EtOH); 1H NMR (300 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.86 (s, 2H, PhH), 7.67 (d, J =8.10 Hz, 2H, PhH), 7.53 (s, 1H, NH), 7.36 (s, 3H, PhH), 7.24 (d, J =8.10 Hz, 2H, PhH), 6.18 (s, 1H, HC=C), 3.53 (s, 3H, OCH_3), 2.40 (s, 3H, $PhCH_3$); ^{13}C NMR (75.45 MHz, $CDCl_3$) δ : 165.4, 137.7, 132.8, 131.1 (3), 130.4 (2), 129.4 (2), 128.5 (2), 127.6 (3), 52.57, 21.55. HRMS calcd for $C_{17}H_{17}NO_4SNa$ 354.0771, found 354.0776.

其他产物的合成过程及结构表征见 Supporting information.

References

- [1] Ferreira, P. M. T.; Monteiro, L. S.; Coban, T.; Suzen, S. *J. Enzyme Inhib. Med. Chem.* **2009**, *24*, 967.
- [2] Kong, Y.; Yang, W.; Wu, W.-T. *Pharm. Biotechnol.* **2007**, *14*, 230. (孔毅, 杨婉, 吴梧桐, 药物生物技术, **2007**, *14*, 230.)
- [3] Lanigan, G. W.; Payne, A. L.; Smith, L. W.; Wood, P. M.; Petterson, D. S. *Appl. Environ. Microbiol.* **1979**, *37*, 289.
- [4] Plate, R.; Akkerman, M. A. J.; Ottenheim, H. C. J. *J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1* **1987**, 2481.
- [5] Bonauer, C.; Walenzyk, T.; Konig, B. *Synthesis* **2006**, 1.
- [6] Armstrong, R. W.; Moran, E. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1992**, *114*, 371.
- [7] Schmidt, U.; Lieberknecht, A.; Wild, J. *Synthesis* **1988**, 159.
- [8] Alcaraz, L.; Macdonald, G.; Ragot, J.; Lewis, N. J.; Taylor, R. J. K. *Tetrahedron* **1999**, *55*, 3707.
- [9] Chang, L. C.; Bhat, K. P. L.; Pisha, E.; Kennelly, E. J.; Fong, H. H. S.; Pezzuto, J. M.; Kinghorn, A. D. *J. Nat. Prod.* **1998**, *61*, 1257.
- [10] Zhou, H.; Donk, W. A. V. D. *Org. Lett.* **2001**, *3*, 593.
- [11] Zhou, H.; Donk, W. A. V. D. *Org. Lett.* **2002**, *4*, 1335.
- [12] Pereira, G.; Abreu, A. S.; Castanheira, E. M. S.; Coutinho, P. J. G.; Ferreira, P. M. T.; Queiroz, M.-J. R. P. *Eur. J. Org. Chem.* **2009**, 3906.
- [13] Pereira, G.; Castanheira, E. M. S.; Ferreira, P. M. T.; Queiroz, M.-J. R. P. *Eur. J. Org. Chem.* **2010**, 464.
- [14] Sibi, M. P.; Asano, Y.; Sausker, J. B. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2001**, *40*, 1293.
- [15] Miossec, B.; DanionBougot, R.; Danion, D. *Synthesis* **1994**, 1171.
- [16] Burk, M. J.; Allen, J. G.; Kiesman, W. F.; Stoffan, K. M. *Tetrahedron Lett.* **1997**, *38*, 1309.
- [17] Manzoni, L.; Colombo, M.; Scolastico, C. *Tetrahedron Lett.* **2004**, *45*, 2623.
- [18] Horikawa, H.; Nishitani, T.; Iwasaki, T.; Mushika, Y.; Inoue, I.; Miyoshi, M. *Tetrahedron Lett.* **1980**, *21*, 4101.
- [19] Bartels, A.; Peter, G. J.; Liebscher, J. *Tetrahedron Lett.* **1995**, *36*, 3673.
- [20] Bartels, A.; Jones, P. G.; Liebscher, J. *Synthesis* **2003**, 67.
- [21] Tang, W.; Zhang, X. *Chem. Rev.* **2003**, *103*, 3029.
- [22] Enthaler, S.; Erre, G. *Eur. J. Org. Chem.* **2008**, 3352.
- [23] Chen, W. P.; Mbafor, W. J. *Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 3922.
- [24] Ferreira, P. M. T.; Maia, H. L. S.; Monteiro, L. S. *Tetrahedron Lett.* **1999**, *40*, 4099.
- [25] Abreu, A. S.; Silva, N. O.; Ferreira, P. M. T.; Queiroz, M. J. R. P. *Eur. J. Org. Chem.* **2003**, 1537.
- [26] Bull, S. D.; Davies, S. G.; O'Shea, M. D. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1998**, 3657.
- [27] Srinivasan, M.; Perumal, S.; Selvaraj, S. *ARKIVOC* **2006**, *10*, 21.
- [28] Weigel, W.; Henning, H.-G. *Chem. Commun.* **1997**, *19*, 1893.
- [29] Sant, K. V.; South, M. S. *Tetrahedron Lett.* **1987**, *28*, 6019.
- [30] Padwa, A.; Eisenhardt, W. J. *Org. Chem.* **1970**, *35*, 2472.
- [31] Chen, D.-J.; Guo, L.; Liu, J.-Y.; Kirtane, S.; Cannon, J. F.; Li, G.-G. *Org. Lett.* **2005**, *7*, 921.
- [32] Pak, C. S.; Kim, T. H.; Ha, S. J. *J. Org. Chem.* **1998**, *63*, 10006.
- [33] Chen, Z.-G.; Wei, J.-F.; Li, W.-L.; Wang, Y.; Zhao, P.-F.; Shi, X.-Y. *Chin. J. Chem.* **2011**, *29*, 1689.
- [34] Chen, Z.-G.; Zhou, J.-M.; Wang, Y.; Li, W.-L. *Acta Chim. Sinica* **2011**, *69*, 2851. (陈战, 周继梅, 王芸, 李文丽, 化学学报, **2011**, *69*, 2851.)
- [35] Li, W.-L.; Chen, Z.-G.; Zhou, J.-M.; Hu, J.-L.; Xia, W. *Chin. J. Chem.* **2012**, *30*, 830.
- [36] Chen, Z.-G.; Wang, Y.; Wei, J.-F.; Zhao, P.-F.; Shi, X.-Y. *J. Org. Chem.* **2010**, *75*, 2085.
- [37] Chen, Z.-G.; Zhou, L.-Y.; Li, W.-L.; Zhou, J.-M.; Wang, C.-N. *Acta Chim. Sinica* **2011**, *69*, 1093. (陈战, 周利燕, 李文丽, 周继梅, 王传宁, 化学学报, **2011**, *69*, 1093.)
- [38] Wei, J.-F.; Chen, Z.-G.; Gao, Y.-N.; Zhang, P.; Wang, C.-N.; Zhao, P.-F.; Wang, Y.; Shi, X.-Y. *Chin. J. Chem.* **2012**, *30*, 391.

(Cheng, B.; Fan, Y.)