含有二氟亚甲基的 Fostriecin 类似物的设计和合成研究

杨义^{a,b} 游正伟^a 卿凤翎^{*,a,c}

(^a 中国科学院上海有机化学研究所 有机氟化学重点实验室 上海 200032)

(^b 四川理工学院 化学与制药工程学院 自贡 643000)

(^c 东华大学 化学化工与生物工程学院 上海 201620)

摘要 Fostriecin 是近年来备受瞩目的新型抗肿瘤天然产物。根据构效关系分析,设计了具有潜在更高活性的含有二氟亚甲基的 Fostriecin 类似物 **4**, 并进行了合成研究。目标分子的骨架结构由片段 **a**, **b**, **c** 经螯合控制的加成反应和 Stille 偶联反应汇聚合成。在含氟片段 **a** 的合成中应用了以下关键反应: (Z)-烯基碘 **8** 与溴二氟乙酸乙酯在铜粉作用下的偶联反应; 酶动力学拆分构建 C-5 位的手性中心。合成甲基酮片段 **b** 的关键步骤包括: 酶动力学拆分构建 C-11 位的手性中心和 CBS 不对称还原 α,β -不饱和酮 **23**。从商业可得的原料出发, 经最长线性步骤 18 步以 1.28% 的总产率成功地得到未脱保护的含有二氟亚甲基的 Fostriecin 类似物 **42**。但在对 **42** 脱除保护基时, 没有得到目标分子 **4**。这可能是由于偕二氟亚甲基的强吸电子作用使内酯环极化程度增大, 从而导致内酯环易发生水解开环反应。

关键词 Fostriecin; 偕二氟亚甲基; α,β -不饱和 δ -内酯; 酶动力学拆分; 1,5-氧化关环反应; 含氟内酯的水解

Design and Synthetic Investigation toward *gem*-difluoromethylenated Fostriecin Analogue

Yang, Yi^{a,b} You, Zhengwei^a Qing, Fengling^{*,a,c}

(^a Key Laboratory of Organofluorine Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032)

(^b School of Chemistry and Pharmaceutical Engineering, Sichuan University of Science & Engineering, Zigong 643000)

(^c College of Chemistry, Chemical Engineering and Biotechnology, Donghua University, Shanghai 201620)

Abstract Fostriecin is a promising leading anticancer compound. The α,β -unsaturated lactone in Fostriecin is believed to be the critical pharmacophore, which can covalently bind to the Cys269 residue of the PP2A subunit via a Michael 1,4-conjugate addition. We reasoned that the introduction of strong electron-withdrawing *gem*-difluoromethylene to replace the methylene group at the γ position of the lactone ring would lead to fostriecin analogue **4** with enhanced enzymatic binding affinity. Accordingly, the synthesis of fostriecin analogue **4** was investigated. The skeleton of target molecule **4** was established convergently from fragments **a**, **b** and **c** via an magnesium mediated chelation-controlled addition and Stille coupling using $\text{Pd}(\text{CH}_3\text{CN})\text{Cl}_2$ as catalyst. The key steps of synthesizing fragment **a** included the coupling between alkenyl iodide **8** and ethyl bromodifluoroacetate in the presence of copper powder and the establishment of C-5 stereocenter via lipase *AK* catalyzed kinetic resolution. The construction of C-11 and C-9 stereocenters in fragment **b** were realized by the lipase *AK* catalyzed kinetic resolution and CBS asymmetric reduction of α,β -unsaturated ketone **23** ($\text{BH}_3\cdot\text{PhNEt}_2$ as reductive agent), respectively. The connection of fragments **a** and **b** proceeded through the magnesium mediated chelation-controlled addition procedures: fragment **a** (vinyl stannane) was firstly converted to vinyl lithium reagent **27** by the treatment of BuLi (1.05 equiv.) at -78°C , then the *i*-PrMgCl (2.0 equiv.) solution in THF was added dropwise to produce the critical magnesium-ate complex intermediate **A**, finally the addition of fragment **b** solution in THF to the magnesium-ate complex **A** gave the coupled product **29**. The Stille coupling of fragment **c** with vinyl iodide **39** prepared from **29** in the presence of $\text{Pd}(\text{CH}_3\text{CN})\text{Cl}_2$ gave target molecule skeleton **40** in 85% yield. Finally, the protected fostriecin analogue **42** was successfully synthesized by a longest linear steps of 18 steps in 1.28% overall yield. However, the deprotection of compound **42** failed to give the target molecular **4**. This could be caused by the instability of the fluorinated lactone in which the strong electron-withdrawing *gem*-difluoromethylene group enhanced the polarization of the lactone function.

Keywords Fostriecin; difluoromethylene; α,β -unsaturated δ -lactone; enzymatic kinetic resolution; 1,5-oxidative cyclization; hydrolysis of fluorinated lactone

* E-mail: flq@mail.sioc.ac.cn; Tel.: 0086-021-54925187; Fax: 0086-021-64166128

Received September 16, 2012; published October 25, 2012.

Supporting information for this article is available free of charge via the Internet at <http://sioc-journal.cn>.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21072028, 20832008, 21272036) and the National Basic Research Program of China (No. 2012CB21600).

项目受国家自然科学基金(Nos. 21072028, 20832008, 21272036)和国家基础研究重点项目(No. 2012CB21600)资助。

1 引言

Fostriecin **1** 是近年来备受瞩目的新型抗肿瘤天然产物。1983 年, 该分子从 *Streptomyces pulveraceus* 的发酵液中分离得到, 同时还分离到两个同族化合物 PD 113270 和 PD 113271 (Figure 1)^[1]。Fostriecin 具有以下结构特点: 分子中含有 α,β -不饱和 δ -内酯, C-8 为季碳手性中心, C-9 位为磷酸单酯, 分子末端还含有 *Z,Z,E*-共轭三烯单元^[2]。生物活性研究表明 Fostriecin 具有广谱的抗肿瘤和抗真菌活性^[3], 同时它是较好的蛋白磷酸酶 PP2A 和 PP4 的选择性抑制剂(PP2A/PP4 vs PP1 selectivity > 10⁴)^[4]。美国国家癌症研究中心已对该化合物进行了一期临床试验^[5]。

图 1 Fostriecin 以及同族分子的结构

Figure 1 The structures of Fostriecin and two structurally related molecules

2003 年, Boger 小组对 Fostriecin 的构效关系和作用机制进行了考察(Figure 2)^[6]。研究表明 Fostriecin 分子中的 α,β -不饱和 δ -内酯作为 Michael 受体与位于蛋白磷酸酶 PP2A 中的 β 12- β 13 折叠 Cys269 巯基发生共轭加成是其生物活性的关键。2009 年, Sugawara 小组则首先合成了生物素标记的 Fostriecin (biotin-labeled fostriecin), 并应用凝胶电泳和 MALDI-TOF 质谱检测等技术手段, 进一步证实了 HeLa S3 细胞中的 PP2A 蛋白磷酸酶 Cys269 巯基与 Fostriecin 结构中的 α,β -不饱和 δ -内酯进行了 1,4-共轭加成作用^[7]。以上构效关系研究和药理实验表明, Fostriecin 结构中的 α,β -不饱和 δ -内酯是对蛋白磷酸酶 PP2A 起到选择性抑制活性的关键药效基团。

图 2 Fostriecin 的关键药效基团

Figure 2 The key pharmacophore in Fostriecin

Fostriecin 独特的结构与良好的生理活性, 激发了众多有机化学家对它的合成兴趣, 目前对该分子的全合成和形式合成已达 19 例^[8,9]。对已经报道的合成策略归纳

可以发现, Fostriecin 中的 α,β -不饱和 δ -内酯常采用 RCM 关环策略构建^[8c,8e~8f,8i,8l~8m,8p~8s]; 不对称烯丙基化是形成 C-5 位手性中心的常用方法^[8c,8f,8j,8m]; C-8 位季碳手性中心的构建常通过螯合控制的亲核加成反应实现^[8d,8i,8m]; 或者 C-8、C-9 位手性中心由 Sharpless 不对称双羟化一步生成^[8e,8g,8k,8q,8s~8t]; *Z,Z,E*-共轭三烯则常使用钌催化的 Stille 偶联^[8d~8e,8h,8j~8k,8r,8t,9]、Hiyama 偶联^[8m]或者 Suzuki-Miyaura 偶联反应^[8f,8q,8s]来合成; C-9 位羟基的磷酸化在合成的最后阶段进行; 分离提纯稳定性不好的 Fostriecin 分子也是合成的一大难点^[10]。

氟原子具有强吸电子能力, 将氟原子或含氟基团选择性地引入有机分子能显著改变原有分子的生理活性, 从而被广泛应用于药物设计与修饰中^[11]。我们小组长期致力于利用氟原子对 α,β -不饱和 δ -内酯进行结构改造^[12]。根据 Fostriecin 构效关系的研究基础, 我们设计并尝试合成含有二氟亚甲基的 Fostriecin 类似物 **4**, 期望获得具有更加良好抗肿瘤活性的化合物。

2 结果与讨论

2.1 目标分子的设计

我们设计在 Fostriecin 内酯环的 C-4 位引入偕二氟亚甲基, 主要是利用其强吸电子性质, 使内酯环上双键电子云密度进一步降低, 从而有利于 Michael 加成, 以增强该药效基团与预期靶点的作用(Figure 3)。需要指出的是, Fostriecin 的同族分子 PD 113271 (C-4 位具有羟基) 与 Fostriecin 具有相当的生物活性, 这也说明 C-4 位是可供修饰的位点。氟既可以模拟氢原子, 也常用来代替药物分子中的羟基, 因此目标分子 **4** 可看作 Fostriecin 和 PD 113271 两个同族分子的模拟修饰物(Figure 3)。

对于 γ,γ -二氟- α,β -不饱和 δ -内酯是良好的 Michael 受体的设计还基于以下实验事实: 环氧化合物 **5** 在酸性条件下水解生成化合物 **6** 和 **7**, 化合物 **7** 的单晶结构表明水解反应新生成的苄位羟基随即对 γ,γ -二氟- α,β -不饱和 δ -内酯进行了 1,4-共轭加成反应(Figure 4)^[13]。

图 3 目标分子 γ,γ -二氟 Fostriecin **4** 的设计

Figure 3 Rational design of the target molecule **4**

图4 γ,γ -二氟- α,β -不饱和 δ -内酯——良好的 Michael 受体

Figure 4 γ,γ -difluoro- α,β -unsaturated δ -lactone (a good Michael acceptor)

2.2 目标分子的反合成分析

基于天然产物 Fostriecin 的全合成研究, 我们对目标分子 **4** 进行了合成设计 (Scheme 1). 末端三烯 (*Z,Z,E*-triene) 可由片段 **c** 与中间体 **d** 经 Stille 偶联反应获得. 中间体 **d** 则考虑从 C-7 与 C-8 之间切断, 利用螯合控制的加成反应实现左、右两个部分的连接, 同时构建 C-8 位的季碳手性中心. 对于左、右片段我们分别设计了含氟片段 **a** 和甲基酮片段 **b**.

图式1 目标分子 **4** 的反合成分析

Scheme 1 Retrosynthetic analysis of target molecule **4**

目标分子中的 γ,γ -二氟- α,β -不饱和 δ -内酯单元则在片段 **a** 与 **b** 连接后, 通过 1,5-氧化关环反应^[14]来形成. 需要指出, 该反应具有试剂廉价易得、条件温和、官能团兼容性好等优点^[12b-12g]. 而采用通常的 RCM 关环策略^[12a]或者二氟烯丙基化反应^[15]合成 γ,γ -二氟- α,β -不饱和 δ -内酯具有一定局限, 不一定适合结构复杂的目标分子 **4** 的合成^[12b].

最后根据合成路线中的官能团兼容性以及保护基脱除顺序, 我们设计了片段 **a**, **b**, **c** 的具体结构. 其中片段 **c** 为已知化合物^[8e], 片段 **b** 与 Trost 小组相应片段类似^[8m], 含氟片段 **a** 需要设计合成 (Figure 5).

图5 片段 **a**, **b**, **c** 的结构中保护基的设计

Figure 5 The design of the protecting groups in fragments **a**, **b** and **c**

2.3 目标分子的合成研究

2.3.1 片段 **a** 的合成

片段 **a** 可以由化合物 **9** 经过官能团转化得到, 而含氟化合物 **9** 的制备可通过铜粉作用下溴二氟乙酸乙酯与烯基碘化物 **8** 的偶联反应^[16]实现 (Scheme 2).

图式2 片段 **a** 的反合成分析

Scheme 2 Retrosynthetic analysis of fragment **a**

从丙炔酸乙酯出发, 经三步反应以 81% 的产率得到烯基碘化物 **8**^[17]. 碘化物 **8** 与溴二氟乙酸乙酯在铜粉作用下, 以 DMSO 为溶剂, 60 °C 下反应 15 h, 以 65% 的产率顺利得到双键构型保持的化合物 **9** (Scheme 3).

图式 3 化合物 9 的合成
Scheme 3 Synthesis of compound 9

化合物 9 在 $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下接受 (*E*)-2-三丁基锡基乙烯锂试剂进攻, 转化为化合物 10. 将粗产物 10 进行 Luche 还原, 两步以 80% 的总产率得到消旋的烯丙仲醇 11 (Scheme 4). 接下来, 我们准备通过消旋化合物的酶动力学拆分来获得 C-5 位的手性中心. Lipase AK 由美国 Rice 大学的 Burgess 小组从假单胞菌(*Pseudomonas*)中分离得到, 是高效的烯丙仲醇拆分试剂^[18], 并且该酶在拆分含氟化合物时同样具有令人满意效果^[19]. 随即我们将消旋烯丙仲醇 11 在 Lipase AK 和乙酸乙烯酯/正己烷条件下进行酶动力学拆分, 顺利得到具有光学活性的化合物 12 和 13 (Scheme 4). 由于消旋烯丙仲醇 11 的两个对映异构体经手性 HPLC 难以区分, 因此无法通过液相色谱确定化合物 12 和 13 的对映体纯度. 将具有光学活性的仲醇转化为相应的 Mosher 酯, 分析 ^1H NMR 和 ^{19}F NMR 也是确定手性仲醇对映体纯度和绝对构型的常用

Reagents and conditions: (a) TESCl, imidazole, DMF, r.t.; (b) (*R*) or (*S*)- α -methoxy- α -(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride, pyridine, DMAP, CH_2Cl_2 , r.t.; (c) DIBAL-H, CH_2Cl_2 , $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$

图式 4 片段 a 的合成
Scheme 4 Synthesis of fragment a

方法^[20]. 我们将所得到的化合物 12 转化为 Mosher 酯 16 和 17, 确定了其 C-5 位构型为 *R* ($ee > 95\%$). 化合物 13 在 DIBAL-H 作用下脱除乙酰基转化为化合物 15, 随后进行 TES 保护得到化合物 18, 即片段 a. 化合物 15 同样通过 Mosher 酯法确定了其光学纯度 ($ee > 95\%$) 和 C-5 位绝对构型 (*S*) (Scheme 4).

2.3.2 片段 b 的合成

经分析认为片段 b 可由化合物 25 经臭氧化/二甲硫醚分解反应获得, 而异丙烯基格氏试剂对醛 21 的加成反应可顺利实现 C-8 和 C-9 的连接 (Scheme 5). 在这一合成策略中, 如何高效构建 C-9 位的手性中心是片断合成的关键.

图式 5 片段 b 的反合成分析
Scheme 5 Retrosynthetic analysis of fragment b

醛 21^[8a] (C-11 位手性中心通过脂肪酶 AK 动力学拆分构建) 与异丙烯基格氏试剂进行加成反应, 以 95% 的产率得到难以通过柱层析分离的非对映异构体混合物 22 ($dr = 1.7:1$). 烯丙醇 22 在 IBX 作用下氧化为 α,β -不饱和酮 23 (Scheme 6), 随后我们期望通过不对称还原反应立体选择性地构建 C-9 位的羟基.

图式 6 α,β -不饱和酮 23 的合成
Scheme 6 Synthesis of α,β -unsaturated ketone 23

α,β -不饱和酮 23 在噁唑硼烷催化剂作用下, 使用 $\text{BH}_3\cdot\text{PhNEt}_2$ 作为还原剂^[21,22]进行 CBS 不对称还原反应, 以 84% 的产率和较高的非对映选择性得到烯丙醇 24 ($dr > 10:1$). 化合物 24 的羟基进行保护后, 对末端双键进行臭氧化/二甲硫醚还原分解反应则得到片段 b (Scheme 7).

图式 7 片段 **b** 的合成Scheme 7 Synthesis of fragment **b**2.3.3 片段 **a** 与片段 **b** 的连接

我们对片段 **a** 与 **b** 的连接进行了条件筛选 (Table 1). 首先, 按照传统策略将片段 **a** 与 BuLi 进行锡-锂交换后, 加入 MgBr₂ 进行金属交换反应获得烯基格氏试剂中间体 **28**, 随后加入酮 **b** 的四氢呋喃溶液, 但经 TLC 监测, 并未发现加成产物产生 (Entries 1~2 and 5). 而直接以烯基锂中间体 **27** 作为亲核试剂时, 反应产率可达到 80%, 但产物的非对映体比例并不理想 (*dr* = 1.5 : 1) (Entry 3). 将溴化镁络合酮 **b** 的四氢呋喃溶液滴入烯基锂溶液中, 立体选择性仍未得到改善, 且产率有所下降 (Entry 4). 从以上实验结果可看出: 使用烯基锂 **27** 作为

表 1 片段 **a** 与 **b** 连接的初步尝试Table 1 Initial trials for the connection of fragments **a** and **b**^a

Entry	Condition	Yield	Ratio (29 : 30) ^b
1	BuLi (30 min); MgBr ₂ (allyl bromide, Mg, reflux); ketone b	NR	—
2	BuLi (30 min); MgBr ₂ ·OEt ₂ ; ketone b	NR	—
3	BuLi (3 min); ketone b	80%	1.5 : 1
4	BuLi (3 min); MgBr ₂ ·OEt ₂ and ketone b complexed	50% ^c	1.5 : 1
5	BuLi (3 min); MgBr ₂ ·OEt ₂ ; ketone b	NR	—

^a All the reactions were carried out in 0.1 mmol scale at -78 °C, THF as the solvent. ^b Compounds **29** and **30** were isolated as a mixture and the ratio of two isomers was determined by ¹⁹F NMR and ¹H NMR. ^c Ketone **b** was recovered in 30% yield.

亲核试剂时, 加成反应不能获得较好的立体选择性, 这主要因锂试剂的螯合作用不强, 不能很好地通过螯合作用控制反应过渡态的构象, 从而导致产物的立体选择性不理想 (Entries 3, 4); 而烯基格氏试剂 **28** 的活性不足以进攻酮 **b**, 因此加成反应无法进行 (Entries 1, 2, 5).

以上对片段 **a** 与 **b** 的连接实验结果不理想, 因此我们决定采用 Trost 小组的片段连接策略^[8m]. 该小组以镁复合物 **31** 代替烯基格氏试剂中间体 **32** 对酮 **b** 进行加成, 顺利实现了 C-7 和 C-8 的连接, 并且反应获得了良好的非对映选择性 (*dr* > 20 : 1) (Figure 6). Oshima 等小组的研究表明镁复合物中间体由于镁中心上增加了供电子的烷基配体, 提高了其亲核性, 因而在反应性能方面优于普通的格氏试剂 (亲核加成反应时产率较高, 且官能团耐受性好)^[23]. 接下来我们将探索以镁复合物中间体 **A** (Scheme 8) 作为亲核试剂对酮 **b** 的加成反应, 期望获得良好的产率和非对映选择性.

依据上述分析, 首先需要将片段 **a** 转化为镁复合物中间体 **A** (Scheme 8), 再与酮 **b** 进行加成反应, 则可顺利实现片段 **a** 与 **b** 的连接. 我们进行了以下实验 (Scheme 8): 首先片段 **a** 与 BuLi 在 -78 °C 进行锡-锂交换 30 min, 随后加入两当量的异丙基氯化镁反应 30 min 以生成镁复合物 **A**, 最后将溴化镁络合酮 **b** 的 THF 溶液缓慢滴入, 保持 -78 °C 反应 2 h, 以 64% 的产率和良好的非对映选择性 (*dr* > 10 : 1) 得到化合物 **29** (Scheme 8).

2.3.4 内酯环的形成以及烯丙基磷酸酯 **42** 的合成

化合物 **29** 在 HF/Py 作用下选择性脱除 C-1 和 C-5

图6 Trost 小组的连接策略(镁复合物中间体 **31**)Figure 6 The union strategy of Trost's group (Trialkylmagnesium-ate complex **31**) 图式8 片段 **a** 与片段 **b** 的连接Scheme 8 The connection of fragments **a** and **b**

位氧上的硅保护基, 以 62% 的产率得到三醇化合物 **34**, 同时可回收 20% 的化合物 **33** (回收的化合物 **33** 可再次在 HF/Py 条件下脱除 C-1 位 TBS 保护基得到所需化合物 **34**) (Scheme 9).

三醇化合物 **34** 在 TEMPO 催化下, 以二乙酸碘苯为氧化剂, 室温反应 3 h, 以 95% 的产率得到 1,5-氧化关环产物 γ,γ -二氟- α,β -不饱和内酯 **35**. 需要指出, 底物 **34** 中 C-8 位的叔羟基对这一氧化关环反应没有影响. 化合物

图式9 化合物 **29** 选择性脱除硅保护基Scheme 9 The selective deprotection of silyl groups in compound **29**

35 中 C-8 位的叔羟基进行 TES 保护后, 随后在 AgNO_3/NIS 条件下进行端炔碘化反应, 以 90% 产率获得炔基碘 **37**. 化合物 **37** 在 DDQ 作用下脱除 DMB 保护基转化为化合物 **38**. 炔基碘 **38** 在 NBSH 和三乙胺作用下对叁键进行还原, 以 50% 产率得到顺式烯基碘 **39** (Scheme 10).

在 $\text{PdCl}_2(\text{CH}_3\text{CN})_2$ 催化下, 烯基碘化合物 **39** 与片段 **c**^[8c] 进行 Stille 偶联反应, 以良好的收率得到化合物 **40**. 化合物 **40** 在亚膦酰胺 **41**、四氮唑作用下反应 1 h, 随后加入 *t*-BuOOH 氧化磷(III)到磷(V), 顺利获得了 C-9 位磷酸化的产物 **42** (Scheme 11).

2.3.5 化合物 **42** 的脱保护

得到磷酸酯 **42** 后, 我们对脱除保护基进行了研究. 由于天然产物 Fostriecin 稳定性较差, 仅在 pH 5.5~7.5 范围内稳定, 所以脱除保护基以及分离纯化获得目标分子一直是合成的难点^[9]. Boger^[8b], Jacobsen^[8d], Imanishi^[8h,8k] 和 O'Doherty^[8s] 等小组将 PMB 保护的磷酸酯 **43** 在氢氟酸作用下首先脱除 PMB 基团, 随后加入吡啶中和反应体系并脱除所有的硅保护基, 进而获得天然产物 Fostriecin (Scheme 12). 该方法由于使用了酸性较强的氢氟酸导致反应产率较低. 而 Hatakeyama 小组提出在钯催化的还原条件下首先脱除磷酸酯 **44** 中的烯丙基保护基, 随后再在 HF/Py 作用下脱除所有的硅保护基^[8c,8r]. 这一方法能以良好的产率获得纯度较高的 Fostriecin 分子, 另外 Shibasaki^[8j] 和 Suguwara^[8n] 等课题组在他们的全合成研究中也使用了这一策略脱除保护基获得 Fostriecin (Scheme 13).

对于磷酸酯 **42**, 我们选取了条件较为温和的后一种方法, 即钯催化的还原条件脱除烯丙基, 再在 HF/Py 作用下脱除所有的硅保护基 (Scheme 14). 但令人遗憾的是, 经过多次尝试(如调节反应体系 pH 值), 我们并未分离得到目标分子 **4**. 根据产物的质谱数据和极性大小, 我们推测预期的产物 **4** 中的 γ,γ -二氟- α,β -不饱和 δ -内酯发生了水解生成了开环产物 **45**. 其中 ESI-MS (negative

图式 10 化合物 39 的合成

Scheme 10 Synthesis of compound 39

图式 11 化合物 42 的合成

Scheme 11 Synthesis of compound 42

图式 12 磷酸酯 43 的脱保护

Scheme 12 The removal of protecting groups in compound 43

图式 13 磷酸酯 44 的脱保护

Scheme 13 The removal of protecting groups in compound 44

mode)检测到 $(M-H)^-$ 483 和 $(M-2H)^{-2}$ 241 这两个特征峰(see supporting information). 开环产物 45 极性很大, 在 C-18 反相硅胶板上 R_f 约为 0.8 ($H_2O:MeCN=10:1$). 但是由于化合物 45 样品不足且始终难以与体系中的无

机盐分开, 因而没有对其进行核磁表征.

其实如前所述, 由于不饱和内酯、磷酸基团和末端多烯多种敏感官能团的共同存在, Fostriecin 分子本身稳定性不佳; 而强吸电子性的偕二氟亚甲基的引入, 使得

图式 14 磷酸酯 42 的脱保护

Scheme 14 The removal of protecting groups in compound 42

目标分子 4 的内酯结构更加极化, 从而极易受到进攻发生水解开环。

3 结论

本文对含有二氟亚甲基的 Fostriecin 类似物 4 进行了合成研究。根据其结构特点, 我们设计了和天然产物 Fostriecin 全合成不同的一些策略: 在含氟片段 a 的合成过程中, C-5 位手性中心通过酶动力学拆分获得; 片段 b 中 C-9 位手性中心通过 CBS 不对称还原反应进行构建; 同时采用烯基碘和溴二氟乙酸乙酯在铜粉作用下的偶联反应以及 1,5-氧化关环反应来制备不饱和内酯。但令人遗憾的是, 在合成的最后阶段对烯丙基磷酸酯 42 脱保护基过程中, 由于目标分子 4 中含氟内酯结构极化程度较大易发生开环水解, 而难以分离得到所需目标化合物 4。

4 实验部分

4.1 仪器与试剂

^1H NMR 谱用 Bruker AM-300 (300 MHz), Bruker AM-400 (400 MHz) 以及 Varian VXR (300 MHz) 型核磁共振仪测定, TMS 作内标。 ^{13}C NMR 谱用 Bruker AM-300 (75.5 MHz), Varian VXR (75.5 MHz), Varian Mercury-300 (75.5 MHz), Bruker AM-400 (100 MHz) 型核磁共振仪测定, TMS 作内标。 ^{19}F NMR 谱用 Bruker AM-300 (282 MHz) 和 Varian VXR (282 MHz) 型核磁共振仪测定, CFCl_3 为外标, 高场为负。 IR 谱用 Shimadzu IR-440 型红外分光光度计测定。 MS 谱用 HP-5989A 型质谱仪测定。 HRMS 谱用 Finnigan MAT 8430 型质谱仪测定。实验中所用试剂均为分析纯, 使用前未做纯化处理; 分析测定中所用试剂为色谱纯; 柱层析色谱使用 300~400 目的工业硅胶。

4.2 实验操作与产物结构表征

4.2.1 化合物 9 的合成

在氮气氛围下, 向铜粉 (146 mg, 2.30 mmol) 的

DMSO 悬浊液 (1 mL) 中加入化合物 8 (246 mg, 0.825 mmol) 与溴二氟乙酸乙酯 (0.11 mL, 0.825 mmol) 的 DMSO 混合溶液 (1 mL), 体系加热至 60 $^\circ\text{C}$ 反应 15 h, 加入饱和氯化铵溶液淬灭反应, 乙醚萃取, 有机相依次使用饱和氯化铵、水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离 (PE : EA = 50 : 1, V/V) 得到 151 mg 淡黄色油状物 9, 产率 65%, ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 6.03~6.00 (m, 1H), 5.54 (dd, $J=27.3, 12.9$ Hz, 1H), 4.45~4.43 (m, 2H), 4.29 (q, $J=6.6$ Hz, 2H), 1.31 (t, $J=6.9$ Hz, 3H), 0.87 (s, 9H), 0.04 (s, 6H); ^{13}C NMR (100.7 MHz, CDCl_3) δ : 163.6 (t, $J=34.4$ Hz), 142.6, 119.3 (t, $J=27.0$ Hz), 112.6 (t, $J=249.7$ Hz), 63.0, 59.7, 25.8, 18.2, 13.8, -5.4; ^{19}F NMR (282 MHz, CDCl_3) δ : -99.6 (d, $J=15.5$ Hz, 2F); IR (KBr) ν_{max} : 2957, 2931, 2859, 1769, 1472, 1303, 1081, 839 cm^{-1} ; MS (ESI) m/z : 295 ($M + \text{H}$) $^+$; HRMS calcd for $\text{C}_{13}\text{H}_{24}\text{SiO}_3\text{F}_2\text{Na}$: 317.1360, found 317.1355.

4.2.2 化合物 11 的合成

反式-二(三丁基烯基)乙烯 (5.0 g, 8.25 mmol) 溶解于干燥的四氢呋喃 (40 mL), 体系冷却至 -78 $^\circ\text{C}$, 缓慢滴加 BuLi (1.6 mol $\cdot$ L $^{-1}$ in hexane, 5.16 mL, 8.25 mmol), 搅拌 0.5 h 后, 滴入化合物 9 (2.2 g, 7.5 mmol) 的四氢呋喃溶液 (10 mL), 反应 0.5 h。加水淬灭反应, 乙醚萃取, 有机相依次使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物 10 溶解于甲醇 (50 mL), 加入七水合三氯化铈 (2.18 g, 5.84 mmol), 体系冷却至 0 $^\circ\text{C}$, 分批加入硼氢化钠 (221 mg, 5.84 mmol), 反应 0.5 h 后, 加水淬灭反应, 乙酸乙酯萃取, 有机相依次使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离 (PE : EA = 20 : 1, V/V , 1% Et $_3\text{N}$) 得到 3.40 g 无色透明油状物 11, 产率 80%, ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 6.48 (dt, $J=19.2, 19.5$ Hz, 1H), 6.02 (dd, $J=19.5, 5.1$ Hz, 1H), 5.98~5.94 (m, 1H), 5.47 (dd, $J=28.2, 14.1$ Hz, 1H), 4.45~4.41 (m, 2H), 4.29~4.26 (m, 1H), 2.28 (d, $J=6.0$ Hz, 1H), 1.55~1.45 (m, 6H), 1.37~

1.25 (m, 6H), 0.91 (s, 9H), 0.95~0.87 (m, 15H), 0.08 (s, 6H); ^{13}C NMR (100.7 MHz, CDCl_3) δ : 141.1, 140.6 (t, $J=4.4$ Hz), 134.5, 120.2 (t, $J=25.9$ Hz), 60.0 (t, $J=3.8$ Hz), 29.0 (t, $J=9.9$ Hz), 27.2 (t, $J=26.7$ Hz), 25.9, 18.3, 13.7, 9.6, -5.3; ^{19}F NMR (282 MHz, CDCl_3) δ : -102.3 (dt, $J=254.1$, 12.1 Hz, 1F), -103.3 (dt, $J=254.1$, 13.5 Hz, 1F); IR (KBr) ν_{max} : 3430, 2958, 2929, 2857, 1465, 1256, 1099, 839, 776 cm^{-1} ; MS (MALDI) m/z : 591 ($\text{M}+\text{Na}$) $^{+}$; HRMS calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{50}\text{F}_2\text{O}_2\text{Si}^{116}\text{SnNa}$: 587.2463, found 587.2458.

4.2.3 酶动力学拆分获得化合物 12 与 13

消旋化合物 **11** (2.80 g, 4.93 mmol) 和乙酸乙烯酯 (2.3 mL, 24.7 mmol) 溶解于正己烷 (50 mL), 然后加入脂肪酶 AK (1.4 g), 室温下反应 10 h, 过滤, 固体依次用正己烷、乙醚洗涤, 固体抽干置冰箱保存供重复使用; 减压除去滤液中的溶剂, 粗产物经柱层析 (PE : EA = 75 : 1 to 40 : 1, V/V , 1% Et_3N) 得到无色透明油状物 **12** (1.33 g, Yield 46%) 和无色透明油状物 **13** (1.40 g, Yield 48%).

Data for compound **12**: $[\alpha]_{\text{D}}^{25} +4.6$ (c 1.60, CHCl_3); 其余数据与化合物 **11** 一致.

Data for compound **13**: $[\alpha]_{\text{D}}^{25} +30.8$ (c 0.70, CHCl_3); ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 6.45 (d, $J=18.9$ Hz, 1H), 5.98~5.86 (m, 2H), 5.46 (d, $J=12.0$ Hz, 1H), 5.42 (dd, $J=37.8$, 16.5 Hz, 1H), 4.45~4.43 (m, 2H), 2.14 (s, 3H), 1.56~1.44 (m, 6H), 1.38~1.26 (m, 6H), 0.90 (s, 9H), 0.94~0.87 (m, 15H), 0.08 (s, 6H); ^{13}C NMR (100.7 MHz, CDCl_3) δ : 169.2, 141.1 (t, $J=4.0$ Hz), 137.9, 137.2, 119.9 (t, $J=25.8$ Hz), 119.1 (t, $J=244.3$ Hz), 60.1 (t, $J=4.2$ Hz), 31.5, 30.2, 29.0 (t, $J=10.9$ Hz), 27.2 (t, $J=26.7$ Hz), 25.1, 20.9, 18.2, 13.6, 9.6, -5.3; ^{19}F NMR (282 MHz, CDCl_3) δ : -101.0 (dt, $J=255.8$, 14.1 Hz, 1F), -102.6 (dt, $J=255.8$, 13.5 Hz, 1F); IR (KBr) ν_{max} : 2957, 2929, 2877, 2856, 1761, 1223, 1083, 775 cm^{-1} ; MS (MALDI) m/z : 633 ($\text{M}+\text{Na}$) $^{+}$; HRMS calcd for $\text{C}_{27}\text{H}_{52}\text{F}_2\text{O}_3\text{Si}^{116}\text{SnNa}$: 629.2569, found 629.2563.

4.2.4 化合物 14 的合成

化合物 **12** (1.33 g, 2.34 mmol) 和咪唑 (320 mg, 4.69 mmol) 溶解于 DMF (10 mL), 冷却至 0 $^{\circ}\text{C}$, 缓慢滴入 TEA (0.67 mL, 3.52 mmol), 回复至室温反应 3 h, 饱和碳酸氢钠溶液淬灭反应, 乙醚萃取, 有机相依次使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离 (PE : EA = 50 : 1, V/V , 1% Et_3N) 得到 1.50 g 无色透明油状物 **14**, 产率 95%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25} -10.4$ (c 4.35, CHCl_3); ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 6.41 (d, $J=19.2$ Hz, 1H), 5.94 (d, $J=18.6$ Hz, 1H), 5.93~5.90 (m, 1H), 5.43 (dd, $J=29.7$, 14.7 Hz, 1H), 4.45~4.43 (m, 2H), 4.26~4.22 (m, 1H), 1.56~1.46 (m, 6H), 1.38~1.26 (m, 6H), 0.89 (s, 9H), 0.98~0.86 (m, 24H), 0.61 (q,

$J=7.8$ Hz, 6H), 0.07 (s, 6H); ^{13}C NMR (100.7 MHz, CDCl_3) δ : 143.0 (d, $J=3.7$ Hz), 140.0 (t, $J=3.8$ Hz), 134.0, 120.2 (t, $J=25.0$ Hz), 60.3 (t, $J=4.4$ Hz), 29.1 (t, $J=9.8$ Hz), 27.2 (t, $J=26.4$ Hz), 25.1, 18.2, 13.7, 9.5, 6.6, 4.8, -5.3; ^{19}F NMR (282 MHz, CDCl_3) δ : -100.5 (d, $J=251.5$ Hz, 1F), -103.7 (dd, $J=251.5$, 10.4 Hz, 1F); IR (KBr) ν_{max} : 2957, 2929, 2877, 2857, 1464, 1253, 1100, 839 cm^{-1} ; MS (MALDI) m/z : 705 ($\text{M}+\text{Na}$) $^{+}$; HRMS calcd for $\text{C}_{31}\text{H}_{64}\text{F}_2\text{O}_2\text{Si}^{116}\text{SnNa}$: 701.3328, found 701.3323.

4.2.5 化合物 15 的合成

化合物 **13** (1.40 g, 2.30 mmol) 溶解于二氯甲烷 (10 mL), 冷却至 -78 $^{\circ}\text{C}$, 缓慢滴入 DIBAL-H (1.0 mol $\cdot$ L $^{-1}$ in toluene, 4.6 mL, 4.6 mmol), 保持温度反应 2 h, 加入乙酸乙酯 (2.0 mL) 淬灭反应. 随后加入饱和酒石酸钾钠溶液 (30 mL), 回复至室温搅拌 1 h, 乙醚萃取, 有机相使用饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离 (PE : EA = 10 : 1, V/V , 1% Et_3N) 得到 1.12 g 无色透明油状物 **15**, 产率 95%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25} -5.2$ (c 2.70, CHCl_3); 其余数据与消旋体 **11** 一致.

4.2.6 化合物 16 的合成

化合物 **12** (17 mg, 0.030 mmol), DMAP (1 mg, 8.2 μmol), 吡啶 (10 μL , 0.12 mmol) 溶解于干燥的二氯甲烷 (1.0 mL), 滴入 (*S*)-MTPA 酰氯 (12 μL , 0.066 mmol), 室温反应 10 h, 加水淬灭反应, 二氯甲烷萃取, 有机相依次使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离 (PE : EA = 20 : 1, V/V) 得到 20 mg 无色透明油状物 **16**, 产率 84%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25} +12.1$ (c 1.00, CHCl_3); ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 7.52 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 7.41~7.38 (m, 3H), 6.42 (dt, $J=30.3$, 18.6 Hz, 1H), 5.97~5.95 (m, 1H), 5.81 (dd, $J=19.5$, 6.3 Hz, 1H), 5.67~5.58 (m, 1H), 5.39 (dd, $J=29.4$, 14.7 Hz, 1H), 4.44~4.41 (m, 2H), 3.59 (s, 3H), 1.55~1.41 (m, 6H), 1.35~1.22 (m, 6H), 0.90 (s, 9H), 1.00~0.78 (m, 15H), 0.07 (s, 6H); ^{13}C NMR (100.7 MHz, CDCl_3) δ : 165.1, 141.9, 140.1, 135.8, 132.1, 129.7, 128.4, 127.3, 125.9, 123.2, 119.0 (t, $J=25.1$ Hz), 59.9, 55.6, 28.9 (t, $J=10.7$ Hz), 27.2 (t, $J=27.0$ Hz), 25.8, 18.2, 13.6, 9.6, -5.3; ^{19}F NMR (282 MHz, CDCl_3) δ : -71.4 (s, 3F), -100.5 (dt, $J=256.6$, 13.3 Hz, 1F), -101.5 (dt, $J=256.6$, 12.7 Hz, 1F); IR (KBr) ν_{max} : 2957, 2929, 2856, 1761, 1464, 1251, 1172, 838 cm^{-1} ; MS (MALDI) m/z : 807 ($\text{M}+\text{Na}$) $^{+}$; HRMS calcd for $\text{C}_{35}\text{H}_{57}\text{F}_5\text{O}_4\text{Si}^{116}\text{SnNa}$: 803.2861, found 803.2856.

4.2.7 化合物 17 的合成

化合物 **12** (13 mg, 0.023 mmol), DMAP (1 mg, 8.2 μmol), 吡啶 (10 μL , 0.12 mmol) 溶解于干燥的二氯甲烷 (1.0 mL), 滴入酰氯 (12 μL , 0.066 mmol), 室温反应 10 h,

加水淬灭反应, 二氯甲烷萃取, 有机相依次使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离(PE:EA=20:1, *V/V*)得到 13 mg 无色透明油状物 **17**, 产率 83%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25}$ -88.1 (*c* 1.00, CHCl₃); ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ : 7.52 (d, *J*=7.8 Hz, 2H), 7.41~7.39 (m, 3H), 6.60 (dt, *J*=30.6, 19.5 Hz, 1H), 5.94 (dd, *J*=19.5, 6.6 Hz, 1H), 5.90~5.82 (m, 1H), 5.64 (dd, *J*=16.8, 9.6 Hz, 1H), 5.29 (dd, *J*=29.4, 14.7 Hz, 1H), 4.36~4.34 (m, 2H), 3.53 (s, 3H), 1.55~1.40 (m, 6H), 1.38~1.24 (m, 6H), 0.90 (s, 9H), 0.95~0.86 (m, 15H), 0.06 (s, 6H); ¹³C NMR (100.7 MHz, CDCl₃) δ : 165.1, 141.6, 141.2, 136.0, 131.9, 129.7, 128.4, 127.5, 118.9 (q, *J*=25.3 Hz), 59.9, 55.4, 29.0 (t, *J*=10.6 Hz), 27.4 (t, *J*=28.2 Hz), 25.8, 18.2, 13.6, 9.6, -5.3; ¹⁹F NMR (282 MHz, CDCl₃) δ : -71.4 (s, 3F), -100.6 (dt, *J*=258.3, 11.8 Hz, 1F), -102.5 (dt, *J*=258.3, 9.6 Hz, 1F); IR (KBr) ν_{max} : 2957, 2929, 2856, 1761, 1464, 1251, 1172, 838 cm⁻¹; MS (MALDI) *m/z*: 807 (M+Na)⁺; HRMS calcd for C₃₅H₅₇F₅O₄Si¹¹⁶SnNa: 803.2861, found 803.2856.

4.2.8 化合物 18 的合成

化合物 **15** (1.12 g, 1.98 mmol)和咪唑(269 mg, 3.95 mmol)溶解于 DMF (5 mL), 冷却至 0 °C, 缓慢滴入 TESCl (0.57 mL, 2.96 mmol), 回复至室温反应 3 h, 饱和碳酸氢钠溶液淬灭反应, 乙醚萃取, 有机相依次使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离(PE:EA=50:1, *V/V*, 1% Et₃N)得到 1.24 g 无色透明油状物 **18**, 产率 95%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25}$ +10.2 (*c* 2.40, CHCl₃); 其余数据与化合物 **14** 一致.

4.2.9 化合物 19 的合成

采用与化合物 **17** 相同的合成方法, 从原料 **15** (22 mg, 0.039 mmol)出发制备得到 34 mg 无色透明油状物 **19**, 产率 88%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25}$ 88.8 (*c* 1.00, CHCl₃); 其余数据与化合物 **17** 一致.

4.2.10 化合物 20 的合成

采用与化合物 **16** 相同的合成方法, 从原料 **15** (29 mg, 0.051 mmol)出发制备得到 40 mg 无色透明油状物 **20**, 产率 90%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25}$ -14.6 (*c* 0.85, CHCl₃); 其余数据与化合物 **16** 一致.

4.2.11 化合物 22 的合成

-78 °C下, 异丙基溴化镁溶液 (0.5 mol·L⁻¹ in THF, 59.1 mL, 29.55 mmol)缓慢滴入化合物 **21** (7.0 g, 24.64 mmol)的 THF 溶液(25 mL), 保持温度反应 2 h, 将反应溶液倒入饱和氯化铵溶液中, 乙醚萃取, 有机相依次使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离(PE:EA=10:1, *V/V*)得到 7.11 g 无色透明油状物 **22** (**22** 为两个非对映体混合物, 比例为 1.7:1), 产率 88%, ¹H NMR (300 MHz,

CDCl₃) δ : 4.97 (s, 0.37H), 4.95 (s, 0.63H), 4.77 (s, 1H), 4.63 (t, *J*=10.2 Hz, 0.37H), 4.52 (t, *J*=6.3 Hz, 0.63H), 4.41 (d, *J*=5.1 Hz, 0.37H), 4.23~4.20 (m, 0.63H), 3.07 (s, 0.63H), 3.04 (s, 0.37H), 1.88~1.81 (m, 2H), 1.67 (s, 3H), 0.86 (s, 9H), 0.13 (s, 9H), 0.08 (s, 6H); ¹³C NMR (100.7 MHz, CDCl₃) δ : 146.9, 146.7, 110.7, 110.3, 106.7, 106.5, 89.9, 89.7, 74.0, 72.2, 63.0, 61.9, 43.8, 42.9, 25.8, 18.4, 18.0, 18.0, -0.3, -0.4, -4.3, -4.6, -5.0, -5.2.

4.2.12 化合物 23 的合成

IBX (1.13 g, 4.05 mmol)加入到化合物 **22** (882 mg, 2.70 mmol)的 DMSO 溶液(14 mL), 室温反应 5 h, 加入饱和硫代硫酸钠溶液淬灭反应, 乙醚萃取, 有机相依次使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离(PE:EA=30:1, *V/V*)得到 800 mg 淡黄色油状物 **23**, 产率 90%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25}$ +79.7 (*c* 6.20, CHCl₃); ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ : 5.98 (s, 1H), 5.80 (s, 1H), 4.87 (dd, *J*=9.0, 3.9 Hz, 1H), 3.30~3.22 (m, 1H), 2.78~2.72 (m, 1H), 1.85 (s, 3H), 0.83 (s, 9H), 0.12 (s, 9H), 0.05 (s, 6H); ¹³C NMR (100.7 MHz, CDCl₃) δ : 197.6, 144.0, 124.8, 105.8, 88.1, 59.2, 44.8, 24.7, 17.1, 16.5, -0.1, -1.3, -5.7, -6.2; IR (KBr) ν_{max} : 2959, 2929, 2897, 2857, 2174, 1682, 1251, 1095, 841, 779 cm⁻¹; MS (ESI) *m/z*: 325 (M+H)⁺; 347 (M+Na)⁺; HRMS calcd for C₁₇H₃₃O₂Si₂: 325.2019, found 325.2014.

4.2.13 化合物 24 的合成

向干燥的 THF (2 mL)冷却至 0 °C, 依次加入 CBS 催化剂(1.0 mol·L⁻¹ in toluene, 0.12 mL, 0.12 mmol), BH₃·PhNEt₂ (90 μ L, 0.51 mmol), 搅拌反应 0.5 h, 缓慢滴加化合物 **23** (164 mg, 0.51 mmol) 的 THF 溶液(3 mL), 保持温度反应 20 min, 将体系溶液缓慢滴入 1 mol·L⁻¹ HCl 中, 乙酸乙酯萃取, 有机相依次使用 1 mol·L⁻¹ HCl、水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离(PE:EA=15:1, *V/V*)得到 140 mg 无色透明油状物 **24**, 产率 84%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25}$ +34.8 (*c* 5.90, CHCl₃); ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ : 5.04 (s, 1H), 4.85 (s, 1H), 4.66 (t, *J*=5.2 Hz, 1H), 4.43 (s, 1H), 2.99 (s, 1H), 1.94~1.85 (m, 2H), 1.73 (s, 3H), 0.91 (s, 9H), 0.17 (s, 9H), 0.16 (s, 3H), 0.14 (s, 3H); ¹³C NMR (100.7 MHz, CDCl₃) δ : 147.2, 110.7, 106.8, 90.2, 72.7, 62.3, 43.1, 26.0, 18.8, 18.4, 0.1, -4.2, -4.8; IR (KBr) ν_{max} : 3431, 2957, 2929, 2897, 2857, 2173, 1251, 1094, 841, 779 cm⁻¹; MS (ESI) *m/z*: 349 (M+Na)⁺; 365 (M+K)⁺; HRMS calcd for C₁₇H₃₄O₂Si₂Na: 349.1995, found 349.1990.

4.2.14 化合物 25 的合成

化合物 **24** (615 mg, 1.88 mmol)溶解于 DMF (4 mL),

依次加入 DIEA (1.7 mL, 9.78 mmol)、Bu₄NI (104 mg, 0.28 mmol)和 DMBOCH₂Cl (8.10 mmol), 于 40 °C 下反应 24 h, 饱和氯化铵溶液淬灭反应, 乙醚萃取, 有机相依次使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离(PE : EA = 8 : 1, *V/V*)得到 1.0 g 淡黄色油状物 **25**, 产率 90%, $[\alpha]_D^{25} + 63.2$ (*c* 1.60, CHCl₃); ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ : 6.90~6.82 (m, 3H), 5.00 (s, 1H), 4.94 (s, 1H), 4.70~4.64 (m, 2H), 4.59~4.55 (m, 2H), 4.55~4.51 (m, 1H), 4.26 (dd, *J*=8.4, 4.2 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 2.06~1.97 (m, 1H), 1.93~1.84 (m, 1H), 1.84 (s, 3H), 0.92 (s, 9H), 0.17 (s, 9H), 0.14 (s, 6H); ¹³C NMR (100.7 MHz, CDCl₃) δ : 149.1, 148.7, 144.1, 130.5, 120.5, 113.7, 111.3, 111.0, 107.5, 92.0, 89.1, 69.5, 60.2, 56.0, 55.8, 43.6, 25.8, 18.2, 17.0, -0.2, -4.1, -4.7; IR (KBr) $\nu_{\max}$: 2956, 2930, 2896, 2856, 2171, 1517, 1464, 1251, 1094, 1030, 841 cm⁻¹; MS (ESI) *m/z*: 524 (M+NH₄)⁺, 545 (M+K)⁺; HRMS calcd for C₂₇H₄₆O₅Si₂Na: 529.2781, found 529.2776.

4.2.15 化合物 **26** 的合成

化合物 **25** (1.4 g, 2.76 mmol)溶解于正丙醇(30 mL), 冷却至 -78 °C, 缓慢通入臭氧直至原料消失, 通入氮气赶出多余的臭氧, 滴加二甲硫醚(2.04 mL, 27.60 mmol), 体系回复至室温, 反应 24 h, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离(PE : EA = 6 : 1, *V/V*)得到 1.32 g 无色透明油状物 **26**, 产率 80%, $[\alpha]_D^{25} - 3.2$ (*c* 2.20, CHCl₃); ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ : 6.85~6.79 (m, 3H), 4.74 (d, *J*=6.9 Hz, 1H), 4.69 (d, *J*=6.9 Hz, 1H), 4.60 (d, *J*=11.4 Hz, 1H), 4.59~4.54 (m, 1H), 4.47 (d, *J*=11.1 Hz, 1H), 4.19~4.15 (m, 1H), 3.86 (s, 3H), 3.84 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.06~1.90 (m, 2H), 0.90 (s, 9H), 0.16 (s, 3H), 0.15 (s, 9H), 0.11 (s, 3H); ¹³C NMR (100.7 MHz, CDCl₃) δ : 208.5, 149.1, 148.8, 130.0, 120.6, 111.3, 111.0, 106.7, 95.0, 89.8, 80.2, 70.1, 59.4, 55.9, 55.8, 40.9, 26.2, 25.8, 18.2, -0.3, -4.2, -4.8; IR (KBr) $\nu_{\max}$: 2956, 2930, 2897, 2857, 2172, 1717, 1518, 1251, 1160, 1095, 1031, 841 cm⁻¹; MS (ESI) *m/z*: 526 (M+NH₄)⁺, 531 (M+Na)⁺, 547 (M+K)⁺; HRMS calcd for C₂₆H₄₄O₆Si₂Na: 531.2574, found 531.2569.

4.2.16 化合物 **29** 的合成

片段 **a** (180 mg, 0.26 mmol)溶解于干燥的 THF (2 mL), 体系冷却至 -78 °C, 缓慢滴入 BuLi (1.6 mol·L⁻¹ in hexane, 0.17 mL, 0.26 mmol), 锡/锂交换 0.5 h 后, 滴入异丙基氯化镁(2.0 mol·L⁻¹ in THF, 0.26 mL, 0.53 mmol), 保持温度反应 0.5 h, 随后将片段 **b** (132 mg, 0.26 mmol)与溴化镁/乙醚络合物(269 mg, 1.04 mmol)的 THF 溶液(1 mL)缓慢滴入, 保持温度反应 3 h, 将反应溶液缓慢倒入冰冷的饱和氯化铵溶液, 乙醚萃取, 有机相依次

使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离(PE : EA = 8 : 1, *V/V*)得到 133 mg 淡黄色油状物 **29**, 产率 64%, 同时回收片段 **b** (49 mg, recovered yield 28%), $[\alpha]_D^{25} + 7.2$ (*c* 2.20, CHCl₃); ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ : 6.89~6.82 (m, 3H), 5.90~5.87 (m, 1H), 5.82 (s, 2H), 5.45 (dd, *J*=29.4, 15.6 Hz, 1H), 4.87 (d, *J*=6.6 Hz, 1H), 4.75 (d, *J*=6.6 Hz, 1H), 4.70 (d, *J*=11.4 Hz, 1H), 4.54 (d, *J*=11.7 Hz, 1H), 4.50 (d, *J*=2.4 Hz, 1H), 4.46 (d, *J*=2.4 Hz, 1H), 4.43~4.40 (m, 1H), 4.30 (t, *J*=8.4 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 3.88 (s, 3H), 3.55 (d, *J*=8.4 Hz, 1H), 3.08 (br, 1H), 1.92~1.85 (m, 1H), 1.73~1.64 (m, 1H), 1.26 (s, 3H), 0.96 (t, *J*=7.8 Hz, 9H), 0.89 (s, 9H), 0.87 (s, 9H), 0.62 (q, *J*=7.8 Hz, 6H), 0.15 (s, 6H), 0.11 (s, 9H), 0.06 (s, 6H); ¹³C NMR (100.7 MHz, CDCl₃) δ : 149.2, 148.9, 140.2, 138.1, 129.7, 125.9 (d, *J*=5.3 Hz), 120.6 (t, *J*=230.9 Hz), 120.2 (t, *J*=26.0 Hz), 111.4, 111.1, 107.5, 96.7, 89.1, 85.4, 74.0, 70.3, 60.3, 60.0, 55.9 (d, *J*=7.4 Hz), 41.1, 25.9, 25.8, 22.3, 18.2, 18.1, 6.7, 4.8, -0.3, -4.0, -4.8, -5.2; ¹⁹F NMR (282 MHz, CDCl₃) δ : -100.6 (dt, *J*=251.5, 11.3 Hz, 1F), -102.2 (ddd, *J*=251.5, 15.8, 3.7 Hz); IR (KBr) $\nu_{\max}$: 3450, 2956, 2932, 2880, 2858, 2171, 1517, 1463, 1094 cm⁻¹; MS (ESI) *m/z*: 923 (M+Na)⁺; HRMS calcd for C₄₅H₈₂Si₄O₈F₂Na: 923.4953, found 923.4947.

4.2.17 化合物 **34** 的合成

化合物 **29** (100 mg, 0.11 mmol)溶解于 THF (1.0 mL), 体系冷却至 0 °C, 将配制的 HF/Py 的 THF 溶液(3.0 mol·L⁻¹, 0.5 mL, 1.5 mmol)滴入, 室温反应 4 h, 将反应溶液缓慢倒入饱和碳酸氢钠溶液, 乙酸乙酯萃取, 有机相依次使用饱和碳酸氢钠溶液、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离(PE : EA = 3 : 1 to 1 : 1, *V/V*)得到 66 mg 无色透明油状物 **34**, 产率 62%, 同时回收化合物 **33** (12 mg, 20%).

Data for compound **34**: $[\alpha]_D^{25} - 3.8$ (*c* 1.20, CHCl₃); ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ : 6.89~6.83 (m, 3H), 6.06~6.00 (m, 1H), 5.88 (s, 2H), 5.50 (dd, *J*=28.5, 16.2 Hz, 1H), 4.89 (d, *J*=6.6 Hz, 1H), 4.71 (d, *J*=9.6 Hz, 2H), 4.53 (d, *J*=11.4 Hz, 1H), 4.48 (dd, *J*=10.5, 2.4 Hz, 1H), 4.37 (dd, *J*=11.4, 6.3 Hz, 1H), 4.25~4.23 (m, 2H), 3.90 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 3.55 (d, *J*=9.3 Hz, 1H), 2.74 (br, 3H), 1.91~1.84 (m, 1H), 1.75~1.67 (m, 1H), 1.29 (s, 3H), 0.88 (s, 9H), 0.16 (s, 9H), 0.15 (s, 3H), 0.09 (s, 3H); ¹³C NMR (100.7 MHz, CDCl₃) δ : 149.2, 149.1, 139.1 (t, *J*=5.4 Hz), 138.4, 129.3, 124.8, 121.2 (t, *J*=26.8 Hz), 120.7, 111.4, 111.1, 107.3, 96.7, 89.5, 85.9, 74.1, 73.9 (t, *J*=29.4 Hz), 70.5, 60.0, 58.5, 56.0, 55.9, 41.1, 25.8, 22.1, 18.1, -0.3, -4.0, -4.8; ¹⁹F NMR (282 MHz, CDCl₃) δ : -100.6

(dd, $J=247.6, 12.7$ Hz, 1F), -108.3 (dt, $J=247.6, 13.3$ Hz, 1F); IR (KBr) $\nu_{\max}$: 3409, 2956, 2932, 2897, 2857, 1517, 1251, 1028, 840 cm^{-1} ; MS (ESI) m/z : 695 ($M+\text{Na}$)⁺; HRMS calcd for $\text{C}_{33}\text{H}_{54}\text{Si}_2\text{O}_8\text{F}_2\text{Na}$: 695.3223, found 695.3218.

4.2.18 化合物 35 的合成

化合物 34 (49 mg, 0.073 mmol) 溶解于二氯甲烷(2 mL), 依次加入二乙酸碘苯(70 mg, 0.218 mmol)和 TEMPO (2 mg, 0.015 mmol), 室温反应 4 h, 加入饱和硫酸钠溶液淬灭反应, 加水稀释后, 二氯甲烷萃取, 有机相依次使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离(PE : EA = 5 : 1, V/V)得到 45 mg 淡黄色油状物 35, 产率 95%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25} + 15.1$ (c 1.05, CHCl_3); ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 6.88~6.78 (m, 3H), 6.87 (d, $J=9.6$ Hz, 1H), 6.31 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 6.12~5.98 (m, 2H), 5.06~4.98 (m, 1H), 4.87 (d, $J=7.2$ Hz, 1H), 4.75 (d, $J=6.6$ Hz, 1H), 4.70 (d, $J=11.7$ Hz, 1H), 4.54 (d, $J=11.7$ Hz, 1H), 4.50 (d, $J=12.3$ Hz, 1H), 4.03 (s, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.88 (s, 3H), 3.57 (d, $J=7.5$ Hz, 1H), 1.94~1.87 (m, 1H), 1.79~1.72 (m, 1H), 1.30 (s, 3H), 0.87 (s, 9H), 0.17 (s, 9H), 0.15 (s, 3H), 0.09 (s, 3H); ^{13}C NMR (100.7 MHz, CDCl_3) δ : 160.3, 149.2, 149.0, 142.5, 137.7 (t, $J=27.8$ Hz), 129.5, 126.6 (t, $J=9.4$ Hz), 120.6, 118.8, 111.3, 111.1, 107.2, 96.5, 89.5, 85.1, 79.6 (dd, $J=31.9, 28.6$ Hz), 74.0, 70.4, 60.1, 55.9, 55.9, 41.0, 25.0, 22.8, 18.1, -0.3 , -4.0 , -4.8 ; ^{19}F NMR (282 MHz, CDCl_3) δ : -107.5 (dt, $J=288.5, 5.9$ Hz, 1F), -108.3 (dd, $J=288.5, 14.1$ Hz, 1F); IR (KBr) $\nu_{\max}$: 3459, 2967, 2855, 2172, 1740, 1365, 1217, 840 cm^{-1} ; MS (ESI) m/z : 691 ($M+\text{Na}$)⁺; HRMS calcd for $\text{C}_{33}\text{H}_{50}\text{F}_2\text{Si}_2\text{O}_8\text{Na}$: 691.2910, found 691.2905.

4.2.19 化合物 36 的合成

化合物 35 (197 mg, 0.295 mmol) 溶解于干燥的二氯甲烷(3 mL), 体系冷却至 0°C , 依次加入 2,6-lutidine (103 μL , 0.88 mmol)和 TESOTf (135 μL , 0.59 mmol), 保持温度反应 1.5 h, 将反应溶液缓慢倒入冰冷的饱和碳酸氢钠溶液中, 二氯甲烷萃取, 有机相依次使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离(PE : EA = 6 : 1, V/V)得到 205 mg 淡黄色油状物 36, 产率 95%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25} + 33.8$ (c 2.40, CHCl_3); ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 6.91~6.85 (m, 3H), 6.82~6.80 (m, 1H), 6.33 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 6.13 (d, $J=15.6$ Hz, 1H), 5.84 (dd, $J=15.6, 6.6$ Hz, 1H), 5.06~5.03 (m, 1H), 4.87 (d, $J=6.6$ Hz, 1H), 4.77 (d, $J=6.9$ Hz, 1H), 4.58 (s, 2H), 4.54 (dd, $J=9.3, 3.6$ Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 3.57 (dd, $J=8.1, 1.8$ Hz, 1H), 2.06~1.93 (m, 1H), 1.64~1.55 (m, 1H), 1.43 (s, 3H), 0.96 (t, $J=7.8$ Hz, 9H), 0.88 (s, 9H), 0.62 (q, $J=8.1$ Hz, 6H), 0.16

(s, 9H), 0.11 (s, 3H), 0.06 (s, 3H); ^{13}C NMR (100.7 MHz, CDCl_3) δ : 160.3, 149.1, 148.6, 143.1, 137.7 (t, $J=32.3$ Hz), 130.6, 126.5 (t, $J=9.1$ Hz), 120.4, 118.3, 111.3, 111.1, 108.1, 96.3, 88.9, 83.2, 79.6 (t, $J=29.7$ Hz), 70.1, 60.4, 55.9, 55.8, 40.9, 25.8, 24.1, 18.1, 7.1, 6.8, -0.2 , -4.2 , -4.8 ; ^{19}F NMR (282 MHz, CDCl_3) δ : -108.2 (m, 2F); IR (KBr) $\nu_{\max}$: 2956, 2878, 2170, 1750, 1516, 1365, 1231, 1032, 841 cm^{-1} ; MS (ESI) m/z : 805 ($M+\text{Na}$)⁺, 821 ($M+\text{K}$)⁺; HRMS calcd for $\text{C}_{39}\text{H}_{64}\text{Si}_3\text{O}_8\text{F}_2\text{Na}$: 805.3775, found 805.3769.

4.2.20 化合物 37 的合成

氮气氛围下, 化合物 36 (205 mg, 0.262 mmol) 溶解于丙酮(4 mL), 依次加入 NIS (77 mg, 0.341 mmol)和硝酸银(44 mg, 0.262 mmol), 室温反应 4 h, 反应液经硅藻土过滤, 减压除去滤液中的溶剂, 粗产物经柱层析分离(PE : EA = 5 : 1, V/V)得到 210 mg 淡黄色油状物 37, 产率 90%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25} + 29.1$ (c 1.50, CHCl_3); ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 6.91~6.81 (m, 3H), 6.85 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.33 (d, $J=9.6$ Hz, 1H), 6.12 (d, $J=15.9$ Hz, 1H), 5.84 (dd, $J=15.9, 6.9$ Hz, 1H), 5.10~5.00 (m, 1H), 4.86 (d, $J=6.9$ Hz, 1H), 4.76 (d, $J=6.6$ Hz, 1H), 4.70 (dd, $J=9.3, 3.3$ Hz, 1H), 4.60 (d, $J=11.1$ Hz, 1H), 4.55 (d, $J=11.7$ Hz, 1H), 3.91 (s, 3H), 3.90 (s, 3H), 3.57~3.55 (m, 1H), 2.02~1.95 (m, 1H), 1.64~1.56 (m, 1H), 1.42 (s, 3H), 0.96 (t, $J=7.8$ Hz, 9H), 0.87 (s, 9H), 0.62 (q, $J=7.8$ Hz, 6H), 0.09 (s, 3H), 0.05 (s, 3H); ^{13}C NMR (100.7 MHz, CDCl_3) δ : 160.3, 149.1, 148.7, 142.9, 137.8 (t, $J=29.4$ Hz), 130.4, 126.5 (t, $J=9.5$ Hz), 120.5, 118.2, 112.1 (t, $J=242.8$ Hz), 111.3, 111.1, 96.6, 96.4, 83.5, 79.5 (t, $J=30.4$ Hz), 70.2, 61.6, 56.0, 55.9, 40.8, 25.8, 24.2, 18.1, 7.1, 6.8, -4.5 , -4.9 ; ^{19}F NMR (282 MHz, CDCl_3) δ : -107.1 ~ -109.3 (m, 2F); IR (KBr) $\nu_{\max}$: 2955, 2935, 2878, 2176, 1751, 1516, 1265, 1031, 778 cm^{-1} ; MS (ESI) m/z : 859 ($M+\text{Na}$)⁺, 875 ($M+\text{K}$)⁺; HRMS calcd for $\text{C}_{36}\text{H}_{55}\text{O}_8\text{F}_2\text{Si}_2\text{INa}$: 859.2346, found 859.2340.

4.2.21 化合物 38 的合成

化合物 37 (218 mg, 0.26 mmol) 溶解于二氯甲烷与水的混合溶剂(4.4 mL, $V : V=10 : 1$), 加入 DDQ (71 mg, 0.31 mmol), 室温反应 3 h, 加入饱和亚硫酸钠溶液淬灭反应, 搅拌 10 min, 加入半饱和碳酸氢钠溶液稀释, 乙醚萃取, 有机相依次使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离(PE : EA = 5 : 1, V/V)得到 160 mg 无色透明油状物 38, 产率 89%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25} + 34.7$ (c 2.05, CHCl_3); ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 6.86~6.80 (m, 1H), 6.32 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 6.16 (d, $J=15.9$ Hz, 1H), 5.83 (dd, $J=15.3, 6.9$ Hz, 1H), 5.08~4.98 (m, 1H), 4.85~4.82 (m, 1H), 3.87 (d, $J=10.2$ Hz, 1H), 3.23 (br, 1H), 1.94~1.87 (m, 1H), 1.58~

1.49 (m, 1H), 1.42 (s, 3H), 0.96 (t, $J=8.1$ Hz, 9H), 0.89 (s, 9H), 0.62 (q, $J=8.1$ Hz, 6H), 0.15 (s, 3H), 0.12 (s, 3H); ^{13}C NMR (100.7 MHz, CDCl_3) δ : 160.3, 143.3, 137.7 (t, $J=28.8$ Hz), 126.6 (t, $J=8.6$ Hz), 118.3, 112.1 (t, $J=248.0$ Hz), 95.2, 79.8 (t, $J=30.5$ Hz), 75.5, 63.5, 38.6, 25.7, 23.4, 18.1, 7.1, 6.7, -4.8 , -5.4 ; ^{19}F NMR (282 MHz, CDCl_3) δ : $-107.3 \sim -109.5$ (m, 2F); IR (KBr) ν_{max} : 3514, 2955, 2877, 2179, 1748, 1258, 1098, 1075, 838 cm^{-1} ; MS (ESI) m/z : 679 ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$, 695 ($\text{M}+\text{K}$) $^+$; HRMS calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{43}\text{Si}_2\text{O}_5\text{F}_2\text{INa}$: 679.1559, found 679.1554.

4.2.22 化合物 39 的合成

化合物 38 (50 mg, 0.076 mmol) 溶解于 THF 与异丙醇的混合溶剂 (2 mL, $V:V=1:1$), 依次加入 NBSH (35 mg, 0.152 mmol) 和三乙胺 (21 μL , 0.152 mmol), 避光室温反应 24 h, 加入乙醚稀释反应溶液, 有机相使用饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离 (PE:EA=5:1, V/V) 得到 28 mg 淡黄色油状物 39, 产率 50%, 同时回收原料 38 (12 mg, 25%).

Data for compound 39: $[\alpha]_{\text{D}}^{25} + 29.7$ (c 0.6, CHCl_3); ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 6.87~6.80 (m, 1H), 6.37 (dd, $J=15.3$, 7.5 Hz, 1H), 6.33 (d, $J=9.6$ Hz, 1H), 6.25 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 6.16 (d, $J=15.3$ Hz, 1H), 5.82 (dd, $J=15.9$, 7.2 Hz, 1H), 5.09~4.99 (m, 1H), 4.71~4.65 (m, 1H), 3.68 (d, $J=10.8$ Hz, 1H), 3.30 (br, 1H), 1.83~1.76 (m, 1H), 1.47~1.40 (m, 1H), 1.39 (s, 3H), 0.94 (t, $J=7.8$ Hz, 9H), 0.88 (s, 9H), 0.59 (q, $J=7.8$ Hz, 6H), 0.11 (s, 3H), 0.06 (s, 3H); ^{13}C NMR (100.7 MHz, CDCl_3) δ : 160.3, 143.8, 137.8 (t, $J=29.5$ Hz), 126.6 (t, $J=9.2$ Hz), 118.5, 112.1 (t, $J=242.4$ Hz), 80.0 (t, $J=14.1$ Hz), 75.1, 74.5, 36.6, 25.7, 25.6, 23.1, 18.0, 7.0, 6.7, -4.5 , -5.1 ; ^{19}F NMR (282 MHz, CDCl_3) δ : $-107.2 \sim -109.4$ (m, 2F); IR (KBr) ν_{max} : 3488, 2955, 1749, 1275, 1098, 1074, 1003, 837, 744 cm^{-1} ; MS (ESI) m/z : 681 ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$; HRMS calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{45}\text{Si}_2\text{O}_5\text{F}_2\text{INa}$: 681.1716, found 681.1711.

4.2.23 化合物 40 的合成

氮气氛围下, 向化合物 39 (14.4 mg, 0.017 mmol) 和片段 c (21 mg, 0.034 mmol) 的 DMF 溶液 (1.0 mL) 中加入 $\text{PdCl}_2(\text{CH}_3\text{CN})_2$ (0.5 mg, 0.002 mmol), 避光室温反应 24 h, 加入饱和碳酸氢钠溶液淬灭反应, 乙醚萃取, 有机相依次使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离 (PE:EA=4:1, V/V) 得到无色透明油状物 40, 产率 85%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25} + 11.1$ (c 0.60, CH_3CN); ^1H NMR (300 MHz, CD_3CN) δ : 7.67 (d, $J=6.3$ Hz, 4H), 7.46~7.38 (m, 6H), 6.97~6.90 (m, 1H), 6.77 (dd, $J=13.2$, 12.6 Hz, 1H), 6.33 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 6.32 (t, $J=11.4$ Hz, 1H), 6.20 (t, $J=10.8$ Hz, 1H), 6.14 (d,

$J=15.9$ Hz, 1H), 6.07 (t, $J=10.8$ Hz, 1H), 5.88 (dt, $J=10.2$, 3.0 Hz, 1H), 5.78 (dd, $J=15.6$, 7.2 Hz, 1H), 5.50 (t, $J=9.6$ Hz, 1H), 5.17 (dt, $J=16.2$, 7.5 Hz, 1H), 4.89 (t, $J=9.0$ Hz, 1H), 4.31 (d, $J=3.9$ Hz, 2H), 3.64~3.59 (m, 1H), 3.19 (d, $J=4.5$ Hz, 1H), 1.78~1.70 (m, 1H), 1.36 (s, 3H), 1.21~1.15 (m, 1H), 1.04 (s, 9H), 0.93 (t, $J=8.1$ Hz, 9H), 0.87 (s, 9H), 0.60 (q, $J=8.1$ Hz, 6H), 0.06 (s, 3H), 0.01 (s, 3H); ^{13}C NMR (100.7 MHz, CD_3CN) δ : 160.3, 143.6, 137.7 (t, $J=29.4$ Hz), 135.5, 135.1, 134.3, 133.6, 130.1, 129.7, 127.7, 126.5 (t, $J=9.3$ Hz), 124.4, 123.1, 122.4, 118.3, 112.1 (t, $J=242.4$ Hz), 79.9 (t, $J=31.8$ Hz), 75.1, 67.6, 64.1, 38.4, 27.8, 26.8, 25.8, 17.5, 13.6, 7.0, 6.6, -4.4 , -5.2 ; ^{19}F NMR (282 MHz, CD_3CN) δ : -108.1 (ddd, $J=285.7$, 15.8, 2.5 Hz, 1F), -109.0 (dt, $J=285.7$ Hz, 7.6 Hz, 1F); IR (KBr) ν_{max} : 3505, 2955, 2930, 2877, 2857, 1749, 1110, 1072, 702 cm^{-1} ; MS (ESI) m/z : 875 ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$; HRMS calcd for $\text{C}_{47}\text{H}_{70}\text{O}_6\text{F}_2\text{Si}_3\text{Na}$: 875.4346, found 875.4341.

4.2.24 化合物 42 的合成

化合物 40 (16.8 mg, 0.020 mmol) 溶解于干燥的二氯甲烷 (1 mL), 体系冷却至 0 $^{\circ}\text{C}$, 依次加入四氮唑 (22 mg, 0.315 mmol) 和亚磷酰胺 41 (42 μL , 0.158 mmol), 保持温度反应 1 h, 滴入过氧叔丁醇 ($5.5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ in decane, 73 μL , 0.40 mmol), 保持温度继续反应 1 h, 加入饱和碳酸氢钠溶液淬灭反应, 二氯甲烷萃取, 有机相依次使用水、饱和食盐水洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压除去溶剂, 粗产物经柱层析分离 (PE:EA=4:1, V/V) 得到 12 mg 化合物 42, 产率 60%, $[\alpha]_{\text{D}}^{25} + 22.5$ (c 0.55, CH_3CN); ^1H NMR (400 MHz, CD_3CN) δ : 7.71 (d, $J=7.2$ Hz, 4H), 7.52~7.43 (m, 6H), 7.00~6.96 (m, 1H), 6.81 (t, $J=12.4$ Hz, 1H), 6.36 (t, $J=10.0$ Hz, 2H), 6.27 (t, $J=11.2$ Hz, 1H), 6.14 (d, $J=15.2$ Hz, 1H), 6.11 (t, $J=10.0$ Hz, 1H), 6.08~5.98 (m, 2H), 5.95~5.84 (m, 2H), 5.49~5.40 (m, 3H), 5.33~5.20 (m, 3H), 5.03 (t, $J=11.4$ Hz, 1H), 4.56 (q, $J=5.6$ Hz, 4H), 4.49 (t, $J=10.2$ Hz, 1H), 4.36 (d, $J=4.8$ Hz, 2H), 2.10~2.03 (m, 1H), 1.51 (s, 3H), 1.34~1.29 (m, 1H), 1.09 (s, 9H), 1.00 (t, $J=8.0$ Hz, 9H), 0.92 (s, 9H), 0.68 (q, $J=8.0$ Hz, 6H), 0.15 (s, 3H), 0.06 (s, 3H); ^{13}C NMR (100.7 MHz, CD_3CN) δ : 161.4, 142.7, 138.5 (dd, $J=25.6$, 31.9 Hz), 137.1, 136.4, 135.5, 134.5, 133.9 (dd, $J=10.5$, 7.5 Hz), 130.9, 130.9, 128.8, 127.8 (t, $J=9.2$ Hz), 125.4, 124.5, 123.2, 120.5, 118.8, 83.0 (d, $J=7.2$ Hz), 79.8 (dd, $J=32.5$, 27.5 Hz), 77.1 (d, $J=5.2$ Hz), 69.0 (d, $J=5.4$ Hz), 66.0, 65.0, 41.2, 30.3, 27.2, 26.4, 25.4, 19.8, 18.7, 7.5, 7.4, -3.7 , -4.0 ; ^{19}F NMR (282 MHz, CD_3CN) δ : -107.7 (dd, $J=286.5$, 19.2 Hz, 1F), -109.0 (dt, $J=286.5$, 7.3 Hz, 1F); IR (KBr) ν_{max} : 3071, 2955, 2929, 2878, 2856, 1753, 1465, 1275, 1110, 1007, 701 cm^{-1} ; MS (ESI)

m/z : 1035 ($M+Na$)⁺; HRMS calcd for $C_{53}H_{79}O_9F_2PSi_3Na$: 1035.4635, found 1035.4600.

References

- [1] (a) Tunac, J. B.; Graham, B. D.; Dobson, W. E. *J. Antibiot.* **1983**, *36*, 1595; (b) Stampwala, S. S.; Bunge, R. H.; Hurley, T. R.; Willmer, N. E.; Brankiewicz, A. J.; Steinman, C. E.; Smitka, T. A.; French, J. C. *J. Antibiot.* **1983**, *36*, 1600.
- [2] Boger, D. L.; Hikota, M.; Lewis, B. M. *J. Org. Chem.* **1997**, *62*, 1748.
- [3] Lewy, D. S.; Gauss, C.-M.; Soenen, D. R.; Boger, D. L. *Curr. Med. Chem.* **2002**, *9*, 2005.
- [4] (a) Walsh, A. H.; Cheng, A.; Honkanen, R. E. *FEBS Lett.* **1997**, *416*, 230; (b) Hastie, C. J.; Cohen, P. T. W. *FEBS Lett.* **1998**, *431*, 357.
- [5] Lê, L. H.; Erlichman, C.; Pillon, L.; Thiessen, J. J.; Day, A.; Wainman, N.; Eisenhauer, E. A.; Moore, M. J. *Invest. New Drugs* **2004**, *22*, 159.
- [6] Buck, S. B.; Hardouin, C.; Ichikawa, S.; Soenen, D. R.; Gauss, C. M.; Hwang, I.; Swingle, M. R.; Bonness, K. M.; Honkanen, R. E.; Boger, D. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, *125*, 15694.
- [7] Takeuchi, T.; Takahashi, N.; Ishi, K.; Kusayanagi, T.; Kuramochi, K.; Sugawara, F. *Bioorg. Med. Chem.* **2009**, *17*, 8113.
- [8] For review, see: (a) Shibasaki, M.; Kanai, M. *Heterocycles* **2005**, *66*, 727. For examples, see: (b) Boger, D. L.; Ichikawa, S.; Zhong, W. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, *123*, 4161; (c) Cossy, J.; Pradaux, F.; BouzBouz, S. *Org. Lett.* **2001**, *3*, 2233; (d) David, E. C.; Eric, N. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2001**, *40*, 3667; (e) Esumi, T.; Okamoto, N.; Hatakeyama, S. *Chem. Commun.* **2002**, 3042; (f) Falck, J. R. *Org. Lett.* **2002**, *4*, 969; (g) Kiyotsuka, Y.; Igarashi, J.; Kobayashi, Y. *Tetrahedron Lett.* **2002**, *43*, 2725; (h) Miyashita, K.; Ikejiri, M.; Kawasaki, H.; Maemura, S.; Imanishi, T. *Chem. Commun.* **2002**, 742; (i) Wang, Y.-G.; Kobayashi, Y. *Org. Lett.* **2002**, *4*, 4615; (j) Fujii, K.; Maki, K.; Kanai, M.; Shibasaki, M. *Org. Lett.* **2003**, *5*, 733; (k) Miyashita, K.; Ikejiri, M.; Kawasaki, H.; Maemura, S.; Imanishi, T. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, *125*, 8238; (l) Ramachandran, P. V.; Liu, H.; Ram Reddy, M. V.; Brown, H. C. *Org. Lett.* **2003**, *5*, 3755; (m) Trost, B. M.; Frederiksen, M. U.; Papillon, J. P. N.; Harrington, P. E.; Shin, S.; Shireman, B. T. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 3666; (n) Takeuchi, T.; Kuramochi, K.; Kobayashi, S.; Sugawara, F. *Org. Lett.* **2006**, *8*, 5307; (o) Yadav, J. S.; Prathap, I.; Tadi, B. P. *Tetrahedron Lett.* **2006**, *47*, 3773; (p) Hayashi, Y.; Yamaguchi, H.; Toyoshima, M.; Okado, K.; Toyo, T.; Shoji, M. *Org. Lett.* **2008**, *10*, 1405; (q) Robles, O.; McDonald, F. E. *Org. Lett.* **2009**, *11*, 5498; (r) Sarkar, S. M.; Wanzala, E. N.; Shibahara, S.; Takahashi, K.; Ishihara, J.; Hatakeyama, S. *Chem. Commun.* **2009**, 5907; (s) Gao, D.; O'Doherty, G. A. *Org. Lett.* **2010**, *12*, 3752; (t) Li, D.; Zhao, Y.; Ye, L.; Chen, C.; Zhang, J. *Synthesis* **2010**, 3325.
- [9] Maki, K.; Motoki, R.; Fujii, K.; Kanai, M.; Kobayashi, T.; Tamura, S.; Shibasaki, M. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 17111.
- [10] De Jong, R.; Mulder, N.; Uges, D.; Sleijfer, D. T.; Höppener, F.; Groen, H.; Willemse, P.; Van der Graaf, W.; De Vries, E. *Br. J. Cancer* **1999**, *79*, 882.
- [11] (a) Yamazaki, T.; Taguchi, T.; Ojima, I. In *Fluorine in Medicinal Chemistry and Chemical Biology*, Ed.: Ojima, I., Wiley-Blackwell, Chichester, U.K., **2009**, p. 3; (b) Muller, K.; Faeh, C.; Diederich, F. *Science* **2007**, *317*, 1881; (c) Purser, S.; Moore, P. R.; Swallow, S.; Gouverneur, V. *Chem. Soc. Rev.* **2008**, *37*, 320; (d) Wang, J.; Liu, H. *Chin. J. Org. Chem.* **2011**, *31*, 1785. (王江, 柳红, 有机化学, **2011**, *31*, 1785.)
- [12] (a) You, Z.-W.; Wu, Y.-Y.; Qing, F.-L. *Tetrahedron Lett.* **2004**, *45*, 9479-9481; (b) You, Z.-W.; Jiang, Z.-X.; Wang, B.-L.; Qing, F.-L. *J. Org. Chem.* **2006**, *71*, 7261; (c) You, Z.-W.; Zhang, X.; Qing, F.-L. *Synthesis* **2006**, 2535; (d) Lin, J.; Qiu, X.-L.; Qing, F.-L. *J. Fluorine Chem.* **2010**, *131*, 684; (e) Lin, J.; Qiu, X.-L.; Qing, F.-L. *Beilstein J. Org. Chem.* **2010**, *6*, 37; (f) Lin, J.; Yue, X.; Huang, P.; Cui, D.; Qing, F.-L. *Synthesis* **2010**, 267; (g) Chen, J.-L.; Zheng, F.; Huang, Y.; Qing, F.-L. *J. Org. Chem.* **2011**, *76*, 6525.
- [13] You, Z.-W. *Ph.D. Dissertation*, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Science, Shanghai, **2007**. (游正伟, 博士学位论文, 中国科学院上海有机化学研究所, 上海, **2007**.)
- [14] Hansen, T. M.; Florence, G. J.; Lugo-Mas, P.; Chen, J.; Abrams, J. N.; Forsyth, C. J. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 57.
- [15] (a) Veeraraghavan Ramachandran, P.; Chatterjee, A. *Org. Lett.* **2008**, *10*, 1195; (b) Ramachandran, P. V.; Tafelska-Kaczmarek, A.; Sakavuyi, K.; Chatterjee, A. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 1302; (c) Ramachandran, P. V.; Tafelska-Kaczmarek, A.; Sakavuyi, K. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 4044.
- [16] (a) Sato, K.; Kawata, R.; Ama, F.; Omote, M.; Ando, A.; Kumadaki, I. *Chem. Pharm. Bull.* **1999**, *47*, 1013; (b) Sato, K.; Omote, M.; Ando, A.; Kumadaki, I. *J. Fluorine Chem.* **2004**, *125*, 509.
- [17] (a) Ma, S.; Lu, X.; Li, Z. *J. Org. Chem.* **1992**, *57*, 709; (b) Beruben, D.; Marek, I.; Normant, J. F.; Platzer, N. *J. Org. Chem.* **1995**, *60*, 2488.
- [18] Burgess, K.; Jennings, L. D. *J. Am. Chem. Soc.* **1991**, *113*, 6129.
- [19] (a) Itoh, T.; Kudo, K.; Tanaka, N.; Sakabe, K.; Takagi, Y.; Kihara, H. *Tetrahedron Lett.* **2000**, *41*, 4591; (b) Kirihaara, M.; Kawasaki, M.; Katsumata, H.; Kakuda, H.; Shiro, M.; Kawabata, S. *Tetrahedron: Asymmetry* **2002**, *13*, 2283; (c) Itoh, T.; Kudo, K.; Yokota, K.; Tanaka, N.; Hayase, S.; Renou, M. *Eur. J. Org. Chem.* **2004**, *2004*, 406; (d) Kaneda, T.; Komura, S.; Kitazume, T. *J. Fluorine Chem.* **2005**, *126*, 17.
- [20] Sullivan, G. R.; Dale, J. A.; Mosher, H. S. *J. Org. Chem.* **1973**, *38*, 2143.
- [21] Corey, E. J.; Guzman-Perez, A.; Lazerwith, S. E. *J. Am. Chem. Soc.* **1997**, *119*, 11769.
- [22] Matsuo, J.; Kozai, T.; Nishikawa, O.; Hattori, Y.; Ishibashi, H. *J. Org. Chem.* **2008**, *73*, 6902.
- [23] (a) Kitagawa, K.; Inoue, A.; Shinokubo, H.; Oshima, K. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2000**, *39*, 2481; (b) Inoue, A.; Kitagawa, K.; Shinokubo, H.; Oshima, K. *J. Org. Chem.* **2001**, *66*, 4333; (c) Knochel, P.; Dohle, W.; Gommermann, N.; Kneisel, F. F.; Kopp, F.; Korn, T.; Sapountzis, I.; Vu, V. A. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2003**, *42*, 4302.

(Cheng, F.)