水溶性卟啉及金属卟啉在 DNA 中的研究进展

张现侠 陈灿玉*

(杭州师范大学材料与化学化工学院 杭州 310036)

摘要 近年来, 卟啉及金属卟啉与 DNA 的相互作用已成为研究的热点. 通过对卟啉及金属卟啉与 DNA 相互作用的研究将有助于更深地认识 DNA 本身的结构和功能, 有助于卟啉及金属卟啉在医学上的应用, 对认识很多疾病的治病机制和药物的设计也起到非常重要的作用. 本文阐述了卟啉及金属卟啉与 DNA 相互作用的方式和影响因素, 并将水溶性卟啉及金属卟啉分为三类: 具有吡啶基或铵基的阳离子型卟啉及金属卟啉, 具有磺酸基或羧基的阴离子型卟啉及金属卟啉, 以及非离子型的卟啉及金属卟啉. 重点论述了这三类水溶性卟啉及金属卟啉与 DNA 之间的相互作用, 以及这三类水溶性卟啉及金属卟啉在 DNA 中的应用研究进展.

关键词 水溶性; 卟啉; 金属卟啉; DNA; 研究进展

Development of Study on Water-Soluble Porphyrins and Metalloporphyrins in DNA

Zhang, Xianxia Chen, Canyu*

(College of Material, Chemistry and Chemical Engineering, Hangzhou Normal University, Hangzhou 310036)

Abstract The research of the interaction between porphyrins or metalloporphyrins and DNA becomes one focal point in recent years. The research conduces to realize the structure and the function of DNA more deeply, and profits porphyrins or metalloporphyrins to use in the medicine, and also be very important for understanding the treatment mechanism and the drug design of many diseases. The mode and influencing factors of interaction between porphyrins or metalloporphyrins and DNA are elucidated, and the water-soluble porphyrins and metalloporphyrins are classified into three types: the cationic porphyrins and metalloporphyrins which have pyridyl group or ammonium group, the anionic porphyrins and metalloporphyrins which have sulfonic group or carboxyl group, and the neutral porphyrins and metalloporphyrins. The interaction and the recent exploratory development in the study of the three types of the water-soluble porphyrins and metalloporphyrins in DNA are emphatically reviewed.

Keywords water-soluble; porphyrins; metalloporphyrins; DNA; development

1 引言

卟啉及金属卟啉在自然界和生物体中广泛存在, 如叶绿素、血红素、维生素 B₁₂ 等都是金属卟啉^[1], 它们在生命过程中, 对氧的传递(血红蛋白)、储存(肌红蛋白)、活化(细胞色素 P-450)和光合作用(叶绿素)都起着重要作用. 近年来, 卟啉及金属卟啉与 DNA 的相互作用已成为研究的热点, 卟啉及金属卟啉可用于 DNA 的足迹法^[2]、端链酶抑制剂的设计^[3]、DNA/RNA 杂交的稳定^[4]、DNA 的三螺旋和四螺旋^[5]、抗病毒试剂的开发以及 DNA/RNA 的选择性切割试剂的开发^[6]等. 此外, 卟啉类化合物也具有良好的 DNA 光断裂特性, 它可以插入 DNA 碱基对之间, 并以不同的作用机制使 DNA 断裂. 金属卟啉具有切割 DNA 和核酸酶的活性^[2,7], 也是 DNA 结构和动力学研究的非常好的探针. 卟啉及金属卟啉化

合物的抗癌活性与其能够和 DNA 相互作用有关^[8]. 因此, 对卟啉及金属卟啉与 DNA 相互作用的研究将有助于更深地认识 DNA 本身的结构和功能, 有助于卟啉及金属卟啉在医学上的应用, 如抑制艾滋病毒、流感病毒以及光动力学治疗癌症等^[9], 对认识很多疾病的治病机制和药物的设计也起到非常重要的作用.

DNA 是水溶性物质, 而卟啉大环是脂溶性的, 因此对水溶性卟啉的研究尤为重要. 水溶性卟啉及金属卟啉按其所含的官能团来分, 主要有以下几类(图 1): 具有吡啶基或铵基的阳离子型卟啉及金属卟啉, 具有磺酸基或羧基的阴离子型卟啉及金属卟啉, 以及非离子型的卟啉及金属卟啉. 本文将简要说明卟啉及金属卟啉与 DNA 的作用方式和影响因素, 并针对这三类水溶性卟啉及金属卟啉与 DNA 相互作用的研究进展进行了介绍.

* E-mail: chency@hznu.edu.cn

Received September 24, 2012; published November 14, 2012.

Project supported by Program for Technological Development of Hangzhou (No. 20100933B10) and Science Foundation of Hangzhou Normal University (No. 2011PYJJ09) and Technological Program for Health Bureau of Zhejiang Province (No. 2012KYB161).

项目受杭州市科技发展计划项目(No. 20100933B10)、杭州师范大学科研基金(No. 2011PYJJ09)和浙江省医药卫生科技项目(No. 2012KYB161)资助.

图1 三类水溶性卟啉及金属卟啉的化学结构

Figure 1 Chemical structures of the three types of the water-soluble porphyrins and metalloporphyrins

2 卟啉及金属卟啉与 DNA 相互作用的方式

由于 DNA 中不仅有大量可与金属离子配位的碱基, 还有可形成氢键的脱氧核糖以及由双螺旋结构形成的袋状结构; 而且卟啉及金属卟啉与 DNA 之间不同的结合位置及结合方式在光谱上有着不同的现象. 因此, 研究者们利用各种光谱学方法研究卟啉及金属卟啉与 DNA 之间的相互作用, 并提出了三种主要作用方式^[10]: (1)嵌插结合, 即平面或几乎平面的芳香环嵌入碱基对之间. 采用这种作用方式的卟啉主要是自由卟啉和一些没有轴向配体的金属卟啉, 如络合 Cu(II)、Pd(II)等离子的金属卟啉. 在较低离子强度及较低金属卟啉/DNA 比的条件下, 这类配合物可以插入到 DNA 中, 特别是富含鸟嘌呤-胞嘧啶(G-C)的片段中. (2)外部结合, 分为静电结合和沟内结合. 静电结合指卟啉通过非特异性的相互作用结合于带负电的 DNA 双螺旋外部的磷酸链骨架. 尽管这种作用模式的特异性不强, 但是在卟啉化合物与 DNA 相互作用中也起到了非常重要的作用. 沟内结合指卟啉与 DNA 的大沟或小沟的碱基对边缘直接作用. 此时, 卟啉以其分子平面与双螺旋链相垂直的方式与 DNA 结合, 一般非平面卟啉主要以此种方式与 DNA 相互作用. 具有轴向配体的金属卟啉如络合 Fe(III)、Mn(III)、Co(II)、Zn(II)等离子的金属卟啉主要以这种方式与 DNA 结合, 并对核酸大沟中富含腺嘌呤-胸腺嘧啶(A-T)片断具有特异识别能力. (3)外部堆积, 金属卟啉沿 DNA 双螺旋链相互聚集并结合于 DNA 上, 这种作用主要发生在溶液离子强度较高的情况下, 通常这种结合模式下所产生的诱导圆二信号非常强. 这三种结合方式主要通过氢键、离子键、范德华力和疏水键等弱作用力完成. 在分子水平上的生命现象中, 这些弱作用键形成了生物大分子的生物功能所要求的空间结构, 因而决定了基因转录、调控的主要机制. 此外, 部分插入方式以及多种方式共存的现象也有报道.

3 卟啉及金属卟啉与 DNA 相互作用的影响因素

卟啉与 DNA 之间的结合方式与卟啉周边上的取代基、中央金属离子、所带电荷数、DNA 的种类、所处的环境以及卟啉与 DNA 的相对浓度等有关, 同时其稳

定性受静电作用、范德华力、疏水作用以及空间张力等因素的影响. 另外, 卟啉自身的聚集状态也将影响其与 DNA 的相互作用^[10b,11]. 总的来说, 可以归为以下四个方面:

(1) 卟啉及金属卟啉的性质

卟啉及金属卟啉都有一个四吡咯共轭的大 π 刚性平面, 可以在 β 位和 *meso* 位连接不同的侧链基团. 侧链基团的亲水性、空间结构、数目和所处位置以及所带电荷数都会对卟啉与 DNA 两者的相互作用产生影响. 取代基的亲疏水性影响卟啉在水溶液中的溶解度和聚集状态, 不同的聚集状态和 DNA 的作用也不同; 取代基的空间位阻过大时, 也会减弱卟啉对 DNA 的嵌插作用; 卟啉中心金属离子的价态及有无轴向配体也影响着与 DNA 作用的方式^[12]; 此外, 卟啉所带的电荷数及种类也是一个重要的因素, 带有不同电荷的卟啉和 DNA 的作用方式各不相同. *meso*-四(4-*N*-甲基吡啶基)卟啉(TMPyP)和 DNA 的相互作用表现出非常强烈的插入作用^[13]. 而由于电荷数目和位置的不同, 其他含有吡啶正离子的卟啉化合物和 DNA 的相互作用各不相同^[10c]. 含有三个 4-吡啶正离子的卟啉以插入方式和 DNA 相互作用, 但是只含有一个正离子的卟啉却是以沟外结合和外部堆积的方式与 DNA 作用^[14]. 而含有两个吡啶正离子的卟啉, 包括顺式和反式, 与 DNA 也有多种结合方式^[15].

(2) DNA 的性质

不同的 DNA 与卟啉的结合方式不同, 因为 DNA 中不同碱基序列会改变卟啉与其作用的方式, 如 Monaselidze 课题组通过微热测量研究 Cu(II)-TOEPyP 和 Zn(II)-TOEPyP 与 DNA, poly(dA)poly(dT), poly(d(A-C))poly(d(G-T))之间的相互作用, 发现这两种金属卟啉与 DNA 间的作用方式取决于核酸本身的序列^[16]; 而 DNA 不同的构型所含的沟槽空间不同, 与卟啉间的相互作用也有所不同; 此外, DNA 所处的状态(游离态或结合态)也将影响其与卟啉的结合方式.

(3) 两者之间的比例

卟啉与 DNA 相互作用时两者的浓度比值直接影响着二者间的结合方式, 并且随着卟啉与 DNA 的比例变化, 结合方式也发生改变. 如研究最多的 TMPyP, 随着 TMPyP 与 DNA 之间的摩尔比增大, 其结合部位逐渐由 DNA 的小沟过渡移向了大沟.

(4) 相互作用时所处的环境

卟啉与 DNA 相互作用时的溶液环境影响着它们之间的结合方式. pH 值、温度、浓度、溶液种类等因素都会影响卟啉与 DNA 在溶液中的性质, 进而导致作用方式或者作用力的改变. 而相对于这些因素的影响, 研究人员更热衷于溶液的离子浓度对两者之间作用的影响. 溶液中离子强度较高时, 卟啉与 DNA 的相互作用减弱, 卟啉的 Soret 带红移; 离子强度较低时, 卟啉与

DNA 复合体的圆二色谱信号方向与离子强度较高时的相反. 有研究表明, TMPyP 与小牛胸腺 DNA (ct DNA) 相互作用时, 随着溶液的离子强度增加, 卟啉从 GC 碱基对富集部位向 AT 碱基对富集部位转移.

4 水溶性卟啉及金属卟啉在 DNA 中的研究进展

4.1 阳离子型

DNA 为水溶性物质, 具有带负电荷的磷酸链, 与带正电荷的水溶性卟啉反应具有得天独厚的优势^[17]. 水溶性阳离子卟啉及金属卟啉被认为是具有双重作用的化合物, 不仅能与 DNA 稳定的结合, 还可以利用它们的光活性来裂解 DNA^[18]. 因此, 水溶性阳离子卟啉及金属卟啉不仅是蛋白质和核酸结构与动力学研究潜在的优良探针, 而且可应用于光动力学治疗, 癌症检测, 抑制病毒, 人造核酸酶等领域^[11b,19], 这使得它们与 DNA 的相互作用成为近年来的研究热点. 水溶性阳离子卟啉及金属卟啉主要可分为吡啶基阳离子型和铵基阳离子型.

(1) 吡啶基阳离子型

自从 1979 年 Fiel 等^[13]发现 TMPyP 能插入小牛胸腺 DNA(ct DNA)以来, TMPyP 越来越引起人们的关注^[10g,20]. 吡啶基阳离子卟啉是目前研究最为广泛、深入的一类水溶性阳离子卟啉, 其中包含不同电荷数的不对称阳离子卟啉, 如二价^[15b]、三价^[21]卟啉及其各种衍生物(如图 2 所示为常见的吡啶基取代基团).

图 2 阳离子卟啉的几种常见吡啶基取代基团

Figure 2 Some pyridyl substituent groups of cationic porphyrins

吡啶基阳离子卟啉及金属卟啉与 DNA 的相互作用主要表现出强烈的嵌插作用^[13]. 但是由于电荷数目的不同和取代基位置的不同, 它们与 DNA 的相互作用也不尽相同. 如同样带有四个电荷, *meso*-四(3-*N*-甲基吡啶基)卟啉($T_3\text{MPyP}$)与 DNA 能以嵌插方式相结合, 而 *meso*-四(2-*N*-甲基吡啶基)卟啉($T_2\text{MPyP}$)则不能^[22]. 如果卟啉配有金属离子时, 不同的金属与卟啉结合的空间结构不同、轴向有无配体等也将导致它们与 DNA 的作用方式及位置的不同^[23]. Ni(II)-TMPyP 可以选择性地插入 DNA 中富 G-C 碱基对区域^[8a,24], 而 TMPyP 则自身诱导 DNA 的构型从 *Z* 型转化为 *E* 型^[25]. Pt(II)-TMPyP 在水中是非聚集四配位体, 与 DNA 结合后, 在 420 nm 处产生了很强的负的 ICD 谱带, 这表明 Pt(II)-TMPyP 与 DNA 的结合方式为嵌插作用. 而从 NaCl 对 TMPyP 与 DNA 作用的 ICD 光谱影响也可以看出, TMPyP 与 DNA

的结合方式也为嵌插作用^[4,26]. 但是, 拥有轴向配体的金属卟啉, 如 TMPyP 的锰(III)、钴(III)和铁(III)的配合物并不显示这种嵌合行为, 而是键合到富 A-T 碱基对区域的小沟槽中. 此外, Co(II)-TMPyP 也是富集在富 A-T 碱基对区域的小沟槽中^[27]. Marzilli 等^[28]研究了 TMPyP 与 $[\text{d(G-C)}_2]_n$ 以及五种合成寡聚 DNA 片段作用的 ^1H 和 ^{31}P NMR, 结果发现卟啉与 DNA 结合后 ^1H 的信号向高场迁移而 ^{31}P 信号的移动方向则与 5'CG3'片的选择性相互作用一致, 证实 TMPyP 与 DNA 的作用位点是 DNA 中的富 GC 区. 而 2001 年, Marzilli 等^[29]又研究了 $\text{CH}_3\text{CoTMPyP}$ 与 ct DNA 的相互作用, 发现在刚加入 $\text{CH}_3\text{CoTMPyP}$ 时体系粘度略有上升, 且随着加入量增大体系粘度不断下降, 表明两者的作用是外部结合, 并以五配位的结构方式结合在 DNA 的富 AT 区. Yoon^[30]通过拉曼光谱和荧光光谱发现 $\text{O}=\text{Ti(IV)-TMPyP}$ 与 ct DNA 的作用位点大部分是在 DNA 的富 GC 区, 少部分是在 DNA 的富 AT 区, 并导致 DNA 形态的改变. Leontis 等^[31]利用二维 ^1H NMR 和 CD 谱等方法研究了 TMPyP 与 $[\text{d(GCACGTGC)}]_2$ 片段的相互作用, 结果表明 TMPyP 在寡聚 DNA 没有解体的情况下插入到了双螺旋的中间, 使得 DNA 碱基和糖的化学位移向高场迁移. Williams 等^[32]利用 X 射线衍射技术研究由 Cu(II)-TMPyP 与单链 DNA 培养出的 $\text{d(CGATCG) \cdot Cu(II)-TMPyP}$ 单晶. 结果显示: 卟啉中吡啶环上带正电荷的 N 与 DNA 中带负电荷的磷酸根通过静电作用结合, 卟啉被静电作用拖入了 DNA 中的小沟并嵌入双螺旋的内部. 2005 年, 康敬万等^[33]合成了四[4-(3-丙氧基吡啶基溴化盐)苯基]卟啉(TPPBr)及其锌、镍配合物, 研究了它们与 ct DNA 之间的相互作用, 发现它们之间采用外部静电结合和外部堆积的混合方式; 而 *meso*-四[4-(1-吡啶基)丙氧基苯基]卟啉(TPyPP)及其镍配合物与 ct DNA 之间则采用自堆积方式. 2007 年, 王凯等^[34]合成了含有 8 个阳离子的水溶性桥联双卟啉(PD), 并与 TMPyP 相比较, 研究了 PD 与 ct DNA 的相互作用, 结果表明 PD 与 ct DNA 间采用嵌插和外部结合的混合方式. 2009 年, 杜斌等^[35]研究了三价阳离子卟啉 TriMPyP 与 ct DNA 间的相互作用发现, 由于 TriMPyP 分子的不对称性, 空间位阻使其不能与 DNA 有效地进行插入或外部结合; 并且由于 DNA 的加入, 使 TriMPyP 聚集程度增加. Dezhampahan 等采用光谱学方法、共振光扫描和粘度法发现 5-(1-(正戊酸基)吡啶基), 10,15,20-三(甲基吡啶基)卟啉(5-CBPYP)与 ct DNA 之间是嵌插结合, 并且 TMPyP 与 ct DNA 间的亲和力比 5-CBPYP 与 ct DNA 间的亲和力高^[36], 但是 Mn(III)-5-CBPYP 的摩尔吸光系数比 Mn(III)-TMPyP 的来得高, 这是由 Mn(III)-5-CBPYP 上的 $(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$ 取代基团引起的^[37].

Gandini 等^[38]通过凸约束算法分析吸收光谱的重叠将 Mn(III)-TMPyP 在低离子浓度下与不同浓度 DNA 作用后分为三种存在状态: 分别是游离态, 络合物 1 和络

合物 **2**. 随着 DNA 浓度的增加, 游离态的含量急剧减少; 络合物 **1** 的含量则急剧增加, 在 DNA 与金属卟啉具有相同浓度时达到最大, 之后逐渐减少; 络合物 **2** 的含量逐渐增加, 逐渐趋向于 100%. 其中络合物 **1** 能产生很强的散射信号, 且能在 DNA 表面聚集. 当 DNA 浓度继续增大时, 散射峰强度明显降低. Chinsky 等^[39]借助共振拉曼光谱法研究 Cu(II)-TMPyP 与合成核酸结构 (dA-dT)_n 的相互作用, 确认了在卟啉激发态时卟啉-AT 碱基激发复合体的形成, 并对其特性进行了初步表征. Kruglik 等^[40]也利用时间分辨共振拉曼光谱法研究了铜卟啉与 DNA 激发复合体的形成. 尚利等^[41]通过研究 Cu(II)-TMPyP、Cu(II)-TMAP 和 Cu(II)-TSPP 等与 DNA 作用的循环伏安行为, 也证实了卟啉与 DNA 加合物的生成, 且可以从电流的大小说明加合物的匹配程度.

TMPyP 及其金属配合物能够通过嵌插、外部结合或外部堆积的方式与 DNA 有效地结合, 在可见光照射或者在还原/氧化剂存在的条件下可以裂解 DNA, 从而干扰基因正常运行, 抑制细胞增殖^[42]. 此外, TMPyP 及其金属配合物还可以稳定端粒 DNA 四链体, 抑制端粒酶活性, 从而抑制癌细胞生长^[22a].

根据 TMPyP 及其金属配合物与 DNA 之间的相互作用关系, TMPyP 及其金属配合物可以用来检测 DNA 的存在及其含量. Rodriiguez 等^[43]则用示差脉冲伏安法研究偏端霉素 A 与 Mn(III)-TMPyP 的相互作用和此化合物与 ct DNA 的相互作用. Mn(III)-TMPyP 中偏端霉素的加入引起 Mn(III)-TMPyP 的还原峰电流降低和峰电位的正迁移, 并利用此变化可检测 DNA 的存在. Diaz-Garcia 等^[44]在研究钼卟啉与双链 DNA 的相互作用时发现, 钼卟啉在 680 nm 处有一强的室温磷光发射, 得出钼卟啉可能插入到 DNA 中, 并提出运用钼卟啉的这种室温磷光来检测 DNA 的方法. 李南强等^[45]用循环伏安法、线性扫描法和计时库仑法与悬汞电极相结合研究了 Ni(II)-TMPyP. 在相应的实验条件下, Ni(II)-TMPyP 的还原包括 TMPyP 的 4e 还原. Ni(II)-TMPyP 与 DNA 相互作用可生成非电活性化合物 DNA-2(Ni(II)-TMPyP) 使得还原峰电流明显降低. 这表明, DNA 的加入会引起 Ni(II)-TMPyP 的浓度降低. 峰电流的降低与 DNA 浓度成正比, 据此可确定 DNA 的浓度.

Bard 等^[46]以电化学方法研究了 Mn(III)-TMPyP 和 Fe(III)-TMPyP 与 ct DNA 的相互作用, 观察在施加电位条件下, 这两种卟啉切割质粒 pBR322 DNA 的情况. Lambrechts 等^[47]发现三价阳离子卟啉 TriMPyP 对白色念珠菌等有很好的光灭活作用, 而带有两个正电荷的顺式和反式的二(*N*-甲基-吡啶基)-二苯基卟啉与 DNA 的结合能力不如带有四个正电荷的 TMPyP, 对 DNA 的切割能力较差^[14], 它们的钼离子配合物能通过嵌插和适度堆积的外部连接与 DNA 相互作用, 且在相同浓度下反式钼卟啉的非嵌插 DNA 光裂解能力比顺式钼卟啉的

嵌插 DNA 光裂解能力强很多, 这是由于它们不同的 DNA 连接模式引起不同的溶解氧接受能力导致的^[48]. 2007 年, Hirakawa 等^[49]研究二羟基磷(V)四苯基卟啉 (P(V)TPP) 与 DNA 的相互作用, 发现 P(V)TPP 诱导鸟嘌呤特异光氧化 DNA 主要通过单线态氧而不是通过能量转移 (图 3). 后来他们又发现三价阳离子卟啉 PyTriMPyP 和 AnTPyP 在光动力治疗中都不能单独产生单线态氧, 而与 DNA 结合相互作用后却能在生理 pH 值时就很好地产生单线态氧^[50]. Haeubl 等^[51]发现金属卟啉 Au(III)-TMPy₃Pyr₁P 能嵌插在 DNA 的富 A-T 和富 G-C 区域, 能在好氧条件下裂解质粒 DNA、寡聚核酸和氧化鸟嘌呤核苷、5'-dGMP, 并且即使在厌氧条件下也能氧化鸟嘌呤核苷和 5'-dGMP. 黄齐茂等^[52]研究了 β-[2-(6-吡啶溴化盐)己氧基]萘基-5,10,15,20-四苯基卟啉及其 Cu(II), Ni(II), Zn(II) 配合物作为光动力治疗光敏剂与 PBR322 质粒 DNA 的相互作用, 由于在卟啉的 β 位引入空间自由度相对较大的阳离子取代基, 不但改善了化合物的亲水性, 而且使其有机会与 DNA 的磷酸基团发生强烈的静电作用, 增强与 DNA 结合能力, 并对 EB 染色 DNA 体现明显的竞争抑制效应, 这种空间自由度也使卟啉大环有利于顺着 DNA 的双螺旋结构在 DNA 的外部自堆积, 使光敏剂对 DNA 体现较好的光敏切割效果. 2010 年, Karapetyan 等^[53]发现 Zn(II)-TOEPyP 和 Ag(I)-TOEPyP 的抗肿瘤能力比 Co(III)-TOEPyP 和 TOEPyP 的抗肿瘤能力强. 2011 年, Gunawardhana 等^[54]通过紫外可见、循环伏安法等研究 Rh(III)-Br₈TMPyP⁵⁺ 在抗坏血酸存在下催化 DNA 裂解的能力, 发现 Rh(III)-Br₈TMPyP⁵⁺ 能催化产生大量氢氧根用于裂解 DNA (0.01~0.1 μmol/L), 并且 Rh(III)-Br₈TMPyP⁵⁺ 裂解 DNA 的能力比其他金属卟啉来得高. 另外, 周翠松等^[55]合成了一种新型水溶性的阳离子卟啉 C₆₀-Por, 见图 4, 并利用凝胶电

图3 P(V)TPP 的能级和 P(V)TPP 光氧化 DNA 的机理图

Figure 3 Energy levels of P(V)TPP and the proposed mechanism of DNA damage photosensitized by P(V)TPP

图4 C₆₀-Por 的化学结构Figure 4 Chemical structure of C₆₀-Por

泳法证实了该卟啉-富勒烯分子具有超高 DNA 光剪切性能, 明显高于单独的卟啉分子或富勒烯分子的光剪切率, 甚至高于其他敏化剂的相关报道。

DNA 的 G-四链体结构被认为是包含于基因表达和端粒内环境稳定的规则之中的, 因此能够调整 G-四链体结构稳定性的小分子具有癌症治疗和预防衰老的治疗价值。卟啉芳香环平面与 G-四链体大小接近, 该类化合物能够通过其 G-四链体的堆积作用诱导并稳定 G-四链体结构, 通过改造 *meso*-位的侧链和引入不同金属离子, 可以调节卟啉对 G-四链体的亲和性和选择性^[3]。2006 年, 周翔小组^[56]报道了季铵盐类卟啉 TQMP, SPR 结果显示, 与 TMPyP 相比, 它对 G-四链体的选择性有了很大的提高。2007 年, Pratviel 小组^[57]报道了一种结合了锰金属的吡啶基卟啉, 它对 G-四链体与对双链 DNA 结合选择性高达 10000 倍, 是迄今为止发现的对 G-四链体 DNA 选择性最好的一种化合物。2009 年, 李灿课题组^[58]通过时间分辨(荧光)各向异性研究 TMPyP 与四种 G-四链体 (AG₃(T₂AG₃)₃, thrombin-binding aptamer (TBA), (G₄T₄G₄)₂ 和 (TG₄T₄)₄) 之间的相互作用, 发现这四种 G-四链体与 TMPyP 的作用强度顺序为 TBA > (TG₄T₄)₄ > AG₃(T₂AG₃)₃ > (G₄T₄G₄)₂; 而且 TBA 与 TMPyP 是通过一种新型三明治模式连接的, 通过末端 G-四集体和 T-T 碱基对堆积与卟啉 π - π 相互作用连接的。而 Gargallo 课题组^[59]的研究也发现 G-四链体与 TMPyP 之间存在两种键连模式: 包含末端堆积的强连接模式和外部环连接的弱连接模式。

(2) 铵基阳离子型

水溶性阳离子卟啉的第二大类是铵基卟啉, 常见的铵基取代基如图 5 所示。同样包含不同电荷数的不对称阳离子卟啉^[60]。

meso-四(4-三甲铵基苯基)卟啉(TMAP)作为一种阳离子卟啉, 具有与 TMPyP 类似的性质, 也可以与 DNA 很好的结合^[61]。但由于空间因素的影响, 不能以插入方式相互作用, 很可能以聚合体形式存在于 DNA 的分子表面^[22a,62]。而且卟啉的结构、卟啉与 DNA 的相对浓度

图5 阳离子卟啉的几种常见铵基取代基团

Figure 5 Some ammonium substituent groups of cationic porphyrins

决定了两者之间的结合方式。Marzilli 等^[29]采用粘度法、可见光谱及 CD 光谱研究了 CH₃CoTMAP 与 DNA 的相互作用, 发现 CH₃CoTMAP 与 DNA 作用是外部结合, 并以五配位的结构结合在 DNA 的富 AT 区。2009 年, 他们^[63]又合成系列金属磺胺卟啉, 并研究与 ct DNA 间的相互作用, 发现卟啉上取代基与卟啉环共平面是卟啉与 DNA 能否嵌插作用的一个重要因素。Bathaie 等^[64]采用分光光度法、荧光光谱法及 CD 光谱等方法发现, Fe(III)-(TMAP)OAc 在不同离子强度下与 DNA 的作用方式不同: 在高离子强度下的作用方式为外部结合; 在低离子强度下的作用方式为外部堆积。杜斌等^[35]研究发现, 在 $R > 1$ 时 ($R = C_{\text{TMAP}}/C_{\text{DNA}}$), TMAP 在 DNA 分子表面发生聚集, 吸收光谱有明显的减色效应, 卟啉的荧光被猝灭。随 DNA 浓度的增加, 在 $R < 1$ 时, TMAP 与 DNA 以外外部结合方式结合, 荧光得到增强, 共振光信号减弱。

袁雯等^[65]研究钯-*meso*-四(4-三甲铵基苯基)卟啉 (Pd(II)-TMAP) 荧光探针与 ct DNA 的相互作用发现, 卟啉大分子选择性地插入 DNA 的 G-C 碱基富集区, 由于 π - π 堆积或氢键相互作用, 引起激发波长和吸收波长红移。或者探针分子结合于 DNA 的浅沟槽处, 在过量 DNA 存在时, 探针通过自身所带电荷与 DNA 磷酸二酯结构的静电结合作用, 使卟啉探针部分暴露于极性水介质而引起激发波长蓝移。李改茹等^[66]同样利用室温磷光研究发现平均一个 Pd(II)-TMAP 分子与 4~5 个 DNA 碱基对相互作用时, DNA 表面的钯卟啉分子达到饱和, 之后随着卟啉量的增加, 卟啉分子开始聚集组装, 彼此相互作用导致激发光谱分裂; 并证实 Pd(II)-TMAP 与 DNA 分子间具有较高的亲和力, 主要通过沟区键合和静电相互作用结合于 ct DNA 链上。

目前, 铵基阳离子卟啉及金属卟啉在 DNA 中的应用研究主要集中在测定 DNA 含量方面。TMAP 在低离子强度下能在 DNA 表面进行长距组装, 并诱导 DNA 超螺旋结构的形成。长距组装使得 TMAP 的 Soret 带发生减色效应, 并使 Soert 带处激发产生的荧光被猝灭。体系离子强度(I)增大将降低 TMAP 长距组装的能力, 导致荧光猝灭程度降低, 在 $I = 0.004$ 时的荧光猝灭程度与 DNA 的浓度成线性关系, 可用于 $1.5 \times 10^{-6} \sim 9 \times 10^{-6}$ mol/L 的 ct DNA, $1.5 \times 10^{-6} \sim 10.5 \times 10^{-6}$ mol/L 鱼精子 DNA 的测定^[67]。而利用 TMAP 与 DNA 作用能产生增强的共振光散射信号, 并在 432 nm 附近产生特征吸收峰,

以此可以测定纳克级的核酸,其检出限比荧光猝灭法低一个数量级^[68]。此外,刘森等^[69]建立了 DNA 对 TMAP 荧光定量猝灭体系,研究了吡啶荧光光谱的特性以及 pH, DNA 变性时间和紫外光对体系荧光强度的影响,建立了一种定量检测 DNA 的方法,该方法线性范围为 0~5 $\mu\text{g/mL}$,检出限为 0.717 $\mu\text{g/mL}$ 。李南强等研究了 Cu(II)-TMAP 的电化学性质,首次报道了在汞电极上其与 DNA 的相互作用^[70]。Cu(II)-TMAP 的还原包括 Cu^{2+} 的 2e 还原和 TMAP 的 2e 还原。DNA 和 TMAP 反应生成了一种非电活性化合物,这导致了 Cu(II)-TMAP 还原峰电流的降低,并且峰电流的下降与 DNA 的浓度呈正比,因此,此电极可用来检测 DNA 的浓度。

另外,刘杰等^[71]合成了水溶性的 TMAP 及其金属吡啶 M-TMAP,其中 $\text{M}=\text{Zn(II)}, \text{Cu(II)}, \text{Fe(III)}, \text{Co(III)}, \text{Ni(II)}, \text{Mn(III)}$;研究了 TMAP 和 Zn(II)-TMAP 与小牛胸腺 DNA 的相互作用。结果表明, TMAP, Zn(II)-TMAP 与 DNA 相互作用使紫外-可见光谱发生了 8~12 nm 的红移,并出现了明显的减色效应。荧光光谱强度明显增大,吸收峰位发生变化。并以艾氏腹水癌(Ac)和肝癌(Hept)细胞为靶细胞,采用 MTT 染色法评价了吡啶及金属吡啶的抗癌活性,结果表明, Co(III)-TMAP 吡啶化合物表现出较高的抗肿瘤活性,一些吡啶化合物表现出中等的抗肿瘤活性,而 Cu(II)-TMAP, Ni(II)-TMAP 几乎没有活性。可见,吡啶及金属吡啶的抗肿瘤活性不仅与它们和 DNA 的相互作用的强弱及结合模式有关,而且可能与化合物的电位及金属离子的性质有关。

4.2 阴离子型

由于 DNA 具有带负电荷的磷酸链,因此带负电荷的阴离子吡啶不易和 DNA 相互作用。但近年来还是有一些关于阴离子吡啶与 DNA 相互作用的报道。Chatterjee 等^[72]发现一些含有羧基亚甲基氧基苯基的负电荷吡啶与 DNA 有较好的相互作用。Vicente 等^[73]则合成了带有四个负电荷的四-(4-巢型-碳硼烷基苯基)吡啶,并发现它在环内的 N 原子发生质子化后与 DNA 有较好的相互作用。Chen 等^[74]发现通过加入阳离子吡啶 TMPyP,可以与带负电的 TSPP 在 DNA 表面形成具有手性的二元聚集体,并且该二元聚集体的手性与两种吡啶的摩尔比以及与 DNA 的结合方式有关。Monajjemi 等^[75]发现 TSPP 有很强的电解效应, NaCl 浓度的提高将导致 TSPP 在 DNA 表面的自堆积。而 2003 年,李改茹等^[66b]采用室温磷光探针法发现,由于阴离子探针 Pd(II)-TSPP 带有负电荷,与 ct DNA 发生的主要是沟区键合,其与 DNA 的亲和能力远弱于 Pd(II)-TMAP。2010 年, Bhattacharya 等^[76]利用 FT-IR 发现四-(4-羧基苯基)吡啶(TCPP)与 ct DNA 的相互作用后, TCPP 中 $\text{C}=\text{O}$ 基团在 1615 cm^{-1} 处的吸收峰发生了明显的移动,变为 1580 cm^{-1} 。这一现象说明在两者之间形成了氢键,进一步确认了 TCPP 与 ct DNA 通过沟内结合方式而相互作用。黄承志等^[77]

将 TCPP 负载在碳纳米管上(图 6),发现染料标记的单链 DNA 与其相互作用会导致荧光猝灭;而双链 DNA 与其相互作用后其荧光仍然保留。这是因为单链 DNA 只是简单的吸附在 TCPP 负载的碳纳米管上,而双链 DNA 则是和 TCPP 负载的碳纳米管有着很强的静电斥力。

图 6 TCPP/碳纳米管悬浮液的扫描电子显微照片
Figure 6 SEM image of TCPP/MCNTs suspension

在 DNA 中应用的阴离子吡啶主要有 TSPP 和 TCPP。2001 年,彭小彬等^[78]提出 TSPP 能够在聚赖氨酸上进行聚集并形成超分子化合物,根据溶液的荧光光谱,这种溶液体系能快速准确地测定溶液中的 DNA 浓度,检测限可达 10^{-8} mol/L 。TSPP 是光动力学中有效的光敏剂,单线态氧的产率很高,能与肿瘤很好的结合,对癌细胞有很强的杀伤作用^[79]。然而,当 TSPP 浓度较高时,它的毒性阻碍了其在临床上的有效应用^[80]。在不破坏核酸有机结构的条件下, TCPP 也能与 DNA 作用并将其裂解,起到杀死癌细胞的作用^[65]。

此外,2005 年,陈志航等^[81]合成了一种新型的同时含有正负电荷的水溶性吡啶——5-(N-三甲基-4-氨基苯基)-10,15,20-三(4-磺酸基苯基)吡啶三铵盐,并研究了该化合物的一些生物活性。该化合物所带的正、负电荷可以有效地增加吡啶和 DNA 的相互作用。与带有四个负电荷的 TSPP 相比,它对 DNA 的切割有着明显的优越性。而且在酸性条件下,发生环内质子化所带上的正电荷也可以有效地增强吡啶和 DNA 的相互作用。此外,该化合物比 TSPP 有着更好的杀菌能力(大肠杆菌和伤寒杆菌)和相近的肿瘤杀灭效果。

4.3 非离子型

非离子型吡啶及金属吡啶则主要是通过吡啶大环与寡核苷、多肽或氨基酸等强极性分子结合,形成强极性化合物^[82],然后再与 DNA 相互作用。蒋小磊等^[83]合成了一种新型尾式金属吡啶,是一类通过柔性脂肪链将能与配体配位的基团连接在吡啶上的特殊吡啶,并证明了其与 ct DNA 通过嵌插结合的方式作用。2009 年,苏彦文等^[84]合成了四-[3-甲氧基-4-(N-吡啶)正丁氧基]吡啶(4C4-TPP)和四-[3-甲氧基-4-(N-吡啶)正己氧基]吡啶(4C6-TPP),两个结构相似但侧链不同的吡啶化合物,

并研究其与 ct DNA 之间的相互作用. 证实侧链基团对于卟啉与 DNA 作用的影响不是主要决定于其空间尺寸大小, 影响卟啉与 DNA 相互作用的重要因素是取代基的化学结构.

黄承志等^[62,85]报道了非离子型卟啉 *meso*-四(对羟基苯基)卟啉(THPP)与 DNA 的作用, 并发现在 pH 4.9~5.4 范围内, DNA 能与聚合态的 THPP 作用, 产生不规则的电子吸收光谱. 根据 459.0 nm 处的吸收峰可以测定 0.2~5.0 mg/L 的 ct DNA 和 0.2~6.0 mg/L 的鱼精子 DNA, 检测限分别达 0.02 和 0.03 mg/L, 10 倍量的 RNA 不干扰测定. 而韩木先等^[86]研究了 5-邻氯乙酰氧基苯基-10,15,20-三苯基卟啉与 DNA 的相互作用, 建立了一种通过荧光猝灭光谱法测定 DNA 含量的方法. 此外, 陆家政等^[87]证实了卟啉-荧光素二元化合物与 ct DNA 的结合模式为插入结合, 并探讨了卟啉-荧光素二元化合物体外清除活性氧自由基及抗氧化的作用, 并表明它能有效清除活性氧自由基, 对卵磷脂脂质的过氧化和 DNA 的氧化损伤有显著的抑制作用.

5 总结与展望

总之, 通过研究水溶性卟啉及金属卟啉和 DNA 之间的相互作用, 有助于从分子水平了解卟啉类药物的作用机理和构效关系, 为设计肿瘤新型诊疗药物提供有价值的信息. 水溶性卟啉及金属卟啉不仅可以用来测定 DNA 含量, 还可以用作 DNA 结构和动力学研究的探针, 为它们在医学上的应用提供了帮助. 虽然目前距水溶性卟啉及金属卟啉广泛用作药物治疗还有很多工作要做, 但是可以肯定, 随着研究的不断深入, 水溶性卟啉及金属卟啉在医学上的应用前景将越来越广阔.

作者简介

张现侠, 女, 1987 年生, 硕士研究生, 从事水溶性卟啉的合成及在生化方面的应用研究工作.

陈灿玉, 男, 博士, 助理研究员, 硕士生导师, 目前主要从事化学发光免疫检测技术、水溶性卟啉及金属卟啉的合成及其在生物医药等方面的应用研究工作.

References

- [1] Biesaga, M.; Pyrzyńska, K.; Trojanowicz, M. *Talanta* **2000**, *51*, 209.
- [2] Dabrowiak, J. C.; Ward, B.; Goodman, J. *Biochemistry* **1989**, *28*, 3314.
- [3] Wheelhouse, R. T.; Sun, T.; Han, H.; Han, F. X.; Hurley, L. H. *J. Am. Chem. Soc.* **1998**, *120*, 3261.
- [4] Uno, T.; Hamasaki, K.; Tanigawa, M.; Shimabayashi, S. *Inorg. Chem.* **1997**, *36*, 1676.
- [5] (a) Lauceri, R.; Campagna, T.; Contino, A.; Purrello, R. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1996**, *35*, 215; (b) Anantha, N. V.; Azam, M.; Sheardy, R. D. *Biochemistry* **1998**, *37*, 2709.
- [6] (a) Arthanari, H.; Basu, S.; Kawano, T. L.; Bolton, P. H. *Nucleic Acids Res.* **1998**, *26*, 3724; (b) Berlin, K.; Jain, R. K.; Simon, M. D.; Richert, C. J. *Org. Chem.* **1998**, *63*, 1527.
- [7] (a) Ding, L.; Etemad-Moghadam, G.; Meunier, B. *Biochemistry* **1990**, *29*, 7868; (b) Fiel, R. J.; Beerman, T. A.; Mark, E. H.; Datta-Gupta, N. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* **1982**, *107*, 1067; (c) Bernadou, J.; Pratiel, G.; Bennis, F.; Girardet, M.; Meunier, B. *Biochemistry* **1989**, *28*, 7268; (d) Pitié, M.; Pratiel, G.; Bernadou, J.; Meunier, B. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **1992**, *89*, 3967; (e) Huang, C. Z.; Li, K. A.; Tong, S. Y. *Anal. Chem.* **1996**, *68*, 2259.
- [8] (a) Psternack, R. F.; Gibbs, E. J.; Villafranca, J. J. *Biochemistry* **1983**, *22*, 5409; (b) Hudson, B. P.; Sou, J.; Berger, D. J.; McMillin, D. R. *J. Am. Chem. Soc.* **1992**, *114*, 8997.
- [9] (a) Dixon, D. W.; Schinazi, R.; Marzilli, L. G. *Ann. NY Acad. Sci.* **1990**, *616*, 511; (b) Sessler, J. L.; Cyr, M. J.; Lynch, V.; McGhee, E.; Ibers, J. A. *J. Am. Chem. Soc.* **1990**, *112*, 2810.
- [10] (a) Ward, B.; Skorobogaty, A.; Dabrowiak, J. C. *Biochemistry* **1986**, *25*, 6875; (b) Ward, B.; Skorobogaty, A.; Dabrowiak, J. C. *Biochemistry* **1986**, *25*, 7827; (c) Sari, M. A.; Battioni, J. P.; DuPre, D.; Mansuy, D.; Le Pecq, J. B. *Biochemistry* **1990**, *29*, 4205; (d) Zupán, K.; Herényi, L.; Tóth, K.; Majer, Z.; Csík, G. *Biochemistry* **2004**, *43*, 9151; (e) Hirakawa, K.; Kawanishi, S.; Hirano, T. *Chem. Res. Toxicol.* **2005**, *18*, 1545; (f) McMillin, D. R.; Shelton, A. H.; Bejune, S. A.; Fanwick, P. E.; Wall, R. K. *Coord. Chem. Rev.* **2005**, *249*, 1451; (g) Zupán, K.; Herényi, L.; Tóth, K.; Egyeki, M.; Csík, G. *Biochemistry* **2005**, *44*, 15000; (h) Shelton, A. H.; Rodger, A.; McMillin, D. R. *Biochemistry* **2007**, *46*, 9143; (i) Shan, B.; Deng, Z. Y.; Xie, J. H.; Deng, S. G. *Food Sci.* **2009**, *30*, 18. (单斌, 邓泽元, 谢建华, 邓胜国, 食品科学, **2009**, *30*, 18); (j) Ma, P. L.; Lavertu, M.; Winnik, F. M.; Buschmann, M. D. *Biomacromolecules* **2009**, *10*, 1490; (k) Zhang, G. W.; Fu, P.; Wang, L.; Hu, M. M. *J. Anal. Sci.* **2011**, *27*, 57. (张国文, 付鹏, 王琳, 胡明明, 分析科学学报, **2011**, *27*, 57); (l) Ramos, A. A.; Azqueta, A.; Pereira-Wilson, C.; Collins, A. R. *J. Agric. Food Chem.* **2010**, *58*, 7465.
- [11] (a) Pasternack, R. F.; Garrity, P.; Ehrlich, B.; Davis, C. B.; Gibbs, E. J.; Orloff, G.; Giartosio, A.; Turano, C. *Nucleic Acids Res.* **1986**, *14*, 5919; (b) Sehlstedt, U.; Kim, S. K.; Carter, P.; Goodman, J.; Voliano, J. F.; Norden, B.; Dabrowiak, J. C. *Biochemistry* **1994**, *33*, 417; (c) Neidle, S. *Principles of Nucleic Acid Structure*, Academic Press, London, **2007**, pp. 1~282.
- [12] Ananyan, G.; Avetisyan, A.; Aloyan, L.; Dalyan, Y. *Biophys. Chem.* **2011**, *156*, 96.
- [13] Fiel, R. J.; Howard, J. C.; Mark, E. H.; Datta-Gupta, N. *Nucleic Acids Res.* **1979**, *6*, 3093.
- [14] Munson, B. R.; Fiel, R. J. *Nucleic Acids Res.* **1992**, *20*, 1315.
- [15] (a) Pasternack, R. F.; Goldsmith, J. I.; Szép, S.; Gibbs, E. J. *Biophys. J.* **1998**, *75*, 1024; (b) Wu, S.; Li, Z.; Ren, L.; Chen, B.; Liang, F.; Zhou, X.; Jia, T.; Cao, X. *Bioorg. Med. Chem.* **2006**, *14*, 2956.
- [16] (a) Monaselidze, J.; Majagaladze, G.; Barbakadze, S.; Khachidze, D.; Gorgoshidze, M.; Kalandadze, Y.; Haroutunian, S.; Dalyan, Y.; Vardanyan, V. *J. Biomol. Struct. Dynamics* **2008**, *25*, 419; (b) Monaselidze, J. R.; Kiladze, M. T.; Gorgoshidze, M. Z.; Khachidze, D. G.; Bregadze, V. G.; Lomidze, E. M.; Lezhava, T. A. *J. Therm. Anal. Calorim.* **2012**, *108*, 127.
- [17] (a) James, B. R.; Meng, G. G.; Posakony, J. J.; Ravensbergen, J. A.; Ware, C. J.; Skov, K. A. *Metal-based Drugs* **1996**, *3*, 85; (b) Martinielli, A. L. C.; Villanova, M. G.; Roselino, A. M. F.; Figueiredo, J. F. C.; Passos, A. D. C.; Covas, D. T.; Zucoloto, S. *J. Clin. Gastroenterol.* **1999**, *29*, 327; (c) Ko, Y. J.; Yun, K. J.; Kang, M. S. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2007**, *17*, 2789.
- [18] (a) Neidle, S.; Waring, M. J. *Molecular Aspects of Anti-cancer Drug Action*, Vol. 1, Verlag Chemie GmbH, Weinheim, **1983**, pp. 1~404; (b) Pratiel, G.; Bernadou, J.; Meunier, B. *Metal Ions in Bio-*

- logical Systems, Vol. 33, Marcel Dekker Inc, New York, 1996, pp. 399~426; (c) Burger, R. M. *Chem. Rev.* **1998**, 98, 1153.
- [19] (a) Ding, L.; Balzarini, J.; Schols, D.; Meunier, B.; De Clercq, E. *Biochem. Pharmacol.* **1992**, 44, 1675; (b) Marzilli, L. G.; Petho, G.; Lin, M.; Kim, M. S.; Dixon, D. W. *J. Am. Chem. Soc.* **1992**, 114, 7575; (c) Onuki, J.; Ribas, A. V.; Medeiros, M. H. G.; Araki, K.; Toma, H. E.; Catalani, L. H.; Mascio, P. D. *Photochem. Photobiol.* **1996**, 63, 272; (d) Chatterjee, S. R.; Kamat, J. P.; Shetty, S. J.; Banerjee, S.; Srivastava, T. S.; Devasagayam, T. P. A. *Radiat. Phys. Chem.* **1997**, 49, 135; (e) Oleinick, N. L.; Evans, H. H. *Radiat. Res.* **1998**, 150, 146; (f) Granville, D. J.; McManus, B. M.; Hunt, D. W. *Histol. Histopathol.* **2001**, 16, 309.
- [20] (a) Batinić-Haberle, I.; Spasojević, I.; Stevens, R. D.; Hambright, P.; Fridovich, I. *J. Chem. Soc. Dalton Trans.* **2002**, 13, 2689; (b) Lee, Y. A.; Kim, J. O.; Cho, T. S.; Song, R.; Kim, S. K. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, 125, 8106; (c) Kim, J. O.; Lee, Y. A.; Yun, B. H.; Han, S. W.; Kwag, S. T.; Kim, S. K. *Biophys. J.* **2004**, 86, 1012; (d) Ohyama, T.; Mita, H.; Yamamoto, Y. *Biophys. Chem.* **2005**, 113, 53.
- [21] (a) Li, H.; Fedorova, O. S.; Grachev, A. N.; Trumble, W. R.; Bohach, G. A.; Czuchajowski, L. *Biochim. Biophys. Acta* **1997**, 1354, 252; (b) Han, G.; Yang, P. *J. Inorg. Biochem.* **2002**, 91, 230.
- [22] (a) Carvlin, M. J.; Fiel, R. J. *Nucleic Acids Res.* **1983**, 11, 6121; (b) Lee, S.; Lee, Y. A.; Lee, H. M.; Lee, J. Y.; Kim, D. H.; Kim, S. K. *Biophys. J.* **2002**, 83, 371.
- [23] (a) Lugo-Ponce, P.; McMillin, D. R. *Coord. Chem. Rev.* **2000**, 208, 169; (b) Bennett, M.; Krah, A.; Wien, F.; Garman, E.; McKenna, R.; Sanderson, M.; Neidle, S. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **2000**, 97, 9476; (c) Park, T. G.; Ko, J. H.; Ryoo, A. Y.; Kim, J. M.; Cho, D. W.; Kim, S. K. *Biochim. Biophys. Acta* **2006**, 1760, 388; (d) Jin, B.; Shin, J. S.; Bae, C. H.; Kim, J. M.; Kim, S. K. *Biochim. Biophys. Acta* **2006**, 1760, 993.
- [24] (a) Kelly, J. M.; Murphy, M. J.; McConnell, D. J.; OhUigin, C. *Nucleic Acids Res.* **1985**, 13, 167; (b) Ford, K.; Fox, K. R.; Neidle, S.; Waring, M. J. *Nucleic Acids Res.* **1987**, 15, 2221; (c) Strickland, J. A.; Marzilli, L. G.; Gay, K. M.; Wilson, W. D. *Biochemistry* **1988**, 27, 8870.
- [25] McKinnie, R. E.; Choi, J. D.; Bell, J. W.; Pasternack, R. F.; Gibbs, E. J. *J. Inorg. Biochem.* **1988**, 32, 207.
- [26] Pethö, G.; Elliott, N. B.; Kim, M. S.; Lin, M.; Dixon, D. W.; Marzilli, L. G. *J. Chem. Soc. Chem. Commun.* **1993**, 1547.
- [27] Terekhov, S. N.; Chirvony, V. S.; Galievsky, V. A.; Turpin, P. Y. *Makrogeterotsikly* **2011**, 4, 89.
- [28] Marzilli, L. G.; Banville, D. L.; Zon, G.; Wilson, W. D. *J. Am. Chem. Soc.* **1986**, 108, 4188.
- [29] Trommel, J. S.; Marzilli, L. G. *Inorg. Chem.* **2001**, 40, 4374.
- [30] (a) Yoon, M. J. *J. Chin. Chem. Soc. (Taiwan)*, **2009**, 56, 443; (b) Jeon, K. S.; Park, T. S.; Suh, Y. D.; Yoon, M. J. *Photochem. Photobiol., A: Chem.* **2009**, 207, 20.
- [31] Guliaev, A. B.; Leontis, N. B. *Biochemistry* **1999**, 38, 15425.
- [32] Lipscomb, L. A.; Zhou, F. X.; Presnell, S. R.; Woo, R. J.; Peek, M. E.; Plaskon, R. R.; Williams, L. D. *Biochemistry* **1996**, 35, 2818.
- [33] (a) Kang, J. W.; Wu, H. X.; Lu, X. Q.; Su, B. Q.; Zhuo, L. *Chem. J. Chin. Univ.* **2005**, 26, 997. (康敬万, 吴海霞, 卢小泉, 苏碧泉, 卓琳, 高等学校化学学报, **2005**, 26, 997.); (b) Kang, J.; Wu, H.; Lu, X.; Wang, Y.; Zhou, L. *Spectrochim. Acta, Part A: Mol. Biomol. Spectr.* **2005**, 61, 2041.
- [34] Wang, K.; Zhang, Z.; Guo, Q. N.; Bao, X. P.; Li, Z. Y. *Acta Chim. Sinica* **2007**, 65, 2597. (王凯, 张智, 郭茜妮, 鲍小平, 李早英, 化学学报, **2007**, 65, 2597.)
- [35] Ma, H. M.; Chen, X.; Sun, S. T.; Zhang, L. N.; Wu, D.; Zhu, P. H.; Li, Y.; Du, B.; Wei, Q. *Spectrosc. Spectr. Anal.* **2009**, 29, 423. (马洪敏, 陈欣, 孙舒婷, 张丽娜, 吴丹, 朱沛华, 李燕, 杜斌, 魏琴, 光谱学与光谱分析, **2009**, 29, 423.)
- [36] (a) Dezhampahan, H.; Bordbar, A.-K.; Tangestaninejad, S. *J. Iran. Chem. Soc.* **2009**, 6, 686; (b) Dezhampahan, H.; Bordbar, A. K.; Tangestaninejad, S. *Eur. J. Chem.* **2010**, 1, 307.
- [37] Dezhampahan, H.; Bordbar, A.-K.; Tangestaninejad, S. *J. Porphyr. Phthalocya.* **2009**, 13, 964.
- [38] Gandini, S. C. M.; Yushmanov, V. E.; Perussi, J. R.; Tabak, M.; Borrissevitch, I. E. *J. Inorg. Biochem.* **1999**, 73, 35.
- [39] Chinsky, L.; Turpin, P. Y.; Al-Obaidi, A. H. R.; Bell, S. E. J.; Hester, R. E. *J. Phys. Chem.* **1991**, 95, 5754.
- [40] Kruglik, S. G.; Mojzes, P.; Mizutani, Y.; Kitagawa, T.; Turpin, P. Y. *J. Phys. Chem. B* **2001**, 105, 5018.
- [41] Jiang, X.; Shang, L.; Wang, Y.; Dong, S. *Biomacromolecules* **2005**, 6, 3030.
- [42] (a) Vialas, C.; Pratviel, G.; Meunier, B. *Biochemistry* **2000**, 39, 9514; (b) Pandey, R. K.; Zheng, G. *In The Porphyrin Handbook*, Kadish, K. M.; Smith, K. M.; Guillard, R., Academic Press, New York, **2000**, 6, pp. 157~230; (c) Ishikawa, Y.; Yamashita, A.; Uno, T. *Chem. Pharm. Bull.* **2001**, 49, 287.
- [43] Rodriguez, M.; Bard, A. J. *Inorg. Chem.* **1992**, 31, 1129.
- [44] Diaz-Garcia, M. E.; Roza-Fernandez, M. *Proc. SPIE* **1995**, 2631, 29.
- [45] Qu, F.; Li, N. Q.; Jiang, Y. Y. *Talanta* **1998**, 45, 787.
- [46] Rodriguez, M.; Kodadek, T.; Torres, M.; Bard, A. J. *Bioconjugate Chem.* **1990**, 1, 123.
- [47] Lambrechts, S. A. G.; Aalders, M. C. G.; Van Marle, J. *Antimicrob. Agents Chemother.* **2005**, 49, 2026.
- [48] Zhu, X.-J.; Wang, P.; Leung, H. W.-C.; Wong, W.-K.; Wong, W.-Y.; Kwong, D. W.-J. *Chem. Eur. J.* **2011**, 17, 7041.
- [49] Hirakawa, K.; Kawanishi, S.; Hirano, T.; Segawa, H. *J. Photochem. Photobiol. B: Biol.* **2007**, 87, 209.
- [50] (a) Hirakawa, K.; Harada, M.; Okazaki, S.; Nosaka, Y. *Chem. Commun.* **2012**, 48, 4770; (b) Hirakawa, K.; Hirano, T.; Nishimura, Y.; Arai, T.; Nosaka, Y. *Photochem. Photobiol.* **2011**, 87, 833.
- [51] Haeubler, M.; Reith, L. M.; Gruber, B.; Karner, U.; Mueller, N.; Knoer, G.; Schoefberger, W. *J. Biol. Inorg. Chem.* **2009**, 14, 1037.
- [52] Huang, Q. M.; Deng, P. X.; Li, Z. Y.; Zhou, H.; Hu, X. L.; Pan, Z. Q. *Acta Chim. Sinica* **2010**, 68, 1070. (黄齐茂, 邓鹏星, 李志远, 周红, 胡学雷, 潘志权, 化学学报, **2010**, 68, 1070.)
- [53] Karapetyan, N. H.; Torosyan, L. V.; Ananyan, G. V.; Muradyan, R. E. *J. Porphyr. Phthalocya.* **2010**, 14, 349.
- [54] Gunawardhana, N.; Homi, S.; Tabata, M. *Catal. Lett.* **2011**, 141, 1803.
- [55] Zhou, C. S.; Liu, Q. L.; Xu, W.; Wang, C. R.; Fang, X. H. *Chem. Commun.* **2011**, 47, 2982.
- [56] Wang, P.; Ren, L. G.; He, H. P.; Liang, F.; Zhou, X.; Tan, Z. *Chem-BioChem* **2006**, 7, 1155.
- [57] Dixon, I. M.; Lopez, F.; Tejera, A. M.; Estève, J. P.; Blasco, M. A.; Pratviel, G.; Meunier, B. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, 129, 1502.
- [58] Jia, G. Q.; Feng, Z. C.; Wei, C. Y.; Zhou, J.; Wang, X. L.; Li, C. J. *Phys. Chem. B* **2009**, 113, 16237.
- [59] Manaye, S.; Eritja, R.; Avino, A.; Jaumot, J.; Gargallo, R. *Biochim. Biophys. Acta* **2012**, 1820, 1987.
- [60] Zhang, J. Y.; Wu, X. J.; Cao, X. P.; Yang, F.; Wang, J. F.; Zhou, X.; Zhang, X. L. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2003**, 13, 1097.
- [61] Bordbar, A. K.; Keshavarz, M.; Zare, K.; Aghaei, H. *Phys. Chem. Liq.* **2006**, 44, 457.
- [62] Huang, C. Z.; Li, K. A.; Tong, S. Y. *Chem. J. Chin. Univ.* **1997**, 18, 525. (黄承志, 李克安, 童沈阳, 高等学校化学学报, **1997**, 18, 525.)
- [63] Manono, J.; Marzilli, P. A.; Marzilli, L. G. *Inorg. Chem.* **2009**, 48, 5636.
- [64] Ghaderi, M.; Bathaie, S. Z.; Saboury, A. A.; Sharghi, H.; Tangestaninejad, S. *Int. J. Biol. Macromol.* **2007**, 41, 173.
- [65] Yuan, W.; Jin, W. J.; Dong, C. *Chem. J. Chin. Univ.* **2001**, 22, 922. (袁雯, 晋卫军, 董川, 高等学校化学学报, **2001**, 22, 922.)
- [66] (a) Jin, W. J.; Li, G. R. *J. Shanxi Univ.* **2002**, 25, 129. (晋卫军, 李改茹, 山西大学学报, **2002**, 25, 129.) (b) Li, G. R.; Jin, W. J. *J. Xinjiang Med. Univ.* **2003**, 26, 548. (李改茹, 晋卫军, 新疆医科大学学报, **2003**, 26, 548.)
- [67] Huang, C. Z.; Hu, X. L.; Liu, X. D.; Tong, S. Y. *J. Southwest Chin. Normal Univ.* **1997**, 22, 58. (黄承志, 胡小莉, 刘希东, 董沈阳, 西南师范大学学报, **1997**, 22, 58.)
- [68] Huang, C. Z.; Li, K. A.; Tong, S. Y. *Anal. Chem.* **1997**, 69, 514.
- [69] Liu, S.; Zhou, B. L.; Liu, L. H.; Deng, X. Y.; Li, L. *Mod. Sci. Instrum.* **2001**, (5), 44. (刘森, 周柏玲, 刘力宏, 邓晓燕, 李蕾, 现代科学仪器, **2001**, (5), 44.)
- [70] Qu, F.; Li, N. Q.; Jiang, Y. Y. *Microchem. J.* **1998**, 58, 39.
- [71] (a) Liu, J.; Xu, D. H.; Mei, W. J.; Pu, H. L.; Huang, J. W.; Ji, L. N. *Chem. J. Chin. Univ.* **2001**, 22, 1446. (刘杰, 许东晖, 梅文杰, 蒲含林, 黄锦汪, 计亮年, 高等学校化学学报, **2001**, 22, 1446.) (b) Liu, J.; Shi, S.; Ji, L. N.; Mei, W. J. *Transition Met. Chem.* **2005**, 30, 684.
- [72] Chatterjee, S. R.; Srivastava, T. S.; Kamat, J. P.; Devasagayam, T. P. A. *J. Porphyr. Phthalocya.* **1998**, 2, 337.
- [73] (a) Lauceri, R.; Purrello, R.; Shetty, S. J.; Vicente, M. G. H. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, 123, 5835; (b) Vicente, M. G. H.; Nurco, D. J.; Shetty, S. J.; Osterloh, J.; Ventre, E.; Deutsch, W. A. *J. Photochem. Photobiol. B* **2002**, 68, 123.

- [74] Chen, X. D.; Liu, M. H. *J. Inorg. Biochem.* **2003**, *94*, 106.
- [75] Monajjemi, M.; Aghaie, H.; Naderi, F. *Biochemistry* **2007**, *72*, 652.
- [76] Bhattacharya, S.; Mandal, G.; Ganguly, T. *J. Photochem. Photobiol. B: Biol.* **2010**, *101*, 89.
- [77] Huang, C. Z.; Liao, Q. G.; Li, Y. F. *Talanta* **2008**, *75*, 163.
- [78] Peng, X. B.; Liang, S. Q. *Prog. Chem.* **2001**, *13*, 360. (彭小彬, 梁世强, 化学进展, **2001**, *13*, 360.)
- [79] (a) Kessel, D.; Thompson, P.; Saatio, K.; Nantwi, K. D. *Photochem. Photobiol.* **1987**, *45*, 787; (b) Kessel, D.; Woodburn, K. *Int. J. Biochem.* **1993**, *25*, 1377; (c) Moan, J.; Iani, V.; Ma, L. W. *J. Photochem. Photobiol. B: Biol.* **1998**, *42*, 100; (d) Berg, K.; Prydz, K.; Moan, J. *Biochim. Biophys. Acta* **1993**, *1158*, 300.
- [80] (a) Sema, A. A.; Kennedy, J. C.; Blakeslee, D.; Robertson, D. M. *Can. J. Neurol. Sci.* **1981**, *8*, 105; (b) Winkelman, J. W.; Collins, G. H. *Photochem. Photobiol.* **1987**, *46*, 801.
- [81] Chen, Z. H.; Chen, B.; Lu, Z. X.; Pang, D. W.; Song, Y.; Ma, H. J.; Zhou, X.; Zhang, X. L.; Wu, X. J.; Du, Y. H. *Wuhan Univ. J. Nat. Sci.* **2005**, *10*, 587.
- [82] Martnie, P. F.; Catherine, V. B.; Eric, T.; Gilles, A. H.; Nathalie, B.; Alain, G. *Tetrahedron* **1996**, *52*, 13569.
- [83] Jiang, X. L.; Mei, W. J.; Liu, J.; Sun, D. D.; Zheng, W. J. *J. Guangdong Pharm. College* **2010**, *26*, 259. (蒋小磊, 梅文杰, 刘杰, 孙冬冬, 郑文杰, 广东药学院学报, **2010**, *26*, 259.)
- [84] Su, Y. W.; Wu, L.; Lu, M.; Wang, X. L.; Su, Y. B.; Li, Z. Q. *Acta Biophys. Sinica* **2009**, *25*, 405. (苏彦文, 吴雷, 吕明, 王雪丽, 苏彦斌, 李正强, 生物物理学报, **2009**, *25*, 405.)
- [85] Huang, C. Z.; Li, K. A.; Tong, S. Y. *Anal. Chem.* **1997**, *25*, 1052. (黄承志, 李克安, 童沈阳, 分析化学, **1997**, *25*, 1052.)
- [86] Han, M. X.; Li, X. F.; Zou, X. P. *Chin. J. Spectr. Lab.* **2011**, *28*, 1187. (韩木先, 李小芬, 邹欣平, 光谱实验室, **2011**, *28*, 1187.)
- [87] (a) Tao, M. L.; Zhou, X. Q.; Jing, M.; Liu, D. Z.; Xing, J. *Dyes Pigm.* **2007**, *75*, 408; (b) Lu, J. Z.; Du, Y. F.; Wei, G. F.; Li, Z. Z. *J. Guangdong Pharm. College* **2009**, *25*, 508. (陆家政, 杜一凡, 韦国锋, 李振中, 广东药学院学报, **2009**, *25*, 508.); (c) Lu, J. Z.; Du, Y. F.; Wu, B.; Huang, J. W.; Jiang, J. *Transition Met. Chem.* **2010**, *35*, 451.

(Lu, Y.)