铜催化 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚化合物与苯酚衍生物的串联醚化反应

耿浩兵^a 陈珊珊^a 孙玺^a 张袖丽^{*,a} 王磊^{*,b}

(^a 安徽农业大学 化学系 合肥 230036)

(^b 淮北师范大学 化学系 淮北 235000)

摘要 首次报道铜催化 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚类化合物与苯酚衍生物的串联醚化反应. 以 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚衍生物与苯酚类化合物为起始原料, 醋酸铜为催化剂、碳酸铯作为碱, 在 *N,N*-二甲基甲酰胺中通过一锅法合成了 24 个未见文献报道的 2-芳氧基苯并呋喃类化合物. 此合成方法具有原料易得、操作简便、分离纯化简单和无需昂贵配体等优点.

关键词 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚; 苯酚; 2-芳氧基苯并呋喃; 二芳醚; 串联反应

Copper-Catalyzed Tandem Etherification Reactions of 2-(2,2-Dibromovinyl)phenol Derivatives with Phenols

Geng, Haobing^a Chen, Shanshan^a Sun, Xi^a Zhang, Xiuli^{*,a} Wang, Lei^{*,b}

(^a Department of Chemistry, Anhui Agricultural University, Hefei 230036)

(^b Department of Chemistry, Huaibei Normal University, Huaibei 235000)

Abstract In this paper, copper-catalyzed tandem etherification reactions of 2-(2,2-dibromovinyl)phenol derivatives with phenols was developed. In the presence of copper acetate as catalyst and cesium carbonate as base, 2-(2,2-dibromovinyl)phenol derivatives reacted with phenols in *N,N*-dimethyl formamide to generate the corresponding 2-phenoxybenzofurans in good yields in one-pot via tandem etherification reactions under ligand-free reaction conditions. Many reaction parameters including bases, copper salts and solvents have been investigated. By screening of bases in the reaction, we found that cesium carbonate is the best one among the tested bases. Experiments shown that strong bases and weak bases, such as potassium hydroxide, potassium *t*-butoxide, potassium acetate and sodium acetate are unfavorable for this reaction. Some common copper catalysts were examined, and the results indicated that copper acetate exhibits the highest reactivity in the reaction. For this reaction, a divalent copper salt is better than a monovalent copper salt. However, CuO and Cu₂O gave the poor yield of the product. The solvent also plays a very important role in the reaction. We found that the optimum solvent is *N,N*-dimethyl formamide (DMF). Dimethyl sulfoxide, *N,N*-dimethylacetamide, and *N*-methylpyrrolidone also afforded good product yield. The further investigation revealed that the reaction temperature was one of the factors affecting the yield of the reaction. Scope of the substrate was studied and 24 new 2-aryloxybenzofuran compounds were synthesized in good yields. 2-(4-*tert*-Butylphenoxy)-5-chlorobenzofuran has the highest reaction yield in 94%. 4-(Benzofuran-2-yloxy)benzonitrile has the lower yield. Phenol containing an electron-withdrawing group on the benzene ring is difficult to perform the reaction. On the other hand, when an electron-donating group is introduced to 2-(2,2-dibromovinyl)phenol, such as 5-methoxy-, or 4-*t*-butyl-2-(2,2-dibromovinyl)phenol, the reaction was failed under the present reaction conditions. This method has several advantages including commercial availability of starting materials, simple operation, easy purification of products, and in the absence of ligand. This tandem reaction has the potential applications. It is important to note that the biological activity of the obtained 2-aryloxybenzofuran compounds will be further investigated and will be reported in due course.

Keywords 2-(2,2-dibromovinyl)phenol; phenols; 2-phenoxybenzofuran; diaryl ether; tandem reaction

1 引言

苯并呋喃类化合物是一类在自然界中广泛存在的天然有机化合物^[1~5], 它多样的生物活性和巨大的医药价值, 长期以来一直受到人们的关注^[6~9]. 作为杂环芳香化合物研究的热点之一, 已有大量此类化合物被发现

或被合成出来^[10~13]. 长期以来, 有限的天然来源严重限制了此类化合物的生物活性和药用价值的开发利用, 因此通过合成途径大量获得十分必要. 许多课题组致力于苯并呋喃类化合物的合成研究^[14]. 二芳醚化合物也是一类在天然产物中大量存在, 它具有多样的生物活性^[15], 也是重要的有机合成中间体. 二芳醚类化合物的

* E-mail: zhxiuli@163.com; leiwang@chnu.edu.cn

Received February 21, 2014; published April 15, 2014.

Supporting information for this article is available free of charge via the Internet at <http://sioc-journal.cn>.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21372095, 21172092) and Natural Key Project of Education Department, Anhui (No. KJ2013A122).

项目受国家自然科学基金(Nos. 21372095, 21172092)和安徽省教育厅自然科学基金重点项目(No. KJ2013A122)资助.

合成方法多样, 其中芳基卤化物与苯酚的乌尔曼偶联反应为合成二芳醚类化合物的经典方法之一^[16]。乌尔曼二芳醚合成反应的研究主要是对高反应活性配体的筛选^[17]。

鉴于苯并呋喃类化合物与二芳醚类化合物的生物活性, 通过逆合成分析对 2-芳氧基苯并呋喃类化合物的结构进行了剖析。2-芳氧基苯并呋喃可以被分解为 2-溴苯并呋喃与苯酚, 前者可以由 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚高效率的生成^[18]。根据 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚的成环偶联以及与酚的交叉偶联反应^[19,20]的相关文献的研究, 通过对影响 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚与苯酚衍生物反应的诸多条件如溶剂、温度、碱和催化剂等的研究, 发现在醋酸铜作为催化剂, 碳酸铯为碱的条件下, 在 *N,N*-二甲基甲酰胺中能成功催化 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚类化合物与苯酚衍生物的串联醚化反应, 生成 2-芳氧基苯并呋喃类化合物(图 1)。

图 1 铜催化 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚衍生物与苯酚的串联醚化反应
Figure 1 Copper-catalyzed tandem etherification reactions of 2-(2,2-dibromovinyl)phenol derivatives with phenols

2 结果与讨论

以 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚(**1a**)和苯酚(**2a**)作为模板反应, 对反应条件进行优化(表 1)。研究了温度、碱、铜催化剂和溶剂对反应的影响。

以 CuI (10% mol)为催化剂, K_2CO_3 (1.0 mmol)作为碱, 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚 (**1a**, 0.25 mmol)和苯酚(**2a**, 0.30 mmol)在 *N,N*-二甲基甲酰胺(DMF, 2.0 mL)中于 120 °C 下反应 14 h, 得到收率为 41%的 2-苯氧基苯并呋喃(**3a**) (表 1, Entry 1)。实验表明, 反应温度是影响反应收率的因素之一。当提高反应温度至 140 °C 时, 产率提高到 49% (表 1, Entry 2)。

考察了不同的碱对于反应收率的影响。结果表明 CS_2CO_3 是最好的选择, 有 58%的 **3a** 产品收率(表 1, Entry 3)。当使用更弱的碱 Na_2CO_3 时, 在紫外灯下的硅胶薄层板上仅能观测到产物的踪迹(表 1, Entry 4)。实验证明, 强碱对反应不利, 如 KOH 和 *t*-BuOK, 收率分别

为 27%和 46% (表 1, Entries 5 和 7)。有趣的是, 钠碱, 如 NaOH 和 *t*-BuONa, 仅能得到目标产物的踪迹(表 1, Entries 6 和 8)。使用弱碱 KOAc 和 NaOAc 时, 没有得到需要的目标产物(表 1, Entries 9 和 10)。

表 1 反应条件的优化

Table 1 Optimization of the reaction conditions^a

Entry	Base	Cu source	Solvent	Yield ^b /%
1 ^c	K_2CO_3	CuI	DMF	41
2	K_2CO_3	CuI	DMF	49
3	CS_2CO_3	CuI	DMF	58
4	Na_2CO_3	CuI	DMF	Trace
5	KOH	CuI	DMF	27
6	NaOH	CuI	DMF	Trace
7	KO <i>t</i> -Bu	CuI	DMF	46
8	NaO <i>t</i> -Bu	CuI	DMF	Trace
9	KOAc	CuI	DMF	N.R.
10	NaOAc	CuI	DMF	N.R.
11	CS_2CO_3	$Cu(OAc)_2$	DMF	81
12	CS_2CO_3	$CuCl_2$	DMF	68
13	CS_2CO_3	$CuBr_2$	DMF	63
14	CS_2CO_3	CuCl	DMF	56
15	CS_2CO_3	CuBr	DMF	52
16	CS_2CO_3	CuO	DMF	49
17	CS_2CO_3	Cu_2O	DMF	43
18	CS_2CO_3	$Cu(OH)_2$	DMF	65
19	CS_2CO_3	$Cu(NO_3)_2$	DMF	59
20	CS_2CO_3	$Cu(OAc)_2$	DMSO	68
21	CS_2CO_3	$Cu(OAc)_2$	DMAc	67
22	CS_2CO_3	$Cu(OAc)_2$	NMP	64
23 ^d	CS_2CO_3	$Cu(OAc)_2$	CH_3CN	Trace
24 ^d	CS_2CO_3	$Cu(OAc)_2$	THF	Trace
25 ^d	CS_2CO_3	$Cu(OAc)_2$	1,4-Dioxane	Trace
26 ^e	CS_2CO_3	$Cu(OAc)_2$	DMF	62
27 ^f	CS_2CO_3	$Cu(OAc)_2$	DMF	37

^a Reaction conditions: 2-(2,2-dibromovinyl)phenol (**1a**, 0.25 mmol), phenol (**2a**, 0.30 mmol), copper source (0.025 mmol), base (1.0 mmol) and solvent (2.0 mL) under air at 140 °C for 14 h; ^b isolated yield; ^c the reaction temperature was 120 °C; ^d the reaction temperature was 110 °C; ^e CS_2CO_3 (0.75 mmol); ^f CS_2CO_3 (0.50 mmol).

对一些常见的催化剂铜盐进行了筛选. 实验证明 $\text{Cu}(\text{OAc})_2$ 有最好的反应收率, 为 81% (表 1, Entry 11). 对于该体系, 一般二价铜盐的催化效果优于一价铜盐. CuCl_2 和 CuBr_2 都有好的反应收率, 产率分别为 68% 和 63% (表 1, Entries 12 和 13). 实验表明, CuCl_2 有着几乎和 $\text{Cu}(\text{OAc})_2$ 相当的反应收率. 而使用 CuCl 和 CuBr 时, 反应产率分别下降到 56% 和 52% (表 1, Entries 14 和 15). 其它的二价铜盐均有较好的反应收率, 如 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 和 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, 反应产率分别为 65% 和 59% (表 1, Entries 18 和 19). CuO 和 Cu_2O 的反应效果略差, 仅有 49% 和 43% 的反应收率 (表 1, Entries 16 和 17).

对于乌尔曼二芳醚合成反应, 溶剂起着相当重要的作用. 对于此类反应, 极性非质子性溶剂优于其它类型的溶剂. 对常用的极性非质子性溶剂做了筛选. 实验证明, N,N -二甲基甲酰胺优于其它溶剂, 二甲基亚砜、 N,N -二甲基乙酰胺和 N -甲基吡咯烷酮也有很好的反应收率 (表 1, Entries 20~22). 乙腈、四氢呋喃和 1,4-二氧六环的反应效果很差, 在紫外灯下的硅胶薄层板上仅能观测到产物的踪迹 (表 1, Entries 23 和 25). 试图降低 Cs_2CO_3 的用量, 发现低于 4 倍于底物 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚 (**1a**) 的用量, 产率达不到最佳 (表 1, Entries 26 和 27).

通过以上条件实验, 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚衍生物与苯酚类化合物的反应最优条件确定为: N,N -二甲基甲酰胺作为溶剂, $\text{Cu}(\text{OAc})_2$ (10 mol%) 为催化剂, Cs_2CO_3 (4.0 equiv.) 作为碱, 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚衍生物 (**1**, 1.0 mmol) 和苯酚类化合物 (**2**, 1.20 mmol), 在 140 °C 下反应 14 h.

在确定的最优反应条件下, 我们对反应的底物范围做了研究, 结果见表 2. 以 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚为反应底物, 首先对苯酚类化合物 (**2**) 的结构对串联反应的影响作了研究. 考察了 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚与邻位、间位和对位甲基苯酚的反应. 实验表明, 此反应体系对苯酚类化合物的位阻效应是敏感的. 邻甲基苯酚由于空间位阻阻碍了反应的进行, 使得反应收率降低 (表 2, Entry 4). 这类邻位位阻效应从邻氯苯酚也可以得到进一步的证实 (表 2, Entries 6 和 20). 其次, 也研究了酚类化合物的电子效应. 在苯酚类化合物的芳环的对位和间位引入供电子基团时, 如 $i\text{-Pr}$ 、 $t\text{-Bu}$ 、Me、Et 和 MeO 等, 该反应的收率明显提高 (表 2, Entries 2, 3, 8, 9, 18, 21 和 22). 而在芳环上引入吸电子基团时, 如 Cl 和强吸电子的 CN, 串联反应的产率分别下降为 79% 和 42% (表 2, Entries 5 和 10). 尤其是, 对硝基苯酚由于强吸电子硝基的存在, 产物 2-(4-硝基苯氧基)苯并呋喃在硅胶薄层板上仅能目测到些踪迹, 但是没有能分离出产物. 4-溴苯酚与 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚的串联反应效果稍差, 反应产率为 56% (表 2, Entry 7). β -萘酚可以得到 71% 收率的目标产物 **3k** (表 2, Entry 11).

表 2 反应底物的扩展

Table 2 The scope of the substrates

Entry	Product	3	Yield ^b /%
1		3a	81
2		3b	83
3		3c	78
4		3d	53
5		3e	79
6		3f	65
7		3g	56
8		3h	91

续表

Entry	Product	3	Yield ^b /%
9		3i	87
10		3j	42
11		3k	71
12		3l	84
13		3m	74
14		3n	86
15		3o	92
16		3p	88
17		3q	78
18		3r	94

续表

Entry	Product	3	Yield ^b /%
19		3s	82
20		3t	69
21		3u	85
22		3v	83
23		3w	73
24		3x	83
25		3y	0
26		3z	<10

^a Reaction conditions: 2-(2,2-dibromovinyl)phenol derivative (**1**, 0.50 mmol), phenol (**2**, 0.60 mmol), Cu(OAc)₂ (0.050 mmol), Cs₂CO₃ (2.0 mmol) and DMF (2.0 mL) under air at 140 °C for 14 h; ^b isolated yield.

尔后我们考察了 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚衍生物 (**1**) 的结构对反应的影响. 当 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚类化合物的芳环上连有吸电子基团时, 如 Cl 和 NO₂, 该串联反应的产物收率明显提高 (表 2, Entries 12 和 14). 当在 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚衍生物的芳环上引入两个卤素时, 反应收率提高更为显著; 同时也没有发现位于 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚衍生物的邻位取代基的位阻效应 (表 2, Entries 15 和 16). 1-(2,2-二溴乙烯基)- β -萘酚与苯酚发生串联反应得到 78% 收率的相应产物 (表 2, Entry

17). 其它底物的串联反应均取得较好的结果(表 2, Entries 13, 19, 23 和 24). 当在 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚类化合物的芳环引入供电子基团, 如 5-甲氧基和 4-叔丁基时, 在优化反应条件下该串联反应很难进行(表 2, Entries 25 和 26). 值得提及, 如果在反应体系中没有苯酚类底物存在下, 仅 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚反应可生成 2-溴苯并呋喃, 产率达 92%; 所得 2-溴苯并呋喃继续和苯酚在同样条件下生成 90%收率的 2-苯氧基苯并呋喃.

3 结论

本文报道了一种以 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚化合物与苯酚衍生物为起始原料, 通过一锅煮串联醚化反应合成 2-芳氧基苯并呋喃类化合物的方法. 以碳酸铯为碱, 醋酸铜为催化剂, 无任何配体的体系中, 在 140 °C 温度下, 在 *N,N*-二甲基甲酰胺中通过一锅煮实现 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚类化合物与苯酚衍生物的串联醚化反应, 合成 2-苯氧基苯并呋喃类化合物. 对影响该反应体系的诸多因素做了研究, 包括碱、铜盐和溶剂等. 对底物适用范围作了考察, 合成了 24 个未见文献报道的 2-芳氧基苯并呋喃类化合物. 该反应体系具有操作简便、原料易得、催化剂价廉及无需添加额外配体等优点, 使得此串联反应具有潜在的应用价值. 其制备的 2-苯氧基苯并呋喃类新化合物的生理活性在进一步的研究中.

4 实验部分

在 10 mL 反应管中依次加入 2-(2,2-二溴乙烯基)苯酚衍生物(**1**, 0.50 mmol)与苯酚类化合物(**2**, 0.60 mmol), 醋酸铜 (0.05 mmol), 碳酸铯(2.0 mmol), *N,N*-二甲基甲酰胺(2.0 mL), 旋紧旋塞, 置于油浴 140 °C 反应 14 h. 反应完毕后, 冷却至室温, 加入水, 用乙酸乙酯萃取, 合并有机相, 用无水硫酸镁干燥, 过滤, 减压浓缩除去溶剂, 以石油醚与乙酸乙酯按不同比例配制的淋洗剂进行柱层析分离, 得到目标产物 **3**, 用 ¹H NMR (400 MHz)、¹³C NMR (100 MHz)和高分辨质谱确定所得产物结构, 表征数据如下.

2-Phenoxybenzofuran (**3a**): ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 7.48~7.40 (m, 4H), 7.26~7.22 (m, 5H), 5.86 (s, 1H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 160.08, 155.66, 149.58, 129.89, 128.91, 124.83, 123.21, 122.80, 120.04, 118.23, 110.74, 83.95. HRMS (ESI) ([M+H]⁺) calcd for C₁₅H₁₃O₂: 211.0759, found 211.0761.

2-(*p*-Tolyloxy)benzofuran (**3b**): ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 7.44~7.39 (m, 2H), 7.23~7.19 (m, 4H), 7.13~7.10 (m, 2H), 5.77 (s, 1H), 2.39 (s, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 160.73, 153.33, 149.48, 134.58, 130.32, 129.02, 123.14, 122.57, 119.87, 118.31, 110.66, 83.03, 20.77. HRMS (ESI) ([M+H]⁺) calcd for C₁₅H₁₃O₂: 225.0916, found 225.0914.

2-(*m*-Tolyloxy)benzofuran (**3c**): ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 7.45~7.39 (m, 2H), 7.30~7.22 (m, 3H), 7.04~7.02 (m, 3H), 5.84 (s, 1H), 2.38 (s, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 160.05, 155.49, 149.42, 140.09, 129.46, 128.83, 125.49, 123.05, 122.59, 119.87, 118.66, 115.09, 110.62, 83.75, 21.29. HRMS (ESI) ([M+H]⁺) calcd for C₁₅H₁₃O₂: 225.0916, found 225.0913.

2-(*o*-Tolyloxy)benzofuran (**3d**): ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 7.41~7.39 (m, 2H), 7.31~7.29 (m, 1H), 7.25~7.17 (m, 4H), 7.15~7.13 (m, 1H), 5.61 (s, 1H), 2.37 (s, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 160.97, 153.38, 149.44, 131.64, 129.20, 129.15, 127.25, 125.32, 123.14, 122.38, 119.71, 118.82, 110.59, 81.86, 15.85. HRMS (ESI) ([M+H]⁺) calcd for C₁₅H₁₃O₂: 225.0916, found 225.0913.

2-(4-Chlorophenoxy)benzofuran (**3e**): ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 7.49~7.40 (m, 2H), 7.37 (d, *J*=8.8 Hz, 2H), 7.27~7.24 (m, 2H), 7.14 (d, *J*=8.8 Hz, 2H), 5.89 (s, 1H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 159.44, 154.25, 149.62, 129.98, 129.89, 128.67, 123.34, 123.08, 120.20, 119.47, 110.80, 84.52. HRMS (ESI) ([M+H]⁺) calcd for C₁₄H₁₀ClO₂: 245.0369, found 245.0372.

2-(2-Chlorophenoxy)benzofuran (**3f**): ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 7.50 (d, *J*=8.0 Hz, 1H), 7.45~7.39 (m, 2H), 7.31~7.28 (m, 1H), 7.24~7.18 (m, 4H), 5.79 (s, 1H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 159.40, 150.92, 149.47, 130.87, 128.66, 127.92, 125.97, 125.05, 123.18, 122.77, 119.98, 110.67, 83.46. HRMS (ESI) ([M+H]⁺) calcd for C₁₄H₁₀ClO₂: 245.0369, found 245.0366.

2-(4-Bromophenoxy)benzofuran (**3g**): ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 7.50 (d, *J*=8.8 Hz, 2H), 7.48~7.39 (m, 2H), 7.25~7.23 (m, 2H), 7.07 (d, *J*=8.4 Hz, 2H), 5.88 (s, 1H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 159.13, 154.69, 149.48, 132.75, 128.50, 123.21, 122.99, 120.10, 119.72, 117.33, 110.69, 84.56. HRMS (ESI) ([M+H]⁺) calcd for C₁₄H₁₀BrO₂: 288.9864, found 288.9867.

2-(4-*tert*-Butylphenoxy)benzofuran (**3h**): ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 7.49~7.43 (m, 4H), 7.27~7.25 (m, 2H), 7.20~7.18 (m, 2H), 5.85 (s, 1H), 1.41 (s, 9H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 160.63, 153.29, 149.56, 147.86, 129.07, 126.74, 123.19, 122.64, 119.96, 117.87, 110.71, 83.33, 34.48, 31.51. HRMS (ESI) ([M+H]⁺) calcd for C₁₈H₁₉O₂: 267.1385, found 267.1386.

2-(4-Methoxyphenoxy)benzofuran (**3i**): ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 7.43~7.39 (m, 2H), 7.23~7.18 (m, 4H), 6.94 (d, *J*=9.0 Hz, 2H), 5.69 (s, 1H), 3.84 (s, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 161.56, 156.88, 149.42, 148.88, 129.10, 123.17, 122.45, 119.98, 119.79, 114.86, 110.61, 82.01, 55.68. HRMS (ESI) ([M+H]⁺) calcd. for

$C_{15}H_{13}O_3$: 241.0865, found 241.0868.

4-(Benzofuran-2-yloxy)benzonitrile (**3j**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.68 (d, $J=8.6$ Hz, 2H), 7.53~7.51 (m, 1H), 7.42~7.39 (m, 1H), 7.29~7.27 (m, 2H), 7.21 (d, $J=8.6$ Hz, 2H), 6.11 (s, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 159.19, 156.91, 149.74, 134.14, 128.06, 123.66, 123.43, 120.53, 118.17, 117.81, 110.88, 107.93, 87.24. HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd for $C_{15}H_{10}NO_2$: 236.0712, found 236.0708.

2-(Naphthalen-2-yloxy)benzofuran (**3k**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.90~7.86 (m, 2H), 7.79~7.77 (m, 1H), 7.57~7.56 (m, 1H), 7.53~7.46 (m, 3H), 7.43~7.38 (m, 2H), 7.25~7.23 (m, 1H), 5.91 (s, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 159.91, 153.22, 149.51, 133.88, 130.77, 130.00, 128.77, 127.70, 127.31, 126.74, 125.32, 123.11, 122.74, 119.97, 118.49, 114.03, 110.68, 84.16. HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd for $C_{18}H_{13}O_2$: 261.0916, found 261.0918.

5-Chloro-2-phenoxybenzofuran (**3l**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.45~7.39 (m, 3H), 7.31~7.16 (m, 5H), 5.74 (s, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 161.37, 155.18, 147.80, 130.35, 129.99, 128.20, 125.23, 122.80, 119.64, 118.53, 111.67, 83.09. HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd for $C_{14}H_{10}ClO_2$: 245.0369, found 245.0366.

5-Bromo-2-phenoxybenzofuran (**3m**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.55~7.54 (m, 1H), 7.44~7.39 (m, 2H), 7.32~7.29 (m, 1H), 7.26~7.23 (m, 2H), 7.21~7.19 (m, 2H), 5.73 (s, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 161.21, 155.15, 148.17, 130.91, 129.97, 125.52, 125.21, 122.59, 118.51, 116.28, 112.14, 82.88. HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd for $C_{14}H_{10}BrO_2$: 288.9864, found 288.9867.

5-Nitro-2-phenoxybenzofuran (**3n**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 8.33~8.32 (m, 1H), 8.16~8.13 (m, 1H), 7.47~7.43 (m, 3H), 7.31~7.29 (m, 1H), 7.25~7.23 (m, 2H), 5.84 (s, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 162.77, 154.51, 152.25, 144.41, 130.03, 129.44, 125.66, 118.71, 118.55, 115.89, 110.78, 83.04. HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd for $C_{14}H_{10}NO_4$: 256.0610, found 256.0608.

5,7-Dichloro-2-phenoxybenzofuran (**3o**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.46~7.42 (m, 2H), 7.29~7.19 (m, 5H), 5.71 (s, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 161.95, 154.71, 143.69, 131.15, 129.98, 128.93, 125.47, 122.70, 118.59, 118.11, 116.50, 83.08. HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd for $C_{14}H_9Cl_2O_2$: 278.9980, found 278.9985.

5,7-Dibromo-2-phenoxybenzofuran (**3p**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.48~7.41 (m, 4H), 7.29~7.22 (m, 3H), 5.72 (s, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 161.78, 154.66, 145.52, 131.43, 129.99, 127.78, 125.50, 121.60,

118.63, 116.34, 103.86, 82.88. HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd for $C_{14}H_9Br_2O_2$: 366.8969, found 366.8967.

2-Phenoxynaphtho[1,2-b]furan (**3q**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 8.33 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.97 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.79 (d, $J=9.0$ Hz, 1H), 7.66 (d, $J=9.0$ Hz, 1H), 7.62 (s, 1H), 7.55~7.49 (m, 2H), 7.40~7.36 (m, 2H), 7.27~7.22 (m, 2H), 7.17~7.13 (m, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 157.88, 151.75, 142.41, 131.95, 130.30, 129.81, 128.39, 127.10, 126.55, 126.26, 124.68, 123.90, 123.24, 116.81, 116.05, 112.80. HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd. for $C_{18}H_{13}O_2$: 261.0916, found 261.0913.

2-(4-*tert*-Butylphenoxy)-5-chlorobenzofuran (**3r**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.45 (d, $J=8.6$ Hz, 2H), 7.40~7.39 (m, 1H), 7.31~7.29 (m, 1H), 7.19~7.16 (m, 3H), 5.72 (s, 1H), 1.39 (s, 9H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 161.88, 152.78, 148.29, 147.76, 130.51, 128.77, 126.83, 122.62, 119.53, 118.15, 111.61, 82.48, 34.50, 31.47. HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd for $C_{18}H_{18}ClO_2$: 301.0995, found 301.0998.

5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)benzofuran (**3s**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.44~7.39 (m, 3H), 7.31~7.29 (m, 1H), 7.25~7.15 (m, 3H), 5.74 (s, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 161.35, 155.16, 147.79, 130.33, 129.97, 128.79, 125.21, 122.78, 119.61, 118.52, 111.66, 83.06. HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd for $C_{14}H_9Cl_2O_2$: 278.9980, found 278.9977.

5-Chloro-2-(2-chlorophenoxy)benzofuran (**3t**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.52~7.50 (m, 1H), 7.38~7.37 (m, 1H), 7.32~7.29 (m, 2H), 7.25~7.22 (m, 2H), 7.18~7.16 (m, 1H), 5.67 (s, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 160.75, 150.55, 147.82, 131.08, 130.22, 128.91, 128.14, 126.50, 125.45, 122.90, 120.55, 119.70, 111.74, 82.71. HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd for $C_{14}H_9Cl_2O_2$: 278.9980, found 278.9977.

2-(4-*iso*-Propylphenoxy)benzofuran (**3u**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.46~7.39 (m, 2H), 7.26 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.24~7.22 (m, 2H), 7.15 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 5.80 (s, 1H), 2.99~2.93 (m, 1H), 1.29 (d, $J=6.8$ Hz, 6H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 160.67, 153.51, 149.51, 145.57, 129.04, 127.72, 123.14, 122.59, 119.90, 118.23, 110.67, 83.20, 33.57, 24.10. HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd for $C_{17}H_{17}O_2$: 253.1229, found 253.1233.

2-(4-Ethylphenoxy)benzofuran (**3v**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.44~7.39 (m, 2H), 7.24~7.21 (m, 4H), 7.15~7.13 (m, 2H), 5.78 (s, 1H), 2.68 (q, $J=7.6$ Hz, 2H), 1.27 (t, $J=7.6$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 160.70, 153.47, 149.49, 140.95, 129.13, 127.63, 123.13, 122.57, 119.88, 118.30, 110.66, 83.11, 28.21, 15.67.

HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd for $C_{16}H_{15}O_2$: 239.1072, found 239.1068.

2-(4-Chloro-3-methylphenoxy)benzofuran (**3w**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.49~7.47 (m, 1H), 7.43~7.41 (m, 1H), 7.36 (d, $J=8.6$ Hz, 1H), 7.27~7.25 (m, 2H), 7.10~7.09 (m, 1H), 7.01~6.98 (m, 1H), 5.88 (s, 1H), 2.41 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 159.69, 154.05, 149.61, 137.94, 130.16, 130.13, 128.77, 123.30, 122.97, 120.50, 120.15, 116.87, 110.80, 84.32, 20.29. HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd for $C_{15}H_{12}ClO_2$: 259.0526, found 259.0527.

5-Chloro-2-(*m*-tolylloxy)benzofuran (**3x**): 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.39 (d, $J=2.0$ Hz, 1H), 7.32~7.28 (m, 2H), 7.18~7.16 (m, 1H), 7.07~7.01 (m, 3H), 5.73 (s, 1H), 2.40 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 161.50, 155.15, 147.78, 140.33, 130.41, 129.66, 128.76, 126.00, 122.71, 119.58, 119.11, 115.49, 111.65, 82.98, 21.38. HRMS (ESI) ($[M+H]^+$) calcd for $C_{15}H_{12}ClO_2$: 259.0526, found 259.0523.

References

- [1] Hu, X.; Wu, J.-W.; Wang, M.; Yu, M.-H.; Zhao, Q.-S.; Wang, H.-Y.; Hou, A.-J. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 82.
- [2] Liu, Y. H.; Kubo, M. K.; Fukuyama, Y. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 2152.
- [3] Wu, S.-F.; Chang, F.-R.; Wang, S.-Y.; Hwang, T.-L.; Lee, C.-L.; Chen, S.-L.; Wu, C.-C.; Wu, Y.-C. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 989.
- [4] Coy-Barrera, E. D.; Cuca-Suárez, L. E.; Sefkow, M. *Phytochemistry* **2009**, *70*, 1309.
- [5] Li, Y.-P.; Dong, L.-B.; Chen, D.-Z.; Li, H.-M.; Zhong, J.-D.; Li, F.; Liu, X.; Wang, B.; Li, R.-T. *Phytochem. Lett.* **2013**, *6*, 281.
- [6] He, Y.-T.; Xu, J.; Yu, Z.-H.; Gunawan, A.-M.; Wu, L.; Wang, L.; Zhang, Z.-Y. *J. Med. Chem.* **2013**, *56*, 832.
- [7] (a) Telvekar, V. N.; Belubbi, A.; Bairwa, V. K.; Satardekar, K. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2012**, *22*, 2343. (b) Ryu, C.-K.; Song, A.-L.; Lee, J.-Y.; Hong, J.-A.; Yoon, J.-H.; Kim, A. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2010**, *20*, 6777. (c) Sidhu, P. S.; AbdelAziz, M. H.; Sarkar, A.; Mehta, A. Y.; Zhou, Q. B.; Desai, U. R. *J. Med. Chem.* **2013**, *56*, 5059.
- [8] He, Y. T.; Xu, J.; Yu, Z.-H.; Gunawan, A. M.; Wu, L.; Wang, L.; Zhang, Z.-Y. *J. Med. Chem.* **2013**, *56*, 832.
- [9] Gunosewoyo, H.; Midzak, A.; Gaisina, I. N.; Sabath, E. V.; Fedolak, A.; Hanania, T.; Brunner, D.; Papadopoulos, V.; Kozikowski, A. P. *J. Med. Chem.* **2013**, *56*, 5115.
- [10] Millot, M.; Kaouadji, M.; Champavier, Y.; Gamond, A.; Simon, A.; Chulia, A. *J. Phytochem. Lett.* **2013**, *6*, 31.
- [11] (a) Schneider, B. *Phytochemistry* **2003**, *64*, 459. (b) Akgul, Y. Y.; Anil, H. *Phytochemistry* **2003**, *63*, 939.
- [12] Liu, Z.-X.; Xia, Y.; Zhou, S.-Y.; Wang, L.; Zhang, Y.; Wang, J.-B. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 5032.
- [13] (a) Yuan, H.; Bi, K.-J.; Li, B.; Yue, R.-C.; Ye, J.; Shen, Y.-H.; Jin, H.-Z.; Sun, Q.-Y.; Zhang, W.-D. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 4742. (b) Qi, J.-P.; Cao, D.-R. *Acta Chim. Sinica* **2010**, *68*, 2019. (c) 金萍, 曹德榕, 化学学报, **2010**, *68*, 2019. (d) Zhao, Y.-H.; Liu, W.-J.; Sun, X.-W.; Lin, G.-Q. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, *32*, 1919. (e) 赵云辉, 刘文杰, 孙兴文, 林国强, 有机化学, **2012**, *32*, 1919. (f) Gao, W.-T.; Jiang, Y.; Li, Y.; Li, F.; Yan, Y. *Chin. J. Chem.* **2012**, *30*, 822. (g) Fang, H.-B.; Jin, L.; Huang, N.-Y.; Wang, J.-Z.; Zou, K.; Luo, Z.-G. *Chin. J. Chem.* **2013**, *31*, 831. (h) Zhu, C.-L.; Yang, L.-J.; Nie, J.; Zheng, Y.; Ma, J.-A. *Chin. J. Chem.* **2012**, *30*, 2693. (i) Jin, Q.; Xin, M.-H.; Cong, X.; You, D.-Q. *Chin. J. Org. Chem.* **2013**, *33*, 590. (j) 金秋, 辛敏行, 丛欣, 尤启冬, 有机化学, **2013**, *33*, 590.
- [14] (a) Anxionnat, B.; Pardo, D. G.; Ricci, G.; Rossen, K.; Cossy, J. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 3876. (b) Yamaguchi, M.; Katsumata, H.; Manabe, K. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 9270. (c) Kuram, M. R.; Bhanuchandra, M.; Sahoo, A. K. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 4607. (d) Zeng, W.; Wu, W.-Q.; Jiang, H.-F.; Huang, L.-B.; Sun, Y.-D.; Chen, Z.-W.; Li, X.-W. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 6611. (e) Zhu, R.-Y.; Wei, J.-B.; Shi, Z.-J. *Chem. Sci.* **2013**, *4*, 3706. (f) Liu, J.-M.; Zhang, N.-F.; Yue, Y.-Y.; Wang, D.; Zhang, Y. L.; Zhang, X.; Zhuo, K.-L. *RSC Advance* **2013**, *3*, 3865. (g) Zhou, L.; Shi, Y.; Xiao, Q.; Liu, Y.-Z.; Ye, F.; Zhang, Y.; Wang, J.-B. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 968.
- [15] (a) Delfin, D. A.; Morgan, R. E.; Zhu, X. H.; Werbovetz, K. A. *Bioorg. Med. Chem.* **2009**, *17*, 820. (b) Bryant, V. C.; Kumar, K.; Nyong, A. M.; Natarajan, A. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2012**, *22*, 245. (c) Asakawa, Y. A.; Ludwiczuk, A.; Nagashima, F. *Phytochemistry* **2013**, *91*, 52. (d) Lv, J.-J.; Xu, M.; Wang, D.; Zhu, H. T.; Yang, C.-R.; Wang, Y. F.; Li, Y.; Zhang, Y.-J. *J. Nat. Prod.* **2013**, *76*, 926.
- [16] (a) Ullmann, F.; Sponagel, P. *Chem. Ber.* **1905**, *38*, 2211. (b) Monnier, F.; Taillefer, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 6954.
- [17] (a) Ma, D.-W.; Cai, Q. *Org. Lett.* **2003**, *5*, 3799. (b) Salih, M. Q.; Beaudry, C. M. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 4540. (c) Uchiro, H.; Kato, R.; Arai, Y.; Hasegawa, M.; Kobayakawa, Y. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 6268. (d) Niu, J.-J.; Zhou, H.; Li, Z.-G.; Xu, J.-W.; Hu, S. J. *J. Org. Chem.* **2008**, *73*, 7814. (e) Collins, J. C.; Farley, K. A.; Limberakis, C.; Liras, S.; Price, D.; James, K. *J. Org. Chem.* **2012**, *77*, 11079.
- [18] (a) Chen, W.; Zhang, Y.-C.; Zhang, L.; Wang, M.; Wang, L. *Chem. Commun.* **2011**, *47*, 10476. (b) Ji, Y.; Li, P.-H.; Zhang, X.-L.; Wang, L. *Org. Biomol. Chem.* **2013**, *11*, 4095.
- [19] Xia, Z.-M.; Wang, K.; Zheng, J.-N.; Ma, Z.-Y.; Jiang, Z.-G.; Wang, X.-X.; Lv, X. *Org. Biomol. Chem.* **2012**, *10*, 1602.
- [20] Jouvin, K.; Bayle, A.; Legrand, F.; Evano, G. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 1652.
- [21] Newman, S. G.; Aureggi, A.; Bryan, C. S.; Lautens, M. *Chem. Commun.* **2009**, 5236.

(Cheng, F.)