通过基于多肽酰肼的化学连接反应合成高张力环状四肽

刘涵 李学臣*

(香港大学化学系)

摘要 刘磊课题组采用其发展的基于多肽酰肼的化学连接反应, 成功合成了一系列高张力环状四肽分子. 多肽酰肼在温和氧化条件下活化多肽酰肼叠氮中间体, 随后与 4-巯基苯乙酸形成硫酯, 进而经由分子内天然化学连接反应得到环状四肽. 通过后续的自由基脱硫反应, 可得到连接位点为丙氨酸的产物.

关键词 化学连接; 多肽酰肼; 环状四肽; 自由基脱硫

Synthesis of Highly-strained Cyclic Tetrapeptides via Peptide Hydrazide Based Ligation

Liu, Han Li, Xuechen*

(Department of Chemistry, The University of Hong Kong)

Abstract A series of highly-strained cyclic tetrapeptides were efficiently synthesized via peptide hydrazide based ligation, reported by Liu *et al.* Upon mild oxidative activation, the peptide hydrazide was transformed into a highly active peptide azide intermediate and then *in situ* converted into a peptide 4-mercaptophenylacetic acid (MPAA) thiol ester, which underwent native chemical ligation (NCL)-mediated cyclization to afford the desired cyclic tetrapeptides. After radical desulfurization, the product with alanine residue at the ligation site can be obtained.

Keywords chemical ligation; peptide hydrazide; cyclic tetrapeptide; radical desulfurization

作为有机化学和化学生物学的重要组成部分, 蛋白质与多肽的合成在过去的数十年中一直是合成化学家研究的热点领域^[1]. 随着 20 世纪 90 年代天然化学连接 (Native chemical ligation) 反应的出现^[2], 该领域出现了长足的进步. 具有更大长度和复杂翻译后修饰的多肽/

蛋白质被合成并应用于相关生物学研究. 与此同时, 通过分子内天然化学连接反应, 众多环肽与环状蛋白分子被成功合成^[3]. 作为天然化学连接的底物, 多肽硫酯的有效制备是该反应成功应用的重要前提, 因此成为蛋白质合成化学的一个研究热点.

图 1 基于多肽酰肼的化学连接反应

Figure 1 Chemical ligation based on peptide hydrazide

* E-mail: xuechenl@hku.hk

Received November 27, 2014; published December 1, 2014.

近年来,清华大学的刘磊课题组利用多肽酰肼作为活性硫酯制备前体,发展了新型多肽化学连接反应(图1)^[4-7]. 经由固相合成得到的 C-端多肽酰肼片段,在温和的低温氧化条件下转化为多肽酰基叠氮中间体,进而在中性 pH 条件下与 MPAA 原位形成高反应活性多肽硫酯. 此硫酯中间体与 N-端为半胱氨酸残基的多肽片段发生化学连接反应,得到连接位点为酰胺键的目标产物. 该方法具有反应效率高,侧链官能团相容性好, C-端残基不发生消旋等优点,且反应前体易于制备. 该课题组将此方法相继应用于 Trifolitoxin^[4], CsslI^[4], RpS25^[5], α -Synuclein^[6]等蛋白的全合成,充分展示了其良好的发展前景.

作为链状体系的拓展,当多肽酰基叠氮中间体的

N-端残基为半胱氨酸时,可发生分子内的化学连接反应,得到环肽产物^[7]. 在类型众多的环肽分子中,环状四肽作为天然存在的活性分子,是多肽合成领域的一大挑战. 其十二元环骨架具有较大张力,直接环化反应难以发生. 能够在不引入转角诱导因素(如 D-氨基酸和脯氨酸等)及辅助基团的情况下实现其构建的合成方法极为罕见^[8]. 2012 年,刘磊课题组在本刊发表了通过多肽酰肼化学连接反应合成环状四肽分子的研究(图2)^[9]. 在该工作中,作者将多肽酰肼的分子内化学连接反应与 Danishefsky 等发展的自由基脱硫反应^[10]相结合,以高产率合成了具有不同侧链官能团的环状四肽分子,突出该方法在克服环肽结构张力方面的卓越能力.

图2 通过多肽酰肼的化学连接反应合成环状四肽

Figure 2 Synthesis of cyclic tetrapeptides via chemical ligation of peptide hydrazide

References

- [1] Kent, S. B. H. *Chem. Soc. Rev.* **2009**, 38, 338.
- [2] Dawson, P. E.; Muir, T. W.; Clark-Lewis, I.; Kent, S. B. H. *Science* **1994**, 266, 776.
- [3] Tam, J. P.; Wong, C. T. T. *J. Biol. Chem.* **2012**, 287, 27020.
- [4] Fang, G.-M.; Li, Y.-M.; Shen, F.; Huang, Y.-C.; Li, J.-B.; Lin, Y.; Cui, H.-K.; Liu, L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, 50, 7645.
- [5] Fang, G.-M.; Wang, J.-X.; Liu, L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, 51, 10347.
- [6] Zheng, J.-S.; Tang, S.; Qi, Y.-K.; Wang, Z.-P.; Liu, L. *Nature Protocols* **2013**, 8, 2483.
- [7] Zheng, J.-S.; Tang, S.; Guo, Y.; Chang, H.-N.; Liu, L. *ChemBioChem* **2012**, 13, 542.
- [8] Wong, C. T. T.; Lam, H. Y.; Song, T.; Chen, G.; Li, X. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, 52, 10212.
- [9] Tang, S.; Zheng, J.-S.; Yang, K.; Liu, L. *Acta Chim. Sinica* **2012**, 70, 1471. (唐姗, 郑基深, 杨可, 刘磊, 化学学报, **2012**, 70, 1471.)
- [10] Wan, Q.; Danishefsky, S. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2007**, 46, 9248.

(Cheng, B.)