可见光促进的苄位 C_{sp3}—H 键活化官能团化反应

裴朋昆 张凡 易红 雷爱文*

(武汉大学化学与分子科学学院 武汉 430072)

摘要 近年来,可见光促进的光致氧化还原催化活化有机小分子在合成化学中蓬勃发展.该策略一般以过渡金属有机络合物或有机染料作为光敏剂,在可见光照射下,其通过与底物发生单电子转移(SET)发生相互作用,利用反应过程中形成的自由基或自由基离子中间体,实现 C—X (X=C, N, O ……)键节能高效、高选择性、绿色性构建.本文根据不同的关键反应中间体,就可见光促进的苄位 C_{sp3}—H 键活化官能团化近年来取得进展进行简要归总.

关键词 可见光催化; C_{sp3}—H 键活化; 甲苯类衍生物; 绿色化学

Visible Light Promoted Benzylic C_{sp3}—H Bond Activation and Functionalization

Pei, Pengkun Zhang, Fan Yi, Hong Lei, Aiwen*

(College of Chemistry and Molecular Sciences, Wuhan University, Wuhan 430072)

Abstract In recent years, visible-light-promoted photoredox catalytic activation of organic molecules has been flourishing vigorously. This kind of methodology usually takes advantage of transition-metal complexes and organic dyes as photosensitizers, which can directly react with organic substrates through a single-electron-transfer (SET) process under visible light irradiation. It's operable to construct C—X (X=C, N, O …) bond via the radical or radical ion generated during the SET process. On the basis of different key intermediates, this highlight gives a brief summary on the recent development of visible light promoted benzylic C_{sp3}—H activation and functionalization.

Keywords visible light photoredox; C_{sp3}—H bond activation; toluene derivatives; green chemistry

1 引言

探寻实现高效性、高选择性、高经济性、绿色、安全的合成策略是化学工作者们孜孜不倦的追求.新型成键模式的不断涌现使方法学在药物、天然产品、超分子、商业化试剂等领域的开发应用中存在巨大的潜力和价值.而直接使用广泛存在的碳氢化合物作为合成子,实现 C—H 键到 C—X 键(X=C, N, O ……)的转化无疑更具诱惑力和挑战性.甲苯类衍生物,作为一类廉价易得的工业原料,其苄位 C_{sp3}—H 键选择性活化官能团化也一直是科学研究的热门领域^[1].

催化领域一个重要的目标就是寻找新方法来活化小分子,其中光催化作为一种新手段近来受到很多关注^[2].光催化反应的实验过程中可以使用常规的玻璃仪器^[3],无需加热和腐蚀性化学品^[4],底物大都也不需要预先官能团化,且多数反应可以在温和的反应条件下高

效进行,无疑在本质上更具优势^[5].然而大多数有机物本身并不感光,因此多种光敏剂被用来吸收光子以活化体系中的有机基质.在可见光的照射下,受激发的电子从 HOMO 跃迁到 LUMO,再经过系统间交换形成相对寿命较长的三重激发态,其相较于基态物质既是更强的氧化剂也是更强的还原剂,继而可发生还原淬灭或氧化淬灭^[6].其单电子氧化还原历程也被化学家用来设计新型有机化学反应^[7].可见光催化由于其低成本、储量丰富、绿色无毒^[8]、可再生^[9]等特点,近年来在有机合成领域得到了迅猛发展,成为一种重要的有机合成工具^[10].不同甲苯类底物通过单电子转移过程可得到不同的苄位自由基或苄位自由基离子中间体,进而发生多种多样的反应.本文依据不同反应活性中间体,对近年来可见光促进的苄位 C_{sp3}—H 键活化官能团化反应进行简要归总(图 1).

* E-mail: aiwenlei@whu.edu.cn

Received August 16, 2016; published September 20, 2016.

Project supported by the 973 Program (2012CB725302), the National Natural Science Foundation of China (21390400, 21520102003, 21272180 and 21302148), and the Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education of China (20120141130002) and the Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University (IRT1030) and the Ministry of Science and Technology of China (2012YQ120060), the Program of Introducing Talents of Discipline to Universities of China (111 Program) is also appreciated.

项目受科技部 973 计划(No. 2012CB725302)、国家自然科学基金(Nos. 21390400, 21520102003, 21272180, 21302148)、高等学校博士学科点专项科研基金(No. 20120141130002)、教育部长江学者和创新团队发展计划(No. IRT1030)、国家科学技术部基金(No. 2012YQ120060)和高等学校学科创新引智计划(111 项目)资助.

Benzylic C_{sp3}-H Activation and Functionalization:

Reaction Intermediate:

图1 可见光促进的 C_{sp3}-H 键活化

Figure 1 Visible light promoted C—H bond activation

2 碳自由基介导的苄位 C_{sp3}-H 键活化官能团化

2013 年, 陈教授课题组^[11]成功地以二芳基酮类化合物作为光敏剂, 实现了苄位 C_{sp3}-H 键的活化单氟化反应, 并通过进一步调节光敏剂活性和筛选氟源首次实现了苄位偕二甲基的双氟化反应(图 2). 该方法学可以很好的兼容芳环和支链含有不同富电子和贫电子官能团(—CN, —F, —Cl.....)的底物. 文章中对取代基的空间位阻效应给出了详尽阐释. 此反应的动力学同位素效应(KIE)表明该反应的决速步为非金属自由基的 C—H 攫取过程. 为展现此反应在有机合成中的应用前景, 1 g 规模的反应也被成功实行. 随后, 该课题组又进一步以苯乙酮为光促进剂, 实现了惰性 C_{sp3}-H 键的活化氟化反应, 并认为其仅参与攫氢过程^[12].

图2 芳基酮催化的 C_{sp3}-H 键氟化反应Figure 2 C_{sp3}-H fluorination catalyzed by arylketones

2013 年, MacMillan 教授课题组^[13]通过可见光诱导的有机小分子催化氧化还原策略, 利用碳自由基/碳自由基偶联, 实现了苄醚 C_{sp3}-H 键的直接活化芳基化(图 3). 该方法学具有良好的官能团耐受性和底物兼容性, 甚至适用于高度拥挤原子处的 C—C 成键. 文章中突出强调键离解能(BDEs)、氢原子转移(HAT)常数、氧化还原电位三个参数的重要性. 需要特别指出的是, 二苄基醚类反应物能专一地转化为相应的单芳基化产物, 并且二氢呋喃在该反应条件下也可以高效高立体选择性地得到目标产物.

图3 苄醚的直接芳基化反应

Figure 3 Direct arylation of benzylic ethers

2014 年, MacMillan 课题组^[14]利用相似的策略, 以铱/硫醇协同催化苄醚和 Schiff 碱为反应底物的自由基-自由基偶联反应构建 β-氨基醚类化合物(图 4). 比较之下, 富电子的苄基醚以及带电中性基团的亚胺能以更高的效率完成反应. 他们推测该反应机理可能为: 可见光照射下 Ir^{III} 被激发到激发态*Ir^{III}, 其与底物 8 发生单电子转移而被还原淬灭并产生自由基阴离子 9; 中间体 5 进一步与巯基乙酸甲酯发生质子偶联电子转移(PCET)作用, 生成的硫自由基 7 与苄基类底物 10 发生氢原子转移, 实现有机催化小分子再生并产生苄基自由基 11, 由稳态自由基效应可知, 自由基 9 与 11 可直接偶联生成目标产物.

图4 交叉偶联反应机理

Figure 4 Mechanism of the heterocoupling reaction

2016 年, Greaney 课题组^[15]以 Cu(dap)₂Cl 为光促进剂, 实现了多种甲苯类衍生物苄位 C_{sp3}-H 键的直接叠

氮化(图5). 该反应具有广泛的官能团耐受性, 并可兼容伯碳、叔碳、季碳类甲苯底物. 他们推测该反应可能是碳自由基介导的自由链式反应.

图5 苄位叠氮化反应链增殖过程

Figure 5 Radical chain propagation of C_{sp^3} -H azidation

2016年, 李课题组^[16]通过“一锅两步法”实现了可见光促进的乙苯类衍生物苄位惰性 C_{sp^3} -H 键活化胺化反应构建苄胺类化合物(图6). 其他溴阴离子化合物的加入未能影响反应率, 并且AgF的加入也未能产生相应的苄基氟化物. 因此他们认为该反应可能经历了一个碳自由基介导的链增殖过程. 同样地, 该课题组利用相似的策略实现了烷基苯基醚到烷酯或烷醇的转化^[17]. 通过机理验证, 表明反应可能经历 α 位 C_{sp^3} -H 键均裂的链增殖过程, 并认为 α -溴代醚为反应活性中间体.

图6 “一锅法”构建苄位 C-N 键

Figure 6 One-pot benzylic C-N bond formation

3 碳正离子介导的苄位 C_{sp^3} -H 键活化官能团化

以碳正离子为反应活性中间体活化苄位 C_{sp^3} -H 键的报道相对比较少. 2016年, Pandey 课题组^[18]以可见光促进的方式形成碳正离子中间体, 分别以水和二级胺类底物作为亲核试剂, 高效、高选择性地实现了分子间交叉脱氢偶联(CDC)反应构建 C-O/C-N 键(图7),

图7 苄位 C_{sp^3} -H 键到 C-N/O 键转化

Figure 7 Benzylic C_{sp^3} -H functionalization for C-N/O bond formation

尤其为唑类化合物的修饰提供了一条简单易行的途径. 通过控制实验, 他们验证了相应的醇为反应中间体.

4 亚胺离子介导的苄位 C_{sp^3} -H 键活化官能团化

2011年, 肖文精教授课题组^[19]利用光敏剂/氧体系, 在可见光催化下, 通过串联氧化/[3+2]环加成/氧化芳构化反应实现了含氮杂环天然产物片螺素的合成(图8). 该串联反应具有极好的立体选择性, 当用非对称性双偶极物质做反应物时, 只有一种位置异构体生成. 氘代实验表明苄位攫氢过程可能是反应的决速步.

图8 光催化氧化/环加成/芳构化历程

Figure 8 Photocatalytic oxidation/cycloaddition/aromatization sequence

2012年, 吴骊珠教授课题组^[20]在可见光诱导下成功实现 *N*-芳基取代四氢异喹啉和硝基烷烃类衍生物、丙二酸二乙酯、丙酮分子间的需氧交叉脱氢偶联(CDC)反应构建 C_{sp^3} - C_{sp^3} 键(图9). 结合瞬态吸收光谱, 电子自旋共振吸收光谱, UV-Vis 吸收光谱和荧光发射光谱等机理验证实验, 她们首次发现了 *N*-芳基取代四氢异喹啉到有机光促进剂 TBA-eosin Y 的单电子转移过程, 并认为反应过程中产生的超氧自由基阴离子而非单线态氧气对于加速该转化的速率具有重要的作用.

2013年, 该课题组采用具有更高氧化还原能力的二价铂络合物代替二联吡啶钌, 在硫酸亚铁的协同作用下, 首次实现了 Pt^{II} 催化的氧气到超氧自由基负离子转化, 完成 *N*-芳基取代四氢异喹啉和吲哚类衍生物的需氧交叉脱氢偶联反应, 同样借助谱学的手段提出了和上面相似的机理^[21].

较之之前的需氧交叉偶联脱氢反应, 虽然交叉脱氢偶联反应可以很好地避免底物的预官能团化步骤, 以氧

图9 可见光促进的需氧交叉脱氢偶联可能机理
Figure 9 Aerobic photocatalytic CDC reactions

气代替当量氧化剂的使用, 并避免当量化学废料的产生, 而水作为唯一的副产物. 但直接使用不同的 C—H 化合物在无额外氧化剂存在的条件下实现其氧化交叉偶联放氢反应无疑更具原子经济性和绿色性. 吴骊珠教授课题组^[22–25]率先报道了系列质子还原催化剂(Proton Reductive Catalyst, PRC)存在下的光催化产氢体系, 实现了多重键型的高效、高选择性、清洁、经济构建(图 10).

图10 无额外氧化剂存在下交叉偶联放氢反应
Figure 10 Oxidant-free photocatalytic CCH reaction

2013 年, 吴课题组^[26]率先报道了无额外氧化剂存在条件下的交叉偶联放氢反应, 以四氢异喹啉和吡啶类衍生物作为底物, 在曙红和 $G\text{-RuO}_2$ 作为光敏剂的条件下, 实现两种不同 C—H 化合物的直接偶联. 反应基质的强电子效应会对此反应的产率有较大的影响, 并且 *N*-苯基四氢异喹啉 4 号位的强吸电子基完全抑制了反应的进行. 2016 年, 该课题组^[27]在之前研究的基础上, 同样利用 CCHE 策略, 以二价铂络合物同时作为光敏剂和质子转移催化剂, 实现了三芳基取代吡啶类化合物到吡啶的脱氢转化(图 11). 通过紫外-可见光谱, 荧光光谱, ^1H 核磁谱, 发射光谱以及瞬态吸收光谱等手段, 他们认为该反应最初是由光引发的单电子转移过程, 随后质子偶联释放出氢气.

图11 以亚胺正离子为介导的 CCHE 反应
Figure 11 Imine cation mediated CCHE reaction

5 氧鎓离子介导的苄位 C_{sp^3} -H 键活化官能团化

相比于氮而言,氧上的孤对电子更难于被氧化,因此以氧鎓离子为介导的光催化 C_{sp^3} -H 键活化屈指可数. 2015 年,吴骊珠教授课题组在无额外氧化剂存在的条件下,通过光敏剂 $\text{Acr-Mes}^+\text{ClO}_4^-$ 和质子转移催化剂 $\text{Co}(\text{dmgBF}_2)_2 \cdot 2\text{MeCN}$ 的协同作用,以 $\text{Cu}(\text{oTf})_2$ 为添加剂,实现了异色满和 β -酮酸酯分子间的交叉偶联放氢反应(图 12)^[28]. 脂肪族和不同电性的芳基 β -酮酯都能很好地发生反应,位阻影响在文中也有详细描述. 辅以瞬态吸收光谱,她们推测该反应可能经历了一个光促进剂还原淬灭的过程,并形成氧鎓离子中间体,同时 KIE 实验表明苄位 C-H 键的断裂可能是反应的决速步.

图 12 无额外氧化剂存在下光催化析氢交叉偶联

Figure 12 Oxidant-free photocatalytic cross-coupling hydrogen-evolution transformation

6 其他

传统意义上,苄位亚甲基 C_{sp^3} -H 键选择性氧化成醛酮需要重金属的参与并使用当量的氧化剂. 而无金属参与的有机小分子催化往往具有很强的底物限制性. 近年来,可见光催化氧化手段的蓬勃发展为该方向注入了新鲜血液,为苄位 C_{sp^3} -H 键选择性氧化在精细品化学中的应用提供了一条崭新的思路.

2012 年, Togo 课题组^[29]利用 KBr 和过硫酸氢钾,通过攫氢和直接氧化过程,分别在热/光氧化条件下实现了多种贫电子芳基酮类化合物的高效构建(图 13).

2014 年,福州大学光催化物理研究所首次利用无金属参与的 $\text{C}_3\text{N}_3\text{S}_3$ 聚合物在可见光照射下实现了苄醇到苯甲醛的选择性高效转化,通过对 $\text{rGO}/\text{C}_3\text{N}_3\text{S}_3$ 夹心结构进一步修饰可以实现更高效能的转化(图 14)^[30].

图 13 以 KBr 为氧化剂实现苄位直接氧化

Figure 13 Benzylic oxidation of alkylarenes using KBr

图 14 无金属参与的苄醇选择性光催化氧化

Figure 14 Metal-free catalysts for selective photocatalytic oxidation of benzylic alcohols

2015 年, Wolf 课题组^[31]利用核黄素四乙酸酯 RFT 和 $\text{Sc}(\text{OTf})_3$ 催化体系实现了贫电子烷基苯和苄醇苄位 C_{sp^3} -H 键的需氧氧化,并认为路易斯酸在调节核黄素氧化还原电位方面起着重要的作用(图 15).

图 15 RFT 催化不同类型底物的需氧氧化

Figure 15 Aerobic oxidation of various organic substrates

2015 年, Goldberg 教授课题组^[32]利用 Mn^{III} 络合物,在可见光诱导下,实现了苄位 C-H 需氧氧化历程(图 16). 他们通过 X 射线单晶衍生对基态催化剂的空间结构进行了表征,并认为物种 $[\text{Mn}^{\text{III}}(\text{H}_2\text{O})(\text{TBP}_8-$

图 16 催化氧化循环示意图

Figure 16 Catalytic cycle for the oxidation of HMB

Cz(H)^+ 质子化的数目和位置对于调控催化物种与氧气反应的活性具有重要影响。

2015 年, 雷爱文教授课题组^[33]通过光化学合成的手段, 以绿色、安全、环境友好的氧气为终端氧化剂, 实现了苄位 $\text{C}_{\text{sp}^3}\text{—H}$ 键到酮类化合物的转变(图 17)。此方法也适用于两个芳环均有取代基的底物, 丰富了反应的应用范围。自由基抑制实验和间歇光照实验表明该反应可能是经光引发的自由基反应历程。同时, ^{18}O 同位素标记实验证明羰基氧来源于氧气。

图 17 光致氧化苄位 $\text{C}_{\text{sp}^3}\text{—H}$ 键制备酮类化合物

Figure 17 Photooxygenation of benzylic $\text{C}_{\text{sp}^3}\text{—H}$ to ketones

7 小结与展望

对于可见光介导的, 涉及单电子转移过程的苄位 $\text{C}_{\text{sp}^3}\text{—H}$ 键活化, 反应形式灵活多变, 展现出独特的合成优势, 在合成形式上实现了简单、理想的化学成键模式。这些研究为有机合成方法学的探索注入了崭新的活力, 展示了这一领域较为广阔的研究潜力和应用前景。但也可以看出, 这类反应底物限制性较大, 机理研究尚不明确。目前, 对可见光促进的苄位 $\text{C}_{\text{sp}^3}\text{—H}$ 键活化的研究还处于起步阶段, 仍需要更多的研究来揭示其内部规律以及进一步拓展其在合成中的应用。

作者简介

裴朋昆, 于 2015 年进入武汉大学攻读硕士学位, 师从雷爱文教授, 主要研究领域为可见光催化的氧化偶联反应。

张凡, 自 2014 年起就读于武汉大学, 攻读理学学士学位, 指导老师为雷爱文教授。主要研究领域为过渡金属催化和光催化的碳-碳、碳-杂原子成键方法学研究。

易红, 2012 年毕业于武汉大学, 获得理学学士学位, 同年于武汉大学攻读博士, 指导老师为雷爱文教授。主要研究领域为金属催化, 光催化的偶联反应及反应机理研究。

雷爱文, 教授。1995 年本科毕业于安徽淮北煤炭师范学院, 2000 年于中国科学院上海有机化学研究所获理学博士学位, 师从陆熙炎院士。2000 年至 2003 年间, 在美国宾夕法尼亚州立大学张绪穆教授课题组从事博士后研究。2003 年至 2005 年在美国斯坦福大学 James P. Collman 教授课题组从事研究助理工作。2005 年回国到武汉大学化学与分子科学学院全职任教。2010 年获得国家杰出青年基金。2014 年入选教育部长江学者特聘教授。现主要从事有机小分子合成方法学以及化学反应活性中间体和反应动力学的机理研究。

References

- [1] (a) Vanjari, R.; Singh, K. N. *Chem. Soc. Rev.* **2015**, *44*, 8062; (b) Zhang, J.; Lu, Q.-Q.; Liu, C.; Lei, A.-W. *Chin. J. Org. Chem.* **2015**, *35*(4), 743. (张剑, 陆庆全, 刘超, 雷爱文, 有机化学, **2015**, *35*(4), 743.); (c) Huang, Z.; Tang, S.; Lei, A. *Sci. Bull.* **2015**, *60*, 1391.
- [2] Prier, C. K.; Rankic, D. A.; MacMillan, D. W. *Chem. Rev.* **2013**, *113*, 5322.
- [3] Koike, T.; Akita, M. *Inorg. Chem. Front.* **2014**, *1*, 562.
- [4] Ravelli, D.; Protti, S.; Fagnoni, M. *Chem. Rev.* **2016**, *116*, 9850.
- [5] (a) Xi, Y.; Yi, H.; Lei, A.-W. *Org. Biomol. Chem.* **2013**, *11*, 2387; (b) Zeng, T.-T.; Xuan, J.; Chen, J.-R.; Lu, L.-Q.; Xiao, W.-J. *Imaging Science and Photochemistry* **2014**, *32*, 415. (曾婷婷, 宣俊, 陈加荣, 陆良秋, 肖文精, 影像科学与光化学, **2014**, *32*, 415.)
- [6] Hopkinson, M. N.; Sahoo, B.; Li, J.-L.; Glorius, F. *Chem. Eur. J.* **2014**, *20*, 3874.
- [7] Nicewicz, D. A.; Nguyen, T. M. *ACS Catal.* **2014**, *4*, 355.
- [8] Hari, D. P.; Konig, B. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2013**, *52*, 4734.
- [9] Yoon, T. P.; Ischay, M. A.; Du, J. *Nat. Chem.* **2010**, *2*, 527.
- [10] Xuan, J.; Xiao, W.-J. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2012**, *51*, 6828.
- [11] Xia, J.-B.; Zhu, C.; Chen, C. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 17494.
- [12] Xia, J.-B.; Zhu, C.; Chen, C. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 11701.
- [13] Qvortrup, K.; Rankic, D. A.; MacMillan, D. W. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 626.
- [14] Hager, D.; MacMillan, D. W. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 16986.
- [15] Rabet, P. T. G.; Fumagalli, G.; Boyd, S.; Greaney, M. F. *Org. Lett.* **2016**, *18*, 1646.
- [16] Hou, T.-Y.; Lu, P.; Li, P.-X. *Tetrahedron Lett.* **2016**, *57*, 2273.
- [17] Lu, P.; Hou, T.-Y.; Gu, X.-Y.; Li, P.-X. *Org. Lett.* **2015**, *17*, 1954.
- [18] Pandey, G.; Laha, R.; Singh, D. *J. Org. Chem.* **2016**, *81*, 7161.
- [19] Zou, Y.-Q.; Lu, L.-Q.; Fu, L.; Chang, N.-J.; Rong, J.; Chen, J.-R.; Xiao, W.-J. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2011**, *50*, 7171.
- [20] Liu, Q.; Li, Y.-N.; Zhang, H.-H.; Chen, B.; Tung, C.-H.; Wu, L.-Z.

- Chem. Eur. J.* **2012**, *18*, 620.
- [21] Zhong, J.-J.; Meng, Q.-Y.; Wang, G.-X.; Liu, Q.; Chen, B.; Feng, K.; Tung, C.-H.; Wu, L.-Z. *Chem. Eur. J.* **2013**, *19*, 6443.
- [22] Gao, X.-W.; Meng, Q.-Y.; Li, J.-X.; Zhong, J.-J.; Lei, T.; Li, X.-B.; Tung, C.-H.; Wu, L.-Z. *ACS Catal.* **2015**, 2391.
- [23] Zheng, Y. W.; Chen, B.; Ye, P.; Feng, K.; Wang, W.; Meng, Q. Y.; Wu, L.-Z.; Tung, C.-H. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, *138*, 10080.
- [24] Zhong, J.-J.; Meng, Q.-Y.; Liu, B.; Li, X.-B.; Gao, X.-W.; Lei, T.; Wu, C.-J.; Li, Z.-J.; Tung, C.-H.; Wu, L.-Z. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 1988.
- [25] Zhong, J.-J.; Wu, C.-J.; Meng, Q.-Y.; Gao, X.-W.; Lei, T.; Tung, C.-H.; Wu, L.-Z. *Adv. Synth. Catal.* **2014**, *356*, 2846.
- [26] Meng, Q.-Y.; Zhong, J.-J.; Liu, Q.; Gao, X.-W.; Zhang, H.-H.; Lei, T.; Li, Z.-J.; Feng, K.; Chen, B.; Tung, C.-H.; Wu, L.-Z. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 19052.
- [27] Ye, P.; Wang, D.-H.; Chen, B.; Meng, Q.-Y.; Tung, C.-H.; Wu, L.-Z. *Sci. China. Chem.* **2016**, *59*, 175.
- [28] Xiang, M.; Meng, Q.-Y.; Li, J.-X.; Zheng, Y.-W.; Ye, C.; Li, Z.-J.; Chen, B.; Tung, C.-H.; Wu, L.-Z. *Chem. Eur. J.* **2015**, *21*, 18080.
- [29] Moriyama, K.; Takemura, M.; Togo, H. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 2414.
- [30] Xu, J.; Luo, L.; Xiao, G.; Zhang, Z.; Lin, H.; Wang, X.; Long, J. *ACS Catal.* **2014**, *4*, 3302.
- [31] Muhldorf, B.; Wolf, R. *Chem. Commun.* **2015**, *51*, 8425.
- [32] Neu, H. M.; Jung, J.; Baglia, R. A.; Siegler, M. A.; Ohkubo, K.; Fukuzumi, S.; Goldberg, D. P. *J. Am. Chem. Soc.* **2015**, *137*, 4614.
- [33] Yi, H.; Bian, C.; Hu, X.; Niu, L.; Lei, A. *Chem. Commun.* **2015**, *51*, 14046.

(Lu, Y.)