调控 CRISPR-Cas9 系统用于基因编辑的研究进展

公少华 李娜* 唐波

(山东师范大学化学化工与材料科学学院 分子与纳米探针教育部重点实验室
化学成像功能探针山东省高等学校协同创新中心 山东师范大学分子与纳米科学研究院 济南 250014)

摘要 基于操作简便、成本低、快捷高效的优势, 规律间隔成簇短回文重复序列及其相关核酸酶(CRISPR-Cas9)系统在基因编辑的基础研究和临床医学方面起到了极为重要的推动作用. 在时空维度上调控 CRISPR-Cas9 发挥功能, 对于减少 CRISPR-Cas9 系统的脱靶效应, 提高基因编辑的特异性具有重要意义. 本综述介绍了近年来利用化学分子以及光调控 CRISPR-Cas9 系统发挥功能, 进而调控基因编辑的研究进展, 并探讨了 CRISPR-Cas9 调控的前景和面临的挑战.

关键词 CRISPR-Cas9; 基因编辑; 特异性; 脱靶效应; 调控

Recent Progress in Regulating CRISPR-Cas9 System for Gene Editing

Gong, Shaohua Li, Na* Tang, Bo

(College of Chemistry, Chemical Engineering and Materials Science, Key Laboratory of Molecular and Nano Probes, Ministry of Education, Collaborative Innovation Center of Functionalized Probes for Chemical Imaging in Universities of Shandong, Institute of Molecular and Nano Science, Shandong Normal University, Jinan 250014, China)

Abstract Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) – CRISPR-associated protein (Cas) system is an adaptive immune system used by many bacteria and archaea to defend the invasion of exogenous nucleic acids. CRISPR-Cas system in different species of archaea and bacteria has different components and working mechanisms. Depending on the numbers of effector proteins, CRISPR-Cas systems can be classified into two major types. CRISPR-Cas9, which is composed of Cas9 nuclease and sgRNA, belongs to class II CRISPR-Cas system and can be used as a powerful genome editing tool. It can target and cleave the DNA sequence which contains protospacer adjacent motif (PAM, 5'-NGG-3') sequence. The DNA double-strand breaks (DSBs) can be repaired by homology-directed repair (HDR) or nonhomologous end joining (NHEJ) mechanism. Insertions or deletions (indels) can be introduced at targeted loci in the DSBs repair process. Due to its convenience, low cost and high efficiency, CRISPR-Cas9 has played an important role in promoting the development of gene editing in basic research and clinical medicine. However, off-target effect of CRISPR-Cas9 should not be neglected. The CRISPR-Cas9 is able to cleave the target DNA even when the sgRNA imperfectly matches with the target DNA, leading to the unwanted indels at nontargeted DNA loci, which limits the further application of genome editing, especially for the treatment of genetic diseases. Therefore, it is significant to reduce the off-target cleavage effect of CRISPR-Cas9. Many efforts have been devoted to realize the reduced off-target effect of CRISPR-Cas9. Among these methods, regulating the function of CRISPR-Cas9 at spatiotemporal dimension is a potential strategy to reduce the off-target effect of CRISPR-Cas9 system and improve the specificity of gene editing. In this review, we summarized the research advances in regulating the function of CRISPR-Cas9 and discussed the prospects and challenges of CRISPR-Cas9 regulation.

Keywords CRISPR-Cas9; gene editing; specificity; off-target effect; regulation

1 引言

规律间隔成簇短回文重复序列及其相关核酸酶 (CRISPR-Cas) 系统是一种细菌和古细菌对抗外来核酸入侵的获得性免疫系统^[1]. 根据所含效应蛋白复合体的数量和组成方式的不同, CRISPR-Cas 系统可以分为两类, CRISPR-Cas9 系统属于第二类 CRISPR-Cas 系统, 该系统可由 II 型 Cas 蛋白(Cas9)与人工设计的单引导

RNA(sgRNA)组成^[2,3]. 其中, Cas9 蛋白含有 HNH 催化域和 RuvC 催化域, 二者分别用于切割靶标 DNA 双链中的其中一条单链, 产生 DNA 双链断裂(DSB). 当对两个催化域同时进行点突变之后, Cas9 会失去核酸酶的切割性质, 只能保留与 DNA 结合的能力, 形成催化失活的 Cas9(dCas9). dCas9 能够与转录效应蛋白进行融合, 利用 CRISPR-dCas9 系统, 能够实现对于靶标基因转录的激活或者抑制^[4]. sgRNA 由 CRISPR RNA(crRNA)和

* E-mail: lina@sdnu.edu.cn

Received April 29, 2020; published June 8, 2020.

Project supported by the National Key R&D Program of China (No. 2019YFA0210100), the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21535004, 91753111, 21927881, 21874086, 21775094), the Key Research and Development Program of Shandong Province (No. 2018YFJH0502), and the Youth Innovation Science and Technology Program of Higher Education Institution of Shandong Province (No. 2019KJC022).

项目受国家重点研发计划(No. 2019YFA0210100)、国家自然科学基金(Nos. 21535004, 91753111, 21927881, 21874086, 21775094)、山东省重点研发计划(No. 2018YFJH0502)和山东省高等学校青年创新科技项目(No. 2019KJC022)资助.

反式激活 RNA(tracrRNA)融合而成, crRNA 作用于靶向目标 DNA, 与 DNA 序列结合, tracrRNA 与 Cas9 核酸酶结合, 使 sgRNA 和 Cas9 核酸酶组合组成 CRISPR-Cas9 系统^[2,5]。当靶标 DNA 含有前间区序列邻近基序(PAM)序列 5'-NGG-3'时, CRISPR-Cas9 系统能够与 DNA 结合, 在距离 PAM 序列上游三个碱基的位置产生 DNA DSB^[4,6]。断裂的双链 DNA 通过两种 DNA 修复机制进行修复, 非同源末端连接(NHEJ)或者同源性定向修复(HDR)。NHEJ 修复机制易于诱导 DNA 产生错误的插入或者缺失, 使基因功能丧失。HDR 修复机制更倾向于在特定位点精准插入外源 DNA 序列^[7-9]。通过以上方式, 可以实现目的基因片段的敲除或者敲入。

CRISPR-Cas9 系统介导的基因编辑相较于依赖锌指核酸酶(ZFNs)和转录激活因子样效应物核酸酶(TALENs)的传统基因编辑技术有明显的优势。传统的基因编辑技术是利用特定的与 DNA 结合的蛋白域对靶标 DNA 进行识别^[10]。对于这种识别机制, 靶向不同 DNA 位点需要发展不同的 DNA 结合蛋白域, 在这一过程中, 蛋白域的设计、合成以及验证过程相对复杂, 这阻碍了基因编辑的进一步发展^[11,12]。而相比之下, CRISPR-Cas9 系统利用 sgRNA 对特定 DNA 位点进行识别, 通过简单改变 sgRNA 的序列, 就能够靶向特定的目标 DNA 位点。与传统的基因编辑方法相比, CRISPR-Cas9 系统避免了识别蛋白设计、合成以及确认的复杂过程, 在很大程度上简化了基因编辑的操作过程^[13]。基于这一优势, CRISPR-Cas9 系统作为一种工具已经在基因编辑基础研究的各个方面得到应用^[14]。例如, 用于在细胞、动物水平上构建转基因模型, 为科学研究提供疾病模型^[15,16]。用于功能基因的大规模筛选, 确定与特定表型相关的基因^[17,18]。通过将 dCas9 与相应的转录激活或者抑制域结合, 可以实现对基因转录过程的激活或者抑制^[19,20]。可以用于实现基因位点的可视化成像^[21,22]。用于体外诊断^[23,24]。实现对于某些基因疾病的治疗^[25,26]。

虽然 CRISPR-Cas9 是一种强有力的基因编辑工具, 但是有研究显示 CRISPR-Cas9 介导的基因编辑存在脱靶切割效应^[5,27-29]。Cas9 蛋白含有 PAM 交互域, CRISPR-Cas9 能够通过 PAM 交互域与含有 PAM 的靶标 DNA 作用, 引发局部 DNA 双链分离, 进一步形成 sgRNA-DNA 异源双链和置换的 DNA 链(R 环)。该结构能够使 Cas9 蛋白中 HNH 域发生位移, 进而引发 Cas9 蛋白构象变化, 激活 HNH 域与 RuvC 域的核酸酶活性, 用于 DNA 双链的切割^[1,4]。值得注意的是, 在 sgRNA 与目标 DNA 序列不完全匹配的情况下, 例如 DNA 序列被靶向区域发生单碱基错配或者在距离 PAM 较远的位置发生多碱基错配, CRISPR-Cas9 仍然能够识别并切割目标 DNA, 从而造成脱靶切割效应^[11]。由于 Cas9 与靶标 DNA 结合仅需要 sgRNA 的种子序列与靶标 DNA 匹配, 而如果要发挥切割活性, 则需要更多碱基进行互补配

对。因此, Cas9 与靶标 DNA 结合相对容易, dCas9 的脱靶效应相比于 Cas9 而言也更为严重^[30,31]。在基因编辑的临床应用中, 特别是在基因疾病的治疗方面, 高特异性的精准基因编辑至关重要。如果产生脱靶基因编辑, 那么很可能会造成基因组的不稳定性, 破坏正常基因的功能, 造成临床应用风险^[32,33]。为了解决 CRISPR-Cas9 系统的脱靶切割的问题, 研究者发展了不同的策略用于提高基因编辑的特异性。例如, 使用成对的 Cas9 切口酶^[34], 缩短 sgRNA^[35], 利用 FokI-dCas9 融合体^[36]等。除此之外, 近些年来, 为了提高 CRISPR-Cas9 介导的基因编辑的特异性, 研究者致力于对 CRISPR-Cas9 系统的功能进行时空维度的调控。通过对外界条件(化学诱导剂的加入、光的照射)的控制, 可以实现对于 CRISPR-Cas9 系统功能的调控。Sato 等^[37]在其综述中总结了 2018 年以前在时空维度上对 Cas9 蛋白活性进行调控的研究进展, 对 sgRNA 进行调控的研究内容涉及较少。Wang 等^[38]综述了可响应内源性与外源性刺激的纳米颗粒用于实现可控递送 CRISPR-Cas9 系统, 进而实现基因编辑的研究进展, 未涉及直接作用于 Cas9 和 sgRNA 进行调控的研究内容。在本综述中, 我们系统地介绍了利用化学分子和光进行 CRISPR-Cas9 活性调控的研究进展, 对作用于 Cas9 蛋白、sgRNA 以及利用光响应的纳米颗粒递送 CRISPR-Cas9 系统进行精准基因编辑的策略进行了总结, 并对 CRISPR-Cas9 调控的前景和面临的挑战进行了探讨。

2 化学分子调控

Cas9 蛋白的浓度会影响 CRISPR-Cas9 进行基因编辑的特异性^[5,39], 因此对 Cas9 蛋白的浓度或者活性进行调控, 能够提高基因编辑的特异性。对 Cas9 的浓度或者活性的控制可以在转录水平上进行, 包括利用诱导型启动子在转录水平上调节 Cas9 蛋白的表达^[40], 利用小干扰 RNA 与抗 CRISPR 蛋白对 Cas9 蛋白的活性进行控制^[41,42], 利用引发 RNA 对 sgRNA 进行控制^[43], 但是这些方式难以在短的时间窗口范围内控制 Cas9 蛋白的活性。相对而言, 在后转录水平上直接对 Cas9 的活性进行调控, 能够更好地在时空维度上实现对基因编辑的控制。

小分子化学诱导剂, 能够渗透进入细胞, 可以被用来在细胞水平上对 Cas9 蛋白的活性进行后转录控制。Zhang 等^[44]将源自酿脓链球菌的 Cas9 蛋白分裂为两个片段, 在两个片段上分别融合能够形成二聚体的蛋白域, 然后利用化学小分子雷帕霉素, 诱导 Cas9 碎片组合, 组合之后的 Cas9 蛋白能够重新发挥基因编辑的功能。通过这种方式, 可以利用小分子实现对于 Cas9 蛋白活性的控制, 提高基因编辑的特异性。4-羟基他莫昔芬(4-HT)能够诱导内含肽蛋白发生分裂, Liu 等^[45]利用 4-HT 的这一性质, 将能够响应 4-HT 的内含肽嵌入到源

自酿脓链球菌的 Cas9 蛋白的特定位置 (Ser219, Cys574) 内含肽嵌入之后, 能够抑制 Cas9 蛋白的活性. 当细胞进行 4-HT 孵育处理时, 内含肽会发生蛋白质剪接, 从而使得 Cas9 蛋白的活性重新恢复. 作者在 HEK293-GFP 细胞中对 EMX, VEGF 和 CLTA 基因位点的切割进行了研究, 实验结果显示, 相比于野生型的 Cas9 蛋白, 这种方法能够在细胞水平上提高对于靶标位点修饰的特异性 (25 倍).

但是上述策略存在一个缺点, 即融合内含肽的 Cas9 蛋白一旦通过 4-HT 激活, Cas9 蛋白的活性难以再被抑制, 因此这种调控方式具有不可逆性. 为了解决这问题, Tan 等^[46]发展了一种利用化学诱导剂对源自酿脓链球菌的 Cas9 蛋白活性进行可逆调控的方法. 作者将雌激素受体融合到 Cas9 蛋白的特定位置, 形成 (ERT2)₂-Cas9-(ERT2)₂ 变异体. 当不存在 4-HT 时, (ERT2)₂-Cas9-(ERT2)₂ 被隔离在细胞质中, Cas9 蛋白无法进入细胞核发挥作用; 而当 4-HT 存在时, (ERT2)₂-Cas9-(ERT2)₂ 能够被转运进入细胞核中发挥基因切割的功能. 实验结果显示, 在诱导剂 4-HT 存在的条件下, Cas9 蛋白的活性能够被快速激活, 实现高效切割, 通过去除诱导剂, 可以重新抑制 Cas9 蛋白发挥功能, 再重新添加 4-HT, Cas9 蛋白能够继续发挥功能, 从而实现可逆控制基因编辑.

虽然上述策略能够实现 Cas9 蛋白活性的快速激活、可逆控制, 但是其 Cas9 蛋白的背景切割活性也相对较高. 为了降低 Cas9 蛋白的背景切割活性, Wells 等^[47]将被分裂 Cas9 蛋白的 N 端和 C 端分别融合源自雌激素受体的配体结合域 ERT. 在没有配体存在的情况下, ERT 能够与细胞质中的 Hsp90 蛋白结合, 从而可以将 Cas9 片段隔离在细胞质中. 当加入 4-HT 之后, 利用一种源自细胞核受体的配体结合域, Cas9 蛋白片段能够脱离 Hsp90 的作用, 进入细胞核重组, 形成具有活性的完整 Cas9 蛋白, 重新发挥基因编辑的功能. 通过这种策略, 可以实现对于 Cas9 蛋白活性的调控, 降低不加入化学小分子诱导剂 4-HT 情况下 Cas9 蛋白的背景切割活性, 提高基因编辑的特异性 (图 1).

上述策略多为在时间维度上对 Cas9 蛋白的活性进行调控. 为了进一步发展在多维度 (剂量、时间等) 水平上进行调控的方法, Choudhary 等^[48]将大肠杆菌二氢叶酸还原酶的不稳定蛋白域 (DHFR) 融合到源自酿脓链球菌的 Cas9 蛋白上, 只有在小分子甲氧苄氨嘧啶 (TMP) 存在的条件下, 该融合蛋白才能保持稳定, 免于被蛋白酶降解. 通过控制 TMP 的加入剂量, 能够实现对于 CRISPR-Cas9 功能的控制. 但是存在的问题是, 该系统在 TMP 不存在的情况下会有 20% 的 Cas9 蛋白的背景切割活性, 这阻碍了对于 Cas9 蛋白的精准调控. 为了进一步优化该系统, 降低在没有 TMP 存在情况下 Cas9 蛋白的背景活性, Choudhary 等^[49]在 Cas9 蛋白上融合了三个 DHFR 蛋白域. 同时, 为了降低 TMP 作为一种抗菌药物

图 1 利用雌激素受体配体结合域 ERT 实现分裂 Cas9 蛋白 CRISPR 活性调控示意图.

Figure 1 Schematic representation of regulating genome-editing activity by fusing split Cas9 to the ligand-binding domain of the oestrogen receptor (ERT, light green)^[47]. Copyright© 2016, Springer Nature.

对细胞产生的毒性, 作者在 TMP 分子上修饰光笼, 利用低强度、短时间的光照实现了对 Cas9 蛋白活性的控制. 通过该策略, 可以在剂量、时间以及空间上实现对于 Cas9 蛋白的活性进行调控 (图 2). 利用类似的策略, Sordella 等^[50]通过在源自酿脓链球菌的 Cas9 蛋白上融合人 FKBP12 蛋白形成 (DD-Cas9), 利用 Shield1 配体对该融合蛋白进行稳定, 当去除 Shield1 配体之后, DD-Cas9 能够被蛋白酶快速降解, 通过控制 Shield1 配体的加入与去除, 可以实现对 Cas9 蛋白活性的调控 (图 3). 除了上述策略之外, Fowler 等^[51]设计了一种可以进行快速诱导的 Cas9 蛋白变异体 (ciCas9). 作者用 BCL-xL 蛋白域替换源自酿脓链球菌的 Cas9 蛋白中的非关键蛋白域 REC2, 形成 Cas9.BCL. 进一步连接 BH3 肽之后, Cas9 蛋白的功能能够被抑制. 当存在小分子 A-385358 时, BCL-xL-BH3 的作用会被快速破坏, Cas9 蛋白的功能能够重新恢复. 利用这种策略, 作者在细胞水平上进行了 Cas9 产生 DNA 双链断裂的动力学研究.

图 2 不稳定域融合到 Cas9 蛋白上, 会导致蛋白酶的降解. TMP 能够稳定 DHFR-Cas9 蛋白融合体产生活性 Cas9.

Figure 2 Schematic representation of destabilized DHFR domains fused to Cas9, resulting in proteasomal degradation. TMP stabilizes the DHFR-Cas9 fusion protein to produce active Cas9^[49]. Copyright© 2019 Wiley-VCH Verlag GmbH & KGaA, Weinheim.

对于 CRISPR-Cas9 系统的切割活性进行调控, 除了可以作用于 Cas9 蛋白之外, 也可以作用于 sgRNA^[52]. Liu 等^[53]发展了一种嵌入适体酶的 sgRNA 用于 CRISPR-Cas9 的基因编辑功能的控制. 适体酶的嵌入能够阻止 sgRNA 与靶标 DNA 的结合, 抑制 CRISPR-Cas9

图3 DD-Cas9示意图. Cas9融合到FKBP12变异体的不稳定域上, 引发融合蛋白的快速降解. 合成配体 Shield-1 能够抑制这种不稳定效应, 防止 Cas9 被降解.

Figure 3 Schematic representation of conditionally destabilized Cas9 (DD-Cas9). Cas9 is fused to the destabilizing domain of mutant FKBP12 that triggers the rapid degradation of the fused-protein. The synthetic ligand (Shield-1) prevents this destabilizing effect and prevents Cas9 from degradation^[50]. Copyright© 2017, Springer Nature.

发挥功能. 在小分子茶碱分子存在的条件下, 适体酶能够发生构型的变化, 酶性核酸域被激活, 引发 RNA 发生自切割, 去除封闭序列, 恢复 sgRNA 的活性, 进而激活 CRISPR-Cas9 的基因编辑功能. Yang 等^[54]设计了一种 sgRNA (SMART-sgRNA). SMART-sgRNA 由原本的 sgRNA, 扩展的封闭 RNA 基序以及作为引发基序的变构适配体通过互补杂交构成, 其功能的发挥能够通过小分子激活的变构适配体进行控制. 在没有小分子茶碱的存在下, SMART-sgRNA 无法与 Cas9 蛋白结合. 当小分子茶碱存在时, 引发基序会与小分子结合, 进而破坏封闭基序, 使得 SMART-sgRNA 能够重新与 Cas9 蛋白结合, 发挥 CRISPR-Cas9 基因编辑的功能. 同样也是利用小分子, Kortemme 等^[55]对 sgRNA 进行设计, 在 sgRNA 上插入了能够响应小分子的适配体, 通过改变小分子的使用剂量, 可以对 CRISPR-Cas9 的功能进行调控. 通过设计不同的适配体, 可以用不同的小分子对多基因进行独立的调控(图 4). 除了直接对 sgRNA 的结构进行设计之外, 对 sgRNA 进行后转录化学修饰也可以用来调控 CRISPR-Cas9 的活性. Kool 等^[56]发展了一种可逆的 RNA 乙酰化方法, 在这种方法中, 叠氮取代的乙酰咪唑试剂(NAI-N₃)能够用于对 sgRNA 的 2'-OH 基团进行乙酰化后修饰, 导致 RNA 的折叠、杂交以及功能受到封闭. 在经过水溶性的磷化氢处理之后, 这种聚乙酰化的

图4 通过在 sgRNA 上插入小分子适配体形成配体调节的 sgRNA 示意图.

Figure 4 Diagram of ligand-regulated sgRNAs by inserting small molecule aptamers into the sgRNA^[55]. Copyright© 2019, Springer Nature.

RNA 能够重新恢复功能. 利用这种可逆的 RNA 乙酰化方法能够在时间上对于 CRISPR-Cas9 的基因编辑功能进行控制(图 5). Zhou 等^[57]利用类似的策略对 CRISPR-Cas9 功能的发挥进行了调控, 并将这种策略应用到了 Cas13a 蛋白上.

图5 NAI-N₃抑制 CRISPR-Cas9 基因编辑示意图. sgRNA 的封闭限制了 RNA 诱导的 Cas9 核酸酶 DNA 双链切割.

Figure 5 Illustration of NAI-N₃-enabled inhibition of CRISPR-Cas9 gene editing. sgRNA cloaking restricts the RNA-guided DNA double strand cleavage by Cas9 nuclease^[56]. Copyright© 2020, Royal Society of Chemistry.

除利用化学小分子进行调控之外, Chin 等^[7]利用内源性蛋白在不同细胞周期活性的不同对 Cas9 蛋白的活性进行了控制. Cas9 蛋白能够诱导产生 DNA DSB, DSB 可以通过 NHEJ 或者 HDR 两种修复机制进行修复. NHEJ 修复途径易于产生错误的插入、缺失, 相比于 NHEJ, HDR 在精准敲入外源 DNA 方面更有优势. 通过 HDR 途径修复 DNA 主要发生在细胞周期的 S 晚期和 G2 期, NHEJ 产生的 DNA 修复主要发生在 G1, S, G2 期. 一般情况下, HDR 的修复效率要远低于 NHEJ. APC/Cdh1 复合物是一种主要的细胞周期控制 E3 泛素连接酶, APC/Cdh1 复合物在晚 M 期和 G1 期能够发挥活性, 促进蛋白泛素化并致使其降解^[7]. 在该控制策略中, 联会蛋白(geminin)作为 APC/Cdh1 复合物的底物, 被融合到 Cas9 蛋白上用于 Cas9 蛋白的活性控制(hCas9-hGem(1/110)). 当细胞处于晚 M 期和 G1 期时, hCas9-hGem(1/110)能够被 APC/Cdh1 复合物降解, 因此 hCas9-hGem(1/110)多集中于 S/G2/M 期并在该细胞周期内切割目的基因片段, 进而能够产生 HDR 介导的 DNA 修复.

3 光调控

3.1 紫外光及蓝光调控

利用化学分子虽然能够在剂量与时间维度上实现对 CRISPR-Cas9 功能的控制, 但是多数小分子具有细胞毒性^[58], 例如雷帕霉素、4-HT、甲氧苄氨嘧啶等, 利用这些化学诱导剂进行调控时, 使用剂量会受到限制. 其次, 扩散的小分子难以被快速清除, 因此难以同时在时间和空间维度上对 CRISPR-Cas9 的功能进行调控. 利用大分子进行调控, 调控效率比较低, 应用范围有限^[7].

利用光对 CRISPR-Cas9 的功能进行调控, 能够很好地解决上述问题, 在时空水平上实现非侵入的 CRISPR-Cas9 调控。

Deiters 等^[59]报道了一种对于 Cas9 蛋白活性进行光化学调控的方法。作者在 Cas9 蛋白的 K866 位点上进行了非天然氨基酸(光笼赖氨酸)的修饰, 在经过光笼赖氨酸修饰之后, Cas9 蛋白的活性会受到抑制。在紫外光(365 nm)的照射下, 连接 Cas9 蛋白与光笼分子的键会发生断裂, 光笼分子能够被去除, Cas9 蛋白的活性能够重新恢复。实验结果表明, 通过紫外光的控制, 该策略可以实现在细胞水平上选择性地敲除内源基因(图 6)。在另一策略中, Sato 等^[58]将源自酿脓链球菌的 Cas9 蛋白分裂为两个片段, 然后在两个片段上分别融合光诱导二聚蛋白域(pMagnets, nMagnets), 形成具有光活性的 Cas9 (paCas9)。在蓝光(470 nm)的照射下, pMagnets 蛋白域与 nMagnets 蛋白域能够发生二聚, 使得 Cas9 片段重新组合, 进而发挥基因编辑的功能。

图 6 笼 Cas9 用于基因编辑的光化学控制示意图。

Figure 6 Diagram of caged Cas9 enabling photochemical control of genome editing^[59]. Copyright© 2015, American Chemical Society.

除了利用光诱导二聚蛋白, 光解离二聚蛋白也能够用于 Cas9 蛋白活性的调节。Lin 等^[60]将 pdDronpa 与源自酿脓链球菌的 Cas9 蛋白融合, 发展了一种对于 Cas9 蛋白活性进行控制的方法。pdDronpa 是一种光解离二聚荧光蛋白, 在黑暗条件下, 其能够保持二聚状态; 在光照条件下, 其能够发生解离。作者将该蛋白融合到 Cas9 蛋白的特定位置, 使其在二聚的状态下, 抑制 Cas9 蛋白的活性。通过光照, 使二聚蛋白解离, 进而恢复 Cas9 的活性。通过这种方式能够实现对 Cas9 蛋白活性的控制。

作为一类源自噬菌体能够抑制 CRISPR-Cas 系统发挥作用的蛋白^[61], 抗 CRISPR(Acr)蛋白也被用于 CRISPR-Cas9 系统功能的调控。Niopek 等^[62]对 Acr 蛋白进行改造, 实现了对于 CRISPR-Cas9 系统的光学控制。在该系统中, LOV2 域作为一种光开关蛋白域被插入到 AcrIIA4 蛋白中, 形成 Acr-LOV 杂交体(CASANOVA)。在没有蓝光(460 nm)激发的条件下, LOV2 的 N 末端和 C 末端保持临近, 被插入的蛋白能够保持原本的构象。在光激活的条件下, LOV2 的末端螺旋能够打开, 从而能够使被插入的蛋白构象发生改变, 失去原有的活性。作

者将 CASANOVA 和 Cas9 以及 sgRNA 在 HEK293T 细胞中共表达, 在蓝光的照射下, AcrIIA4 蛋白的活性被抑制, 其对于 Cas9 蛋白的抑制作用会丧失, 使得 CRISPR-Cas9 系统能够重新发挥基因编辑的功能。

上述策略均基于光对 Cas9 蛋白的调节, 除此之外, 也可以对 sgRNA 的功能进行光调节, 进而调控 CRISPR-Cas9 系统的切割功能。Bhatia 等^[63]发展了一种利用紫外光进行基因编辑控制的 CRISPR-Cas9 系统(CRISPR-plus)。在该系统中, 作者利用一段具有光切割活性的寡核苷酸链与 sgRNA 靶向的目标 DNA 的序列进行杂交, 该杂交复合物具有较高的解链温度, 杂交保护单元的存在阻止了 sgRNA 与靶标 DNA 的结合。当进行紫外光照射时, 光切割保护单元的特定位点会发生断裂, 长光切割寡核苷酸链分解为短核苷酸链片段, 杂交体解链温度降低, 使得光切割寡核苷酸链从 sgRNA 上解离, sgRNA 恢复靶向目标 DNA 的能力, 从而使 CRISPR-Cas9 系统重新发挥 DNA 切割的能力(图 7)。

图 7 CRISPR-plus 实现可进行光激活的 Cas9 介导的 DNA 靶向封闭。

Figure 7 CRISPR-plus realizes photoactivatable blockade of Cas9-mediated DNA targeting^[63]. Copyright©2016, Wiley-VCH Verlag GmbH & KGaA, Weinheim.

3.2 近红外光调控

蓝光对于哺乳动物细胞具有一定的光毒性, 而且对于人体组织的穿透深度低^[64], 需要利用特殊设备发射的短波脉冲光进行长时间照射^[65]。此外, 利用光对 CRISPR-Cas9 系统的功能进行调控时, 多数情况下需要首先在细胞内转染表达特定的 Cas9 蛋白, 这些特定的 Cas9 蛋白一般由 Cas9 融合不同的蛋白域形成, 然后才能利用光进行控制。通过这些策略只能在细胞水平上利用光进行 CRISPR-Cas9 的调控, 对于 CRISPR-Cas9 系统进行活体递送, 进而利用外界条件进行基因编辑的控制仍然存在挑战。近些年, 研究者发展了一系列的非病毒 CRISPR-Cas9 递送载体, 例如金纳米颗粒^[66], 石墨烯^[67], 黑磷^[68], MOF^[69]等, 虽然这些策略能够实现对 CRISPR-Cas9 系统的活体递送, 但是却无法在时空维度上控制 CRISPR-Cas9 系统发挥基因编辑的功能。为了解决这一问题, Song 等^[70]发展了一种可以利用近红外光进行时空维度控制的 CRISPR-Cas9 递送系统(UCNPs-Cas9@PEI)。在该系统中, 作者合成了镧系元

素掺杂的上转化纳米颗粒,在其表面包覆二氧化硅层,用于提高水溶性,CRISPR-Cas9系统通过光切割分子4-(羟甲基)3-硝基苯甲酸共价连接到上转化纳米颗粒的表面,然后在外层包覆PEI用于内体逃逸.在近红外光(980 nm)的照射下,上转化纳米颗粒能够发出短波长光,光切割分子4-(羟甲基)3-硝基苯甲酸的酯键会发生断裂,从而释放CRISPR-Cas9系统,用于发挥基因编辑的功能.作者设计了能够靶向切割肿瘤基因PLK-1的CRISPR-Cas9系统,发现通过近红外光控制该递送系统,能够在细胞以及活体水平上抑制肿瘤细胞的增殖. Le等^[71]发展了一种利用近红外光进行激活的CRISPR-Cas9递送系统(LACM).在该系统中,金纳米棒作为载体,在金纳米棒上,修饰有能够与sgRNA进行杂交的DNA链,通过杂交,能够抑制sgRNA靶向特定基因位点的能力.在近红外光照射的情况下,金纳米棒能够进行光热转化,产生热能,能够在局部升高温度,温度升高能够破坏DNA链与sgRNA的杂交结构,释放sgRNA,sgRNA能够与Cas9蛋白组成,构成CRISPR-Cas9系统,从而发挥基因编辑的功能.利用该系统,作者在活细胞水平上对EGFP、EMX1以及PLK1基因进行编辑.

上述策略是基于对Cas9蛋白以及sgRNA进行可控递送,另外一种策略是直接对于CRISPR-Cas9质粒进行可控递送. Jiang等^[72]发展了一种利用近红外光进行控制的CRISPR-Cas9质粒递送系统.作者在金纳米颗粒上修饰能够靶向细胞核的带正电的TAT肽,通过静电吸附作用,能够结合CRISPR-Cas9质粒,外层包覆脂质体形成纳米颗粒.在近红外光的照射下,金纳米颗粒能够进行光热转化,使温度升高,温度升高能够释放质粒,质粒入核表达CRISPR-Cas9,进而敲除Plk-1基因,下调Plk-1蛋白,使肿瘤细胞凋亡.通过这种方式,能够在细胞以及活体水平上抑制黑色素瘤细胞的生长. Ping等^[73]发展了一种利用近红外光进行控制的纳米递送系统(nanoCRISPR).首先,作者合成了金纳米棒,并在金纳米棒的外层修饰阳离子聚合物,阳离子聚合物可以通过静电作用吸附带负电的Cas9质粒,该质粒由热诱导启动子HSP70驱动表达.携带质粒的金纳米棒能够被细胞内化,经过内体逃逸,质粒能够被释放进入细胞核,金纳米棒仍然留在细胞质中.当利用近红外二区光照射时,金纳米棒能够进行光热转换,产生热量,导致局部温度升高,使得热休克因子(HSF)从无活性的单体转变成具有活性的三聚体(HSE),该三聚体能够被转运进入细胞核与HSP70启动子结合,致使转录激活,从而表达Cas9蛋白.当停止光照时,温度下降,HSE重新变成无活性的HSF,进而抑制了转录过程,通过这种方式,可以对CRISPR-Cas9的功能进行调节.并且,在该策略中,作者利用近红外二区的光作为激发光,该激发光波长更长,组织穿透深度更深,更适合在活体水平上进行基因编辑的控制. Pu等^[74]发展了一种利用近红外光调节的半

导体聚合物纳米换能器(pSPN),用于递送CRISPR-Cas9质粒,并进行非侵入基因编辑调控.pSPN是由能够产生单线态氧的骨架分子以及聚乙烯亚胺组成.聚乙烯亚胺与骨架分子通过响应单线态氧的化学键连接.由于聚乙烯亚胺带正电,pSPN能够吸附CRISPR-Cas9质粒.在近红外光的照射下,pSPN的骨架分子能够产生单线态氧,破坏连接键,致使半导体聚合物结构破坏,释放CRISPR-Cas9质粒,引发基因编辑.实验结果显示,在细胞和活体水平上,与无光照对照组相比,光照组能够分别实现15倍和1.8倍基因编辑的增强(图8).

图8 利用pSPN递送CRISPR-Cas9质粒并利用近红外光照射控制CRISPR-Cas9基因编辑功能示意图.

Figure 8 Schematic representation of pSPN-mediated delivery and light-controlled CRISPR-Cas9 gene editing under the NIR light irradiation (680 nm)^[74]. Copyright©2019, Wiley-VCH Verlag GmbH & KGaA, Weinheim.

4 总结与展望

本文综述了利用化学分子以及光对CRISPR-Cas9系统发挥基因编辑功能进行控制的策略.由于CRISPR-Cas9系统相比于传统的基因编辑方法具有制备简便、成本低、快捷高效的优点,所以它极大地促进了基因编辑的发展.对于CRISPR-Cas9系统进行时空维度的活性调控,能够减少其脱靶效应,提高基因编辑的特异性与精准性.这对于基因编辑在基因疾病治疗等方面的应用,具有重要意义,能够推动基因编辑从基础研究向临床应用的转化.但是,要真正实现可调控的基因编辑,还面临着许多挑战.首先,能够用于CRISPR-Cas9调控的化学分子相对较少,调控的操作过程相对复杂,仍然需要发展更为有效的化学以及光控制开关,简化调控CRISPR-Cas9系统所需要的复杂操作,进一步推动这些策略从细胞水平向活体水平应用的发展.其次,对于利用纳米材料进行递送,进而利用光控

制 CRISPR-Cas9 系统发挥作用的策略而言, 虽然能够实现成功递送, 可控释放, 但是, 真正用于临床治疗, 纳米材料的生物安全性以及精准靶向问题仍然需要考虑。此外, 通过外界条件调控 CRISPR-Cas9 发挥基因编辑的功能, 仍然缺乏能够在活体水平上对 CRISPR-Cas9 功能进行可逆调控的策略, 这一问题需要进一步解决。

作者简介

公少华, 山东师范大学化学化工与材料科学学院在读博士研究生, 主要从事功能纳米探针的构建及生物应用研究工作。

李娜, 2009 年于山东大学毕业获得理学博士学位, 山东师范大学化学化工与材料科学学院教授、博士生导师, 国家自然科学基金优秀青年基金获得者, 教育部“长江学者奖励计划”青年学者, 山东省自然科学基金杰出青年基金获得者, 泰山学者青年专家。主要从事新型功能纳米荧光探针的设计合成及其用于活细胞、活体内活性物种的检测、成像及可控药物输送的研究。2018 年获得国家自然科学基金二等奖(第五位), 2016 年获山东省自然科学一等奖(第三位)和山东省高等学校优秀科研成果自然科学一等奖(第一位)。

唐波, 1994 年毕业于南开大学化学系, 获理学博士, 山东师范大学化学化工与材料科学学院教授、博士生导师, 首届十佳全国优秀科技工作者提名奖获得者, 973 计划首席科学家, 国家杰出青年科学基金获得者, “新世纪百千万人才工程”国家级人选。现主要从事分子及纳米荧光探针的合成及其在生物成像中的应用、绿色化工、荧光材料合成及太阳能化学转化与储存等方面研究工作。荣获国家自然科学基金二等奖 1 项, 国家科技进步奖二等奖 2 项, 山东省自然科学一等奖 1 项, 山东省科技进步奖一等奖 2 项。

References

- [1] Jiang, F.; Doudna, J. A. *Annu. Rev. Biophys.* **2017**, *46*, 505.
- [2] Garcia-Doval, C.; Jinek, M. *Curr. Opin. Struct. Biol.* **2017**, *47*, 157.
- [3] Makarova, K. S.; Haft, D. H.; Barrangou, R.; Brouns, S. J.; Charpentier, E.; Horvath, P.; Moineau, S.; Mojica, F. J.; Wolf, Y. I.; Yakunin, A. F.; van der Oost, J.; Koonin, E. V. *Nat. Rev. Microbiol.* **2011**, *9*, 467.
- [4] Wang, H.; La Russa, M.; Qi, L. S. *Annu. Rev. Biochem.* **2016**, *85*, 227.
- [5] Nunez, J. K.; Harrington, L. B.; Doudna, J. A. *ACS Chem. Biol.* **2016**, *11*, 681.
- [6] Gasiunas, G.; Barrangou, R.; Horvath, P.; Siksnys, V. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **2012**, *109*, 15539.
- [7] Gutschner, T.; Haemmerle, M.; Genovese, G.; Draetta, G. F.; Chin, L. *Cell Rep.* **2016**, *14*, 1555.
- [8] Dow, L. E. *Trends Mol. Med.* **2015**, *21*, 609.
- [9] Pickar-Oliver, A.; Gersbach, C. A. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* **2019**, *20*, 490.
- [10] LaFountaine, J. S.; Fathe, K.; Smyth, H. D. *Int. J. Pharm.* **2015**, *494*, 180.
- [11] Gupta, R. M.; Musunuru, K. *J. Clin. Invest.* **2014**, *124*, 4154.
- [12] Gaj, T.; Gersbach, C. A.; Barbas, C. F. *Trends Biotechnol.* **2013**, *31*, 397.
- [13] Doudna, J. A.; Charpentier, E. *Science* **2014**, *346*, 1258096.
- [14] Hsu, P. D.; Lander, E. S.; Zhang, F. *Cell* **2014**, *157*, 1262.
- [15] Platt, R. J.; Chen, S.; Zhou, Y.; Yim, M. J.; Swiech, L.; Kempton, H. R.; Dahlman, J. E.; Parnas, O.; Eisenhaure, T. M.; Jovanovic, M.; Graham, D. B.; Jhunjhunwala, S.; Heidenreich, M.; Xavier, R. J.; Langer, R.; Anderson, D. G.; Hacohen, N.; Regev, A.; Feng, G.; Sharp, P. A.; Zhang, F. *Cell* **2014**, *159*, 440.
- [16] Carroll, K. J.; Makarewich, C. A.; McAnally, J.; Anderson, D. M.; Zentilin, L.; Liu, N.; Giacca, M.; Bassel-Duby, R.; Olson, E. N. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **2016**, *113*, 338.
- [17] Wang, T.; Wei, J. J.; Sabatini, D. M.; Lander, E. S. *Science* **2014**, *343*, 80.
- [18] Behan, F. M.; Iorio, F.; Picco, G.; Goncalves, E.; Beaver, C. M.; Migliardi, G.; Santos, R.; Rao, Y.; Sassi, F.; Pinnelli, M.; Ansari, R.; Harper, S.; Jackson, D. A.; McRae, R.; Pooley, R.; Wilkinson, P.; van der Meer, D.; Dow, D.; Buser-Doepner, C.; Bertotti, A.; Trusolino, L.; Stronach, E. A.; Saez-Rodriguez, J.; Yusa, K.; Garnett, M. J. *Nature* **2019**, *568*, 511.
- [19] Didovik, A.; Borek, B.; Tsimring, L.; Hasty, J. *Curr. Opin. Biotechnol.* **2016**, *40*, 177.
- [20] Nihongaki, Y.; Furuhashi, Y.; Otabe, T.; Hasegawa, S.; Yoshimoto, K.; Sato, M. *Nat. Methods* **2017**, *14*, 963.
- [21] Ma, Y.; Wang, M.; Li, W.; Zhang, Z.; Zhang, X.; Wu, G.; Tan, T.; Cui, Z.; Zhang, X. E. *Anal. Chem.* **2017**, *89*, 12896.
- [22] Chen, B.; Zou, W.; Xu, H.; Liang, Y.; Huang, B. *Nat. Commun.* **2018**, *9*, 1.
- [23] Wang, X.; Xiong, E.; Tian, T.; Cheng, M.; Lin, W.; Wang, H.; Zhang, G.; Sun, J.; Zhou, X. *ACS Nano* **2020**, *14*, 2497.
- [24] Xu, W.; Jin, T.; Dai, Y.; Liu, C. C. *Biosens. Bioelectron.* **2020**, *155*, 112100.
- [25] De Ravin, S. S.; Li, L.; Wu, X.; Choi, U.; Allen, C.; Koontz, S.; Lee, J.; Theobald-Whiting, N.; Chu, J.; Garofalo, M.; Sweeney, C.; Kardava, L.; Moir, S.; Viley, A.; Natarajan, P.; Su, L.; Kuhns, D.; Zarembek, K. A.; Peshwa, M. V.; Malech, H. L. *Sci. Transl. Med.* **2017**, *9*, eaah3480.
- [26] Park, H.; Oh, J.; Shim, G.; Cho, B.; Chang, Y.; Kim, S.; Baek, S.; Kim, H.; Shin, J.; Choi, H.; Yoo, J.; Kim, J.; Jun, W.; Lee, M.; Lengner, C. J.; Oh, Y. K.; Kim, J. *Nat. Neurosci.* **2019**, *22*, 524.
- [27] Fu, Y.; Foden, J. A.; Khayter, C.; Maeder, M. L.; Reyon, D.; Joung, J. K.; Sander, J. D. *Nat. Biotechnol.* **2013**, *31*, 822.
- [28] Cradick, T. J.; Fine, E. J.; Antico, C. J.; Bao, G. *Nucleic Acids Res.* **2013**, *41*, 9584.
- [29] Lin, Y.; Cradick, T. J.; Brown, M. T.; Deshmukh, H.; Ranjan, P.; Sarode, N.; Wile, B. M.; Vertino, P. M.; Stewart, F. J.; Bao, G. *Nucleic Acids Res.* **2014**, *42*, 7473.
- [30] Wu, X.; Scott, D. A.; Kriz, A. J.; Chiu, A. C.; Hsu, P. D.; Dadon, D. B.; Cheng, A. W.; Trevino, A. E.; Konermann, S.; Chen, S.; Jaenisch, R.; Zhang, F.; Sharp, P. A. *Nat. Biotechnol.* **2014**, *32*, 670.
- [31] Dominguez, A. A.; Lim, W. A.; Qi, L. S. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* **2016**, *17*, 5.
- [32] Knott, G. J.; Doudna, J. A. *Science* **2018**, *361*, 866.

- [33] Zhang, X.-H.; Tee, L. Y.; Wang, X.-G.; Huang, Q.-S.; Yang, S.-H. *Mol. Ther. Nucleic Acids* **2015**, *4*, e264.
- [34] Ran, F. A.; Hsu, P. D.; Lin, C. Y.; Gootenberg, J. S.; Konermann, S.; Trevino, A. E.; Scott, D. A.; Inoue, A.; Matoba, S.; Zhang, Y.; Zhang, F. *Cell* **2013**, *154*, 1380.
- [35] Fu, Y.; Sander, J. D.; Reyon, D.; Cascio, V. M.; Joung, J. K. *Nat. Biotechnol.* **2014**, *32*, 279.
- [36] Guilinger, J. P.; Thompson, D. B.; Liu, D. R. *Nat. Biotechnol.* **2014**, *32*, 577.
- [37] Nihongaki, Y.; Otabe, T.; Sato, M. *Anal. Chem.* **2018**, *90*, 429.
- [38] Cai, W.; Luo, T.; Mao, L.; Wang, M. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, *10.1002/ange.202005644*.
- [39] Hsu, P. D.; Scott, D. A.; Weinstein, J. A.; Ran, F. A.; Konermann, S.; Agarwala, V.; Li, Y.; Fine, E. J.; Wu, X.; Shalem, O.; Cradick, T. J.; Marraffini, L. A.; Bao, G.; Zhang, F. *Nat. Biotechnol.* **2013**, *31*, 827.
- [40] Mandegar, M. A.; Huebsch, N.; Frolov, E. B.; Shin, E.; Truong, A.; Olvera, M. P.; Chan, A. H.; Miyaoka, Y.; Holmes, K.; Spencer, C. I.; Judge, L. M.; Gordon, D. E.; Eskildsen, T. V.; Villalta, J. E.; Horlbeck, M. A.; Gilbert, L. A.; Krogan, N. J.; Sheikh, S. P.; Weissman, J. S.; Qi, L. S.; So, P. L.; Conklin, B. R. *Cell Stem Cell* **2016**, *18*, 541.
- [41] Hoffmann, M. D.; Aschenbrenner, S.; Grosse, S.; Rapti, K.; Domenger, C.; Fakhiri, J.; Mastel, M.; Borner, K.; Eils, R.; Grimm, D.; Niopek, D. *Nucleic Acids Res.* **2019**, *47*, e75.
- [42] Hirose, M.; Fujita, Y.; Saito, H. *ACS Synth. Biol.* **2019**, *8*, 1575.
- [43] Hanewich-Hollatz, M. H.; Chen, Z.; Hochrein, L. M.; Huang, J.; Pierce, N. A. *ACS Cent. Sci.* **2019**, *5*, 1241.
- [44] Zetsche, B.; Volz, S. E.; Zhang, F. *Nat. Biotechnol.* **2015**, *33*, 139.
- [45] Davis, K. M.; Pattanayak, V.; Thompson, D. B.; Zuris, J. A.; Liu, D. R. *Nat. Chem. Biol.* **2015**, *11*, 316.
- [46] Liu, K. I.; Ramli, M. N.; Woo, C. W.; Wang, Y.; Zhao, T.; Zhang, X.; Yim, G. R.; Chong, B. Y.; Gowher, A.; Chua, M. Z.; Jung, J.; Lee, J. H.; Tan, M. H. *Nat. Chem. Biol.* **2016**, *12*, 980.
- [47] Nguyen, D. P.; Miyaoka, Y.; Gilbert, L. A.; Mayerl, S. J.; Lee, B. H.; Weissman, J. S.; Conklin, B. R.; Wells, J. A. *Nat. Commun.* **2016**, *7*, 12009.
- [48] Maji, B.; Moore, C. L.; Zetsche, B.; Volz, S. E.; Zhang, F.; Shoulters, M. D.; Choudhary, A. *Nat. Chem. Biol.* **2017**, *13*, 9.
- [49] Manna, D.; Maji, B.; Gangopadhyay, S. A.; Cox, K. J.; Zhou, Q.; Law, B. K.; Mazitschek, R.; Choudhary, A. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2019**, *58*, 6285.
- [50] Senturk, S.; Shirole, N. H.; Nowak, D. G.; Corbo, V.; Pal, D.; Vaughan, A.; Tuveson, D. A.; Trotman, L. C.; Kinney, J. B.; Sordella, R. *Nat. Commun.* **2017**, *8*, 14370.
- [51] Rose, J. C.; Stephany, J. J.; Valente, W. J.; Trevillian, B. M.; Dang, H. V.; Bielas, J. H.; Maly, D. J.; Fowler, D. M. *Nat. Methods* **2017**, *14*, 891.
- [52] Fontana, J.; Dong, C.; Ham, J. Y.; Zalatan, J. G.; Carothers, J. M. *Biotechnol. J.* **2018**, *13*, e1800069.
- [53] Tang, W.; Hu, J. H.; Liu, D. R. *Nat. Commun.* **2017**, *8*, 15939.
- [54] Lin, B.; An, Y.; Meng, L.; Zhang, H.; Song, J.; Zhu, Z.; Liu, W.; Song, Y.; Yang, C. *Chem. Commun.* **2019**, *55*, 12223.
- [55] Kundert, K.; Lucas, J. E.; Watters, K. E.; Fellmann, C.; Ng, A. H.; Heineke, B. M.; Fitzsimmons, C. M.; Oakes, B. L.; Qu, J.; Prasad, N.; Rosenberg, O. S.; Savage, D. F.; El-Samad, H.; Doudna, J. A.; Kortemme, T. *Nat. Commun.* **2019**, *10*, 2127.
- [56] Habibian, M.; McKinlay, C.; Blake, T. R.; Kietrys, A. M.; Waymouth, R. M.; Wender, P. A.; Kool, E. T. *Chem. Sci.* **2020**, *11*, 1011.
- [57] Wang, S.-R.; Wu, L.-Y.; Huang, H.-Y.; Xiong, W.; Liu, J.; Wei, L.; Yin, P.; Tian, T.; Zhou, X. *Nat. Commun.* **2020**, *11*, 91.
- [58] Nihongaki, Y.; Kawano, F.; Nakajima, T.; Sato, M. *Nat. Biotechnol.* **2015**, *33*, 755.
- [59] Hemphill, J.; Borchardt, E. K.; Brown, K.; Asokan, A.; Deiters, A. *J. Am. Chem. Soc.* **2015**, *137*, 5642.
- [60] Zhou, X. X.; Zou, X.; Chung, H. K.; Gao, Y.; Liu, Y.; Qi, L. S.; Lin, M. Z. *ACS Chem. Biol.* **2018**, *13*, 443.
- [61] Pawluk, A.; Davidson, A. R.; Maxwell, K. L. *Nat. Rev. Microbiol.* **2018**, *16*, 12.
- [62] Bubeck, F.; Hoffmann, M. D.; Harteveld, Z.; Aschenbrenner, S.; Bietz, A.; Waldhauer, M. C.; Borner, K.; Fakhiri, J.; Schmela, C.; Dietz, L.; Grimm, D.; Correia, B. E.; Eils, R.; Niopek, D. *Nat. Methods* **2018**, *15*, 924.
- [63] Jain, P. K.; Ramanan, V.; Schepers, A. G.; Dalvie, N. S.; Panda, A.; Fleming, H. E.; Bhatia, S. N. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2016**, *55*, 12440.
- [64] Gao, P.; Pan, W.; Li, N.; Tang, B. *Chem. Sci.* **2019**, *10*, 6035.
- [65] Shao, J.; Wang, M.; Yu, G.; Zhu, S.; Yu, Y.; Heng, B. C.; Wu, J.; Ye, H. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **2018**, *115*, E6722.
- [66] Wang, P.; Zhang, L.; Xie, Y.; Wang, N.; Tang, R.; Zheng, W.; Jiang, X. *Adv. Sci.* **2017**, *4*, 1700175.
- [67] Yue, H.; Zhou, X.; Cheng, M.; Xing, D. *Nanoscale* **2018**, *10*, 1063.
- [68] Zhou, W.; Cui, H.; Ying, L.; Yu, X.-F. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2018**, *57*, 10268.
- [69] Alsaiani, S. K.; Patil, S.; Alyami, M.; Alamoudi, K. O.; Aleisa, F. A.; Merzaban, J. S.; Li, M.; Khashab, N. M. *J. Am. Chem. Soc.* **2018**, *140*, 143.
- [70] Pan, Y.; Yang, J.; Luan, X.; Liu, X.; Li, X.; Yang, J.; Huang, T.; Sun, L.; Wang, Y.; Lin, Y.; Song, Y. *Sci. Adv.* **2019**, *5*, eaav7199.
- [71] Peng, H.; Le, C.; Wu, J.; Li, X. F.; Zhang, H.; Le, X. C. *ACS Nano* **2020**, *14*, 2817.
- [72] Wang, P.; Zhang, L.; Zheng, W.; Cong, L.; Guo, Z.; Xie, Y.; Wang, L.; Tang, R.; Feng, Q.; Hamada, Y.; Gonda, K.; Hu, Z.; Wu, X.; Jiang, X. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2018**, *57*, 1491.
- [73] Chen, X.; Chen, Y.; Xin, H.; Wan, T.; Ping, Y. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **2020**, *117*, 2395.
- [74] Lyu, Y.; He, S.; Li, J.; Jiang, Y.; Sun, H.; Miao, Y.; Pu, K. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2019**, *58*, 18197.

(Cheng, B.)