二乙基锌促进 CO₂ 的硅氢化反应以及 CO₂ 为 C1 合成子的有机胺甲酰化或脲化反应

杜重阳 陈耀峰*

(中国科学院 中国科学院大学 上海有机化学研究所 金属有机化学国家重点实验室 上海 200032)

摘要 CO₂ 的固定和转化具有重要研究意义, 特别是采用廉价且良好生物相容性的金属催化剂将其转化为有用的有机化合物. 本工作报道采用商品化 ZnEt₂ (1.0 mol%)可促进 CO₂ 的硅氢化反应生成甲氧基硅醚, 以及 CO₂ 为 C1 合成子的有机胺甲酰化或脲化反应生成酰胺或脲类化合物. 在 1.0 mol% ZnEt₂ 存在下, CO₂ 和 (EtO)₃SiH 发生硅氢化反应, 一锅选择性还原为甲氧基硅醚(CH₃OSi(OEt)₃). 考察了反应条件的影响, 在 1.0 MPa CO₂ 起始压力下, 90 °C 反应 7 h, 甲氧基硅醚的产率达到约 90%. 当上述反应体系中存在有机胺时, 则发生了 CO₂ 为 C1 合成子的有机胺甲酰化或脲化反应. 当采用二级有机胺为底物时, 反应生成酰胺类产物; 当一级有机胺为底物时, 反应主要生成脲类产物. 考察了反应底物取代基的影响, 含脂肪基和芳香基的二级有机胺均可发生甲酰化反应, 芳香基的对位含给电子取代基时明显有利于该甲酰化反应. 含脂肪基和芳香基的一级有机胺均可发生脲化反应, 芳香基对位取代基的电子性质对脲化反应的影响规律不如在甲酰化反应中的明显.

关键词 二乙基锌; 二氧化碳转化; 硅氢化反应; 酰胺; 脲

ZnEt₂ Promoted Hydrosilylation of CO₂ and Formylation or Ureolation of Amines with CO₂ as a C1 Building Block

Du, Chongyang Chen, Yaofeng*

(State Key Laboratory of Organometallic Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032, China)

Abstract Fixation and transformation of CO₂ are of the great importance, especially the conversion of CO₂ into valuable organic compounds catalyzed by the cheap and biocompatible metal catalysts. Zinc is an abundant, biocompatible and environmentally friendly element. ZnEt₂ is commercial available, and has been widely used as reducing or transmetalation agent in hydrocarboxylation of unsaturated hydrocarbons with CO₂. In these reactions, ZnEt₂ is generally used in stoichiometric amount or excess amount. This manuscript reports the hydrosilylation of CO₂ into methoxysilane promoted by a catalytic amount of ZnEt₂ (1.0 mol%), the ZnEt₂ promoted formylation or ureolation of amines with CO₂ as a one-carbon (C1) building block is also described. The hydrosilylation of CO₂ into methoxysilane (CH₃OSi(OEt)₃) with (EtO)₃SiH as a hydrosilylation reagent is affected by CO₂ pressure, ZnEt₂ amount, reaction temperature and reaction time. Under the reaction conditions of 1.0 MPa CO₂ (the initial CO₂ pressure) and 1.0 mol% ZnEt₂, the yield of methoxysilane is up to ca. 90% after 7 h at 90 °C, and no solvent is used for this reaction. In the presence of organic amine, the reaction gives formamide or urea instead of methoxysilane. Under 1.5 MPa CO₂, 1.0 mol% ZnEt₂, 2.4 equiv. (EtO)₃SiH and 100 °C, a series of secondary amines, both the aromatic ones and the aliphatic ones, can be formylated into formamides. In the formylation of *N*-methylanilines with different substituents at *para*-position, the isolated yields of the formylation products are in the order of OMe ≈ Me > H > F > Cl ≈ Br > CF₃ > NO₂, indicating the electron-donating group at the *para*-position of the *N*-methylanilines is benefit for the formylation reaction. When primary amines are used as the substrates, the reactions prefer to produce urea derivatives under the same reaction conditions. In the ureolation reaction, the electronic effect is not as significant as that in the formylation reaction.

Keywords ZnEt₂; carbon dioxide transformation; hydrosilylation; formamides; ureas

1 引言

在过去十年里, 将温室气体 CO₂ 作为反应合成子用

于有机合成越来越受到人们关注^[1]. 使用硅烷作为还原剂, 通过形成具有较高键能和稳定性的 Si—O 键, 可以

* E-mail: yaofchen@mail.sioc.ac.cn

Received June 24, 2020; published August 7, 2020.

Supporting information for this article is available free of charge via the Internet at <http://sioc-journal.cn>.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21821002) and the Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences (No. XDB20000000).

项目受国家自然科学基金(No. 21821002)和中国科学院先导项目(No. XDB20000000)资助.

实现 CO_2 的硅氢化反应. 依据硅氢化的程度, 反应可以依次生成甲酸硅脂、二甲硅烷基缩醛、甲氧基硅烷和甲烷产物(图 1)^[2]. 上述硅氢化产物经过简单的衍生化, 可以得到甲酸、甲酰胺、甲醛以及甲醇等. 近些年来, 许多金属催化剂(如: $\text{Ru}^{[3]}$, $\text{Ir}^{[4]}$, $\text{Rh}^{[5]}$, $\text{Co}^{[6]}$, $\text{Ni}^{[7]}$, $\text{Cu}^{[8]}$, $\text{Pd/Pt}^{[9]}$, $\text{Sc}^{[10]}$, $\text{Zr}^{[11]}$, $\text{Mn}^{[12]}$, $\text{Mg}^{[13]}$), 有机小分子催化剂和主族路易斯酸催化剂^[14], 受阻路易斯酸碱对^[15]等被发现可用于催化 CO_2 的硅氢化反应.

图 1 CO_2 的硅氢化反应
Figure 1 Hydrosilylation of CO_2

酰胺是一类重要的化合物, 其具有广泛的用途. 因此, 以 CO_2 为原料的酰胺合成被人们所重视^[16]. 一些金属催化剂(如: $\text{Cu}^{[17]}$, $\text{Pd}^{[18]}$, $\text{Ru}^{[19]}$, $\text{Fe}^{[20]}$, $\text{Co}^{[21]}$, $\text{Rh}^{[22]}$, $\text{Ni}^{[23]}$, $\text{Au}^{[24]}$ 以及碱土金属^[25])和非金属催化剂^[26]相继被报道用于催化 CO_2 参与的酰胺合成. 另一种有重要用途的化合物, 脲类化合物, 也被发现可以通过 CO_2 与胺类化合物的反应实现. 金属催化剂(如: $\text{Au}^{[27]}$, $\text{Cs}^{[28]}$, $\text{Ce}^{[29]}$, $\text{Fe}^{[30]}$, $\text{In}^{[31]}$)和有机碱(如: $\text{Et}_3\text{N}^{[32]}$, $\text{DBU}^{[33]}$, 吡啶^[34])被发现可用于催化(或促进) CO_2 与胺类化合物反应合成脲类化合物, 但发展更为廉价的催化剂在更温和的反应条件下实现 CO_2 与胺类化合物的反应仍是人们探索的目标.

锌元素在自然界中含量丰富、而且具有很好的生物相容性, 所以锌配合物(或锌盐)在有机合成中的应用受到人们的关注, 被发掘用于许多计量反应和催化反应^[35]. 在涉及 CO_2 活化和转化方面, 锌配合物也有重要应用, 如烷基锌试剂在过渡金属催化不饱和底物与 CO_2 的氢羧基化反应中作为优良的转金属化试剂^[36], 一些锌配合物在催化 CO_2 与环氧化物共聚中表现出优秀的性能^[37]. 近年来, 锌配合物在促进 CO_2 活化和转化方面取得一些重要的新进展. Wehmschulte, Parkin, Okuda 和 Dagorne 课题组发现锌配合物可以催化 CO_2 的硅氢化反应, 生成甲酸硅脂^[38a-38d, 38f]、二甲硅烷基缩醛^[13a]、甲氧基硅醚或甲烷^[38b, 38c]. 但所用的配合物多为昂贵的离子对化合物, 如 $[\text{ZnEt}][\text{CHB}_{11}\text{Cl}_{11}]^{[38b]}$, $[(\text{NHC})\text{ZnMe}][\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_4]^{[38c]}$, $\{[\text{Tism}^{\text{PrBenz}}]\text{Zn}\}[\text{HB}(\text{C}_6\text{F}_5)_3]^{[13a]}$, $[(\text{NHC})_3\text{Zn}_3\text{H}_4(\text{THF})][\text{BPh}_4]^{[38c]}$ 和 $[(\text{nNHC})(\text{aNHC})\text{ZnMe}][\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_4]^{[38d]}$. 与此同时, 锌催化的 CO_2 为 C1 合成子的有机胺甲基化和甲酰化反应也取得突破. 2013 年, Cantat

课题组^[39]首先报道了氮杂环卡宾锌配合物催化的 CO_2 和 PhSiH_3 对有机胺的甲基化反应. 2017 年, 纪红兵课题组^[40]报道了席夫碱锌配合物/季铵盐双组分体系以及含咪唑盐离子液体单元官能化席夫碱配体的锌配合物在温和条件下催化的 CO_2 和 PhSiH_3 对有机胺的甲酰化反应. 近期, 我们课题组^[41]发展了基于三齿氮配体的锌硅氧基中性配合物, 发现其可以有效催化 CO_2 硅氢化生成甲酸硅脂以及无 CO_2 存在下催化甲酸硅脂进一步还原生成甲氧基硅醚. 随后, 我们课题组^[42]报道了锌粉可以在硅烷存在下催化 CO_2 与有机胺发生甲酰化或脲化反应, 反应生成一系列酰胺或脲类化合物. 在研究过程中, 我们意外发现采用 1.0 mol% ZnEt_2 在 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 作为还原剂的条件下, CO_2 发生硅氢化反应一锅选择性还原为甲氧基硅醚, 并且在有机胺存在的条件下生成了酰胺或脲类化合物. 本工作报道这方面的研究结果.

2 结果与讨论

2.1 CO_2 的硅氢化反应

以商品化的 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 为硅氢化试剂, 在 1.0 mol% ZnEt_2 存在下(ZnEt_2 为上海齐格乐贸易发展有限公司的产品, 经甲苯稀释至 1.0 mol/L 使用; ZnEt_2 的用量是相对 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 而言), 1.0 MPa CO_2 起始压力下(压力值是室温下充入反应釜的压力值)90 °C 反应 5 h, 通过对反应产物的核磁检测发现 90% 的 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 发生了转化, 甲氧基硅醚的产率达到 72%. 反应产物中只有非常少量的甲酸硅酯, 这和我们之前报道的基于三齿氮配体的锌硅氧基配合物催化 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 对 CO_2 的硅氢化不同, 其在 1.0 MPa CO_2 起始压力下选择性得到甲酸硅脂. 这说明在 ZnEt_2 促进的 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 对 CO_2 的硅氢化反应中, 对反应中间体甲酸硅脂和二甲硅烷基缩醛的进一步还原是相对快速的. 甲氧基硅醚的产率低于 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 的转化率, 这主要是因为反应中有部分 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 发生自身歧化反应^[43]. 之前锌配合物催化 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 对 CO_2 硅氢化选择性生成甲氧基硅醚是 Dagorne 等^[38c]在 2017 年报道的, 他们采用了昂贵的 $[(\text{NHC})\text{ZnMe}][\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_4]$ 为催化剂. 在 1.0 mol% ZnEt_2 存在下即可发生 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 对 CO_2 硅氢化选择性生成甲氧基硅醚是出乎意料的, 在许多文献报道的 CO_2 转化中, ZnEt_2 通常是等物质的量或过量使用, 作为转金属化试剂. Stephen 课题组^[44]曾报道 ZnEt_2 与 $t\text{-Bu}_3\text{P}$ 组成的 Lewis 酸碱对可以催化 PhSiH_3 对 CO_2 硅氢化反应生成甲氧基硅醚, 但在反应中单独使用 ZnEt_2 作为催化剂则不能发生. 我们发现当采用 Ph_2SiH_2 和 $n\text{-C}_6\text{H}_{13}\text{SiH}_3$ 作还原剂时, 也没有硅氢化反应发生. $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 作还原剂时发生硅氢化的可能原因是 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 中 -OEt 取代基的存在使得 Si-H 键容易被活化.

考察了不同反应条件对该反应的影响, 结果见表 1. 在相同条件下, 将反应时间从 5 h 延长至 7 h, $(\text{EtO})_3\text{SiH}$

转化率从 90% 升到 97%，甲氧基硅醚的产率从 72% 升到 89% (表 1, Entries 1, 2). 将反应温度从 90 °C 降至 70 °C, 反应 7 h 后硅烷的转化率和甲氧基硅醚的产率分别为 83% 和 59%; 继续降低反应温度至 50 °C, 硅烷的转化率和甲氧基硅醚的产率进一步降低, 分别为 61% 和 23%; 对反应产物的核磁检测发现随着温度的降低硅烷自身歧化产物占比上升 (表 1, Entries 3, 4). 在 90 °C 反应温度下, 将 ZnEt_2 用量减少为 0.5 mol%, 硅烷的转化率和甲氧基硅醚的产率下降至 69% 和 43% (表 1, Entry 5). CO_2 压力也对反应有明显的影响, 当 CO_2 起始压力从 1.0 MPa 降低为 0.5 MPa 时, 硅烷的转化率和甲氧基硅醚的产率下降至 68% 和 35%; 当 CO_2 压力为常压时, 没有观察到甲氧基硅醚的生成, 只有少量硅烷自身歧化产物 (表 1, Entries 6, 7). 为了检测是否可能使用的 ZnEt_2 中微量杂质导致了该硅氢化反应, 我们从其它公司购买了 ZnEt_2 (1.0 mol/L 的甲苯溶液, J&K 公司), 在相同条件下进行了 CO_2 的硅氢化反应, 得到了非常相近的实验结果 (表 1, Entry 8 vs. Entry 2). 在不存在 ZnEt_2 的情况下, 没有 CO_2 硅氢化反应发生. 考虑到 ZnEt_2 在反应中会分解为金属锌, 所以也研究了 2.0 mol% Zn 粉存在下的反应, 发现也没有甲氧基硅醚产物生成. 我们研究了 ZnEt_2 和 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 的反应, 发现在 80 °C 温度下, 其生成黑色锌粉的速度远大于 ZnEt_2 在相同条件下分解产生锌粉的速度. 这可能由于 ZnEt_2 和 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 反应生成了锌的氢化物物种, 而其不稳定随即发生分解所导致. 因此, 对于 ZnEt_2 促进的 CO_2 硅氢化反应, 我们认为在反应中可能 ZnEt_2 和 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 反应生成锌氢化物, 锌氢化物随即催化了 CO_2 的硅氢化反应, 类似于其它锌配合物催化 CO_2 硅氢化反应的情况.

表 1 二乙基锌促进的 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 对 CO_2 硅氢化反应^a
Table 1 Hydrosilylation of CO_2 with $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ promoted by ZnEt_2 ^a

$\text{CO}_2 + 3 (\text{EtO})_3\text{SiH} \xrightarrow[\text{solvent free}]{1.0 \text{ mol\% ZnEt}_2} \text{CH}_3\text{OSi}(\text{OEt})_3 + [(\text{EtO})_3\text{Si}]_2\text{O}$					
Entry	CO_2 Pressure/ MPa	Temp./°C	Time/h	Conv. ^b /%	Yield ^b /%
1	1.0	90	5	90	72
2	1.0	90	7	97	89
3	1.0	70	7	83	59
4	1.0	50	7	61	23
5 ^c	1.0	90	7	69	43
6	0.5	90	7	68	35
7	0.1	90	7	—	0
8 ^d	1.0	90	7	99	93

^a Reaction conditions: $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ (10 mmol). ^b Determined by quantitative ^1H NMR using mesitylene as an internal standard. ^c ZnEt_2 (0.05 mmol), $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ (10 mmol). ^d ZnEt_2 (1.0 mol/L in toluene) purchased from J&K.

2.2 CO_2 为 C1 合成子的有机胺甲酰化或脲化反应

进一步研究发现当反应体系中有 *N*-甲基苯胺存在时, 发生了对 *N*-甲基苯胺的甲酰化反应, 高选择性得到

N-甲基甲酰苯胺 (表 2). 当 $n(\text{ZnEt}_2) : n(\text{N-methylaniline}) : n((\text{EtO})_3\text{SiH})$ 的比例为 1 : 100 : 200 时, 在 90 °C 和 1.5 MPa CO_2 起始压力下反应 24 h, *N*-甲基苯胺的转化率为 80%, 胺甲酰化产物 *N*-甲基甲酰苯胺的产率达到 76% (表 2, Entry 1). 升高反应温度至 100 °C, *N*-甲基苯胺的转化率和 *N*-甲基甲酰苯胺的产率分别提升至 83% 和 82% (表 2, Entry 2). 考虑到 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 自身歧化的消耗, 将 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 的用量进行 20% 的增加, *N*-甲基苯胺的转化率和 *N*-甲基甲酰苯胺的产率可以进一步提升至 88% 和 86% (表 2, Entry 3). 在 $n(\text{ZnEt}_2) : n(\text{N-methylaniline}) : n((\text{EtO})_3\text{SiH})$ 的比例为 1 : 100 : 240 的情况下, 考察了反应温度的影响. 将反应温度升高至 110 °C, *N*-甲基苯胺的转化率和 *N*-甲基甲酰苯胺的产率基本与 100 °C 时的结果相似 (表 2, Entry 4); 降低反应温度至 90 °C, *N*-甲基苯胺的转化率和 *N*-甲基甲酰苯胺的产率下降至 82% 和 78% (表 2, Entry 5). 缩短反应时间为 12 h, *N*-甲基苯胺的转化率和 *N*-甲基甲酰苯胺的产率下降至 76% 和 70% (表 2, Entry 6). 降低 CO_2 起始压力至 1.0 MPa, *N*-甲基苯胺的转化率和 *N*-甲基甲酰苯胺的产率下降至 81% 和 78% (表 2, Entry 7). 在反应中不加入 ZnEt_2 时, *N*-甲基苯胺的甲酰化反应不发生 (表 2, Entry 8). 考虑到 ZnEt_2 高效促进 CO_2 的硅氢化反应, 以及我们的独立实验验证甲酸硅脂和 *N*-甲基苯胺快速反应生成 *N*-甲基甲酰苯胺, 我们认为可能在反应中 ZnEt_2 促进 CO_2 硅氢化生成甲酸硅脂, 该中间体随即和反应体系中的 *N*-甲基苯胺反应生成了 *N*-甲基甲酰苯胺. 我们前面的研究中发现锌粉可以催化 CO_2 和 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 对 *N*-甲基苯胺的甲酰化^[42], 在反应中 ZnEt_2 分解生成的一些锌粉可能也导致了部分 *N*-甲基甲酰苯胺的生成.

表 2 二乙基锌促进的 CO_2 和 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 对 *N*-甲基苯胺甲酰化反应^a
Table 2 Formylation of *N*-methylaniline with CO_2 and $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ promoted by ZnEt_2 ^a

$\text{Ph-NH-Me} + \text{CO}_2 + 2 (\text{EtO})_3\text{SiH} \xrightarrow[\text{solvent free}]{1.0 \text{ mol\% ZnEt}_2} \text{Ph-N(Me)-C(=O)H} + [(\text{EtO})_3\text{Si}]_2\text{O} + \text{H}_2$						
Entry	Ratio ^b	CO_2 Pressure/ MPa	Temp./ °C	Time/ h	Conv. ^c / %	Yield ^c / %
1	1:100:200	1.5	90	24	80	76
2	1:100:200	1.5	100	24	83	82
3	1:100:240	1.5	100	24	88	86
4	1:100:240	1.5	110	24	90	87
5	1:100:240	1.5	90	24	82	78
6	1:100:240	1.5	100	12	76	70
7	1:100:240	1.0	100	24	81	78
8	0:100:240	1.5	100	24	0	0

^a Reaction conditions: *N*-methylaniline (5 mmol). ^b Ratio = $n(\text{ZnEt}_2) : n(\text{N-methylaniline}) : n((\text{EtO})_3\text{SiH})$. ^c Determined by quantitative ^1H NMR using mesitylene as an internal standard.

考察了该甲酰化反应的底物适用性, 结果如表 3 所示. 对于 *N*-甲基芳胺, 产物的产率明显受芳环对位取代基的电子效应影响. 当对位是供电子取代基-OMe 和 -Me 时, 产物的分离产率可以达到 90%以上. 而当对位是强吸电子取代基时, 产物的产率很低, 如对位含- CF_3 的底物只能取得 33%的产率, 对位含- NO_2 的底物没有甲酰化产物生成. 对位含卤素取代基的底物也可以在该催化体系下发生甲酰化反应, 对位含-F 和 -Cl 取代基的底物分别可以取得 76%和 62%产物产率, 其中等的产率也和-F 和 -Cl 取代基中等的吸电子性相吻合. 芳环邻位含-Me 的底物也可以取得高的产物产率(86%), 而芳环邻位含-F 的底物只能取得 51%的产物产率. 含杂芳环的底物 *N*-甲基-2-氨基吡啶也可以发生甲酰化反应, 并取得 91%的产物产率. 此外, 该催化体系还适用于二级脂肪胺. 当二正己基胺为底物时, 产物的产率可达 95%; 环胺类化合物在反应中也表现出良好的反应性, 产物产率达到 88%以上. 双环己基胺的反应性较差, 仅以 43%的产率得到酰胺产物, 这可能受其大的立体位阻影响. *N*-甲基苄基胺和 *N,N*-二苄基胺为底物时, 产物的产率为

表 3 二级胺甲酰化反应的底物拓展^aTable 3 Substrate scope for the formylation of secondary amines^a

^a Reaction condition: **1** (5 mmol), $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ (12 mmol), 1.5 MPa initial CO_2 pressure, 100 °C, 24 h, isolated yield; ^b ^1H NMR spectrum showed nearly no consumption of **1e**.

中等(73%和 65%). 二氢吡啶和四氢喹啉作为底物时, 也可以达到中等产率(68%和 74%). 含有双胺基的底物, *N,N'*-二甲基-1,2-乙二胺, 在反应中两个胺基都可以被甲酰化, 以 62%的产率得到双甲酰化产物.

在研究过程中, 我们发现当采用苯胺为底物时, 以 47%的分离产率得到了二苄基脒. 对反应后混合物的核磁分析显示有少量甲酰苯胺和 *N,N'*-二苄基脒产物生成. 在反应中不加入 ZnEt_2 , 相同条件下没有二苄基脒生成, 只有当温度升到 150 °C(油浴温度), 才有约 20%的二苄基脒生成(通过对反应后混合物的核磁分析确定). 随后研究了该反应体系对含有不同取代基的苯胺衍生物适用情况(表 4). 对位含氯取代的苯胺反应效果良好, 能以 82%的产率得到脒类化合物. 对位含三氟甲基取代的苯胺, 对反应后混合物的核磁分析显示产物的产率达到约 80%, 但在分离中损失较多, 分离产率为 60%. 对位含甲氧基的苯胺反应效果较差, 产物的分离产率为 50%. 对于大位阻的苯胺衍生物, 2,6-二异丙基苯胺, 反应也良好, 产物的产率为 78%. 另外苯胺衍生物的邻位也可以是卤素取代基, 如氯和溴, 可以获得中等的产物产率(51%~67%). 当使用一级脂肪胺环己基胺和正己基胺为底物时, 脒类产物的产率分别为 67%和 60%. 当采用叔丁基胺时, 脒类产物的产率较低(37%), 这可能与叔丁基胺较大的位阻和较低的沸点有关. 对于苯胺, 脒类产物的产率可以达到 81%. 我们将 2,6-二溴苯胺与 *N*-甲基苯胺等物质的量混合, 在相同条件下进行催化反应, 反应主要生成了二(2,6-二溴苯基)脒和 *N*-甲基甲酰苯胺, 不对称脒类化合物-(2,6-二溴苯基)(*N*-甲基苯基)脒的量极少. 随后, 又将苯胺与 *N*-甲基苯胺等物质的量混合进行

表 4 一级胺的脒化反应底物拓展^aTable 4 Substrate scope for the urelation of primary amines^a

^a Reaction condition: **3** (5 mmol), $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ (12 mmol), 1.5 MPa initial CO_2 pressure, 100 °C, 24 h, isolated yield.

催化反应,也主要是生成了对称脲类化合物——二(苄基)脲以及 *N*-甲基甲酰苯胺,不对称脲类化合物——(苄基)(*N*-甲基苯)脲的量较少。这与锌粉催化一级胺和二级胺混合反应的情况不同,那里反应经历了异氰酸酯中间体,有大量不对称脲类化合物生成^[42]。另外,我们也研究了在相同催化条件下,甲酰苯胺与苯胺的反应。反应生成了二苯基脲,没有脲类化合物生成。根据上述实验结果,我们推测在这里可能主要是胺基甲酸硅脂中间体直接与一级胺反应生成脲类化合物^[45]。

3 结论

催化量的 ZnEt_2 可以高效促进 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 对 CO_2 的硅氢化,一锅选择性生成甲氧基硅醚($\text{CH}_3\text{OSi}(\text{OEt})_3$)。该催化反应可能经历了锌氢化物催化物种,选择性得到甲氧基硅醚表明该反应中反应中间体甲酸硅脂和双甲硅烷基缩醛的进一步还原是相对快速的。向上述反应体系中加入二级有机胺,可以得到酰胺类化合物。其可能是通过 CO_2 硅氢化反应中间体甲酸硅脂与有机胺反应得到。向上述反应体系中加入一级有机胺,可以得到脲类化合物。在上述反应体系下,有机胺甲酰化或脲化反应有较好的底物适用性。

4 实验部分

部分实验操作在氮气气氛的手套箱中进行。 ZnEt_2 为上海齐格乐贸易发展有限公司的产品,经甲苯稀释至 1.0 mol/L 使用。内标均三甲苯经 CaH_2 除水后在惰性气氛下减压蒸馏。 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 和 CO_2 (99.9%) 不经处理直接使用。固体有机胺底物不经处理直接使用,液体有机胺底物经 CaH_2 干燥 24 h 后减压蒸馏,随后储存于手套箱中。 ^1H 和 ^{19}F NMR 在超导核磁共振谱仪 Varian 400 MHz、Agilent 400 MHz 或 Bruker 400 MHz 上测定。 ^1H NMR 的化学位移值以氘代溶剂的残峰或氘代溶剂内的 SiMe_4 峰定标。 ^{19}F NMR 的化学位移值以 CF_3COOH 的化学位移值作为外标。定量 ^1H NMR 的弛豫时间使用大于 5 倍 T_1 时间,此时弛豫时间为 30 s,对样品进行 16 次采样后停止,数据经 Mestronova 处理。

定量 ^1H NMR 分析(以 *N*-甲基苯胺的甲酰化反应为例):在反应釜中将 *N*-甲基苯胺(536 mg, 5.0 mmol)、均三甲苯(120 mg, 1.0 mmol)内标和 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ (1.97 g, 12 mmol) 三者混合均匀后快速取出一小滴装入核磁管中,用氘代氯仿溶解。采用定量 ^1H NMR 谱,获得 *N*-甲基苯胺的 Me 积分面积与均三甲苯的 Me 积分面积之比。反应后,将反应釜冷却,缓慢释放 CO_2 。打开反应釜,反应液为一个均相液体。取一小滴溶于氘代氯仿中进行定量 ^1H NMR 分析,获得反应后 *N*-甲基苯胺的 Me 积分面积与均三甲苯的 Me 积分面积之比以及 *N*-甲基甲酰苯胺的 NCHO 积分面积与均三甲苯的 Me 积分面积之比。根据这些积分面积之比计算得到 *N*-甲基苯胺的转化率和

N-甲基甲酰苯胺的产率。

$(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 不能用分子筛干燥。用分子筛干燥会导致其发生歧化反应,生成易燃的 SiH_4 !

4.1 CO_2 的硅氢化反应

在手套箱中,将均三甲苯(120 mg, 1.0 mmol)内标、 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ (1.65 g, 10 mmol) 和 100 μL 的 ZnEt_2 溶液(0.1 mmol, 1.0 mol/L 的甲苯溶液)加入至 100 mL 高压反应釜中,并混合均匀。将高压反应釜密闭后移出手套箱,并在室温下充入 CO_2 气体至 1.0 MPa 压力。在 90 $^\circ\text{C}$ 油浴中加热反应 7 h 后,将反应釜在水中冷却。卸压后,打开反应釜取样分析。 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ 的转化率和甲氧基硅醚的产率经定量 ^1H NMR 确定。

4.2 CO_2 为 C1 合成子的有机胺甲酰化反应

在手套箱中,将二级胺(5.0 mmol)、均三甲苯(120 mg, 1.0 mmol)内标和 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ (1.97 g, 12 mmol) 加入至 100 mL 高压反应釜中混合均匀,之后向反应釜中加入 50 μL 的 ZnEt_2 溶液(0.05 mmol, 1.0 mol/L 的甲苯溶液)。将高压反应釜密闭后移出手套箱,并在室温下充入 CO_2 气体至 1.5 MPa 压力。在 100 $^\circ\text{C}$ 油浴中加热反应 24 h 后,将反应釜在水中冷却。卸压后,打开反应釜,取一小滴反应液用于定量 ^1H NMR 确定核磁产率,其余样品经柱层析(乙酸乙酯/石油醚)分离纯化得到目标产物。

4.3 CO_2 为 C1 合成子的有机胺脲化反应

在手套箱中,将一级胺(5.0 mmol)、均三甲苯(120 mg, 1.0 mmol)内标和 $(\text{EtO})_3\text{SiH}$ (1.97 g, 12 mmol) 加入至 100 mL 高压反应釜中混合均匀,之后向反应釜中加入 50 μL 的 ZnEt_2 溶液(0.05 mmol, 1.0 mol/L 的甲苯溶液)。将高压反应釜密闭后移出手套箱,并在室温下充入 CO_2 气体至 1.5 MPa 压力。在 100 $^\circ\text{C}$ 油浴中加热反应 24 h 后,将反应釜在水中冷却。卸压后,打开反应釜,加入约 30 mL 石油醚。搅拌约 10 min 后过滤,所得固体再用石油醚(10 mL $\times$ 2)洗涤,随后真空干燥得产物。部分产物在丙酮中进一步重结晶纯化。

References

- [1] (a) Quaranta, E.; Aresta, M. *Carbon Dioxide as Chemical Feedstock*, Wiley-VCH, Weinheim, **2010**. (b) Yu, B.; Liu, Z. M. *Chin. Sci. Bull.* **2015**, 60, 1452 (in Chinese). (c) Zhang, H.; Sun, H. J.; Li, X. Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2016**, 36, 2843 (in Chinese). (d) Yang, Z. Z.; Gao, X.; Liu, Z. M. *Curr. Opin. Green Sustain. Chem.* **2016**, 1, 13. (e) Zhang, S.; Li, X. D.; He, L. N. *Acta Chim. Sinica* **2016**, 74, 17 (in Chinese). (f) Zhang, W. Z.; Zhang, N.; Guo, C. X.; Lv, X. B. *Chin. J. Org. Chem.* **2017**, 37, 1309 (in Chinese). (g) Chen, Y. G.; Xu, X. T.; Zhang, K.; Li, Y. Q.; Zhang, L. P.; Fang, P.; Mei, T. S. *Synthesis* **2018**, 50, 35. (h) Yan, S. S.; Fu, Q.; Liao, L. L.; Sun, G. Q.; Ye, J. H.; Gong, L.; Bo-Xue, Y. Z.; Yu, D. G. *Coord. Chem. Rev.* **2018**, 374, 439. (i) Zhao, Y. F.; Liu, Z. M. *Chin. J. Chem.* **2018**, 36, 455. (j) Feng, J. P.; Zeng, S. J.; Feng, J. Q.; Dong, H. F.; Zhang, X. P. *Chin. J. Chem.* **2018**, 36, 961. (k) Wang, L.; Sun, W.; Liu, C. *Chin. J. Chem.* **2018**, 36, 353. (l) Cao, Y.; He, X.; Wang, N.; Li, H.

- R.; He, L. N. *Chin. J. Chem.* **2018**, *36*, 644 (m) Chen, Z. Y.; Liu, J. W.; Cui, H.; Zhang, L.; Su, C. Y. *Acta Chim. Sinica* **2019**, *77*, 242 (in Chinese). (陈之尧, 刘捷威, 崔浩, 张利, 苏成勇, 化学学报, **2019**, *77*, 242). (n) Zhang, Z.; Gong, L.; Zhou, X. Y.; Yan, S. S.; Li, J.; Yu, D. G. *Acta Chim. Sinica* **2019**, *77*, 783 (in Chinese). (张振, 龚莉, 周晓渝, 颜思顺, 李静, 余达刚, 化学学报, **2019**, *77*, 783). (o) Liu, X. F.; Li, X. Y.; He, L. N. *Eur. J. Org. Chem.* **2019**, *14*, 2437. (p) Wang, S.; Xi, C. J. *Chem. Soc. Rev.* **2019**, *48*, 382. (q) Ran, C. K.; Chen, X. W.; Gui, Y. Y.; Liu, J.; Song, L.; Ren, K.; Yu, D. G. *Sci. China Chem.* **2020**, DOI: 10.1007/s11426-020-9788-2.
- [2] Fernández-Alvarez, F. J.; Aitani, A. M.; Oro, L. *Catal. Sci. Technol.* **2014**, *4*, 611.
- [3] (a) Koinuma, H.; Kawakami, F.; Kato, H.; Hirai, H. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1981**, 213. (b) Süß-Fink, G.; Reiner, J. *Organomet. Chem.* **1981**, *221*, C36. (c) Jansen, A.; Görls, H.; Pitter, S. *Organometallics* **2000**, *19*, 135. (d) Jansen, A.; Pitter, S. *J. Mol. Catal. A: Chem.* **2004**, *217*, 41. (e) Deglmann, P.; Ember, E.; Hofmann, P.; Pitter, S.; Walter, O. *Chem. - Eur. J.* **2007**, *13*, 2864. (f) Metsänen, T. T.; Oestreich, M. *Organometallics* **2015**, *34*, 543.
- [4] (a) Eisenschmid, T. C.; Eisenberg, R. *Organometallics* **1989**, *8*, 1822. (b) Park, S.; Bézier, D.; Brookhart, M. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 11404. (c) Lalremuia, R.; Iglesias, M.; Polo, V.; Sanz Miguel, P. J.; Fernández-Alvarez, F. J.; Pérez-Torrente, J. J.; Oro, L. A. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 12824.
- [5] (a) Huckaba, A. J.; Hollis, S. W. *Organometallics* **2013**, *32*, 6248. (b) Itagaki, S.; Yamaguchi, K.; Mizuno, N. *J. Mol. Catal. A: Chem.* **2013**, *366*, 347.
- [6] Scheuermann, M. L.; Semproni, S. P.; Pappas, I.; Chirik, P. J. *Inorg. Chem.* **2014**, *53*, 9463.
- [7] (a) González-Sebastián, L.; Flores-Alamo, M.; García, J. J. *Organometallics* **2013**, *32*, 7186. (b) Ríos, P.; Curado, N.; López-Serrano, J.; Rodríguez, A. *Chem. Commun.* **2016**, 52, 2114. (c) Singh, V.; Sakaki, S.; Deshmukh, M. M. *Organometallics* **2018**, *37*, 1258.
- [8] (a) Motokura, K.; Kashiwame, D.; Miyaji, A.; Baba, T. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 2642. (b) Motokura, K.; Kashiwame, D.; Takahashi, N.; Miyaji, A.; Baba, T. *Chem. - Eur. J.* **2013**, *19*, 10030. (c) Zhang, L.; Cheng, J.; Hou, Z. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 4782. (d) Gui, Y. Y.; Hu, N. F.; Chen, X. W.; Liao, L. L.; Ju, T.; Ye, J. H.; Zhang, Z.; Li, J.; Yu, D. G. *J. Am. Chem. Soc.* **2017**, *139*, 17011.
- [9] (a) Mitton, S. J.; Turculet, L. *Chem. - Eur. J.* **2012**, *18*, 15258. (b) Takaya, J.; Iwasawa, N. *J. Am. Chem. Soc.* **2017**, *139*, 6074.
- [10] LeBlanc, F. A.; Piers, W. E.; Parvez, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, *53*, 789.
- [11] Matsuo, T.; Kawaguchi, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 12362.
- [12] Bertini, F.; Glatz, M.; Stöger, B.; Peruzzini, M.; Veiros, L. F.; Kirchner, K.; Gonsalvi, L. *ACS Catal.* **2019**, *9*, 632.
- [13] (a) Rauch, M.; Parkin, G. *J. Am. Chem. Soc.* **2017**, *139*, 18162. (b) Rauch, M.; Strater, Z.; Parkin, G. *J. Am. Chem. Soc.* **2019**, *141*, 17754.
- [14] (a) Riduan, S. N.; Zhang, Y.; Ying, J. Y. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 3322. (b) Wehmschulte, R. J.; Saleh, M.; Powell, D. R. *Organometallics* **2013**, *32*, 6812. (c) Courtemanche, M. A.; Légaré, M. A.; Rochette, É.; Fontaine, F. G. *Chem. Commun.* **2015**, *51*, 6858. (d) Chen, J.; Falivene, L.; Caporaso, L.; Cavallo, L.; Chen, E. Y. X. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, *138*, 5321.
- [15] (a) Berkefeld, A.; Piers, W. E.; Parvez, M. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 10660. (b) Jiang, Y.; Blacque, O.; Fox, T.; Berke, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 7751.
- [16] (a) Weissmehl, K.; Arpe, H. J. *Industrial Organic Chemistry*, 3rd ed., Wiley-VCH, Weinheim, Germany, **1997** (translated by Lindley, C. R.). (b) Peter, G. M. Wuts. *Greene's Protective Groups in Organic Synthesis*, 5th ed., Wiley-VCH, Weinheim, **2014**.
- [17] (a) Motokura, K.; Takahashi, N.; Kashiwame, D.; Yamaguchi, S.; Miyaji, A.; Baba, T. *Catal. Sci. Technol.* **2013**, *3*, 2392. (b) Santoro, O.; Lazreg, F.; Minenkov, Y.; Cavallo, L.; Cazin, C. S. J. *Dalton Trans.* **2015**, *44*, 18138. (c) Zhang, S.; Mei, Q. Q.; Liu, H. Y.; Liu, H. Z.; Zhang, Z. P.; Han, B. X. *RSC Adv.* **2016**, *6*, 32370. (d) Li, R. P.; Zhao, Y. F.; Li, Z. Y.; Wu, Y. Y.; Wang, J. J.; Liu, Z. M. *Sci China Chem.* **2019**, *62*, 256.
- [18] (a) Molla, R. A.; Bhanja, P.; Ghosh, K.; Islam, S. S.; Bhaumik, A.; Islam, S. M. *ChemCatChem* **2017**, *9*, 1939. (b) Cui, X. J.; Zhang, Y.; Deng, Y. Q.; Shi, F. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 13521. (c) Luo, X. Y.; Zhang, H. Y.; Ke, Z. G.; Wu, C. L.; Guo, S. E.; Wu, Y. Y.; Yu, B.; Liu, Z. M. *Sci. China Chem.* **2018**, *61*, 725.
- [19] (a) Kröcher, O.; Köppel, R. A.; Baiker, A. *Chem. Commun.* **1997**, 453. (b) Jessop, P. G.; Hsiao, Y.; Ikariya, T.; Noyori, R. *J. Am. Chem. Soc.* **1994**, *116*, 8851. (c) Jessop, P. G.; Hsiao, Y.; Ikariya, T.; Noyori, R. *J. Am. Chem. Soc.* **1996**, *118*, 344. (d) Schmid, L.; Canonica, A.; Baiker, A. *Appl. Catal. A* **2003**, *255*, 23. (e) Munshi, P.; Heldebrant, D. J.; McKoon, E. P.; Kelly, P. A.; Tai, C. C.; Jessop, P. G. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 2725. (f) Zhang, L.; Han, Z.; Zhao, X.; Wang, Z.; Ding, K. L. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2015**, *54*, 6186. (g) Zhang, F. H.; Liu, C.; Li, W.; Tian, G. L.; Xie, J. H.; Zhou, Q. L. *Chin. J. Chem.* **2018**, *36*, 1000.
- [20] (a) Federsel, C.; Boddien, A.; Jackstell, R.; Jennerjahn, R.; Dyson, P. J.; Scopelliti, R.; Laurenczy, G.; Beller, M. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2010**, *49*, 9777. (b) Frogneux, X.; Jacquet O.; Cantat, T. *Catal. Sci. Technol.* **2014**, *4*, 1529. (c) Jayarathne, U.; Hazariand, N.; Bernskoetter, W. H. *ACS Catal.* **2018**, *8*, 1338.
- [21] (a) Daw, P.; Chakraborty, S.; Leitun, G.; Diskin-Posner, Y.; BenDavid, Y.; Milstein, D. *ACS Catal.* **2017**, *7*, 2500. (b) Ke, Z. G.; Yang, Z. Z.; Liu, Z. H.; Yu, B.; Zhao, Y. F.; Guo, S. E.; Wu, Y. Y.; Liu, Z. M. *Org. Lett.* **2018**, *20*, 6622.
- [22] (a) Itagaki, S.; Yamaguchi, K.; Mizuno, N. *J. Mol. Catal. A: Chem.* **2013**, *366*, 347. (b) Nguyen, T. V. Q.; Yoo, W. J.; Kobayashi, S. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2015**, *54*, 9209. (c) Lam, R. H.; McQueen, C. M. A.; Pernik, I.; McBurney, R. T.; Hill, A. F.; Messerle, B. A. *Green Chem.* **2019**, *21*, 538.
- [23] González-Sebastián, L.; Flores-Alamo, M.; García, M. *Organometallics* **2015**, *34*, 763.
- [24] (a) Mitsudome, T.; Urayama, T.; Fujita, S.; Maeno, Z.; Mizugaki, T.; Jitsukawa, K.; Kaneda, K. *ChemCatChem* **2017**, *9*, 3632. (b) Tang, G.; Bao, H. L.; Jin, C.; Zhong, X. H.; Du, X. L. *RSC Adv.* **2015**, *5*, 99678.
- [25] (a) Fang, C.; Lu, C. L.; Liu, M. H.; Zhu, Y. L.; Fu, Y.; Lin, B. L. *ACS Catal.* **2016**, *6*, 7876. (b) Nale, D. B.; Bhanage, B. M. *Synlett* **2016**, 27, 1413.
- [26] (a) Jacquet, O.; Das Neves Gomes, C.; Ephritikhine, M.; Cantat, T. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 2934. (b) Das, S.; Bobbink, F. D.; Bulut, S.; Soudani, M.; Dyson, P. J. *Chem. Commun.* **2016**, 52, 2497. (c) Hao, L. D.; Zhao, Y. F.; Yu, B.; Yang, Z. Z.; Zhang, H. Y.; Han, B. X.; Gao, X.; Liu, Z. M. *ACS Catal.* **2015**, *5*, 4989. (d) Zhao, W. F.; Chi, X. P.; Li, H.; He, J.; Long, J. X.; Xu, Y. F.; Yang, S. *Green Chem.* **2019**, *21*, 567. (e) Liu, X. F.; Li, X. Y.; Qiao, C.; Fu, H. C.; He, L. N. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2017**, *56*, 7425. (f) Lv, H.; Xing, Q.; Yue, C. T.; Lei, Z. Q.; Li, F. W. *Chem. Commun.* **2016**, 52, 6545. (g) Zhao, T. X.; Zhai, G. W.; Liang, J.; Li, P.; Hu, X. B.; Wu, Y. T. *Chem. Commun.* **2017**, *53*, 8046. (h) Gomes, C. D. N.; Jacquet, O.; Villiers, C.; Thuéry, P.; Ephritikhine, M.; Cantat, T. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2012**, *51*, 187. (i) Liu, X. F.; Li, X. Y.; Qiao, C.; He, L. N. *Synlett* **2018**, 29, 548. (j) Wang, M. Y.; Wang, N.; Liu, X. F.; Qiao, C.; He, L. N. *Green Chem.* **2018**, *20*, 1564. (k) Liu, X. F.; Ma, R.; Qiao, C.; Cao, H.; He, L. N. *Chem. Eur. J.* **2016**, *22*, 16489. (l) Liu, X. F.; Li, X. Y.; Qiao, C.; Fu, H. C.; He, L. N. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2017**, *56*, 7425.
- [27] Shi, F.; Zhang, Q. H.; Ma, Y. B.; He, Y.; Deng, Y. Q. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 4182.
- [28] (a) Shi, F.; Deng, Y. Q.; SiMa, T. L.; Peng, J. J.; Gu, Y. L.; Qiao, B. T. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2003**, *42*, 3257. (b) Ion, A.; Parvulescu, V.; Jacobs, P.; Vos, D. D. *Green Chem.* **2007**, *9*, 158.
- [29] Tamura, M.; Ito, K.; Nakagawa, Y.; Tomishige, K. *J. Catal.* **2016**, *343*, 75.
- [30] Jurado-Vazquez, T.; García, J. J. *Catal. Lett.* **2018**, *148*, 1162.
- [31] Xu, M. T.; Jupp, A. R.; Stephan, D. W. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2017**, *56*, 14277.
- [32] Ogura, H.; Takeda, K.; Tokue, R.; Kobayashi, T. *Synthesis* **1978**, 394.
- [33] Cooper, C. F.; Falcone, S. J. *Synth. Commun.* **1995**, *25*, 2467.
- [34] Yamazaki, N.; Higashi, F.; Iguchi, T. *Tetrahedron Lett.* **1974**, *13*, 1191.
- [35] Enthaler, S.; Wu, X. F. *Zinc Catalysis: Applications in Organic Synthesis*, Wiley-VCH, Weinheim, **2015**.
- [36] (a) Takimoto, M.; Mori, M. *J. Am. Chem. Soc.* **2002**, *124*, 10008. (b) Takimoto, M.; Nakamura, Y.; Kimura, K.; Mori, M. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, *126*, 5956. (c) Shimizu, K.; Sato, Y.; Mori, M.; Takimoto, M. *Org. Lett.* **2005**, *7*, 195. (d) Williams, C. M.; Johnson, J. B.; Rovis, T. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 14936. (e) Li, S.; Yuan, W.; Ma, S. M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 2578. (f) Yuan, R.; Lin, Z. *Organometallics* **2014**, *33*, 7147.
- [37] (a) Cheng, M.; Lobkovsky, E. B.; Coates, G. W. *J. Am. Chem. Soc.* **1998**, *120*, 11018. (b) Cheng, M.; Moore, D. R.; Reczek, J. J.; Chamberlain, B. M.; Lobkovsky, E. B.; Coates, G. W. *J. Am. Chem.*

- Soc.* **2001**, 123, 8738. (c) Xiao, Y. L.; Wang, Z.; Ding, K. L. *Chem. Eur. J.* **2005**, 11, 3668. (d) Reiter, M.; Vagin, S.; Kronast, A.; Jandl, C.; Rieger, B. *Chem. Sci.* **2017**, 8, 1876.
- [38] (a) Sattler, W.; Parkin, G. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, 134, 17462. (b) Khandelwal, M.; Wehmschulte, R. *J. Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, 51, 7323. (c) Rit, A.; Zanardi, A.; Spaniol, T. P.; Maron, L.; Okuda, J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, 53, 13273. (d) Specklin, D.; Fliedel, C.; Gourlaouen, C.; Bruyere, J. C.; Avilés, T.; Boudon, C.; Ruhlmann, L.; Dagorne, S. *Chem. - Eur. J.* **2017**, 23, 5509. (e) Specklin, D.; Hild, F.; Fliedel, C.; Gourlaouen, C.; Veiros, L. F.; Dagorne, S. *Chem. - Eur. J.* **2017**, 23, 15908. (f) Tüchler, M.; Gärtner, L.; Fischer, S.; Boese, A. D.; Belaj, F.; Mösch-Zanetti, N. C. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2018**, 57, 6906.
- [39] Jacquet, O.; Frogneux, X.; Das Neves Gomes, C.; Cantat, T. *Chem. Sci.* **2013**, 4, 2127.
- [40] Luo, R. C.; Lin, X. W.; Chen, Y. J.; Zhang, W. Y.; Zhou, X. T.; Ji, H. B. *ChemSusChem* **2017**, 10, 1224.
- [41] Feng, G. Q.; Du, C. Y.; Xiang, L.; Rosal, I. D.; Li, G. Y.; Leng, X. B.; Chen, E. Y.-X.; Maron, L.; Chen, Y. F. *ACS Catal.* **2018**, 8, 4710.
- [42] Du, C. Y.; Chen, Y. F. *Chin. J. Chem.* **2020**, 38, 1057.
- [43] George, H. W. *US 2530367*, **1950** [*Chem. Abstr.* **1950**, 66, 790230].
- [44] Dobrovetsky, R.; Stephan, D. W. *Isr. J. Chem.* **2015**, 55, 206.
- [45] Heyn, H. H. *Advances in Inorganic Chemistry*, Vol. 66, Eds.: Jacobs, I.; Carr, R. H., Elsevier, **2014**, Chapter three, pp. 83~115.

(Cheng, B.)