亚砷亚胺类化合物的合成及应用研究进展

王娅娅 洪学传* 邓子新

(武汉大学药学院 组合生物合成与新药发现教育部重点实验室 武汉 430071)

摘要 亚砷亚胺(Sulfoximine)类化合物是一类重要的杂原子取代化合物,引起了人们的广泛关注.综述了近十年来亚砷亚胺类化合物的研究进展,包括该类化合物的合成及在不对称催化领域中的应用、含有亚砷亚胺的生物活性小分子合成和天然产物全合成.并对发展趋势和应用前景做了展望.

关键词 亚砷亚胺;合成;应用;不对称催化;全合成

Progress in the Synthesis and Application of Sulfoximines

Wang, Yaya Hong, Xuechuan* Deng, Zixin

(Key Laboratory of Combinatorial Biosynthesis and Drug Discovery, Ministry of Education, School of Pharmaceutical Sciences, Wuhan University, Wuhan 430071)

Abstract Sulfoximines are a very important class of heteroatom substitutional compounds and have attracted considerable interest. This review deals with methods for the synthesis of sulfoximines and their applications in catalytical asymmetric synthesis, bioactive small molecules synthesis and total synthesis of natural products. The developing trend and prospects for future application of sulfoximines compound are discussed.

Keywords sulfoximines; synthesis; application; asymmetric catalysis; total synthesis

1950年, Whitehead 和 Bentley^[1a,1b]研究发现,用 NCl_3 处理漂白的小麦,能得到一种化合物 methionine sulfoximine (MSO)(图1). MSO 被证实具有生物活性,是 γ -谷氨酰半胱氨酸合成酶的选择性受体,对生物合成谷胱甘肽的决速步骤具有催化作用^[2a,2b]. 研究表明, MSO 的同系物 buthionine sulfoximine (BSO)能够恢复肿瘤细胞对美法仑的敏感能力^[2c]. 同样,其他的一些亚砷亚胺衍生物可作为抗生素,具有抗凝血、肿瘤转移抑制剂等功能^[2d].

图1 MSO 和 BSO

Figure 1 Structures of MSO and BSO

砷类化合物 **1** 的一个 O 原子被 N 原子单取代之后

可形成亚砷亚胺 **2** 或者 **3**, 双取代后形成 **4**(图2). 此时高价态的 S 原子被四个取代基环绕, 其中至少有两个是杂原子(N 或者 O), 如果 R, R' 取代基不相同, 并且不同于杂原子, S 原子就具有手性. 通常, 这类化合物具有四面体的空间结构. 正是这些独特的性质, 使亚砷亚胺类化合物在有机合成和药物化学中倍受关注^[3].

图2 几类具有代表性的砷类衍生物

Figure 2 Representative derivatives of sulfones

1 手性亚砷亚胺的合成

早期的合成方法是硫醚类化合物经氧化成亚砷, 亚砷化合物经亚胺化形成的外消旋的亚砷亚胺, 通过手性拆分, 即可得到单一的左旋体和右旋体. 下面以甲基苯

* E-mail: xhy78@whu.edu.cn

Received October 5, 2011; revised November 30, 2011; published online December 14, 2011.

Project supported by the Fund of State Key Laboratory of Phytochemistry and Plant Resources in West China (No. P2010-KF10), the Specialized Research Fund of the Doctoral Program of Higher Education (No. 20110141120017), and the National Natural Science Foundation of China (No. 81102357).

植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室开放课题(No. P2010-KF10)、高等学校博士学科点专项科研基金(No. 20110141120017)、国家自然科学基金(No. 81102357)资助项目.

基硫醚为例进行说明(Scheme 1).

Scheme 1

甲基苯基硫醚 **5** 到甲基苯基亚砷 **6** 氧化过程, 文献报道常用的氧化剂有: H_2O_2 ^[4a], m -CPBA^[4b], NaIO_4 ^[4c], NaOCl ^[4d]等. 另外, 还有其它一些氧化途径, Chen 等^[4e]于 2011 年做了详细阐述. 亚砷 **6** 用 HN_3 (NaN_3 和浓 H_2SO_4 原位制备)亚胺化^[5]可制得亚砷亚胺 **7**. 这种亚砷亚胺化方法合成的 **7** 是一对外消旋体, **7** 的拆分可借助于合适的手性拆分试剂. Gais 等^[6]用(+)/(−)-10-樟脑磺酸(CSA)拆分, (*R*)-**7** *ee* 值可达 99%, 产率 80%, 对映体 (*S*)-**7** *ee* 达到 97%~99%, 产率 74%. 这成为实验室少量亚砷亚胺手性拆分的常用方法. 但是, 并不是所有亚砷亚胺都能用此类方法拆分, 因此, 光学纯的亚砷亚胺合成再次成为研究焦点. 目前, 通过不对称催化可直接合成手性亚砷亚胺, 总体来讲可归纳为两类: 金属催化亚胺化和非金属催化亚胺化.

1.1 金属催化亚胺化

早在 2004 年, Bolm 等^[7]用 $\text{Rh}_2(\text{OAc})_4$ 作催化剂, 三氟乙酰胺及 MgO 存在下将手性亚砷(*R*)-**8** 亚胺化, 直接合成手性亚砷亚胺(Eq. 1), 且立体选择性很高. 这是一种很高效的合成手性亚砷亚胺的方法, 但是该方法有一个明显的不足之处, $\text{Rh}_2(\text{OAc})_4$ 价格昂贵.

除 Rh 盐催化剂之外, Bolm 课题组还研究了其他金属催化剂. 2006 年, Bolm 等^[8a]研究发现在亚碘酰苯的作用下, $\text{Fe}(\text{acac})_3$ 为催化剂, 对硝基苯磺酰胺为氮源(NsNH_2), 甲基苯基亚砷(*S*)-**6** 能高效地转变为亚砷亚胺(*S*)-**7** (Eq. 2), 无外消旋化发生. 相比用有毒易爆试剂叠氮酸($\text{NaN}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$)和 2-[(氨基基)磺酰]-1,3,5-三甲基苯

(MSH)^[8b], 效果更好.

2009 年 Bolm 等^[9]报道在 Lewis 酸 $\text{Fe}(\text{OTf})_2$ 催化条件下, (*R*)-甲基苯基亚砷[(*R*)-**8**]与 $\text{PhI}=\text{NNs}$ 反应, 生成的氮取代亚砷亚胺(*R*)-**10** 立体选择性更高(*ee* > 99%), 且反应时间较短, 20~60 min 即可完成(Scheme 2), 化合物(*R*)-**10** 脱保护即可得到手性亚砷亚胺(*R*)-**9**, 在脱保护的过程中, 不发生消旋化.

Scheme 2

在手性亚砷亚胺的制备过程中, Ag 试剂一直被认为是催化效率比较低的试剂, 但 Bolm 等^[10]用 AgNO_3 以及配体 4,4',4''-*t*-Bu₃tpy, 在 CH_3CN 回流的条件下成功将 (*S*)-**6** 亚胺化(Eq. 3), 脱保护后得到(*S*)-**7**, *ee* 值为 83%, 反应总收率为 76%.

1.2 非金属催化

2007 年, Bolm 等^[11a]报道硫醚在 NBS 或 I_2 存在的条件下, 氰氨作为氮源亚胺化, m -CPBA 氧化得氰基亚砷亚胺(Scheme 3), 这种方法是亚胺化-氧化-脱保护模式的完美应用. 类似的, 2010 年, Ochiai 和 Nakanishi 等^[11b]用芳基溴的三氟甲磺酰胺盐, 在温和条件下可得到三氟甲磺基保护的亚砷亚胺, 消旋的甲基苯基亚砷亚胺化得到消旋的亚砷亚胺, 并且亚胺过程中不发生 *ee* 损失.

除以上有机合成方法外, Siu 等^[12]于 2002 年报道了一种新颖的方法——电化学法. 这种方法避免了使用危险试剂, 如过渡金属、催化剂、化学计量氧化剂等. 经亚胺化-脱保护途径可以合成一系列亚砷亚胺(Scheme 4), 这种方法用电极表面溶液的电子转移, 使非常剧烈的化学反应在常温、常压这种很温和的电化学条件下进行, 是一种节能、环保、绿色的合成方式.

Scheme 3

Scheme 4

2 亚砷亚胺的应用

由于亚砷亚胺类化合物具有很多特殊结构性质和反应活性,例如:(1)具有旋光性的硫原子,(2)显酸性的 α -C氢,(3)亲核性较弱的N原子,(4)结构和构象对热、氧化剂、酸、碱等环境相对稳定等,使它们在不对称催化领域、生物活性小分子合成和天然产物全合成中有广泛的应用。

2.1 不对称催化中的应用

作为一类金属催化剂配体,目前已经报道亚砷亚胺可与Zn, Pd, Cu, Fe, Rh, Ti等金属络合,这些络合物在不对称合成中效果甚佳。在早期的亚砷亚胺催化研究中,Bolm等^[13]发现 β -氨基醇类能够有效催化二乙基锌和苯甲醛的不对称加成反应,从而设计合成了 β -羟基亚砷亚胺类手性配体 $\mathbf{17}$,并对亚砷亚胺的手性选择性进行了初步研究,取得了满意的结果(Eq. 4),使亚砷亚胺类化合物在不对称有机合成领域有了很大发展。

随着不对称催化配体研究的逐步深入,特别是具有 C_2 对称性的双亚砷亚胺结构的配体开始倍受关注,Bolm课题组和Harmata课题组几乎是同时着手双亚砷亚胺化合物的研究。2001年,Bolm等^[14]合成 C_2 对称的乙二胺基双亚砷亚胺配体 $\mathbf{22}$ (Eq. 5), $\mathbf{22}$ 与金属Pd络合,可以不

对称催化丙二酸酯衍生物与乙酸烯丙酯的Tsuji-Trost反应,得到了预期的立体选择性很高的烯丙基化产物, ee 值高达98%。

同年,Bolm等^[15]又报道了一类 C_2 对称的苯基双亚砷亚胺类配体(S,S)- $\mathbf{23}$,以共轭环己二烯和甲酰乙酸乙酯的HAD(Hetero-Diels-Alder)反应为模型反应,对催化剂、Cu离子源、溶剂、催化剂载量、温度等进行筛选,最佳反应条件下 ee 值为98%,内型异构体含量99%(Scheme 5)。2003年,Bolm等^[16]利用该配体,催化环戊

Scheme 5

二烯和丙烯酰衍生物的[4+2]-环加成反应. 经过配体结构、催化剂金属离子以及对应负离子筛选之后, 反应产物的 *ee* 可达 86%.

Harmata 等^[17]也于 2001 年报道了另外一种具有芳香性的双亚砷亚胺配体(*S,S*)-**26** (Scheme 6). 1,3-二苯基烯丙醇乙酯和丙二酸二甲酯在配体(*S,S*)-**26** 和催化剂 $\text{Pd}_2(\text{dba})_3$ 作用下, 得到 **27**, *ee* 值最高可达 86%, 从而证实化合物(*S,S*)-**26** 是一种非常有效的金属催化配体.

Scheme 6

2004 年, Bolm 等^[18]用 C_2 -对称的双亚砷亚胺 **23** 和 *N*-喹啉亚砷亚胺 **28** (Scheme 7) 两种配体不对称催化 1-苯基-1-三甲基硅基乙烯醚和丙酮酸甲酯的 Mukaiyama-Aldol 反应, 但产率和 *ee* 值都不理想, 分别只有 35% 和 58%. 根据氨基能增强金属和配体间键合能力的假设, 作者以邻溴硝基苯和光学纯的甲基苯基亚砷亚胺(*S*)-**7** 为初始原料设计合成了配体 **29**, 经过条件优化, **29a** 能使该反应的 *ee* 值达到 99%.

2006 年, Bolm 等^[19a]用亚砷亚胺(*S*)-**29a** 不对称催化丙酮酸乙酯和化合物 **33** 之间的 Mukaiyama-Aldol 反应, 这种方法可得到带有一个季碳中心的 γ,δ -不饱和羟基二酯, *ee* 值为 99%. 此类化合物是萜类天然产物 Isoedunol 和 β -Araneosene 全合成的初始原料^[19b](Scheme 8).

2010 年, Bolm 等^[20]用配体(*S*)-**29a** 和 Cu 盐催化剂催化化合物 **35** 和丙酮酸甲酯的 Mukaiyama-Aldol 反应, 得到 γ -丁烯酸内酯, 得到化合物 **36**, 条件优化后, *ee* 可达 99% (Eq. 6).

同年, Bolm 等^[21]合成一类结构较为新颖的含有亚砷亚胺结构的配体 **40**, **41** (Scheme 9), 其中(*S,R,R*)-**41** 和铜(II)的络合物能够用于 Henry 反应的不对称催化, 对

Scheme 7

Scheme 8

Scheme 9

映体选择性最高为 95%.

2.2 含有亚砷亚胺生物活性小分子合成中的应用

随着生物技术的发展,多肽作为药物在临床上的应用越来越广泛.与传统小分子有机药物相比,多肽类药物又因自身的一些缺点,例如,较低的生物利用度、不稳定性,而限制了其在药物治疗中的应用.然而对多肽进行修饰可降低或弥补这种缺陷,甚至可以表现出特殊的生物活性.因而近些年,多肽修饰的研究日益被关注,通过酰胺键的改变、多肽骨架的改变和修饰基团的引入来改变多肽的化学和生物性质,以期提高生物利用度.

总体来讲,多肽修饰是从酰胺键入手的,因为酰胺键是酶降解的靶点.研究发现,多肽中的酰胺键可以被一个或者多个磺酰胺^[22]、亚磺酰胺^[23a,23b]、磷酰胺^[24]取代,从而表现出不同的生物性质.

1989年 Mock 小组^[25a,25b]通过引入 α -亚砷亚胺酰胺结构合成了一类新型拟肽衍生物作为羧肽酶 A 的过渡态抑制剂。这种 α -亚砷亚胺酰胺具有很好的化学稳定性, sp^3 杂化的硫原子能很好地模拟酰胺键加成反应的四面体过渡态。从结构上看, α -亚砷亚胺酰胺具有和 β -氨基酸相类似的结构, 能够模拟氨基酸用于多肽类化合物的合成。手性 α -亚砷亚胺酰胺的引入在改变酰胺键的同时, 又改变了多肽骨架, 使假肽类化合物具有许多独特的生物活性。1997年, Bolm 等^[26]设计合成一系列含有 α -亚砷亚胺酰胺骨架的假肽(Scheme 10), 并尝试将这种方法用于液相和固相合成假肽低聚物。

Scheme 10

2003 年, Bolm 等^[27]报道了一类在主链中嵌入手性(S)-亚砷亚胺的假肽. 研究发现, 假肽 **48** 的化学键 B 对蛋白酶 K 催化的水解表现出相对稳定性(图 3), 这一性质对前体药物的研究具有很重要的意义. 之后, Bolm 等^[28]又对假肽的修饰做了一系列研究(Scheme 11).

图 3 蛋白酶 K 水解假肽 H-Phe-(S)-SulfCO-Phe-OH [(S)-**46**]
Figure 3 Proteinase K hydrolyzes pseudopeptide H-Phe-(S)-SulfCO-Phe-OH [(S)-**46**]

Reagents and conditions: (a) *n*-BuLi (1.0 equiv.), cyclohexylisopropylamine (1.0 equiv.), THF, CO₂, -78 °C then 25 °C; (b) H-Phe-OBn·HCl (1.0 equiv.), DCC (1.05 equiv.), DMAP (0.12 equiv.), CH₂Cl₂, 0 °C, 12 h; (c) Pd/C (15 mol%), H₂, ethyl acetate, 24 h; (d) TFA/CH₂Cl₂ (V : V=1 : 4), 4 h; yield after additional HPLC purification.

Scheme 11

除了可用于多肽修饰改造, 亚砷亚胺还可用于合成其他一些生物活性小分子, 例如, Rodriguez 等^[29a,29b]利用亚砷亚胺形成的中间化合物, 最后设计合成出 chalcogran (Eq. 7), chalcogran 是一类甲虫信息素, 在农药研发领域具有重要意义。

2.3 亚砷亚胺在全合成中的应用

1997 年, Gais 等^[30a]利用手性亚砷亚胺, 设计合成具有特殊生物活性^[30b,30c]的天然产物 azaspirocyclic 57. 烯丙基亚砷亚胺 51 经过 γ 羟基烷基化形成高烯丙醇 52, 53 经过高度非立体选择性的分子内 Aza-Michael 加成反应得到噁酮核心中间体 54; 54 在碱的作用下, 发生两次亲核进攻得到三环螺旋结构 55, 55 经过两步反应, 得到目标化合物 57 (Scheme 12).

Gais 等^[31a]还报道, 以 (R)-7 和酮类化合物 58 为初始原料, 通过加成-消除过程不对称烯化得到烯基亚砷亚胺化合物 59, 59 经过甲醇锂处理得到烯丙基亚砷亚胺 60, 60 经过烷基化、脱保护得到重要中间化合物 62. 最后, 经过 Pd 催化的烯丙基重排得到重要天然产物 Isocarbacycline (Scheme 13), 天然产物 66 对于心脑血管阻塞等疾病具有良好的功效^[31b].

Gais 等^[32]于 2011 年运用亚砷亚胺, 通过 Ru 催化的复分解关环反应(RCM), 合成一系列 N 杂大环分子(图 4), 这类分子是具有药物活性天然产物的前体结构单元, 对天然产物的全合成具有重要意义。

Reagents and conditions: (a) *n*-BuLi, THF, -78 °C; (b) ClTi(O-*i*-Pr)₃, -78 °C; (c) CH₃CHO, -78 °C, 85%, >84% de; (d) Cl₃C(O)NCO, CH₂Cl₂, r.t.; (e) (NH₄)₂CO₃, MeOH, r.t.; (f) *n*-BuLi, THF, -78 °C, 79%, >98% de; (g) *n*-BuLi, THF, -50 ~ -10 °C; (h) TsO(CH₂)₃OTs, -50 °C, -r.t., 57%, >98% de; (i) *n*-BuLi, THF, -78 °C, 56; (j) NH₄Cl, ClCO₂CH(Cl)Me, CH₂Cl₂, r.t., 74%, >98% de

Scheme 12

Harmata 和 Hong^[33]发现了以手性亚砷亚胺为辅助剂的不对称 1,4-加成反应, 能得到并杂环化合物 69, 反应具有广泛的普遍性和绝对的立体选择性(Scheme 14), 并在此基础上, 利用该反应和合适的原料设计、合成了一系列具有抗结核活性的天然或非天然化合物例如 (+)-curcumene (70)^[34], (+)-curcuphenol (71)^[33], erogorgiaene (72)^[3], pseudopteroxazole (73)^[36a,36b].

Rodriuez 等从加勒比海柳珊瑚 *P. elisabetha* 分离得到 erogorgiaene (72)^[37a]和 pseudopteroxazole (73)^[37b], 这两类生物碱均能够较好的抑制结核分枝杆菌 H₃₇R_v 生长. Harmata 和 Hong^[36a,36b]巧妙地用手性亚砷亚胺为辅助剂在苯基 α 位引入手性烷基, 并经叶立德等系列反应构建化合物 77 (Scheme 15). 随后的弗瑞德-克来福特反应, 由于手性亚砷亚胺的立体效应, 只得到单一的手性化合物 78. 化合物 82 可由化合物 78 经自由基还原、三氮烯化、碘化、Heck 反应和 Pfaltz 催化剂手性还原而得到, 最后根据文献^[34c]引入噁唑环从而完成 pseudopteroxazole (73) 的不对称全合成(Schemes 16, 17).

Reagents and conditions: (a) (*R*)-7, *n*-BuLi, THF, -78°C ; (b) TMSCl, $-90 \sim 25^{\circ}\text{C}$; (c) *n*-BuLi, -90°C , 86%; (d) MeOLi, *o*-phenanthroline, THF/toluene ($V:V=3:1$), $0 \sim 25^{\circ}\text{C}$, 36 h, 88%; (e) $\text{LiCu}[(\text{CH}_2)_4\text{OCH}(\text{Me})\text{OEt}]_2$, Me_2S , Et_2O , -45°C , 62%; (f) $(\text{MePhCH})_2\text{NLi}$, LiCl, THF, -105°C , $\text{Me}(\text{CH}_2)_4\text{CHCHCHO}$, $-82 \sim 70^{\circ}\text{C}$, 52%; (g) $\text{PdCl}_2(\text{MeCN})_2$ (cat.), THF, 18 h, 71%.

Scheme 13

Scheme 14

Reagents and conditions: (a) $\text{Pd}(\text{OAc})_2$, *rac*-BINAP, (*R*)-7, 81%; (b) LDA, 88%; (c) LAH; (d) oxalyl chloride, DMSO, 81%, **76a** : **76b** = 1.68 : 1, 2 steps; (e) KOBu-*t*, bis(3-methyl-2-butenyl) diphenylphosphonium bromide; (f) MsOH, 88%

Scheme 15

图 4 亚砷亚胺取代的氮杂环分子

Figure 4 Sulfoximine-substituted nitrogen heterocyclic molecule

Reagents and conditions: (a) LiHMDS, allyl bromide; (b) Na/Hg, 92%, 2 steps; (c) HONO, Et₂NH, 100%; (d) CH₂I₂, 20 h, 75%; (e) Pd(OAc)₂, (o-Tol)₃P, TEA, 120 °C, 38 h

Scheme 16

Reagents and conditions: (a) 3% catalyst, 1.4 MPa, H₂, r.t., 1 h, CH₂Cl₂, 90%; (b) 7.0 equiv. NaH, 6.0 equiv. EtSH, DMF, overnight, reflux, 87%; (c) HNO₃, Hexanes, 1.5 min, 84%; (d) Zn, NH₄Cl, 90% MeOH, r.t., 1 h; (e) CH(OMe)₃, TsOH (cat.), 65%, two steps

Scheme 17

3 结论与展望

亚砷亚胺类化合物具有一系列特殊性质,使其在现代有机化学中被广泛应用。近年来,通过金属催化氧化-亚胺化,合成出带有不同官能团具有不同性质的亚砷亚胺类化合物。亚砷亚胺已经被证明不仅可用于合成具有生物活性的小分子和天然产物,而且能够作为一种有效配体应用于金属不对称催化。随着金属不对称催化的蓬勃发展,亚砷亚胺类化合物将具有更广阔的前景。然而,由于不对称催化机理认识的不足,使得这一发展受到限制。但是,随着科学的不断发展,一系列难题将

被一一克服,新类型、高效率的以亚砷亚胺类化合物为不对称催化配体的化合物将被陆续发现。

References

- [1] (a) Whitehead, J. K.; Bentley, H. R. *J. Am. Chem. Soc.* **1952**, 1572.
(b) Bentley, H. R.; McDermott, E. E.; Pace, J.; Whitehead, J. K.; Moran, T. *Nature* **1950**, 165.
- [2] (a) Griffith, O. W.; Meister, A. *J. Biol. Chem.* **1979**, 254, 7558.
(b) Bailey, H. H. *Chem.-Biol. Interact.* **1998**, 8, 23.
(c) O'Dwyer, P. J.; Hamilton, T. C.; LaCreta, F. P.; Gallo, J. M.; Kilpatrick, D.; Halbherr, T.; Brennan, J.; Bookman, M. A.; Hoffman, J.; Young, R. C.; Comis, R. L.; Ozols, R. F. *J. Clin. Oncol.* **1996**, 14, 249.
(d) Mueller, E. *US 4442111*, **1984** [*Chem. Abstr.* **1983**, 98, 215493].
- [3] (a) Johnson, C. R. *Acc. Chem. Res.* **1973**, 6, 341.
(b) Pyne, S. G. *Sulfur Rep.* **1992**, 12, 57.
(c) Reggelin, M.; Zur, C. *Synthesis* **2000**, 1.
- [4] (a) Mikolajczyk, M. *Synthesis* **1990**, 937.
(b) Kinahan, T. C.; Tye, H. *Tetrahedron: Asymmetry* **2001**, 12, 1255.
(c) Johnson, C. R.; Keiser, J. E. *Org. Synth.* **1966**, 46, 78.
(d) Furukawa, N.; Akutagawa, K.; Yoshimura, T.; Oae, S. *Synthesis* **1982**, 77.
(e) Chen, C.-Y.; Li, Y.; Xiao, Y.; Zhu, L.; Cheng, C.-M.; Liu, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2011**, 31, 925 (in Chinese).
(陈春玉, 李毅, 肖英, 朱林, 程长明, 刘杨, 有机化学, **2011**, 31, 925.)
- [5] Johnson, C. R. *J. Am. Chem. Soc.* **1970**, 92, 6594.
- [6] Brandt, J.; Gais, H. J. *Tetrahedron: Asymmetry* **1997**, 8, 909.
- [7] Okamura, H.; Bolm, C. *Org. Lett.* **2004**, 6, 1305.
- [8] (a) Mancheno, O. G.; Bolm, C. *Org. Lett.* **2006**, 8, 2349.
(b) Johnson, C. R.; Kirchhoff, R. A.; Corkins, H. G. *J. Org. Chem.* **1974**, 39, 2459.
- [9] Mancheno, O. G.; Bolm, C. *Org. Lett.* **2009**, 11, 2429.
- [10] Cho, G. Y.; Bolm, C. *Org. Lett.* **2005**, 7, 4983.
- [11] (a) Mancheno, O. G.; Bistri, O.; Bolm, C. *Org. Lett.* **2007**, 9, 3809.
(b) Ochiai, M.; Naito, M.; Miyamoto, K.; Hayashi, S.; Nakanishi, W. *Chem. Eur. J.* **2010**, 16, 8713.
- [12] Siu, T.; Yudin, A. K. *Org. Lett.* **2002**, 4, 1839.
- [13] Bolm, C.; Muller, J. *J. Am. Chem. Soc.* **1993**, 115, 182.
- [14] Bolm, C.; Simic, O.; Martin, M. *Synlett* **2001**, 1878.
- [15] Bolm, C.; Simic, O. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, 123, 3830.
- [16] Bolm, C.; Martin, M. *Org. Lett.* **2003**, 5, 427.
- [17] Harmata, M.; Ghosh, S. K. *Org. Lett.* **2001**, 3, 3321.
- [18] Langner, M.; Bolm, C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2004**, 43, 5984.
- [19] (a) Remy, P.; Langner, M.; Bolm, C. *Org. Lett.* **2006**, 8, 1209.
(b) Kingsbury, J. S.; Corey, E. J. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, 127, 13813.
- [20] Frings, M.; Bolm, C. *Chem. Eur. J.* **2010**, 16, 4577.
- [21] Steurer, M.; Bolm, C. *J. Org. Chem.* **2010**, 75, 3301.
- [22] Zecchini, G. P.; Paradisi, M. P.; Torrini, I.; Lucente, G.; Gavuzzo, E.; Mazza, F.; Pochetti, G. *Tetrahedron Lett.* **1991**, 32, 6779.
- [23] (a) Moree, W. J.; Marel, G. A. V.; Liskamp, R. M. J. *Tetrahedron Lett.* **1991**, 32, 409.
(b) Moree, W. J.; Marel, G. A. V.; Liskamp, R. M. J. *J. Org. Chem.* **1996**, 60, 5157.
- [24] Morgan, B. P.; Scholtz, J. M.; Ballinger, M. D.; Zipkin, I. D.; Bartlett, P. A. *J. Am. Chem. Soc.* **1991**, 113, 298.
- [25] (a) Mock, W. L.; Zhang, J. Z. *J. Org. Chem.* **1990**, 55, 5791.

- (b) Mock, W. L.; Tsay, J. T. *J. Am. Chem. Soc.* **1989**, *111*, 4467.
- [26] Bolm, C.; Kahmann, J. D.; Moll, D. *Tetrahedron Lett.* **1997**, *38*, 1169.
- [27] Bolm, C.; Muller, D.; Dalhn, D.; Hackenberger, C. P. R.; Weinhold, E. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2003**, *13*, 3207.
- [28] Cho, G. Y.; Okamura, H.; Bolm, C. *J. Org. Chem.* **2005**, *70*, 2346.
- [29] (a) Virolleaud, M. A.; Sridharan, V.; Mailhol, D.; Rodriguez, J. *Tetrahedron* **2009**, *65*, 9756.
(b) Sridharan, V.; Vologdin, N.; Virolleaud, M. A.; Rodriguez, J. *Synthesis* **2011**, 2085.
- [30] (a) Adrien, A.; Gais, H.-J.; Köhler, F.; Runsink, J.; Raabe, G. *Org. Lett.* **2007**, *9*, 2155.
(b) Weinreb, S. M. *Chem. Rev.* **2006**, *106*, 2531.
(c) Clive, D.; Yu, M.; Wang, J.; Yeh, V. S. C.; Kang, S. *Chem. Rev.* **2005**, *105*, 4483.
- [31] (a) Bund, J.; Gais, H.-J.; Schmitz, E.; Erdelmeier, I.; Raabe, G. *Eur. J. Org. Chem.* **1998**, 1319.
(b) Moncada, S.; Gryglewski, R.; Bunting, S.; Vane, J. R. *Nature* **1976**, *1*, 263.
- [32] Mahajan, V.; Gais, H. J. *Chem. Eur. J.* **2011**, *17*, 6187.
- [33] Harmata, M.; Hong, X. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, *125*, 5754.
- [34] Harmata, M.; Hong, X. C.; Barnes, C. L. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 7261.
- [35] Harmata, M.; Hong, X. C. *Tetrahedron Lett.* **2005**, *46*, 3847.
- [36] (a) Harmata, M.; Hong, X. C.; Barnes, C. L. *Org. Lett.* **2004**, *6*, 2201.
(b) Harmata, M.; Hong, X. C. *Org. Lett.* **2005**, *7*, 3581.
(c) Johnson, T. W.; Corey, E. J. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, *123*, 4475.
- [37] (a) Rodriguez, A. D.; Ramirez, C. *J. Nat. Prod.* **2001**, *64*, 100.
(b) Rodriguez, A. D.; Ramirez, C.; Rodriguez, I. I.; Gonzalez, E. *Org. Lett.* **1999**, *1*, 527.

(Zhao, X.)