α,β -不饱和内酯的光化学反应研究进展薛福玲^a 李建晓^{a,b} 莫阳青^a 汪朝阳^{*,a} 陈庆华^c^(a) 华南师范大学化学与环境学院 广州 510006)^(b) 华南理工大学化学化工学院 广州 510640)^(c) 北京师范大学化学学院 北京 100875)

摘要 α,β -不饱和内酯的光化学反应可广泛应用于核苷、稠环生物碱、萜类、甾类等多种光学活性物质与天然产物的合成中。根据不同的反应类型,综述了 2(5H)-呋喃酮等 α,β -不饱和内酯的光化学 1,4-加成反应、1,4-加成-并环反应、[2+2]环加成反应和复杂环加成反应的新进展。

关键词 α,β -不饱和内酯; 2(5H)-呋喃酮; 光化学 1,4-加成反应; [2+2]环加成反应

Research Progress on Photochemical Reaction of α,β -Unsaturated LactoneXue, Fuling^a Li, Jianxiao^{a,b} Mo, Yangqing^aWang, Zhaoyang^{*,a} Chen, Qinghua^c^(a) School of Chemistry and Environment, South China Normal University, Guangzhou 510006)^(b) School of Chemistry and Chemical Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640)^(c) School of Chemistry, Beijing Normal University, Beijing 100875)

Abstract Photochemical reaction of α,β -unsaturated lactone can be utilized in the synthesis of optical active products and natural products, such as nucleotide, ring alkaloids, terpenoids and steroids. Based on different reaction types, including photochemical 1,4-addition reaction, 1,4-addition-cyclization reaction, [2+2] cycloaddition reaction and complex photochemical cycloaddition reaction, the recent progresses in photochemical reactions of α,β -unsaturated lactones, especially 2(5H)-furanones, are reviewed.

Keywords α,β -unsaturated lactone; 2(5H)-furanone; photochemical 1,4-addition reaction; [2+2] cycloaddition reaction

自从化学作为一门科学的研究开始,化学家们就对光作为一种能量来引发化学反应而感兴趣^[1]。其中,研究与开发容易、温和的光化学反应代替那些难于或必需在苛刻条件下才能进行的热化学反应进行化合物的合成,产生了有机合成光化学^[2]。随着光能量转变诱导化学合成和光诱导催化过程等实际应用的不断成功,光化学反应一直激励着人们的研究热情。尤其是倡导绿色化学的今天,光化学反应正扮演着日益重要的角色^[3,4]。但是,国内关于有机光化学合成的研究相对较少。

α,β -不饱和内酯作为环状的 α,β -羰基化合物,是一类很重要的有机合成中间体^[5]。由于 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁的存在,

其在 230~400 nm 有一特征吸收;而 α,β -不饱和羰基化合物中仅 α,β -碳碳双键或碳氧双键反应、另一官能团不受影响或得到一定立体构型化合物的选择性反应,是有机合成中一个极富挑战的课题^[6,7]。因此,近年来 α,β -不饱和内酯的光化学反应,特别是其在环状有机物合成中的广泛应用,已引起了人们的注意,并取得了较大进展。鉴于此,本文按不同的反应类型对其研究进行综述和展望。

1 光化学 1,4-加成反应

α,β -不饱和内酯最常见的光化学反应,是类似

* E-mail: wangwangzhaoyang@tom.com

Received April 19, 2011; revised August 22, 2011; accepted September 20, 2011.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 20772035), the Natural Science Foundation of Guangdong Province (No. 5300082) and the 3rd Talents Special Funds of Guangdong Higher Education (No. Guangdong-Finance-Education[2011]431).

国家自然科学基金(No. 20772035)、广东省自然科学基金(No. 5300082)和广东省高等学校人才引进专项资金(No. 粤财教[2011]431)资助项目。

Michael 加成的自由基型 1,4-加成反应. 自由基通常在光引发下, 由光敏剂的激发态通过系间穿越(ISC)过程后, 从醇类、胺类、醚类等物质中抽取 α -H 而形成 (Scheme 1)^[8].

Scheme 1

1.1 含氧化合物抽取 α -H 参与的 1,4-加成反应

醇类化合物的 α -H 易于被抽提成自由基, 因此其参与的 1,4-加成反应最为常见。当 α,β -不饱和内酯的适当位置具有手性诱导功能时, 自由基的不对称 1,4-加成反应可以得到具有光学活性的加成产物(Scheme 1)。

例如, Mann 等^[8~10]利用 CH_3OH 与二甲基叔丁基硅基(TBDMS)保护的 5-羟甲基-2(5*H*)-呋喃酮 **1** 的光化学反应, 以二苯酮为光敏剂, 最终简洁、高效地合成了化合物 **2** (Scheme 2). 这种特殊的核苷具有类似天然抗病毒的 Oxetanocin 结构, 且本身具有抗病毒活性, 可作为病毒酶类的取代物.

Scheme 2

类似地, 异丙醇也可应用于光催化的不对称合成, 甚至还可不需要二苯酮(或其他酮类)光敏剂的存在. 该反应 48 h 完成, 产率可达到 94%, 其产物可以合成化合物 **3** (Scheme 3), 从而为顺式菊酸的合成找到了新路径, 且新路径比其他方法更适合于大规模的制备顺式菊酸, 故有利于除虫菊酯的合成^[8,11].

Scheme 3

最近,有人利用新型的光反应器进行了类似 Scheme 3 的光化学反应. 这种连续流动光反应器,其外形类似于螺旋的毛细管,不仅提高了转化率,还大大缩短了反应时间——当反应时间仅为 7.5 min 时,转化率即可达到 95%以上;反应时间继续延长到 10 min 时,转化率达到 100%^[12]. 因此,与传统的光反应器相比,微反应器从各个方面(包括大大缩减了反应物和溶剂)推动了该类反应的绿色化学发展. 这种新动向值得关注.

缩醛类化合物 1,3-二氧戊烷 **5** 在光敏剂二苯酮的作用下, 其 α -H 也能被抽提形成自由基, 与 5-取代 2(5H)-呋喃酮 **4** 发生不对称加成反应, 所得产物 **6** 可转变为双四氢呋喃类化合物 **7**, 进一步的反应可最终合成具有抗 HIV 活性的化合物 **8** (Scheme 4)^[13].

Scheme 4

上述的 1,4-加成反应都是通过单电子转移过程发生的,但一些新研究表明,如果一旦含氧化合物 α -H 抽取后电子与质子同时发生转移形成一个双自由基中间体,则会形成 2(5H)-呋喃酮 α 位加成产物(Scheme 5)^[14]. 该结果不仅对于研究 α,β -不饱和内酯光化学自由基加成的反应机理具有重要意义,而且为多环化合物(如化合物 9)的制备提供了一种新思路.

Scheme 5

1.2 含氮化合物抽取 α -H 参与的 1,4-加成反应

参与 1,4-加成反应的含氮化合物较为常见的是 N-取代环胺。例如, N-取代四氢吡咯 **10** 可进行 α -H 抽提而形成自由基, 与 2(5H)-咪喃酮类化合物 **1** 在甲醇溶剂中

进行光化学反应生成化合物 **11**, 进一步衍生可得到化合物 **12** (Scheme 6). **12** 具有吡咯烷衍生物——长柱琉璃 **13** 的环状结构与立体化学, 故这是一个吡咯烷环体系的简洁合成方法^[15].

Scheme 6

类似地, *N*-甲基四氢吡咯 **15** 在波长为 350 nm 或可见光的照射下, 能与手性 2(5*H*)-呋喃酮 **14** 发生加成反应. 当光敏剂为 4,4'-二甲氧基二苯酮时, 仅激发 5 min 分离产率就高达 94%. 反应产物 **16a** 和 **16b** 通过进一步的反应, 可应用于天然产物异倒千里光裂醇(Isoretronecanol)和毒豆碱(Laburnine)的不对称合成 (Scheme 7)^[16,17].

Scheme 7

同样地, 叔胺化合物 **17** 和手性化合物 **14** 在相同条件下由光敏剂 4,4'-二甲氧基二苯酮引发反应, 手性产物可有效地合成生物碱 **18**, 总产率可达 27% (Scheme 8)^[17,18].

Hoffmann 等还发现, 利用一些半导体(如 TiO₂, ZnS 等)作为光敏剂, 2(5*H*)-呋喃酮类化合物与环状叔胺的光

Scheme 8

化学加成反应也能发生^[19], 但产率最高的是化合物 **19** 与叔胺 **15** 的反应(Eq. 1)^[7].

对于链状的叔胺, 其与缺电子的烯烃发生光化学加成反应比较困难. 但是, 在反应体系中除加入光敏剂 4,4'-二甲氧基二苯酮外, 还需添加硫代羰基化合物(如二硫代氨基甲酸酯或黄原酸酯), 方可与 2(5*H*)-呋喃酮 **14** 发生光化学加成反应(Eq. 2), 并且不对称叔胺由于易生成热力学上更稳定的 α -胺烷基自由基而出现选择性差异(Eq. 3)^[18,20].

在国内, 仅北京师范大学曾早在 1995 年也开展过 α,β -不饱和内酯的自由基 1,4-加成反应的研究. 例如, 汪朝阳等^[21,22]成功地进行了化合物 **14** 与 *N*-甲基吗啉 **20** 的光催化不对称共轭加成反应, 合成了 4-(*S*)-[2-(*N*-甲基)吗啉基]-5-(*R*)-[1-薄荷烷氧基]-丁内酯 **21** (Eq. 4). 与国外的研究相比, 国内在深度与广度上都存在明显的距离.

1.3 含氮化合物做光敏剂的 1,4-加成反应

在上述酮类化合物作光敏剂的反应中, 反应机理都是酮在光的照射下, 与胺发生光电子转移反应, 生成 α -胺烷基自由基和羰基自由基, 前者进一步发生 1,4-加成

反应. 但是, Hoffmann 等^[23]研究发现, 在 α -胺烷基自由基(如自由基 **23**)不够活泼时, 其不与烯烃发生加成反应, 而是羰基自由基(如自由基 **24**)加到缺电子的双键上 (Scheme 9).

Scheme 9

以乙腈为溶剂, Hoffmann 等^[23]深入研究了化合物 **14** 与酮类化合物发生的立体选择性反应, 发现叔胺为三乙胺时产物复杂, 而用 *N,N*-二甲基苯甲胺 **22** 时化学选择性较高; 链酮的空间位阻对该反应有一定的影响, 与丙酮反应的效果最好, 产率可达 73%; 与环酮反应时 (Eq. 5), 环己酮的产率最高, 可达 69%.

羰基通常被认为是亲电的, 难以与缺电子的双键发生加成反应, 但是上述酮与胺的光电子转移过程实现了羰基的“极性转换”, 得到的羰基自由基 **24** 能进行该类反应^[23] (Scheme 9). 由于这种新发现的极性转换用常规方法是无法实现的, 因此 Hoffmann 等的这一发现具有重要意义; 同时, 其在一定程度上也实现了光敏剂由酮类到胺类的逆转.

上述反应中(如 Eq. 5), 不仅酮是化学计量参与反应的, 胺类光敏剂 *N,N*-二甲基苯甲胺(**22**)实质上也是在不断地被消耗的 (Scheme 9), 已知其相应的自由基 **23** 能与羰基自由基 **24** 耦合生成化合物 **25** (Eq. 6)^[23], 但有可能发生自身的二聚而消耗尚不清楚. 事实上, 该极性转换涉及了叔胺氧化、酮还原-加成, 故其光化学反应机理研究有待深入.

2 光化学 1,4-加成-并环反应

对机理的深入研究, 有助于新的合成路线的设计. 因此, 依据缺电子烯烃发生亲核自由基加成的优先性,

Hoffmann 等^[24]设想 *N*-烯丙基吡咯烷抽取 α -H 后, 可能会与烯烃发生串联的光化学 1,4-加成-并环反应 (Scheme 10).

Scheme 10

但是, *N*-烯丙基吡咯烷 **26** 与 2(5*H*)-呋喃酮 **14** 并没有发生预期的反应, 而是吡咯烷对 **14** 的 Michael 加成反应 (Eq. 7), 这事实上是化合物 **26** 烯丙基侧链上的 α -H 更易于被抽提, 所得自由基经系列变化而最终释放出吡咯烷所引起的反应所致^[19,24].

如果用二甲基取代的 *N*-烯丙基吡咯烷 **28**, 由于仅环上 α -H 被抽提, 可顺利地得到预期结果, Scheme 10 中两种不同成环方式的产率几乎相同. 但是, 由于 2(5*H*)-呋喃酮 **14** 上 5-位氧基所处立体构型的影响, 产物中 **a** 系列异构体的产率稍高 (Eq. 8)^[24].

类似地, 手性 2(5*H*)-呋喃酮 **14** 也可与含有叁键的 *N*-吡咯烷 **31** 进行光化学反应, 而且此时只有 Scheme 10 预期中的内型加成产物, 其中产物 **33** 是由非共轭的产物异构化生成的, 但奇怪的是该反应条件下产物 **32** 没有发生异构化 (Eq. 9)^[24].

如果 *N,N*-二烷基芳香胺上烷基的 α -H 亦被抽提生

成自由基, 且把苯环视作 Scheme 10 中类似的不饱和键, 其理应可发生类似的 1,4-加成-并环反应, 且产物以外型的为主(因其形成的是与苯环稠合的六元环, 较稳定). 化合物 **14** 与 *N,N*-二甲基苯胺(**34**)的反应结果证明的确如此(Eq. 10)^[24].

上述芳香胺光化学反应生成的手性四氢喹啉衍生物(如化合物 **35a**), 可进一步衍生而应用于药物合成^[24], 特别是在同样的条件下, 化合物 **14** 的异构体 **38** 也可发生类似的光化学反应^[25], 这为手性药物的构型选择提供了方便.

同时, Hoffmann 等^[24]分别用氘代试剂 **39**, **40** 进行光化学反应, 并结合 Eq. 10 中副产物 **36**, **37** 的生成, 论证了 *N,N*-二烷基芳香胺进行光化学 1,4-加成-并环反应的上述机理. 由于机理中涉及到 1,4-加成中间体与芳胺邻位的成环, 故化合物 **41** 虽然仅有一个邻位 H 但也可得到四氢喹啉类产物, 而化合物 **42** 的反应只能停留于 1,4-加成产物.

3 光化学[2+2]环加成反应

光化学[2+2]环加成反应实验过程简单^[26], 也可避免使用过量的有毒溶剂, 同时具有高效的立体选择性和区域选择性, 现已广泛用于四元环类化合物的合成中^[27], 包括一些糖苷配基和植物抗毒素的合成^[28]. 同样地, α,β -不饱和内酯的光化学[2+2]环加成反应也常应用于有机合成中生成环丁烷类化合物^[4,26].

3.1 2(5*H*)-呋喃酮类化合物的光化学[2+2]环加成反应

近年来, 对手性 2(5*H*)-呋喃酮类的光化学[2+2]环加成反应研究较多. 例如, Alibés 等^[29]发现, 手性 2(5*H*)-呋喃酮 **43** 与乙炔发生[2+2]环加成, 主产物为 **44**; 当 R^1 为 *t*-BuCO, R^2 为 H 时, 以乙腈为溶剂, 125 W 汞灯下照射 2.5 h, 产率可达 68%, *de* 值为 32% (Eq. 11).

相比之下, 各种烯类化合物更常用于手性 2(5*H*)-呋喃酮类化合物的[2+2]光化学环加成反应. 例如, Curtius 等^[30]报道了手性 2(5*H*)-呋喃酮 **46** 与乙烯的光化学环加成反应, 产物以从位阻小的一侧进攻得到的 **48** 为主, 且温度对 *de* 值有较大的影响——当反应温度由 $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 降低为 $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, *de* 值可由 5% 提升到 20% (Eq. 12).

类似地, Font 等^[31,32]报道了三甲基硅烷基(TMS)保护的手性 2(5*H*)-呋喃酮 **49** 与乙烯的[2+2]光化学环加成反应, 由于化合物 **49** 的对称性, 使区域选择性生成的中间体 **50** 能高效地经过氧化、还原、甲基化等步骤合成性信息激素(+)-Grandisol (Scheme 11).

Scheme 11

如果以 1,1-二乙氧基乙烯与手性的 5-新戊酰氧基 (PivO)亚甲基-2(5*H*)-呋喃酮(**51**)反应, 产物经酸解去缩酮化可得稠合的四元环酮 **52**, 其作为中间体经过多步反应, 能合成天然抗病毒 Oxetanocin 的类似物 Cyclobut-A^[33] (Scheme 12).

Scheme 12

2(5*H*)-呋喃酮也可与烯酮发生发生[2+2]光化学环加成反应, 但反应的选择性较差. 例如, 手性呋喃酮 **14** 与环戊烯酮 **53** 在乙腈中反应, 4 种可能异构体的比例是一样, 只有改用正己烷作溶剂, 产物 **54** 与 **55** 之比为 8 : 1. 即使如此, **54a** 与 **54b** 之比仍为 1 : 1, 即手性呋喃酮 **14** 没有表现出其以往明显的面选择性^[34](Eq. 13).

(13)

上述环状烯酮与 2(5*H*)-呋喃酮的光化学[2+2]反应事实上也构筑了一个稠合三环体系. 因此, 如果含有另一个环烯结构的 2(5*H*)-呋喃酮发生分子内反应, 则可构

建四环体系. 例如, 化合物 **56** 发生分子内加成反应, 生成的四环中间体 **57** 可用于合成来自于海洋的三环萜类化合物 (+)-Stoechospermol 和 (+)-Spatol^[35,36] (Scheme 13).

Scheme 13

在这种分子内反应中, 2(5*H*)-呋喃酮类化合物的 α 位取代基对其分子内加成反应的区域选择性有重要影响. 例如, 最近 Weixler 等^[37]研究表明, Tetrionate 类化合物 **58** 的 α 位取代基为甲基时, 分子内加成反应得到化合物 **59**; 当 α 位取代基为空间位阻较大的烷氧碳基时, 生成另一种成环方式的分子内加成产物 **60** (Scheme 14).

Scheme 14

同样利用分子内[2+2]环加成反应, Fleck 等^[38]以分子内另外含有 2 个双键且用三异丙基硅基(TIPS)保护的 2(5*H*)-呋喃酮 **61** 为原料, 先成功合成了化合物 **62**, 再将四环体系 **62** 中的残留双键适时氧化为甲基酮, 并通过环合等多步反应, 最终可得天然产物 Punctaporonin C (Scheme 15).

如果以 1,2-二氯乙烯(**64**)为烯烃原料, 其与手性 2(5*H*)-呋喃酮 **63** 反应后, 不对称加成的环丁烷类产物可脱去卤素和还原内酯结构而得到手性的环丁烯衍生物 **65**(三步总产率可高达 75%), 其可用于合成天然产物

Scheme 15

(-)-Merrilactone A^[39](Scheme 16).

Scheme 16

类似地, 手性 2(5*H*)-呋喃酮 **66** 也能与 1,2-二氯乙烯 (**64**) 发生[2+2]环加成反应, 继续经微波(MW)下脱卤素可得手性环丁烯类化合物 **67**, 它是合成天然产物 (+)-Lineatin 的重要中间体之一^[40](Scheme 17).

Scheme 17

如果利用 1,1-二乙氧基乙烯(甚至 1-烷氧乙烯、1-酰氧乙烯)为烯烃原料, 与 2(5*H*)-呋喃酮 **66** 发生类似 Scheme 12 的[2+2]环加成, 也可经多步反应得到化合物 **68**; 而 **66** 直接与乙炔反应, 则得到化合物 **67**. 因此, 光化学[2+2]环加成反应是合成(+)-Lineatin 的一条简单而高效的途径^[40].

联烯类化合物的研究也越来越受到了人们的关注^[41], 一些研究表明其也可以作为烯烃与 2(5*H*)-呋喃酮

类化合物发生[2+2]光化学环加成反应. 例如, 最近 Hiemstra 等^[42]发现, 含 2(5*H*)-呋喃酮结构的联烯类化合物 **69** 能发生分子内[2+2]光化学环加成反应, 且其产物 **70** 有望用于合成天然化合物 Solanoelepin A (Scheme 18).

Scheme 18

3.2 其他 α,β -不饱和内酯的光化学[2+2]环加成反应

除 2(5*H*)-呋喃酮类化合物外, 其他 α,β -不饱和内酯也会发生光化学[2+2]环加成反应, 特别是香豆素类化合物. 例如, Bach 等^[43]报道了 2,3-二甲基-2-丁烯(**72**)与香豆素(**71**)的光化学[2+2]环加成反应, 在路易斯酸催化下, 产率可高达 97% (Eq. 14). 不仅如此, 一些香豆素衍生物也能与烯烃衍生物发生分子间的[2+2]环加成反应^[44].

其实, 香豆素类化合物自身也能相互间发生光化学[2+2]环加成反应, 而且在一些手性环境中能高立体选择性地得到有构型的产物 **73**^[45,46]. 不仅如此, 控制合适的条件, 生成的立体规整二聚体 **73** 也可解聚重新成为单体. 这些对于研究香豆素类化合物特殊的生物活性与光生物学性质, 以及光控的自组装开关等具有重要意义^[47,48].

香豆素类化合物也能发生分子内光化学[2+2]环加成反应而构筑多环体系. 例如, 4-烯基取代的香豆素 **74** 在手性环境下, 四环体系主产物 **75** 的 *ee* 值最高可达 82%^[43](Eq. 15).

利用香豆素类化合物中 α,β -不饱和双键发生的分子内光化学[2+2]环加成反应, 也可合成系列多环的大环化合物, 如化合物 **76** 和 **77** 的分子内[2+2]环加成反应^[49].

近来, Miyauchi 等^[50]还利用了 α,β -不饱和内酯 **78** (其甲基处双键参与反应) 和化合物 **79** 的分子间光化学 [2+2] 环加成反应, 制备了含有大环的多环分子, 但产率较低。

4 光化学的复杂环加成反应

α,β -不饱和内酯除会发生光化学 [2+2] 环加成反应外, 某些具有更多共轭体系的不饱和内酯还会发生光化学 [4+4] 环加成反应。例如, West 等^[51]报道了不饱和内酯 **80** 与其呋喃环侧链发生的分子内光化学 [4+4] 环加成反应, 进一步反应的产物 **81** 是广泛用于天然产物合成中的合成子 (Scheme 19)。类似地, 多共轭体系的不饱和内酯 **82** 也会发生上述反应^[52]。

不仅共轭体系的延长影响了 α,β -不饱和内酯的光化学反应的复杂性, 而且也与同类反应底物中 β -位取代基的变化有关。例如, 香豆素类化合物 **83** 与 2,3-二甲基-2-丁烯 (**72**) 的光化学反应, 由于 β -位上取代基氰基是一个强缺电子基团, 使光化学反应不再是简单的 [2+2] 环加成反应, 而是通过加成形成五元环化合物^[53] (Eq. 16)。

Scheme 19

当 β -位上取代基为强吸电子的炔基时, 香豆素类化合物 **84** 同样可发生此类反应。但化合物 **84** 与烯烃 **72** 形成的双自由基 **85** 经过 1,5-环化作用形成中间体 **86** 后, 卡宾与苯环发生分子内插入反应, 最后 **87** 经 H 迁移而形成了四环化合物 **88**^[54] (Scheme 20)。

Scheme 20

另外, α,β -不饱和内酯光化学反应的复杂性, 不仅体现在可发生各种光化学环加成反应, 而且某些更多共轭结构的 α,β -不饱和内酯 (如化合物 **89**) 在光照下还可通过电环化而发生开环和缩环两种竞争反应, 甚至继续发生光化学降解等系列反应^[55,56] (Scheme 21)。

对于某些含有多烯结构的 α,β -不饱和内酯, 如化合物 **90**, 甚至还能在 1,4-二氰基-2,3,5,6-四甲基苯 (DCTMB) 和二苯酮作为光敏剂的条件下, 通过光诱导

Scheme 21

电子转移过程(PET)形成复杂的多环化合物 **91**^[57](Eq. 17). 这种 PET 的多烯环化过程同时形成了多个手性立体中心, 故常用于萜类、甾类(如化合物 **92**)等天然产物的仿生合成^[57,58](Eq. 18).

4 结束语

α,β -不饱和内酯的光化学反应已普遍应用于有机合成, 特别是多种环状光学活性物质和天然产物的合成, 这对于新药研发与绿色化学都意义重大. 但是, 如何解决 α,β -不饱和内酯光化学反应中的复杂性问题, 包括立体化学控制的复杂性^[59], 仍然值得关注; 同时, 如何深化光化学反应机理研究为发现、设计新的反应奠定基础, 目前仅 Hoffmann 课题组在这方面有系列探索, 也有待加强.

References

- [1] Roth, H. D. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1989**, 28, 1193.
- [2] Zhang, B.-W.; Cheng, X.-X.; Liu, Y.-Y.; Cao, Y. *Photogr. Sci. Photochem.* **2001**, 19, 139 (in Chinese).
(张宝文, 程学新, 刘颢颢, 曹怡, 感光科学与光化学, **2001**, 19, 139.)
- [3] Albini, A.; Fagnoni, M. *Green Chem.* **2004**, 6, 1.
- [4] Hoffmann, N. *Chem. Rev.* **2008**, 108, 1052.
- [5] Hashem, A.; Kleinpeter, E. *Adv. Heterocycl. Chem.* **2001**, 81, 107.
- [6] Yu, H.-T.; Kang, R.-H.; Ouyang, X.-M. *Chin. J. Org. Chem.* **2000**, 20, 441 (in Chinese).
(于海涛, 康汝洪, 欧阳兴梅, 有机化学, **2000**, 20, 441.)
- [7] Hoffmann, N. *Pure Appl. Chem.* **2007**, 79, 1949.
- [8] Mann, J.; Weymouth-Wilson, A. C. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1994**, 3141.
- [9] Mann, J.; Weymouth-Wilson, A. C. *Synlett* **1992**, 67.
- [10] Gould, J. H. M.; Mann, J. *Chem. Commun.* **1997**, 243.
- [11] Mann, J.; Weymouth-Wilson, A. C. *Carbohydr. Res.* **1991**, 216, 511.
- [12] Yavorsky, A.; Shvydkiv, O.; Nolan, K.; Hoffmann, N.; Oelgemöller, M. *Tetrahedron Lett.* **2011**, 52, 278.
- [13] Ghosh, A. K.; Leshchenko, S.; Noetzel, M. *J. Org. Chem.* **2004**, 69, 7822.
- [14] Jahjah, R.; Gassama, A.; Bulach, V.; Suzuki, C.; Abe, M.; Hoffmann, N.; Martinez, A.; Nuzillard, J. M. *Chem. Eur. J.* **2010**, 16, 3341.
- [15] de Alvarega, E. S.; Mann, J. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1993**, 2141.
- [16] Bertrand, S.; Glapski, C.; Hoffmann, N.; Pete, J. P. *Tetrahedron Lett.* **1999**, 40, 3169.
- [17] Bertrand, S.; Hoffmann, N.; Pete, J. P. *Tetrahedron Lett.* **1999**, 40, 3173.
- [18] Hoffmann, N.; Bertrand, S.; Marinkovic, S.; Pesch, J. *Pure Appl. Chem.* **2006**, 78, 2227.
- [19] Marinkovic, S.; Hoffmann, N. *Chem. Commun.* **2001**, 1576.
- [20] Griesbeck, A. G.; Hoffmann, N.; Warzecha, K. D. *Acc. Chem. Res.* **2007**, 40, 128.
- [21] Wang, Z.-Y.; Jian, T.-Y.; Chen, Q.-H. *Chin. Chem. Lett.* **1999**, 10, 889.
- [22] Wang, Z.-Y.; Jian, T.-Y.; Chen, Q.-H. *Chin. J. Chem.* **2001**, 19, 177.
- [23] Brulé, C.; Hoffmann, N. *Tetrahedron Lett.* **2002**, 43, 69.
- [24] Bertrand, S.; Hoffmann, N.; Humbel, S.; Pete, J. P. *J. Org. Chem.* **2000**, 65, 8690.
- [25] Marinkovic, S.; Brulé, C.; Hoffmann, N.; Prost, E.; Nuzillard, J. M.; Bulach, V. *J. Org. Chem.* **2004**, 69, 1646.
- [26] Cucarull-Gonzalez, J. R.; Hernando, J.; Alibes, R.; Figueredo, M.; Font, J.; Rodriguez-Santiago, L.; Sodupe, M. *J. Org. Chem.* **2010**, 75, 4392.
- [27] Lee-Ruff, E.; Mladenova, G. *Chem. Rev.* **2003**, 103, 1449.
- [28] Srikrishna, A.; Ramasastry, S. S. V. *Tetrahedron Lett.* **2006**, 47, 335.
- [29] Alibés, R.; de March, P.; Figueredo, M.; Font, J.; Fu, X.-L.; Racamonde, M.; Alvarez-Larena, A.; Piniella, J.-F. *J. Org. Chem.* **2003**, 68, 1283.
- [30] Curtius, F.; Scharf, H. *Tetrahedron: Asymmetry* **1996**, 7, 2957.
- [31] de March, P.; Figueredo, M.; Font, J.; Raya, J. *Org. Lett.* **2000**, 2, 163.
- [32] de March, P.; Figueredo, M.; Font, J.; Raya, J.; Alvarez-Larena, A.; Piniella, J. F. *J. Org. Chem.* **2003**, 68, 2437.
- [33] Rustullet, A.; Alibés, R.; de March, P.; Figueredo, M.; Font, J. *Org. Lett.* **2007**, 9, 2827.
- [34] Bertrand, S.; Hoffmann, N.; Pete, J. P. *Tetrahedron* **1998**, 54, 4873.
- [35] Tanaka, M.; Tomioka, K.; Koga, K. *Tetrahedron* **1994**, 50, 12829.
- [36] Tanaka, M.; Tomioka, K.; Koga, K. *Tetrahedron* **1994**, 50, 12843.
- [37] Weixler, R.; Hehn, J. P.; Bach, T. *J. Org. Chem.* **2011**, 76, 5924.
- [38] Fleck, M.; Bach, T. *Chem. Eur. J.* **2010**, 16, 6015.
- [39] Inoue, M.; Sato, T.; Hirama, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2006**, 45, 4843.
- [40] Racamonde, M.; Alibés, R.; de March, P.; Figueredo, M.; Font, J. *J. Org. Chem.* **2008**, 73, 5944.
- [41] Xiong, H.-L.; Wang, H.; He, L.-J.; Zhang, Y.-H.; Zeng, Z. *Chin. J. Org. Chem.* **2011**, 31, 466 (in Chinese).
(熊红兰, 王辉, 何丽娟, 张永红, 曾卓, 有机化学, **2011**, 31, 466.)
- [42] Lutteke, G.; Kleinnijenhuis, R. A.; Jacobs, I.; Wrigstedt, P. J.; Correia, A. C. A.; Nieuwenhuizen, R.; Hue, B. T. B.; Goubitz, K.; Peschar, R.; van Maarseveen, J. H.; Hiemstra, H. *Eur. J. Org. Chem.* **2011**, 3146.
- [43] Guo, H.; Herdtweck, E.; Bach, T. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, 49, 7782.
- [44] Sakamoto, M.; Kato, M.; Aida, Y.; Fujita, K.; Mino, T.; Fujita, T. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, 130, 1132.
- [45] Tanaka, K.; Toda, F.; Mochizuki, E.; Yasui, N.; Kai, Y.; Miyahara, I.; Hirotsu, K. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1999**, 38, 3523.
- [46] Tanaka, K.; Fujiwara, T. *Org. Lett.* **2005**, 7, 1501.
- [47] Yu, X.-L.; Scheller, D.; Rademacher, O.; Wolff, T. *J. Org. Chem.* **2003**, 68, 7387.

- [48] Kehrlosser, D.; Trager J.; Kim, H. C.; Hampp, N. *Langmuir* **2010**, *26*, 3878.
- [49] Giménez-Arnau, E.; Bussey, C.; Lepoittevin, J. P. *Photochem. Photobiol.* **1997**, *65*, 316.
- [50] Miyauchi, H.; Ikematsu, C.; Shimazaki, T.; Kato, S.; Shinmyozu, T.; Shimo, T.; Somekawa, K. *Tetrahedron* **2008**, *64*, 4108.
- [51] Li, L.; McDonald, R.; West, F. G. *Org. Lett.* **2008**, *10*, 3733.
- [52] Li, L.; Bender, J. A.; West, F. G. *Tetrahedron Lett.* **2009**, *50*, 1188.
- [53] Schwebel, D.; Soltan, M.; Margaretha, P. *Synthesis* **2001**, 1111.
- [54] Soltan, M.; Göwert, M.; Margaretha, P. *Org. Lett.* **2005**, *7*, 5159.
- [55] Faustoa, R.; Bredaa, S.; Kus, N. *J. Phys. Org. Chem.* **2008**, *21*, 644.
- [56] Menke, J. L.; McMahon, R. J. *Can. J. Chem.* **2011**, *89*, 186.
- [57] Heinemann, C.; Xing, X.-C.; Warzecha, K.-D.; Ritterskamp, P.; Gerner, H.; Demuth, M. *Pure Appl. Chem.* **1998**, *70*, 2167.
- [58] Heinemann, C.; Demuth, M. *J. Am. Chem. Soc.* **1999**, *121*, 4894.
- [59] Müller, C.; Bach, T. *Aust. J. Chem.* **2008**, *61*, 557.

(Zhao, X.)