天然黄酮香叶木素类及其衍生物的合成与生物活性研究

蔡双莲^a 吴 峥^a 吴 进^a
汪秋安^{*,a} 单 杨^b^(a) 湖南大学化学化工学院 长沙 410082)^(b) 湖南省柑桔工程技术研究中心 长沙 410125)

摘要 以橙皮苷为原料,经脱氢、选择性甲基化、糖苷水解、相转移催化下的糖苷化反应、异戊烯基化和法呢烯基化等反应步骤,分别合成了 3'-O-甲基香叶木素(1),香叶木素-7-O-β-D-葡萄糖苷(2),香叶木素-7-O-β-D-半乳糖苷(3),3'-O-甲基香叶木素-7-O-β-D-葡萄糖苷(4) 4 种天然产物及 3'-O-甲基香叶木素-7-O-β-D-半乳糖苷(5),香叶木素-7-O-β-D-乙酰葡萄糖苷(6)、香叶木素-7-O-β-D-乙酰半乳糖苷(7),3'-O-甲基香叶木素-7-O-β-D-乙酰葡萄糖苷(8),3'-O-甲基香叶木素-7-O-β-D-乙酰半乳糖苷(9),7-O-异戊基香叶木素(10),7-O-异戊烯基-3'-O-甲基香叶木素(11)和 7-O-法呢烯基-3'-O-甲基香叶木素(12) 8 种新的香叶木素衍生物. 所合成化合物的结构已由核磁共振谱、红外光谱和质谱所证实,并用比色法 MTT [3-(4,5-二甲基噻唑-2)-2,5-二苯基四氮唑盐]蛋白染色法对所合成的目标化合物进行了体外抗肿瘤细胞生物活性测试,发现化合物 6, 10 和 11 对肝癌细胞(SMMC-7721)、乳腺癌细胞(MCF-7)和结肠癌细胞(SW480)有一定的抑制活性.

关键词 黄酮类; 橙皮苷; 香叶木素; 合成; 生物活性

Synthesis and Biological Activities of Natural Flavonoid
Diosmetin and Its DerivativesCai, Shuanglian^a Wu, Zheng^a Wu, Jing^a Wang, Qiu'an^{*,a} Shan, Yang^b^(a) College of Chemistry and Chemical Engineering, Hunan University, Changsha 410082)^(b) Centre for Citrus Engineering Technology Research in Hunan, Changsha 410125)

Abstract Four natural flavonoids 3'-O-methyldiosmetin (1), diosmetin-7-O-β-D-glucoside (2), diosmetin-7-O-β-D-galactoside (3), 3'-O-methyldiosmetin-7-O-β-D-glucoside (4), and eight new diosmetin derivatives 3'-O-methyldiosmetin-7-O-β-D-galactoside (5), diosmetin-7-O-β-D-acetylglucoside (6), diosmetin-7-O-β-D-acetylgalactoside (7), 3'-O-methyl- diosmetin-7-O-β-D-acetylglucoside (8), 3'-O-methyldiosmetin-7-O-β-D-galactoside (9), 7-O-isopentyldiosmetin (10), 7-O-prenyldiosmetin (11) and 7-O-farnesyl-3'-O-methyldiosmetin (12) were synthesized from hesperidin by reaction steps including dehydrogenation, selective methylation, glycoside hydrolysis, glycosylation under phase transfer catalytic condition, O-prenylation and O-farnesylation, respectively. Their structures were confirmed by NMR, IR and MS techniques. The synthesized compounds were evaluated for biological activity against four human cancer cell lines by the standard MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] method, and the results showed that 6, 10 and 11 exhibited moderate cytotoxicity against SMMC-7721, MCF-7 and SW480 cancer cell lines.

Keywords flavonoid; hesperidin; diosmetin; synthesis; biological activity

3'-O-甲基香叶木素(1)是我国南方药用植物 *Striga asiatica* (L.) O. Kuntze (Scrophulariaceae)的有效成分^[1], 香叶木素-7-O-葡萄糖苷(2)是具有清热解毒等作用的蓬子菜的主要化学成分之一^[2], Lin 等^[3]在菊花中也发现了香叶木素-7-O-葡萄糖苷(2)和香叶木素-7-O-半乳糖苷

(3), 而 3'-O-甲基香叶木素-7-O-葡萄糖苷(4)在埃及水苏中首次被发现^[4]. 关于这些天然黄酮糖苷类化合物的生物活性报道较少, 而关于香叶木素-7-O-半乳糖(3)及 3'-O-甲基香叶木素-7-O-葡萄糖苷(4)的化学合成更是未见文献报道. 另外, 研究表明 O-法呢烯基化或 O-异戊

* E-mail: wangqiu'an@yahoo.com

Received September 8, 2011; revised October 14, 2011; published online November 21, 2011.

Project supported by the Science and Technology Planning Project of Hunan Province (No. 2011FJ3214).

湖南省科技计划(No. 2011FJ3214)资助项目.

烯基化可使黄酮类化合物的亲脂性得到提高, 有助于其在生物体中透过细胞膜从而增强其生物活性^[5,6].

为了进一步研究香叶木素黄酮类化合物的生物活性, 探讨其构效关系, 我们以丰富易得的天然二氢黄酮类橙皮苷(hesperidin, hespertin-7-rutinoside)为原料, 经脱氢、甲基化(或苄基选择性保护酚羟基), 糖苷水解、相转移催化下的糖苷化反应、异戊烯基化和法呢烯基化等反应步骤, 分别合成了 3'-*O*-甲基香叶木素(**1**), 香叶木素-7-*O*- β -D-葡萄糖苷(**2**), 香叶木素-7-*O*- β -D-半乳糖苷(**3**), 3'-*O*-甲基香叶木素-7-*O*- β -D-葡萄糖苷(**4**) 4 种天然

产物及 3'-*O*-甲基香叶木素-7-*O*- β -D-半乳糖苷(**5**), 香叶木素-7-*O*- β -D-乙酰葡萄糖苷(**6**), 香叶木素-7-*O*- β -D-乙酰半乳糖苷(**7**), 3'-*O*-甲基香叶木素-7-*O*- β -D-乙酰葡萄糖苷(**8**), 3'-*O*-甲基香叶木素-7-*O*- β -D-乙酰半乳糖苷(**9**), 7-*O*-异戊基香叶木素(**10**), 7-*O*-异戊烯基-3'-*O*-甲基香叶木素(**11**)和 7-*O*-法呢烯基-3'-*O*-甲基香叶木素(**12**) 8 种新的香叶木素类衍生物. 并用 MTT 蛋白染色法对所合成的目标化合物进行了体外抗肿瘤细胞生物活性测试. 系列香叶木素类天然黄酮及其衍生物的合成路线见 Scheme 1.

Reagent and conditions: (a) I_2 , pyridine, 90~95 °C; (b) $BnBr$, K_2CO_3 , DMF; (c) H^+ , H_2O , C_2H_5OH ; (d) $(CH_3)_2SO_4$, 3% $NaOH$, 10~25 °C; (e) acetylglycose bromide, K_2CO_3 , $CHCl_3$, $Bu_4N^+Br^-$, 45~50 °C; (f) 5% Pd/C , H_2 , $CH_3CO_2C_2H_5$, CH_3OH , r.t.; (g) CH_3ONa , CH_3OH , reflux; (h) prenyl bromide or farnesyl bromide, K_2CO_3 , dry acetone

Scheme 1

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

熔点在 XRC-1 型显微熔点仪上测定, 温度未校正; NMR 用 Bruker Am-400 型核磁共振仪测定(溶剂为 CDCl_3 或 $\text{DMSO}-d_6$, TMS 为内标); 质谱用 Agilent 1100 液-质联用仪或 ZAB-HS 型仪测定记录; 红外光谱用 FD-5DX 仪(KBr 压片)测定; 元素分析用德国元素分析仪(Vario ELL III)测定; 柱层析用硅胶(青岛海洋化工厂产品)。所用试剂和溶剂为化学纯和分析纯; 要求无水的溶剂均经除水和重蒸处理。

地奥明(Diosmin)和香叶木素(Diosmetin)按文献[7]以橙皮苷为原料分别经脱氢、糖苷水解制备; 溴代-2,3,4,6-四-*O*-乙酰基- α -D-吡喃葡萄糖和溴代-2,3,4,6-四-*O*-乙酰基- α -D-吡喃半乳糖参考文献[8]制备。

1.2 3'-*O*-苄基香叶木素(13)的合成

在 100 mL 三口瓶中加入地奥明(2.215 g, 3.64 mmol), 无水 K_2CO_3 (4 g, 29 mmol), N_2 保护下, 加入无水 DMF 23 mL, 室温搅拌 1 h, 再缓慢滴加 BnBr (0.5 mL, 4.19 mmol), 油浴升温至 95 °C 左右搅拌反应 4 h, 将反应液倒入冰水中, 有黄色固体析出, 减压抽滤, 水洗, 得固体。将此固体转移到 250 mL 单口瓶中, 加入 120 mL 无水乙醇, 室温搅拌下滴加 10 mL 浓 HCl, 回流搅拌 7 h, 反应液冷却至室温, 减压蒸除部分乙醇, 将剩下的乙醇溶液倒入水中, 有淡黄色固体析出, 减压抽滤, 滤饼水洗, 干燥, 硅胶柱层析分离[洗脱剂: $V(\text{石油醚}): V(\text{乙酸乙酯})=2:1$], 得黄色粉末状固体 0.68 g, 产率 56%. m.p. 230~232 °C; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 12.93 (s, 1H, 5-OH), 10.88 (s, 1H, 7-OH), 7.68~7.73 (m, 2H, 2'',6''-H), 7.36~7.51 (m, 5H, 2',6',3'',4'',5''-H), 7.16 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, 5'-H), 6.97 (s, 1H, 3-H), 6.53 (s, 1H, 6-H), 6.21 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 8-H), 5.24 (s, 2H, 3'- OCH_2), 3.87 (s, 3H, 4'- OCH_3); MS (FAB^+) m/z : 391 $[\text{M}+1]^+$ 。

1.3 3'-*O*-甲基香叶木素(1)的合成

称取地奥明(3.088 g, 5.07 mmol)加入到 250 mL 三口瓶中, 再加入 3% NaOH 溶液 100 mL, 控制温度在 10~25 °C 搅拌 30 min, 分次缓慢滴加 $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$ (6.8 mL, 71.35 mmol), 搅拌反应 8 h, 反应过程中控制 pH 为碱性, 若反应体系变成酸性需要及时补加 3% NaOH 溶液。反应结束, 将反应液调制酸性, 过滤析出的固体, 将滤液加入到 250 mL 单口瓶中, 搅拌下滴加 6 mL 浓 H_2SO_4 , 油浴升温, 回流搅拌 6 h, 反应过程中有黄色固体析出。反应结束后, 将反应液冷却至室温, 减压抽滤, 滤液用乙酸乙酯萃取, 滤饼水洗至中性, 干燥, 硅胶柱

层析分离[洗脱剂: $V(\text{石油醚}): V(\text{乙酸乙酯})=2:1$], 得黄色粉末状固体 0.72 g, 产率 45%. m.p. 278~280 °C [文献值^[1]: 276~278 °C]; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 12.93 (s, 1H, 5-OH), 10.85 (s, 1H, 7-OH), 7.69 (dd, $J=8.2, 2.0$ Hz, 1H, 6'-H), 7.57 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 2'-H), 7.13 (d, $J=8.2$ Hz, 1H, 5'-H), 6.98 (s, 1H, 3-H), 6.54 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 6-H), 6.21 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 8-H), 3.88, 3.86 (each s, each 3H, 4'- OCH_3 , 3'- OCH_3); IR (KBr) ν : 3100, 1650, 1615, 1570, 1510, 1160, 1015, 850, 765 cm^{-1} ; MS (FAB^+) m/z : 315 $[\text{M}+1]^+$ 。

1.4 香叶木素-7-*O*- β -D-乙酰葡萄糖苷(6)的合成

向 100 mL 单口瓶中, 加入 13 (200 mg, 0.51 mmol), 50 mg $\text{Bu}_4\text{N}^+\text{Br}^-$ (TBAB), 再分别加入 20 mL 0.25 mol/L 的 K_2CO_3 溶液和 20 mL CHCl_3 , 室温下搅拌 1 h 后, 向体系中加入溴代-2,3,4,6-四-*O*-乙酰基- α -D-吡喃葡萄糖(0.42 g, 1.02 mmol), 升温至 45~50 °C, 反应过夜。反应结束后, 分离得到有机相, 水相再用 CH_2Cl_2 萃取三次, 合并有机相, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 蒸除溶剂得粗品。硅胶柱层析分离[洗脱剂: $V(\text{石油醚}): V(\text{乙酸乙酯})=2:1$], 得油状物, 用甲醇重结晶, 得到黄色固体 3'-*O*-苄基香叶木素-7-*O*- β -D-乙酰葡萄糖苷 212 mg, 产率 58.9%. m.p. 105~107 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 12.82 (s, 1H, 5-OH), 7.49~7.53 (m, 3H, 2'',6',6'''-H), 7.32~7.42 (m, 4H, 2',3'',4'',5''-H), 7.00 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, 5'-H), 6.52 (s, 1H, 3-H), 6.55 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 6-H), 6.45 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, 8-H), 5.28~5.33 (m, 2H, 6''- CH_2), 5.23 (s, 2H, 3'- OCH_2), 5.19 (d, $J=7.6$ Hz, 1H, 2''-H), 5.17 (d, $J=9.6$, 1H, 1''-H), 4.30 (dd, $J=12.0, 6.0$ Hz, 1H, 3''-H), 4.21 (dd, $J=12.4, 2.4$ Hz, 1H, 4''-H), 3.97 (s, 3H, 4'- OCH_3), 3.93~3.94 (m, 1H, 5''-H), 2.10, 2.08, 2.07, 2.05 (each s, each 3H, COCH_3)。

在 100 mL 放有磁子的三口瓶加入 253 mg 5% Pd/C, 将其充满氢气, 然后将 3'-*O*-苄基香叶木素-7-*O*- β -D-乙酰葡萄糖苷(200 mg, 0.28 mmol)用 20 mL 乙酸乙酯和 10 mL 甲醇的混合溶液溶解, 用注射器加入三口瓶中, 室温氢解反应 12 h。反应结束后, 过滤除去 Pd/C, 用乙酸乙酯、甲醇交替淋洗 Pd/C, 滤液减压蒸干得到粗产物, 硅胶柱层析分离[洗脱剂: $V(\text{石油醚}): V(\text{乙酸乙酯})=3:2$], 得黄色固体 160 mg, 产率 91.5%. m.p. 221~223 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 12.81 (s, 1H, 5-OH), 7.45 (dd, $J=8.4, 2.0$ Hz, 1H, 6'-H), 7.42 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 2-H), 6.97 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, 5'-H), 6.59 (s, 1H, 3-H), 6.58 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 6-H), 6.44 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, 8- CH_2), 5.76 (s, 1H, 3'-OH), 5.30~5.33 (m, 2H, 6''-H), 5.17~5.19 (m, 1H, 2''-H), 5.16 (d, $J=9.2$ Hz, 1H, 1''-H),

4.30 (dd, $J=12.4, 4.0$ Hz, 1H, 3''-H), 4.21 (dd, $J=12.0, 2.4$ Hz, 1H, 4''-H), 3.99 (s, 3H, 4'-OCH₃), 3.93~3.97 (m, 1H, 5''-H), 2.12, 2.08, 2.07, 2.05 (each s, each 3H, COCH₃); MS (ESI) m/z : 653 [M+Na]⁺. Anal. calcd for C₃₀H₃₀O₁₅: C 57.14, H 4.80; found C 57.29, H 4.71.

1.5 香叶木素-7-*O*-β-*D*-葡萄糖苷(2)的合成

在 100 mL 单口烧瓶中, 加入 **5** (49 mg, 0.078 mmol), 用 15 mL 甲醇加热搅拌至溶解, 此时再加入 5 mL 甲醇钠溶液(5 mL 甲醇和 4.3 mg 钠配置而成), 回流搅拌反应 3 h 后, TLC 跟踪反应至原料点消失, 停止反应, 冷却至室温, 减压蒸除溶剂, 硅胶柱层析分离[洗脱剂: 用乙酸乙酯及乙酸乙酯和乙醇的混合溶剂进行梯度洗脱], 得到淡黄色固体 17 mg, 产率 47.1%. m.p. 259~261 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 400 MHz) δ : 12.94 (s, 1H, 5-OH), 9.47 (s, 1H, 3'-OH), 7.59 (dd, $J=8.6, 2.4$ Hz, 1H, 6'-H), 7.46 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, 2'-H), 7.12 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, 5'-H), 6.84 (s, 1H, 3-H), 6.82 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 6-H), 6.46 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 8-H), 5.41 (d, $J=4.8$ Hz, 1H, 2''-OH), 5.14 (d, $J=4.8$ Hz, 1H, 3''-OH), 5.09 (d, $J=9.0$ Hz, 1H, 1''-H), 5.07 (br s, 1H, 4''-OH), 4.62 (t, $J=5.6$ Hz, 1H, 6''-OH), 3.88 (s, 3H, 4'-OCH₃), 3.71 (dd, $J=10.2, 5.2$ Hz, 1H, 3''-H), 3.45~3.49 (m, 2H, 6''-CH₂), 3.17~3.31 (m, 3H, 2'', 4'', 5''-H); MS (ESI) m/z : 485 [M+Na]⁺.

1.6 香叶木素-7-*O*-β-*D*-乙酰半乳糖苷(7)的合成

7 的合成方法同 **6**, 以 **13** 和溴代-2,3,4,6-四-*O*-乙酰基-α-*D*-吡喃半乳糖为原料, 得黄色固体 3'-*O*-苄基香叶木素-7-*O*-β-*D*-乙酰半乳糖苷, 产率 51%. m.p. 116~119 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.48~7.53 (m, 3H, 2'', 6'', 6'''-H), 7.34~7.41 (m, 3H, 2', 3'', 4'', 5'''-H), 7.01 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, 5'-H), 6.52 (s, 1H, 3-H), 6.56 (d, $J=1.2$ Hz, 1H, 6-H), 6.46 (d, $J=1.2$ Hz, 1H, 8-H), 5.48~5.53 (m, 3H, 2'', 5''-H), 5.23 (s, 2H, 3'-OCH₂), 5.13~5.16 (m, 3H, 1'', 3''-H), 4.25 (dd, $J=11.2, 8.8$ Hz, 1H, 4''-H), 4.14~4.20 (m, 2H, 6''-CH₂), 3.97 (s, 3H, 4'-OCH₃), 2.20, 2.17, 2.09, 2.03 (each s, each 3H, COCH₃). 然后将 3'-*O*-苄基香叶木素-7-*O*-β-*D*-乙酰半乳糖苷室温催化氢化, 硅胶柱层析分离[洗脱剂: $V(\text{石油醚}): V(\text{乙酸乙酯})=3:2$], 得黄色固体 **7**, 产率 90.2%. m.p. 163~166 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 12.80 (s, 1H, 5-OH), 7.542~7.45 (m, 2H, 2', 6'-H), 6.97 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, 5'-H), 6.59 (s, 1H, 3-H), 6.60 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, 6-H), 6.45 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 8-H), 5.86 (s, 1H, 3'-OH), 5.49~5.55 (m, 3H, 2'', 5''-H), 5.13~5.16 (m, 3H, 1'', 3''-H), 4.21~4.23 (m, 2H, 6''-CH₂), 4.15~4.17 (m, 1H, 4''-H), 3.98 (s, 3H, 4'-OCH₃), 2.20, 2.11, 2.09, 2.03 (each s, each 3H, COCH₃); MS (ESI)

m/z : 653 [M+Na]⁺. Anal. calcd for C₃₀H₃₀O₁₅: C 57.14, H 4.80; found C 57.28, H 4.65

1.7 香叶木素-7-*O*-β-*D*-半乳糖苷(3)的合成

3 的合成方法同 **2**, 以 **7** 为原料, 得淡黄色固体, 产率 45%. m.p. 250~252 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 400 MHz) δ : 12.95 (s, 1H, 5-OH), 9.49 (s, 1H, 3'-OH), 7.58 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, 6'-H), 7.46 (d, $J=1.6$ Hz, 1H, 2'-H), 7.11 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, 5'-H), 6.81~6.84 (m, 2H, 3, 6-H), 6.46 (s, 1H, 8-H), 5.26 (d, $J=4.8$ Hz, 1H, 2''-OH), 5.04 (d, $J=7.2$ Hz, 1H, 1''-H), 4.93 (d, $J=5.6$ Hz, 1H, 4''-OH), 4.73 (t, $J=5.2$ Hz, 1H, 6''-OH), 4.58 (d, $J=4.8$ Hz, 1H, 3''-OH), 3.88 (s, 3H, 4'-OCH₃), 3.56~3.73 (m, 6H, sugar-H); MS (ESI) m/z : 485 [M+Na]⁺.

1.8 3'-*O*-甲基香叶木素-7-*O*-β-*D*-乙酰葡萄糖苷(8)的合成

8 的合成方法同 **6**, 以 **1** 和溴代-2,3,4,6-四-*O*-乙酰基-α-*D*-吡喃葡萄糖为原料, 得黄色固体, 产率 62.1%. m.p. 120~122 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.53 (dd, $J=8.4, 2.0$ Hz, 1H, 6'-H), 7.33 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 2'-H), 7.00 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, 5'-H), 6.62 (s, 1H, 3-H), 6.60 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 6-H), 6.45 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 8-H), 5.31~5.34 (m, 2H, 6''-CH₂), 5.21 (d, $J=6.8$ Hz, 1H, 2''-H), 5.17 (d, $J=9.2$ Hz, 1H, 1''-H), 4.31 (dd, $J=12.4, 6.0$ Hz, 1H, 3''-H), 4.21 (dd, $J=12.4, 5.0$ Hz, 1H, 4''-H), 3.99, 3.98 (each s, each 3H, 4'-OCH₃, 3'-OCH₃), 3.93 (m, 1H, 5''-H), 2.11, 2.08, 2.07, 2.05 (each s, each 3H, COCH₃); MS (ESI) m/z : 667 [M+Na]⁺. Anal. calcd for C₃₁H₃₂O₁₅: C 57.76, H 5.00; found C 57.56, H 4.91.

1.9 3'-*O*-甲基香叶木素-7-*O*-β-*D*-葡萄糖苷(4)的合成

4 的合成方法同 **2**, 以 **8** 为原料, 得淡黄色固体, 产率 42%. m.p. 234~236 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 400 MHz) δ : 12.92 (s, 1H, 5-OH), 7.59 (d, $J=7.6$ Hz, 1H, 6'-H), 7.46 (s, 1H, 2'-H), 7.12 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, 5'-H), 7.08 (s, 1H, 3-H), 6.89 (s, 1H, 6-H), 6.46 (s, 1H, 8-H), 5.42 (br, 1H, 2''-OH), 5.17 (br, 1H, 3''-OH), 5.09 (br, 1H, 4''-OH), 5.07 (d, $J=7.2$ Hz, 1H, 1''-H), 4.65 (br, 1H, 6''-OH), 3.86, 3.88 (each s, each 3H, 3'-OCH₃, 4'-OCH₃), 3.70~3.72 (m, 1H, 3''-H), 3.44~3.48 (m, 2H, 6''-CH₂), 3.17~3.31 (m, 3H, 2'', 4'', 5''-H); MS (ESI) m/z : 499 [M+Na]⁺.

1.10 3'-*O*-甲基香叶木素-7-*O*-β-*D*-乙酰半乳糖苷(9)的合成

9 的合成方法同 **6**, 以 **1** 和溴代-2,3,4,6-四-*O*-乙酰基-α-*D*-吡喃半乳糖为原料, 得黄色固体 **9**, 产率 55%.

m.p. 118~120 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 12.82 (s, 1H, 5-OH), 7.54 (dd, $J=8.4, 2.0$ Hz, 1H, 6'-H), 7.34 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 2'-H), 7.00 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, 5'-H), 6.62 (s, 1H, 3-H), 6.61 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, 6-H), 6.45 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 8-H), 5.48~5.54 (m, 3H, 2'',5''-H), 5.12~5.17 (m, 3H, 1'',3''-H), 4.25 (dd, $J=11.2, 7.2$ Hz, 1H, 4''-H), 4.14~4.20 (m, 2H, 6''-CH₂), 3.99, 3.97 (each s, each 3H, 4'-OCH₃, 3'-OCH₃), 2.20, 2.10, 2.09, 2.03 (each s, each 3H, COCH₃). MS (ESI) m/z : 667 [$\text{M}+\text{Na}$]⁺. Anal. calcd for $\text{C}_{31}\text{H}_{32}\text{O}_{15}$: C 57.76, H 5.00; found C 57.57, H 4.93.

1.11 3'-O-甲基香叶木素-7-O- β -D-半乳糖苷(5)的合成

5的合成方法同**2**,以**9**为原料,得黄色固体,产率40.1%. m.p. 232~235 °C; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 12.90 (s, 1H, 5-OH), 7.69 (dd, $J=8.4, 2.0$ Hz, 1H, 6'-H), 7.56 (d, $J=1.6$ Hz, 1H, 2'-H), 7.11 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, 5'-H), 7.04 (s, 1H, 3-H), 6.85 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 6-H), 6.43 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 8-H), 5.28 (d, $J=4.8$ Hz, 1H, 2''-OH), 4.99 (d, $J=7.6$ Hz, 2H, 1''-H, 4''-OH), 4.73 (t, $J=5.2$ Hz, 1H, 6''-OH), 4.58 (d, $J=4.0$ Hz, 1H, 3''-OH), 3.85, 3.82 (each s, each 3H, 3'-OCH₃, 4'-OCH₃), 3.38~3.67 (m, 6H, sugar-H); IR (KBr) ν : 3413, 3228, 2169, 2042, 1660, 1615, 1400, 1257, 897 cm^{-1} ; MS (ESI) m/z : 499 [$\text{M}+\text{Na}$]⁺. Anal. calcd for $\text{C}_{23}\text{H}_{24}\text{O}_{11}$: C 57.98, H 5.08; found C 58.18, H 5.21.

1.12 7-O-异戊基香叶木素(10)的合成

称取**13** (70 mg, 0.18 mmol), 无水 K_2CO_3 (127 mg, 0.92 mmol)加入到50 mL单口瓶中,再加入10 mL无水丙酮,50 °C左右搅拌1 h,缓慢滴加法呢烯基溴(0.03 mL, 0.26 mmol)与2 mL丙酮的混合溶液, TLC跟踪反应至原料点消失,约2 h,停止反应,冷却至室温,过滤,用少量丙酮润洗滤渣,滤液旋干得粗产物. 硅胶柱层析分离[洗脱剂: $V(\text{石油醚}):V(\text{乙酸乙酯})=10:1$],得黄色固体7-O-异戊基-3'-O-苄基香叶木素77 mg,产率93%. m.p. 130~132 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 12.77 (s, 1H, 5-OH), 7.48~7.52 (m, 3H, 2'',4'',6''-H), 7.38~7.42 (m, 3H, 2',3'',5''-H), 7.33 (dd, $J=8.4, 2.0$ Hz, 1H, 6'-H), 6.99 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, 5'-H), 6.49 (s, 1H, 3-H), 6.45 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 6-H), 6.37 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 8-H), 5.48~5.52 (m, 1H, 2''-H), 5.23 (s, 2H, 3'-OCH₂), 4.59 (d, $J=6.4$ Hz, 1H, 1''-CH₂), 3.97 (s, 3H, 4'-OCH₃), 1.82, 1.78 (each s, each 3H, 4'',5''-CH₃).

室温氢解同**6**,硅胶柱层析分离[洗脱剂: $V(\text{石油醚}):V(\text{乙酸乙酯})=4:1$],得黄色固体52 mg,产率87.8%. m.p. 138~141 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 12.76 (s, 1H, 5-OH), 7.46 (dd, $J=8.4, 2.0$ Hz, 1H, 6'-H),

7.43 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 2'-H), 6.96 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, 5'-H), 6.56 (s, 1H, 3-H), 6.48 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, 6-H), 6.35 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 8-H), 5.75 (s, 1H, 3'-OH), 4.06 (t, $J=6.8$ Hz, 1H, 1''-H), 3.98 (s, 3H, 4'-OCH₃), 1.84~1.86 (m, 1H, 3''-H), 1.69~1.74 (m, 2H, 2''-CH₂), 0.99, 0.97 (each s, each 3H, 4'',5''-CH₃); IR (KBr) ν : 3413, 3228, 2169, 2030, 1650, 1615, 1400, 1266 cm^{-1} ; MS (FAB⁺) m/z : 371 [$\text{M}+1$]⁺. Anal. calcd for $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{O}_6$: C 68.10, H 5.99; found C 67.92, H 6.11.

1.13 7-O-异戊烯基-3'-O-甲基香叶木素(11)的合成

称取**1** (108 mg, 0.34 mmol), 无水 K_2CO_3 (0.19 g, 1.36 mmol)加入到50 mL单口瓶中,再加入15 mL无水丙酮,50 °C下搅拌1 h,缓慢滴加异戊烯基溴(0.06 mL, 0.50 mmol)与3 mL丙酮的混合溶液, TLC跟踪反应至原料点消失,约3 h后停止反应,冷却至室温,过滤,用少量丙酮润洗,滤液旋干,得到粗产物,硅胶柱层析分离[洗脱剂: $V(\text{石油醚}):V(\text{乙酸乙酯})=4:1$],得亮黄色粉末状固体125 mg,产率95.2%. m.p. 114~116 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 12.78 (s, 1H, 5-OH), 7.52 (dd, $J=8.4, 2.0$ Hz, 1H, 6'-H), 7.33 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 2'-H), 6.97 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, 5'-H), 6.57 (s, 1H, 3-H), 6.49 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 6-H), 6.37 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 8-H), 5.49 (t, $J=6.4$ Hz, 1H, 2''-H), 4.58 (d, $J=7.2$ Hz, 1H, 1''-CH₂), 3.98, 3.97 (each s, each 3H, 4'-OCH₃, 3'-OCH₃), 1.82, 1.77 (each s, each 3H, 4''-CH₃, 5''-CH₃); MS (FAB⁺) m/z : 383 [$\text{M}+1$]⁺. Anal. calcd for $\text{C}_{22}\text{H}_{22}\text{O}_6$: C 69.10, H 5.80; found C 69.26, H 5.72.

1.14 7-O-法呢烯基-3'-O-甲基香叶木素(12)的合成

12的合成方法同**11**,以**1**和法呢烯基溴为原料,得黄色固体,产率88%. m.p. 54~56 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 12.75 (s, 1H, 5-OH), 7.52 (dd, $J=8.4, 2.0$ Hz, 1H, 6'-H), 7.33 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 2'-H), 6.98 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, 5'-H), 6.58 (s, 1H, 3-H), 6.49 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 6-H), 6.37 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, 8-H), 5.49 (t, $J=5.6$ Hz, 1H, 2''-H), 5.06~5.12 (m, 2H, 6'',10''-H), 4.61 (d, $J=6.4$ Hz, 1H, 1''-CH₂), 3.98, 3.97 (each s, each 3H, 4'-OCH₃, 3'-OCH₃), 2.12~2.16 (m, 4H, 4'',5''-CH₂), 1.97~2.06 (m, 4H, 8'',9''-CH₂), 1.77 (s, 3H, 15''-CH₃), 1.67 (s, 3H, 14''-CH₃), 1.61, 1.59 (each s, each 3H, 12'',13''-CH₃); MS (FAB⁺) m/z : 519 [$\text{M}+1$]⁺. Anal. calcd for $\text{C}_{32}\text{H}_{38}\text{O}_6$: C 74.11, H 7.39; found C 74.31, H 7.28.

1.15 合成化合物的生物活性测试

采用MTT法对合成的化合物**1**~**12**进行体外抗肿瘤细胞HL-60(白血病细胞)、SMMC-7721(肝癌细胞),

SK-BR-3(乳腺癌细胞)、A-549(肺癌细胞)和结肠癌细胞(SW480)的活性筛选. 使用 MTT(噻唑蓝)蛋白染色法. 以顺铂(MW300)和紫杉醇作为阳性对照.

实验方法: (1)接种细胞: 用含 10%胎牛血清的培养液(DMEM 或者 RPMI1640)配成单个细胞悬液, 以每孔 5000~10000 个细胞接种到 96 孔板, 每孔体积 100 μL , 贴壁细胞提前 12 h 接种培养. (2)加入待测化合物溶液(固定浓度 40 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 初筛, 在该浓度对肿瘤细胞生长抑制在 50%附近的化合物设 5 个浓度进入梯度复筛), 每孔终体积 200 μL , 每种处理均设 3 个复孔. (3)显色: 37 $^{\circ}\text{C}$ 培养 48 h 后, 每孔加 MTT 溶液 20 μL . 继续孵育 4 h, 终止培养, 吸弃孔内培养上清液, 每孔加 200 μL 的 SDS 溶液(10%), 过夜孵育(温度 37 $^{\circ}\text{C}$), 使结晶物充分融解. (4)比色: 选择 595 nm 波长, 酶联免疫检测仪(Bio-Rad 680)读取各孔光吸收值, 记录结果, 以浓度为横坐标, 细胞存活率为纵坐标绘制细胞生长曲线, 应用两点法(Reed and Muench 法)计算化合物的 IC_{50} 值.

2 结果与讨论

以丰富易得的天然二氢黄酮类橙皮苷为原料, 经脱氢反应得黄酮类地奥明. 黄酮结构中各个位置上的酚羟基活性不同, 一般为 $\text{C}^7\text{-OH} > \text{C}^3\text{-OH} > \text{C}^5\text{-OH}$. 由于 4 位羰基的影响, 5 位羟基的反应活性较低. 所以设计合成路线时, 首先用苄基和甲基两种基团选择性的将 3'位 OH 进行保护. 3'位-OH 经甲基化或苄基保护后的地奥明极性较大, 分离较困难, 因此直接将得到的混合物进行酸催化水解, 然后再分离提纯, 得到 3'-*O*-甲基香叶木素(**1**)及 3'-*O*-苄基香叶木素(**13**).

地奥明苄基保护采用 K_2CO_3 作为缩合剂, 在 N_2 气氛下进行. 在实验过程中, 将不同温度及反应时间下得到的实验结果进行了比较. 结果发现, 如果温度较低(50~60 $^{\circ}\text{C}$), 则需要的反应时间较长, 温度过高(>110 $^{\circ}\text{C}$)或者反应时间过长均会造成副产物增加, 最终确定反应温度为 90~98 $^{\circ}\text{C}$, 反应时间 3~4 h. 苄基保护后, 未经分离提纯直接水解脱糖基, 转化率较高. 地奥明 3'位 OH 的 *O*-甲基化, 选用 $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$ 作甲基化试剂. 实验之初, 尝试用 DMF 作溶剂, 在弱碱 K_2CO_3 存在的条件下, 60~70 $^{\circ}\text{C}$ 反应, 反应生成了目标物, 但是由于地奥明不会完全甲基化, 而 3'-*O*-甲基香叶木素和香叶木素在硅胶柱层析分离时较困难. 因此, 尝试在 NaOH 溶液体系中进行反应, NaOH 溶液可以溶解地奥明, 也可作为碱, 脱去地奥明 3'位酚羟基的氢. 反应温度控制在 60~70 $^{\circ}\text{C}$ 时, 反应副产物仍较多. 经过多次尝试, 最终选用 $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$ 作甲基化试剂, 在 3% NaOH 溶液中, 控制温度在 10~25 $^{\circ}\text{C}$ 进行反应. 实验发现 3'-*O*-甲基地奥

明的水溶性增强, 而地奥明在酸性溶液中溶解度小. 利用它们溶解度的差异, 反应结束后, 先将溶液调至酸性, 未反应的地奥明会析出, 过滤除去地奥明, 得到甲基化的粗产物. 改进后的方法, 有利于水解后分离纯化得到化合物 3'-*O*-甲基香叶木素.

在系列黄酮糖苷的合成中, 以适当保护的 3'-*O*-苄基香叶木素(**13**)以及 3'-*O*-甲基香叶木素(**1**)作为黄酮苷元与活化的糖基给体进行糖苷化反应. 糖基给体溴代乙酰糖合成纯化后应充分干燥, 放入冰箱中低温避光保存, 最好是制得后立即使用. 糖苷化反应采用的是相转移催化法, 用四丁基溴化铵(TBAB)作相转移催化剂, 在 0.25 mol/L K_2CO_3 溶液及 CHCl_3 两相体系中反应, 溴代乙酰糖不稳定, 在高温下容易分解, 反应过程中还容易碳化, 因而反应时温度不能过高, 确定在 45~50 $^{\circ}\text{C}$. 反应中用较弱的碱 K_2CO_3 代替了强碱 KOH 或 NaOH, 减少了溴代乙酰糖的水解. 相转移催化黄酮糖苷合成法, 反应体系简单, 操作简便, 立体选择性好而且收率也相对较高. 同时, 实验时也尝试了用无水丙酮及无水 DMF 的混合溶液作溶剂, 无水 K_2CO_3 作缩合剂, TBAB 作相转移催化剂的合成方法, 但是与前一种方法相比副产物相对较多, 产率也相对较低. 因此, 最终采用了在 K_2CO_3 溶液及 CHCl_3 两相体系中进行糖苷化反应. 将合成的黄酮乙酰基糖苷在甲醇钠/甲醇体系中脱掉乙酰基, 得到系列黄酮糖苷类, 3'-*O*-苄基香叶木素乙酰糖苷需要先在 Pd/C 的催化下氢解脱掉苄基, 再脱乙酰保护基, 最后得到黄酮糖苷类 **2~5**.

利用氢核磁共振谱中糖的端基质子的偶合常数判断苷键的构型是目前最常用的方法^[9,10]. 糖的六元环中, β 型糖的 H^1 , H^2 都处于 *a* 键, 它们之间的偶合常数 $J_{1,2}=7\sim 10\text{ Hz}$, 而 α 型糖的 H^1 , H^2 分别处于 *e* 键和 *a* 键, 它们之间的偶合常数 $J_{1,2}=2\sim 6\text{ Hz}$. 化合物 **2~5** 端基质子的化学位移分别为 δ 5.09, 5.04, 5.07, 4.99, 其偶合常数 $J_{1,2}$ 依次为 9.0, 7.2, 7.6, 7.2 Hz, 可以判断所有产物的糖苷键均为 β 构型.

由于香叶木素 3'位羟基已经甲基化或苄基保护, 而 5 位羟基与 4 位羰基形成分子内氢键, 反应活性较低, 因此在用 3'-*O*-甲基香叶木素(**1**)和 3'-*O*-苄基香叶木素(**13**)作底物, 进行异戊烯基化和法呢烯基化时, 反应选择性的发生在 7 位. 反应采用了较简单的无水 K_2CO_3 /无水丙酮体系, 异戊烯基溴和法呢烯基溴的热稳定性差, 对温度很敏感, 反应时先将底物在无水丙酮中溶解, K_2CO_3 存在的条件下搅拌, 生成大量氧负离子后再缓慢滴加异戊烯基溴或法呢烯基溴, 这样反应可在短时间内以高收率完成. 黄酮苷元与异戊烯基溴或法呢烯基溴的反应机理为亲核取代机理. 法呢烯基溴和异戊烯基溴均

容易形成较稳定的碳正离子结构(C^+ 和双键的 $p-\pi$ 共轭效应), 与水接触也容易发生取代反应, 因此在反应过程中要避免反应体系中有水的存在, 反应所用试剂均需经过无水处理。

在用 Pd/C , H_2 对 7-*O*-异戊烯基-3'-*O*-苄基香叶木素进行脱苄基反应时, 希望得到的目标化合物是 7-*O*-异戊烯基香叶木素, 但是反应结束后, 发现异戊烯基的双键也被氢化变成单键, 得到化合物 7-*O*-异戊基香叶木素 (10)。

将合成的化合物 1~12 用 MTT 法进行体外抗肿瘤细胞生物活性筛选, 结果见表 1。半数抑制浓度 IC_{50} 值表明, 化合物 10 对白血病细胞(HL-60)、肝癌细胞(SMMC-7721)、肺癌细胞(A-549)、乳腺癌细胞(MCF-7)和结肠癌细胞(SW480)均具有明显的体外生长抑制活性; 化合物 6 和 11 对肝癌细胞(SMMC-7721)、乳腺癌细胞(MCF-7)以及结肠癌细胞(SW480)表现出一定的抑制活性。

表 1 化合物对不同肿瘤细胞株的半数抑制浓度 [IC_{50} ($\mu mol \cdot L^{-1}$)]

Table 1 Half-inhibitory concentration [IC_{50} ($\mu mol \cdot L^{-1}$)] of different compounds to different tumor cell lines

化合物	白血病(HL-60)	肝癌(SMMC-7721)	肺癌(A-549)	乳腺癌(MCF-7)	结肠癌(SW480)
1	>40	>40	>40	>40	>40
2	>40	>40	>40	>40	>40
3	>40	>40	>40	>40	>40
4	>40	>40	>40	>40	>40
5	>40	>40	>40	>40	>40
6	>40	22.05	>40	21.23	20.44
7	>40	>40	>40	>40	>40
8	>40	>40	>40	>40	>40
9	>40	>40	>40	>40	>40
10	16.24	5.80	10.35	4.70	8.55
11	>40	22.77	>40	20.35	21.44
12	>40	>40	>40	>40	>40
顺铂	2.51	14.99	13.61	18.65	18.85
紫杉醇	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008

References

- [1] Nakanishi, T.; Ogaki, J.; Inada, A.; Murata, H.; Nishi, M. *J. Nat. Prod.* **1985**, *48*, 491.
- [2] Zhao, C.-C.; Shao, J.-H.; Cao, D.-D.; Zhang, Y.-W.; Li, X. *China J. China Mater. Med.* **2009**, *34*, 2761 (in Chinese). (赵春超, 邵建华, 曹丹丹, 张玉伟, 李铤, 中国中药杂志, **2009**, *34*, 2761.)
- [3] Lin, L. Z.; Harnly, J. M. *Food Chem.* **2010**, *120*, 319.
- [4] Desoky, S. K.; Hawas, U. W.; Sharaf, M. *Chem. Nat. Compd.* **2007**, *43*, 542.
- [5] Epifano, F.; Curini, M.; Genovese, S.; Blaskovich, M.; Hamilton, A.; Sebt, S. M. *Bioorg. Med. Chem.* **2007**, *17*, 2639.
- [6] Clark, M. K.; Scott, S. A.; Wojtkowiak, J.; Chirco, R.; Mathieu, P.; Reiners, J. J.; Mattingly, R. R.; Borch, R. F.; Gibbs, R. A. *J. Med. Chem.* **2007**, *50*, 3274.
- [7] Shan, Y.; Li, G.-Y.; Wang, Q.-A.; Li, Z.-H. *Chin. J. Org. Chem.* **2008**, *28*, 1024 (in Chinese). (单阳, 李高阳, 汪秋安, 李忠海, 有机化学, **2008**, *28*, 1024.)
- [8] Zhao, J.; Zhang, Z.-P.; Chen, H.-S.; Zhang, X.-Q.; Chen, X.-H. *Acta Pharm. Sin.* **1998**, *33*, 22 (in Chinese). (赵晶, 张致平, 陈鸿珊, 张兴权, 陈湘红, 药学报, **1998**, *33*, 22.)
- [9] Wang, Q.-A.; Wu, Z.; Liu, L.; Zou, L.-H.; Luo, M. *Chin. J. Org. Chem.* **2010**, *30*, 1682 (in Chinese). (汪秋安, 吴峥, 刘莉, 邹亮华, 罗茗, 有机化学, **2010**, *30*, 1682.)

(Zhao, C.)