二取代烯基硼酸的氯化反应研究

徐 衍^a 李战雄^a 李 慧^b 杨 军^{*,b}^(a) 苏州大学纺织与服装工程学院 苏州 215021)^(b) 中国科学院上海有机化学研究所 上海 200032)

摘要 由二取代烯基硼酸[4-substituted-1,2-oxaborol-2(5*H*)-ol]与 *N*-氯代丁二酰亚胺(NCS)在甲醇中常温反应 0.5 h, 可以中等到良好的收率构型保持地合成得到取代的(Z)-3-氯烯丙醇, 产物经 ¹H NMR, ¹³C NMR, FT-IR, MS 和 HRMS 鉴定. 通过该方法合成取代的(Z)-3-氯烯丙醇操作简便, 反应条件温和, 收率较高且反应构型能够得到保持.

关键词 合成; 烯基硼酸; 卤代反应; (Z)-2-取代-3-氯烯丙醇

Chlorination Reaction of Disubstituted Alkenylboronic Acids

Xu, Yan^a Li, Zhanxiong^a Li, Hui^b Yang, Jun^{*,b}^(a) College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University, Suzhou 215021)^(b) Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032)

Abstract The chlorination reaction of 4-substituted-1,2-oxaborol-2(5*H*)-ols with *N*-chlorosuccinimide (NCS) afford (Z)-2-substituted-3-chloroallyl alcohol in moderate to good yields under the optimized condition. The structures of the products were identified by ¹H NMR, ¹³C NMR, FT-IR and MS techniques. This method is simple, mild, high yield and the configuration is maintained.

Keywords synthesis; alkenylboronic acid; chlorination; (Z)-2-substituted-3-chloro allyl alcohol

(Z)-3-氯烯丙醇及其衍生物是有机合成中的一种有价值的中间体^[1,2], 其中(Z)-3-氯-2-芳基-烯丙醇结构既存在于天然藻类代谢产物之中^[3], 又有专利报道其可作为高分子材料的键合剂、单体^[4]. 文献报道中其合成方法多通过取代的 1,2,3-三氯丙烷加热脱除 HCl 得到, 但所得产物多为顺反混合物. 通过硼氢化反应可以高立体选择性地获得烯基硼化物, 文献中报道了利用简单烯基硼酸的卤代反应制备卤代烯烃的方法^[5,6]. 近期我们小组^[7]报道了立体专一地制备二取代烯基硼酸[4-substituted-1,2-oxaborol-2(5*H*)-ol]的合成方法, 所得烯基硼酸为顺式且有两个取代基团. 在此基础上我们开展了二取代烯基硼酸的氯化反应研究.

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

Varian Mercury-400 型核磁共振仪(CDCl₃ 为溶剂, TMS 为内标); Perkin-Elmer 983 型傅立叶红外光谱仪

(KBr 压片); HP5973N 型质谱仪; Finnigan MAT 8430 型质谱仪.

二取代烯基硼酸根据文献[7]方法合成; *N*-氯代丁二酰亚胺(NCS), 分析纯, 上海大和化学品有限公司; 三乙胺, 分析纯, 上海联试化工有限公司; 其余试剂均为市售分析纯, 使用前未经纯化处理. 柱层析硅胶用硅胶 300~400 目; 制备板层析用硅胶 GF 254, 烟台江友硅胶开发有限公司.

1.2 合成操作

反应管中加入 6.0 mL 甲醇, 0.80 mmol 烯基硼酸和 NCS (118 mg, 0.88 mmol), 用注射器逐渐滴加三乙胺 (123 mmL, 0.88 mmol), 滴加时间不少于 15 min, 继续搅拌 30 min. 旋去甲醇溶液, 加乙醚后硅藻土过滤, 以无水硫酸钠干燥, 快速柱层析[*V*(己烷): *V*(乙酸乙酯)=2:1]分离即可制得取代的(Z)-2-取代-3-氯-烯丙醇.

(Z)-3-氯-2-对甲基苯基丙基-2-烯-1-醇(**1a**): ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.31 (d, *J*=7.9 Hz, 2H), 7.18 (d, *J*=

* E-mail: yangj@mail.sioc.ac.cn

Received June 3, 2011; revised October 20, 2011; accepted November 24, 2011.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 91017006, 90917017, 90817008, 20802088).

国家自然科学基金(Nos. 91017006, 90917017, 90817008, 20802088)资助项目.

7.9 Hz, 2H), 6.35 (s, 1H), 4.71 (s, 2H), 2.37 (s, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 141.78, 138.23, 134.59, 129.50, 126.56, 117.41, 60.20, 21.17; IR (KBr) ν : 3377, 3076, 3027, 2922, 1734, 1706, 1613, 1559, 1512, 1457, 1384, 1252, 1023, 969, 804, 786, 718, 518, 496 cm^{-1} ; MS (EI) m/z (%): 182 (49.02, M^+), 115 (100.00), 147 (72.43), 55 (57.77), 91 (44.15), 129 (43.41), 116 (29.97), 117 (28.89); HRMS calcd for $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{OCl}$ 182.0498, found 182.0493.

(Z)-3-氯-2-间甲基苯基丙基-2-烯-1-醇(**1b**): ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 7.14~7.29 (m, 4H), 6.37 (s, 1H), 4.71 (s, 2H), 2.37 (s, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 142.05, 138.51, 137.46, 129.10, 128.71, 127.40, 123.76, 117.97, 60.30, 21.46; IR (KBr) ν : 3363, 3073, 3027, 2922, 1607, 1487, 1457, 1379, 1260, 1223, 1021, 971, 803, 774, 721, 699, 648, 594, 444 cm^{-1} ; MS (EI) m/z (%): 182 (50.01, M^+), 115 (100.00), 147 (78.12), 55 (49.90), 129 (45.32), 91 (43.66), 117 (32.61), 116 (25.62); HRMS calcd for $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{OCl}$ 182.0498, found 182.0502.

(Z)-3-氯-2-苯丙基-2-烯-1-醇(**1c**): ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 7.44~7.31 (m, 5H), 6.39 (s, 1H), 4.73 (s, 2H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 141.76, 137.41, 128.64, 128.14, 126.56, 118.05, 59.97; IR (KBr) ν : 3357, 3077, 2949, 2889, 1602, 1495, 1465, 1465, 1443, 1386, 1251, 1078, 1030, 970, 808, 754, 696 cm^{-1} ; MS (EI) m/z (%): 168 (36.13, M^+), 133 (100.00), 115 (63.76), 102 (62.88), 103 (55.79), 77 (49.26), 55 (47.35), 51 (33.72); HRMS calcd for $\text{C}_9\text{H}_9\text{OCl}$ 168.0342, found 168.0336.

(Z)-3-氯-2-(对甲氧基苯基)丙基-2-烯-1-醇(**1d**): ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 7.39~7.31 (m, 2H), 6.95~6.86 (m, 2H), 6.32 (s, 1H), 4.70 (s, 2H), 3.82 (s, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 159.73, 141.46, 129.89, 127.88, 116.74, 114.24, 60.26, 55.36; IR (KBr) ν : 3396, 3075, 3002, 2956, 2935, 2837, 1608, 1569, 1512, 1464, 1289, 1246, 1182, 969, 842, 814, 723, 621, 555 cm^{-1} ; MS (EI) m/z (%): 198 (100.00, M^+), 132 (63.41), 163 (58.30), 119 (54.10), 89 (53.45), 13 (51.60), 55 (43.33), 91 (41.70); HRMS calcd for $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_2\text{Cl}$ 198.0448, found 198.0451.

(Z)-2-氯亚甲基-4-甲基-1-戊醇(**1e**): ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 5.88 (s, 1H), 4.29 (d, $J=0.5$ Hz, 2H), 2.06 (dd, $J=7.2$, 0.9 Hz, 2H), 1.82 (tt, $J=13.7$, 6.7 Hz, 1H), 0.89 (d, $J=6.6$ Hz, 6H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 140.74, 114.66, 59.96, 42.37, 26.15, 22.30; IR (KBr) ν : 3334, 3071, 2957, 2928, 2870, 1708, 1631, 1598, 1466, 1385, 1367, 1310, 1228, 1167, 1103, 1026, 903, 792, 760,

646 cm^{-1} ; MS (EI) m/z (%): 148 (7.58, M^+), 43 (100.00), 41 (81.31), 88 (51.92), 57 (45.14), 95 (36.60), 113 (33.72), 53 (33.18); HRMS calcd for $\text{C}_7\text{H}_{13}\text{O}_2\text{Cl}$ 148.0655, found 148.0653.

(Z)-2-氯亚甲基-1-己醇(**1f**): ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 5.89 (s, 1H), 4.30 (s, 2H), 2.20 (t, $J=7.5$ Hz, 2H), 1.18~1.49 (m, 5H), 0.91 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 141.73, 114.06, 60.15, 32.80, 29.76, 22.32, 13.85; IR (KBr) ν : 3335, 3069, 2958, 2929, 2860, 1633, 1465, 1378, 1315, 1260, 1099, 1023, 980, 931, 890, 862, 800, 760; MS (EI) m/z (%): 148 (4.81, M^+), 91 (100.00), 113 (84.59), 57 (78.27), 95 (56.37), 41 (44.45), 93 (36.90), 55 (21.96), 69 (21.87); HRMS calcd for $\text{C}_7\text{H}_{13}\text{O}_2\text{Cl}$ 148.0655, found 148.0656.

2 结果与讨论

2.1 合成条件优化

我们首先选取 4-对甲基苯基-1,2-噁硼-2(5H)-2-醇作为模板反应原料, 通过 4-对甲基苯基-1,2-噁硼-2(5H)-2-醇与 NCS 开展氯化反应条件的优化(Eq. 1), 产物(Z)-3-氯-2-对甲基苯基丙基-2-烯-1-醇(**1a**)的收率列于表 1.

当采用氯仿作为反应的溶剂^[6]反应 15 min 后, 可通过 TLC 跟踪发现部分原料发生反应, 而延长反应时间到 24 h 后 TLC 跟踪发现仍有部分原料没有参与反应, 中止反应后测得 **1a** 的收率为 49% (Entry 1). 由于氯仿对有机硼化物溶解度较低, 我们尝试更换溶剂来提高反应得率. 当使用极性较小的甲苯为溶剂时, **1a** 的收率为 45% (Entry 2); 当溶剂选择极性较大的乙腈、甲醇和 HMPA 时, **1a** 的收率均有提高(Entries 3, 4, 5); 其中当溶剂为甲醇时, **1a** 的收率为 85% (Entry 4); 当溶剂为水时原料不溶, **1a** 的收率仅为 33% (Entry 6); 而当溶剂为甲醇和水的混合溶剂($V:V=1:1$)时, 底物的溶解度有所改善, **1a** 的收率为 79% (Entry 7).

反应温度对此反应收率有一定影响, 当反应温度从室温降为 0 $^{\circ}\text{C}$ 时, **1a** 的收率从 85% 降至 79% (Entry 8), 而当反应温度从室温升至回流温度时, **1a** 的收率为 78% (Entry 9).

在条件优化中 TLC 跟踪发现产物 **1a** 生成速度很快, 因此我们尝试缩短反应时间至 15 min, 所得 **1a** 收率为

表 1 二取代烯基硼酸氯化反应条件优化^a

Table 1 The optimized condition of the chlorination reaction

Entry	溶剂	温度	时间/h	NCS/equiv.	碱(equiv.)	收率 ^b /%
1	CHCl ₃	室温	2	1.1	三乙胺(1.1)	49
2	Toluene	室温	2	1.1	三乙胺(1.1)	45
3	CH ₃ CN	室温	2	1.1	三乙胺(1.1)	62
4	MeOH	室温	2	1.1	三乙胺(1.1)	85
5	HMPA	室温	2	1.1	三乙胺(1.1)	81
6	H ₂ O	室温	2	1.1	三乙胺(1.1)	33
7	H ₂ O/MeOH (<i>V</i> : <i>V</i> =1:1)	室温	2	1.1	三乙胺(1.1)	79
8	MeOH	0 °C	2	1.1	三乙胺(1.1)	79
9	MeOH	回流	2	1.1	三乙胺(1.1)	78
10	MeOH	室温	0.25	1.1	三乙胺(1.1)	84
11	MeOH	室温	0.5	1.1	三乙胺(1.1)	90
12	MeOH	室温	1	1.1	三乙胺(1.1)	88
13	MeOH	室温	0.5	2.0	三乙胺(1.1)	78
14	MeOH	室温	0.5	1.1	三乙胺(2.0)	76
15	MeOH	室温	0.5	1.1	二异丙胺(1.1)	64
16	MeOH	室温	0.5	1.1	碳酸钠(1.1)	68

^a 0.1 mmol 烯基硼酸, 2 mL 溶剂; ^b 核磁收率, 对硝基苯乙酮为内标.

84% (Entry 10), 而当反应时间为 0.5 h, **1a** 收率为 90% (Entry 11), 反应时间为 1 h, **1a** 的收率为 88% (Entry 12). 从上述结果可以看出当反应时间为 0.5 h, **1a** 的收率最高, 当进一步延长反应时间, **1a** 的收率反而下降.

我们又探讨了 NCS 和三乙胺的用量对此反应的影响. 当 NCS 的量增加为 2 equiv., 三乙胺的量为 1.1 equiv. 时, **1a** 的收率为 78% (Entry 13), 而当 NCS 的量为 1.1 equiv., 三乙胺的量增加到 2 equiv. 时, **1a** 的收率为 76% (Entry 14); 此外, 不同的碱对此反应也有影响. 当选用无机碱碳酸钠时, **1a** 的收率为 64% (Entry 15), 而选用二异丙胺作为碱时, **1a** 的收率为 68% (Entry 16).

综上, 我们确定的最优反应条件为: 在室温条件下, 在甲醇溶剂中与 1.1 equiv. 的 NCS 和 1.1 equiv. 的三乙胺反应 0.5 h.

2.2 不同取代基烯基氯化物的合成

我们随后对几种二取代的烯基硼酸在最优条件下的氯代反应进行了底物拓展(Eq. 2), 所得各分离收率结果见表 2.

从表中可以看出二取代烯基硼酸均可以与 NCS 顺利的发生氯代反应制备得到取代的(Z)-3-氯-烯丙醇. 当二取代烯基硼酸的 4 位是对甲基苯基取代基时, 反应以 83% 的分离收率得到目标产物(Entry 1); 间甲基苯基取

表 2 不同取代烯基氯化物合成^a

Table 2 The chlorination reaction of (Z)-2,2-disubstituted allylboronic acids

序号	烯基硼酸	产物	收率 ^c /%
1			83
2			73
3			76
4			66
5 ^b			51

续表

序号	烯基硼酸	产物	收率 ^c /%
6			23

^a 0.8 mmol 烯基硼酸, 0.88 mol NCS, 0.88 mol 三乙胺, 6 mL 甲醇, 室温; ^b 1.2 mmol 烯基硼酸, 1.32 mol NCS, 1.32 mol 三乙胺, 10 mL 甲醇, 室温; ^c 分离收率.

代的烯基硼酸收率为 73% (Entry 2); 苯基取代的烯基硼酸能以 76% 的收率得到目标产物(Entry 3); 当取代基是对甲氧基苯基时, 收率下降为 66% (Entry 4); 当取代基分别是异丁基和丁基时反应同样能够进行, 以 51% 和 23% 的收率分别得到(*Z*)-2-氯亚甲基-4-甲基-1-戊醇和(*Z*)-2-氯亚甲基-1-己醇(Entries 5, 6). 由上可知, 烷基取代的烯基硼酸氯化反应的收率均较芳基取代的烯基硼酸低, 而异丁基取代的烯基硼酸氯化反应的收率较丁基取代的烯基硼酸高, 具体原因有待进一步深入的研究.

通过化合物(*Z*)-2-氯亚甲基-1-己醇(**1f**)的二维 ¹H-¹H NOESY 谱来确定其构型(Scheme 1, 谱图见辅助材料图 S1), 化合物 **1f** 的 ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ : 5.89 (s, 1H), 4.30 (s, 2H), 2.20 (t, *J*=7.5 Hz, 2H), 1.18~1.49 (m, 5H), 0.91 (t, *J*=7.2 Hz, 3H); 其中化合物 **1f** 烯氢(H_a)化学位移为 δ 5.89, 丁基中烯丙位氢(H_b)化学位移为 δ 2.20, 羟甲基氢(H_c)化学位移为 δ 4.30. ¹H-¹H NOESY 谱分析表明 H_a 与 H_b 有相互作用, 因此化合物结构应为顺式, 通过与原料 4-丁基-1,2-噁硼-2(5*H*)-2-醇的构型相对比可知该反应中双键的构型得到保持.

Scheme 1

3 结论

二取代烯基硼酸与 NCS 的氯化反应可以制备取代的(*Z*)-3-氯烯丙醇. 通过溶剂、反应时间、温度、物料配比、碱对该反应的研究确定了最优反应条件为: 在室温条件下, 在甲醇溶剂中与 1.1 equiv. 的 NCS 和 1.1 equiv. 的三乙胺反应 0.5 h.

将上述最优反应条件应用于底物拓展后, 含有苯基、烷基取代基的烯基硼酸与 NCS 发生氯化反应后都能以中等到良好的收率得到相应取代的(*Z*)-3-氯烯丙醇, IR, ¹H NMR, ¹³C NMR 和 MS 分析表明各产物的结构正确.

本研究通过二取代烯基硼酸与 NCS 的反应建立了一个制备取代的(*Z*)-3-氯烯丙醇的新方法, 该方法具有操作简便, 反应条件温和, 产物构型保持且收率较高等优点.

辅助材料(Supporting Information) (*Z*)-2-氯乙烯基-1-己醇(**1f**)的 ¹H-¹H NOESY 谱图. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] Steinhagen, H.; Corey, E. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1999**, 38, 1928.
- [2] Williard, P. G.; Grab, L. A.; Laszlo, S. E. *J. Org. Chem.* **1983**, 48, 1123.
- [3] Marco, J. A.; Sanz-Cervera, J. F.; Mangano, E. *Phytochemistry* **1993**, 33, 875.
- [4] Kelth, C. W.; Lansing, Z., R. P. *US 3300533*, **1967** [*Chem. Abstr.* **1967**, 66, 104810].
- [5] Brown, H. C.; Subrahmanyam, C.; Hamaoka, T. *J. Org. Chem.* **1989**, 54, 6068.
- [6] Petasis, N. A.; Zavialov, I. A. *Tetrahedron Lett.* **1996**, 37, 567.
- [7] Fang, G.-H.; Yan, Z.-J.; Yang, J.; Deng, M.-Z. *Synthesis* **2006**, 1148.

(Zhao, X.; Lu, Z.)

辅助材料(Supporting Information)

二取代烯基硼酸的氯化反应研究

徐 衍^a 李战雄^a 李 慧^b 杨 军^{*,b}

(^a 苏州大学纺织与服装工程学院 苏州 215021)

(^b 中国科学院上海有机化学研究所 上海 200032)

化合物(Z)-2-氯乙烯基-1-己醇(**1f**) ¹H-¹H NOESY 谱图如下:

局部放大

全谱

图 S1 化合物(Z)-2-氯乙烯基-1-己醇(**1f**) ¹H-¹H NOESY 谱
Figure S1 ¹H-¹H NOESY of (Z)-2-(chloromethylene)hexan-1-ol