ZSM-5 催化一锅法合成 3-(5'-取代-2'-苯并噁唑基)-7-二乙基氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮

蒋绍亮^a 韩亮^{*,b}^(a) 浙江工业大学药学院 工业催化学科 杭州 310032)^(b) 浙江工业大学化学与材料学院 杭州 310032)

摘要 以绿色环保的固体酸 ZSM-5 分子筛为催化剂, 正丁醇为溶剂, 4-位取代邻氨基苯酚、4-二乙氨基水杨醛和氰乙酸乙酯三组分一锅法合成了香豆素类化合物 3-(5'-取代-2'-苯并噁唑基)-7-二乙基氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮。与液体酸催化相比, 该方法具有收率更高、环境友好等优点。

关键词 香豆素; 固体酸催化; 一锅法合成; ZSM-5 分子筛

One-Pot Synthesis of 3-(5'-Substituted-benzoxazol-2'-yl)-7-diethylamino-chromen-2-one Catalyzed with ZSM-5

Jiang, Shaoliang^a Han, Liang^{*,b}^(a) Industrial Catalysis Subjects, College of Pharmaceutical Science, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310032)^(b) College of Chemical Engineering and Materials Science, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310032)

Abstract 3-(5'-Substituted-benzoxazol-2'-yl)-7-diethylamino-chromen-2-ones were prepared by one-pot three-component reaction of 4-diethylaminosalicylaldehydes, ethyl cyanoacetate and *o*-aminophenols in refluxing *n*-butanol catalyzed by ZSM-5. This method has advantages of better yields and more environment-friendly process compared with that catalyzed by liquid catalysts.

Keywords coumarin; solid acid catalyst; one-pot synthesis; ZSM-5 zeolite

香豆素类化合物是一类广泛存在于自然界中的内酯类化合物, 具有抗肿瘤、降血压、抗菌、抗 HIV 病毒等多方面的活性, 在医药、香料、染料、分析、农业等领域应用广泛^[1]。香豆素类荧光色素作为一类典型的含分子内电荷迁移系的大 π 共轭结构化合物, 具有强烈的荧光、鲜艳的色泽、良好的应用性能而受到高度重视。在香豆素母环 3, 4 位引入吸电子基团, 在 7 位引入供电子基团, 可以使整个分子形成一个标准的电子“供体-受体”的共轭模式, 所得到的稠杂环香豆素衍生物也变成了黄色或红色且带有强烈荧光的功能染料^[2]。7-二乙氨基-3-杂环取代的香豆素衍生物, 如 3-(5'-取代-2'-苯并噁唑基)-7-二乙基氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮(Scheme 1)是这类荧光色素的典型代表(如 R=Cl 时为商品染料溶

剂黄 X16), 除可用于塑料着色外, 还可用于彩色荧光涂料、太阳能聚集器的彩色荧光树脂、感光材料、光敏材料、光盘记录材料等高新技术领域。

Scheme 1

香豆素类化合物可以通过 Perkin, Pechmann, Knoevenagel, Reformatsky 和 Wittig 反应等方法合成, 主要催化剂有 H_2SO_4 , H_3PO_4 , CF_3COOH , AlCl_3 等^[3]。3-(5'-取

* E-mail: hanliang814@163.com

Received January 29, 2012; revised March 5, 2012; published online April 11, 2012.

Project supported by the Natural Science Foundation of Zhejiang Province (No. Y12B030037) and the Foundation of Department of Education of Zhejiang Province (No. Y201018410).

浙江省自然科学基金(No. Y12B030037)和浙江省教育厅基金(No. Y201018410)资助项目。

代-2'-苯并噁唑基)-7-二乙氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮等3-杂环类香豆素可通过首先合成香豆素环再合成杂环,也可首先合成杂环再合成香豆素环^[4],最近 Ye 等^[5c]发现杂环取代香豆素衍生物可以在苯甲酸催化下通过取代邻氨基苯酚、4-二乙氨基水杨醛和氰乙酸乙酯三组分一锅法合成. 与传统的液体酸催化剂相比,固体酸催化剂具有产物分离简单、催化剂易回收循环利用、三废少等特点,采用环境友好的固体酸催化剂替代传统的液体酸是化学工业的重要趋势和研究的热点^[6]. 因此,我们对固体酸取代液体酸一锅法催化合成3-(5'-取代-2'-苯并噁唑基)-7-二乙氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮进行了研究,发现 ZSM-5 分子筛作为催化剂对此反应具有很好的催化效果(Eq. 1).

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

化合物熔点采用毛细管法测定,温度计未校正;¹H NMR 由 Bruker AVANCE III 500MHz 核磁共振仪(CDCl₃ 为溶剂)测定. 催化剂 ZSM-5 为市售,所用试剂为市售化学纯或分析纯.

1.2 3-(5'-取代-2'-苯并噁唑基)-7-二乙氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮的合成

将 0.218 g (2 mmol)邻氨基苯酚 **1**, 0.386 g (2 mmol) 4-二乙氨基水杨醛(**2**)和 0.226 g (2 mmol)氰乙酸乙酯(**3**)加入到 50 mL 三口烧瓶中,再加入 20 mL 丁醇和 0.3 g ZSM-5 分子筛. 搅拌下加热回流 7 h 后,趁热过滤,用 5 mL 热丁醇洗涤催化剂,再用 50 mL 水洗,溶液合并后放置冰箱中结晶 5 h. 得到的固体用 10 mL 体积比 1:1 的乙醇/0.1% NaOH 水溶液打浆洗涤后,10 mL 水洗,70 °C 真空干燥得到化合物 **4a**. 其它目标化合物用类似方法合成.

3-(2'-苯并噁唑基)-7-二乙氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮(**4a**): 黄色固体. m.p. 189~191 °C(文献值^[5c] 185~186 °C); ¹H NMR (CDCl₃, 500 MHz) δ : 8.60 (s, 1H, 4-H), 7.81~7.79 (m, 1H, 6'-H), 7.59~7.58 (m, 1H, 5'-H), 7.41 (d, $J=8.93$ Hz, 1H, 5-H), 7.35~7.31 (m, 2H, 4'-H, 7'-H),

6.64 (dd, $J=8.93, 2.38$ Hz, 1H, 6-H), 6.53 (d, $J=2.26$ Hz, 1H, 8-H), 3.45 [q, $J=7.15$ Hz, 4H, N(CH₂CH₃)₂], 1.24 [t, $J=7.10$ Hz, 6H, N(CH₂CH₃)₂]; MS m/z : 357.1 [M+Na]⁺. HR-ESI-MS calcd for C₂₀H₁₈N₂NaO₃: 357.1215, found 357.1199.

3-(5'-甲基-2'-苯并噁唑基)-7-二乙氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮(**4b**): 黄色固体. m.p. 205~208 °C(文献值^[5c] 204~205 °C); ¹H NMR (CDCl₃, 500 MHz) δ : 8.61 (s, 1H, 4-H), 7.58 (s, 1H, 4'-H), 7.45 (d, $J=8.17$ Hz, 1H, 7'-H), 7.41 (d, $J=8.85$ Hz, 1H, 5-H), 7.14 (d, $J=8.26$ Hz, 1H, 6'-H), 6.64 (d, $J=7.18$ Hz, 1H, 6-H), 6.54 (s, 1H, 8-H), 3.46 [q, $J=7.1$ Hz, 4H, N(CH₂CH₃)₂], 2.48 (s, 3H, ArCH₃), 1.25 [t, $J=7.0$ Hz, 6H, N(CH₂CH₃)₂]; MS m/z : 371.1 [M+Na]⁺. HR-ESI-MS calcd for C₂₁H₂₀N₂NaO₃: 371.1372, found 371.1359.

3-(5'-氯-2'-苯并噁唑基)-7-二乙氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮(**4c**): 黄色固体. m.p. 205~207 °C(文献值^[5c] 195~196 °C); ¹H NMR (CDCl₃, 500 MHz) δ : 8.58 (s, 1H, 4-H), 7.74 (s, 1H, 4'-H), 7.49 (d, $J=8.59$ Hz, 1H, 7'-H), 7.41 (d, $J=8.96$ Hz, 1H, 5-H), 7.28 (d, $J=8.65$ Hz, 1H, 6'-H), 6.64 (d, $J=8.92$ Hz, 1H, 6-H), 6.52 (s, 1H, 8-H), 3.46 [q, $J=7.14$ Hz, 4H, N(CH₂CH₃)₂], 1.25 [t, $J=7.13$ Hz, 6H, N(CH₂CH₃)₂]; MS m/z : 391.1 [M+Na]⁺. HR-ESI-MS calcd for C₂₀H₁₇ClN₂NaO₃: 391.0825, found 391.0817.

3-(5'-硝基-2'-苯并噁唑基)-7-二乙氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮(**4d**): 黄色固体. m.p. 263~265 °C(文献值^[5c] 264~265 °C); ¹H NMR (CDCl₃, 500 MHz) δ : 8.62~8.61 (m, 2H, 4'-H, 4-H), 8.27 (dd, $J=8.90, 2.19$ Hz, 1H, 6'-H), 7.66 (d, $J=8.89$ Hz, 1H, 7'-H), 7.43 (d, $J=8.93$ Hz, 1H, 5-H), 6.66 (d, $J=8.95$ Hz, 1H, 6-H), 6.51 (s, 1H, 8-H), 3.48 [q, $J=7.16$ Hz, 4H, N(CH₂CH₃)₂], 1.27 [t, $J=7.10$ Hz, 6H, N(CH₂CH₃)₂]; MS m/z : 402.1 [M+Na]⁺. HR-ESI-MS calcd for C₂₀H₁₇N₃NaO₅: 402.1066, found 402.1061.

3-(5'-磺酸氨基-2'-苯并噁唑基)-7-二乙氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮(**4e**): 黄色固体. m.p. >300 °C(文献值^[5c] 298~299 °C); ¹H NMR (CDCl₃, 500 MHz) δ : 8.83 (s, 1H, 4-H), 8.15 (s, 1H, 4'-H), 7.93 (d, $J=8.51$ Hz, 1H, 6'-H), 7.88 (d, $J=8.58$ Hz, 1H, 7'-H), 7.70 (d, $J=9.03$ Hz, 1H, 5-H), 7.48 (s, 2H, SO₂NH₂), 6.80 (dd, $J=9.04, 2.34$ Hz, 1H, 6-H), 6.59 (s, 1H, 8-H), 3.49 (q, $J=7.07$ Hz, 4H, N(CH₂CH₃)₂), 1.16 [t, $J=7.02$ Hz, 6H, N(CH₂CH₃)₂]; MS m/z : 436.1 [M+Na]⁺. HR-ESI-MS calcd for C₂₀H₁₉N₃NaO₅S: 436.0943, found 436.0942.

2 结果与讨论

ZSM-5 是一种典型的酸性分子筛, 随着硅铝比的增大酸性增强, 对很多酸催化的有机反应具有较好的催化效果. Ye 等^[5c]用苯甲酸做催化剂三组分一锅法合成了 **4**, 而 Nourmohammadian 等^[7]用微波合成大大缩短了反应的时间, 但仍存在使用大量的苯甲酸、连二磷酸等液体酸, 催化剂用量大, 且一次性损耗, 因而对环境不友好. 我们改用固体催化剂 ZSM-5 催化此反应, 得到了比液体酸更好的催化效果. 首先用 3-(2'-苯并噁唑基)-7-二乙氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮的合成为探针反应研究了 ZSM-5 硅铝比、催化剂用量、反应时间等因素对催化反应的影响. 与苯甲酸催化反应结果不同, 由于 ZSM-5 酸性较强, 在反应过程中有部分邻氨基苯酚、4-二乙氨基水杨醛在强酸催化下生成了副产物 2-(2'-羟基-4'-二乙氨基苯基)苯并咪唑(**5**) (Scheme 2). 不同硅铝比的 ZSM-5 催化合成 3-(2'-苯并噁唑基)-7-二乙氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮(**4a**)的结果如表 1.

表 1 ZSM-5 催化合成 3-(2'-苯并噁唑基)-7-二乙氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮(**4a**)^a

Table 1 Catalytic synthesis of 3-benzoxazol-2'-yl-7-diethylamino-chromen-2-one (**4a**) with ZSM-5

Entry	Si/Al ratio	Catalyst amount/g	Yield/%	
			4a	5
1	25	0.3	78.2	2.1
2	38	0.2	70.3	2.8
3	38	0.3	80.3	2.8
4	38	0.5	80.2	2.9
5	100	0.3	81.1	4.0
6	200	0.3	81.2	4.3

^a 2 mmol 邻氨基苯酚(**1**), 2 mmol 4-二乙氨基水杨醛(**2**), 2 mmol 氰乙酸乙酯(**3**); 20 mL 丁醇; 回流 7 h.

从表 1 中可以看出, ZSM-5 酸性随着硅铝比的增大而增强, **4a** 的收率略有增加. 由于副产物 **5** 的生成需要强酸催化, 所以其生成量随着 ZSM-5 硅铝比的增大增加较快, 但是即使是硅铝比 200 的 ZSM-5 催化下也比强液体酸催化时(5%~10%)生成量低^[8]. 硅铝比 38 的 ZSM-5 作为催化剂时, 反应具有相对较高的收率且副产物的生成量较低; 催化剂的用量 0.3 g 时具有最高的收率, 继续增加催化剂的用量收率不再提高. 产物中副产物 **5** 的含量只与催化剂的酸性强弱有关, 而与催化剂的用量关系不大.

另外, 在反应过程中有副产物亚胺 **6** 的生成 (Scheme 2), 此副产物很容易通过 1:1 乙醇/0.1% NaOH 水溶液洗涤除去. 硅铝比 38 的 ZSM-5 催化反应不同时

间后, 结晶得到的固体在 1:1 乙醇/0.1% NaOH 水溶液洗涤之前用液相色谱检测分析(表 2), 反应 3 h 后, 主要产物为邻氨基苯酚与氰乙酸乙酯反应生成的副产物亚胺 **6**, 在得到的产物中其含量达到 72.6%. 随着反应时间的增加, 副产物的量降低, 反应 7 h 后, 副产物 **6** 消失. 说明首先在 4-二乙氨基水杨醛和邻氨基苯酚之间发生了可逆反应生成副产物 **6**, 随着反应的进行, **6** 可逆分解成 4-二乙氨基水杨醛和邻氨基苯酚. 根据结果推测反应机理如 Scheme 2.

表 2 反应时间对 **4a** 的催化合成反应的影响^a

Table 2 Effect of reaction time on the catalytic synthesis of 3-benzoxazol-2'-yl-7-diethylamino-chromen-2-one (**4a**)

Entry	Reaction time/h	Yield/%	
		4a	亚胺 6
1	3	65.3	72.6
2	5	72.5	18.1
3	7	80.3	0
4	9	79.7	0

^a 2 mmol 邻氨基苯酚(**1**), 2 mmol 4-二乙氨基水杨醛(**2**), 2 mmol 氰乙酸乙酯(**3**); 20 mL 丁醇; 0.3 g ZSM-5

三个反应是竞争反应, 首先发生无催化剂常温下就可发生的可逆反应 I, 随着强弱酸均可催化的主反应 III 的进行, 产物 **6** 可逆分解, 最后反应得到目标产物 **4a**. 副反应 II 需要强酸催化, 随着催化剂酸性的增强此反应的产物 **5** 的生成量增大.

在优化的反应条件下, 对 0.3 g 硅铝比 38 的 ZSM-5 催化剂进行了回收套用实验(表 3), 在套用过程中补足回收过程中损耗的催化剂至 0.3 g, 套用两次未见催化剂活性下降; 并用不同的 4 位取代邻氨基苯酚进行了取代香豆素的一锅法合成, 在 0.3 g 硅铝比 38 的 ZSM-5 催化下所有目标产物都得到了比苯甲酸催化更高的收率(表 4). 从表中可以看出, 供电子基团对此反应有利, 而吸电子基团的存在降低了反应收率.

表 3 催化剂回收套用结果

Table 3 Results of catalyst recycle applied

Catalyst recycled time	Yield/%
0	80.3
1	80.5
2	80.1

总之, 我们用环境友好的固体酸 ZSM-5 取代苯甲酸一锅法催化合成了一系列 3-(5'-取代-2'-苯并噁唑基)-7-二乙氨基-2H-1-苯并吡喃-2-酮化合物, 得到了比文献上报道的用苯甲酸^[5c]和连二磷酸^[7]等液体酸催化更高的收率.

Scheme 2

表 4 ZSM-5 催化一锅法合成香豆素类衍生物

Table 4 One pot synthesis of coumarin derivatives catalyzed with ZSM-5

Entry	R	Product	Yield/% (Reference [5c] yield)
1	H	4a	80.3 (68)
2	CH ₃	4b	85.8 (78)
3	Cl	4c	78.6 (65)
4	NO ₂	4d	74.9 (64)
5	SO ₂ NH ₂	4e	73.8 (66)

References

- [1] (a) Donnelly, C.; Mays, J. R.; Brulison, J. J. *Org. Chem.* **2008**, *73*, 8901.
(b) Wu, L.-Q.; Yan, F.-L.; Yang, C.-G.; Yang, L.-M. *Chin. J. Org. Chem.* **2010**, *30*, 1764 (in Chinese).
(武利强, 闫福林, 杨春广, 杨利敏, 有机化学, **2010**, *30*, 1764.)
(c) Zhou, J.-F.; Gong, G.-X.; An, L.-T.; Sun, X.-J.; Zhu, F.-X. *Chin. J. Org. Chem.* **2009**, *29*, 1988 (in Chinese).
(周建峰, 贡桂霞, 安礼涛, 孙小军, 朱凤霞, 有机化学, **2009**, *29*, 1988.)
- [2] Griffiths, J.; Millar, V. *Dyes Pigm.* **1995**, *28*, 327.
- [3] (a) Johnson, J. R. *Org. React.* **1942**, *1*, 210.
(b) Jones, F.; Piermatti, O.; Pizzo, F. *Heterocycles* **1996**, *43*, 1257.
(c) Shirner, R. L. *Org. React.* **1942**, *1*, 1.
(d) Yavari, I.; Hekmat-Shoar, R.; Zonouzi, A. *Tetrahedron Lett.* **1998**, *39*, 2391.
(e) Cartwright, G. A.; McNab, H. J. *J. Chem. Res., Synop.* **1997**, 26.
- [4] (a) Zhang, Y.-Y.; Meng, X.-M. *Dyes Color* **2003**, *40*, 39 (in Chinese).
(张彦英, 孟宪梅, 染料与染色, **2003**, *40*, 39.)
(b) Guo, P. *Liaoning Chem. Ind.* **1998**, *27*, 76 (in Chinese).
(郭萍, 辽宁化工, **1998**, *27*, 76.)
(c) Lee, S.; Sivakumar, K.; Shin, W. S.; Xie, F.; Wang, Q. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2006**, *16*, 4596.
- [5] (a) Zhou, S.-H.; Jia, J.-H.; Gao, J.-R.; Han, L.; Li, Y.-J.; Sheng, W.-J. *Dyes Pigm.* **2010**, *86*, 123.
(b) Han, L.; Zhou, S.-H.; Jia, J.-H.; Sheng, W.-J.; Li, Y.-J.; Gao, J.-R. *Heterocycl. Commun.* **2009**, *15*, 245.
(c) Ye, F.-F.; Gao, J.-R.; Sheng, W.-J.; Jia, J.-H. *Dyes Pigm.* **2008**, *77*, 556.
- [6] Cheng, C.-C.; Cheng, H.-R.; Yu, J.-C.; Ye, Z.-Q.; Shi, J.-L. *Chin. J. Catal.* **2011**, *32*, 647 (in Chinese).
(陈崇城, 陈航榕, 俞建长, 叶争青, 施剑林, 催化学报, **2011**, *32*, 647.)
- [7] Nourmohammadian, F.; Gholami, M. D. *Synth. Commun.* **2010**, *40*, 901.
- [8] Kovalenko, S. N.; Vasil'ev, M. V.; Sorokina, I. V.; Chernykh, V. P.; Turov, A. V.; Rudnev, S. A. *Chem. Heterocycl. Compd.* **1998**, *34*, 1412.

(Qin, X.)