苯并啡啶类生物碱及其衍生物合成研究进展

程 辟^a 曾建国^{*,a,b}^a 湖南农业大学 作物种质资源创新与资源利用国家重点实验室培育基地 长沙 410128)^b 湖南农业大学 国家中药材生产(湖南)技术中心 长沙 410128)

摘要 苯并啡啶类生物碱是一类广泛分布于罂粟科和芸香科植物中的天然含氮化合物, 具有显著的抗肿瘤和广谱抗菌等多种生物活性。基于苯并啡啶类生物碱的生源合成途径的特殊性对天然苯并啡啶类生物碱结构类型进行了分类。综述了自 1999 年以来天然苯并啡啶类生物碱及其衍生物的合成方法研究进展, 对各个合成路线的特点进行了讨论。

关键词 苯并啡啶类生物碱; 衍生物; 合成; 研究进展

Progresses in Synthesis of Benzophenanthridine Alkaloids and Their Derivatives

Cheng, Pi^a Zeng, Jianguo^{*,a,b}^a Pre-State Key Laboratory for Germplasm Innovation and Utilization of Crop, Hunan Agricultural University, Changsha 410128)^b National Chinese Medicinal Herbs (Hunan) Technology Center, Hunan Agricultural University, Hunan Agricultural University, Changsha 410128)

Abstract Benzophenanthridine alkaloids are a small family of natural N-containing compounds that widely distribute in papaveraceous and rutaceous plants and display obvious antitumor and antibacterial activities. In this review, the structure types of natural benzophenanthridine alkaloids are classified based on the particularity of biosynthetic pathway of this group of alkaloids. The synthetic methods of benzophenanthridine alkaloids and related derivatives from 1999 are reviewed with discussion on particularity of each synthetic route.

Keywords benzophenanthridine alkaloids; derivatives; synthesis; progresses

苯并啡啶类生物碱(benzophenanthridine alkaloids)是植物生物碱类次生代谢产物中一个较小的结构类型, 常见于芸香科花椒属和罂粟科植物中^[1]。这类生物碱在 1839 年已有首次报道, 一个世纪后两面针碱(Nitidine)和花椒宁碱(Fagaronine)相继从芸香科植物中得到分离。由于苯并啡啶类生物碱具有广泛的生理活性, 人们逐渐认识到其重要的研究价值。从 20 世纪 90 年代开始, 全球多个研究小组针对天然苯并啡啶类生物碱的抗肿瘤、抗菌活性和作用机制进行了系统的研究。如血根碱(Sanguinarine)和白屈菜红碱(Chelerythrine)具有显著的广谱抗菌活性^[2]。在相关终端产品方面最具代表性的是德国 Phytobiotics 公司与湖南美可达生物资源有限公司合作开发的替代抗生素饲料添加剂 Sangrovit[®]^[3]以及美

国 Camas 公司开发的植物源杀菌剂 QWEL^[4]。其中 Sangrovit[®]远销全球 70 多个国家和地区, 主要成分为来自罂粟科植物博落回中具有抗菌活性的血根碱等季铵类本并啡啶生物碱^[5]。此外, 两面针碱和花椒宁碱被证实具有抗肿瘤和抗病毒活性, 能够作用于拓扑异构酶和病毒的逆转录酶^[6]。1997 年和 1999 年 Mackay^[6]和 Ishikawa^[7]分别就具有抗肿瘤活性的苯并啡啶类生物碱的全合成方法进行了文献综述。由于天然苯并啡啶类生物碱生源合成途径和化学结构的特殊性, 其母核结构取代基的多样性受到了限制。近十多年来, 苯并啡啶生物碱基本骨架的高效合成方法得到了很大的发展, 有效地促进了这类生物碱的生物活性和构效关系研究。本文将基于天然苯并啡啶类生物碱的结构亚型类别、生源合成

* E-mail: ginkgo@world-way.net

Received April 6, 2012; revised May 1, 2012; published online May 11, 2012.

Project supported by the International Scientific and Technological Cooperation Program of State Ministry of Science and Technology (No. 2010DFA32810). 科技部国际科技合作计划(No. 2010DFA32810)资助项目。

Scheme 2

基或羟基取代个数, 其中 O_4 -生物碱可以依据母核取代位置的不同进一步分为两面针碱型(nitidine type)和白屈菜红碱型两类(chelerythrine type).

虽然苯并啡啶类生物碱的生源合成途径已明确, 但目前没有相关文献报道 Protopine 6 位高效选择性羟基化反应, 直接将 Protopine 转化为二氢血根碱的化学合成仍然存在困难和挑战. 因此, 苯并啡啶类生物碱衍生物的合成通常采用常规化学原料通过多步合成来实现. 在大部分合成路线中, B 环和 C 环的环合反应是构建苯并啡啶生物碱四环体系的最后步骤. 本文将依据构建苯并啡啶基本骨架环合反应的成键位置, 将文献报道的合成路线进行综述和分类(Scheme 3).

1 B 环环合策略

1.1 C_6-C_{6a} 成键环合

1.1.1 Bischler-Napieralski 环合反应

Bischler-Napieralski (BN)反应是合成异喹啉类生物碱的常用合成方法之一^[9], 苯并啡啶类生物碱基本骨架

Scheme 3

中 A-B 环成异喹啉结构单元. BN 反应构建苯并啡啶基本骨架一般以 1-四氢萘酮(**1**)为关键合成前体^[10], 在 Lewis 酸 TiCl_4 的催化下 1-四氢萘酮(**1**)与甲胺反应得到中间体烯胺, 随后用 NaBH_4 还原得到仲胺 **2**. 中间体 **2** 氮原子甲酰化后, DDQ 氧化 C 环芳构化制得 BN 反应前体 **4**. 三氯氧磷催化中间体 **4** 发生 BN 反应, C_6-C_{6a} 成键环合后得到季铵类苯并啡啶类生物碱基本骨架 **5** (Scheme 4). Satio 等^[11]的研究表明固体光气能够替代三氯氧磷有效催化 BN 反应顺利进行, 收率 78%~91%.

Scheme 4

以 1-四氢萘酮(6)为起始原料在合成 B/C 环氢化苯并吡啶类生物碱方面得到了较好的应用. Yoshida 等^[12]以 DMF 为溶剂, 铁粉/TMSCl/甲酸/醋酸酐体系催化中间 7 还原氨基化转化为相应的甲酰烯胺中间体 8, 其氮甲基化产物 9 BN 环化后, 用硼氢化钠还原 5,6 位双键生成烯胺中间体 10. 在强酸性条件下, NaBH₃CN 还原中间体 10 得到目标产物 11 (Scheme 5). 上述还原过程具备立体专一性, 烯胺中间体 10 在酸性条件下转化为季铵类 Shiff 碱, 氢负试剂从立体位阻较小的一侧亲核加成 Shiff 碱中间体得到 B/C 环顺式产物.

2000 年 Ishikawa 等^[13]在系统地研究苯并吡啶母核

Reagents and conditions: (a) NH₂OH·HCl, K₂CO₃, EtOH, 90%; (b) Fe, TMSCl, HCO₂H·Ac₂O, DMF, 87%; (c) Me₂SO₄, PhCH₂N(Et)₃Cl, 20% NaOH aq., 100%; (d) POCl₃ then NaBH₄, 75%; (e) NaBH₃CN, MeOH, conc. HCl, 70%

Scheme 5

A 环上烷氧基或羟基取代位置对三氯氧磷催化 BN 反应环合产物产率的影响时发现了非常有趣的结果. 如 Scheme 6 所示, 当 A 环 10 位有甲氧基或羟基取代时, 中间体 12 苯环 10a 位碳原子作为亲核体加成 C=N 双键, 随后发生分子内重排, 导致 A 环扩环产物的产生, 形成新颖的吡咯类衍生物 13, 14 (Scheme 6).

Scheme 6

BN 反应原料 *N*-酰基芳香胺中间体 **12** 一般以 1-四氢萘酮为原料制备. Treus 等^[14]报道了一种全新的制备该中间体的方法用于合成苯并啡啉类生物碱. 该方法以异喹啉生物碱 **15** 为原料, 在 LDA 的作用下, 中间体 **15** 发生 C—N 键断裂生成苯乙烯中间体 **16**. Pd-C 催化中间体 **16** 环合制得 *N*-酰基芳香胺 **17**, 随后在三氯化磷和五氧化磷的作用环合生成苯并啡啉类化合物 **18** (Scheme 7).

Reagents and conditions: (a) LDA, THF, 0 °C, 30~60 min, 100%; (b) (i) 10% Pd-C, *o*-xylene, reflux, 3~6 d, 35%~50%; (ii) NaH, THF, r.t., 30 min, MeI, r.t., 40 min~1 h, 74%~75%; (c) P₂O₅, POCl₃, reflux, 1.5~2.5 h, 58%~66%

Scheme 7

1.1.2 Pictet-Spengler (PS) 环合反应

PS 反应与 BN 反应类似, 均为 Manich 反应的变异类型. Vicario 等^[15]在 -78 °C 下, 用 Lewis 酸 TiCl₄ 催化 1-四氢萘酮(**19**)与苄胺反应生成 Schiff 碱, 随后在 -20 °C 下用 NaBH₄ 立体专一性还原 **19** 得到中间体 **20**. 酸性条件下 **20** 与甲醛发生 PS 反应 C₆—C_{6a} 成键环合生成 B/C 环顺式目标产物 **21** (Scheme 8).

Reagents and conditions: (a) (i) TiCl₄, BnNH₂, Et₃N, THF, -78 °C, 70%~82%; (ii) NaBH₄, MeOH, -20 °C. (b) HCHO, 1 mol/L HCl, 60 °C, 86%~94%

Scheme 8

1.2 N₅—C₆ 成键环合

N₅—C₆ 成键环合一般采用分子内 *N*-酰基化反应或利用氮原子的亲核性质进行分子内 Mitsunobu 反应或亲核取代反应形成 C—N 键, 该方法在构建苯并啡啉类生物碱 B 环体系中并不多见. 2003 年 Watanabe 等^[16]报道的一条新颖的合成路线中采用该环合策略. 该小组以苯乙酰氯 **22** 为起始原料, 与 2-甲基-7-甲氧基苯并咪唑发生傅克酰基化反应, 再与溴乙酸乙酯发生 Reformatsky 反应得到叔醇中间体 **23**. Et₃SiH 还原中间体 **23** 后得到的产物在三氯氧磷存在下发生分子内傅克反应生成 3-芳基取代-1-四氢萘酮中间体 **24**. DDQ 氧化中间体 **24** 芳构化后, 苄基保护酚羟基氧制得关键中间体 **25**. 采用硫酸二甲酯对中间体 **25** 的氧化开环产物中的羧基和酚羟基甲基化, 随后脱去苄基保护得到中间体 **26**. 用亚硝基异戊酯处理中间体 **26** 制得脲醚中间体 **27**. Pd/C 催化脲醚中间体 **27** 还原氨基化, N₅—C₆ 成酰胺键得到苯并啡啉生物碱 **28** (Scheme 9). 该合成路线的最大特点是 2-甲基苯并咪唑母核氧化官能团化和脲醚还原氨基化, 同时可以在单独在苯并啡啉母核 12 位引入官能团酚羟基合成 O₅-生物碱.

Mitsunobu 反应是羟基酯化反应的常用方法, 在大环内酯类天然产物的合成中应用十分广泛^[17]. Yoshida 等^[18]在全合成天然苯并啡啉类生物碱 Homochelidonine (**33**)的过程中采用了该反应实现 N₅—C₆ 成键环合. 在该合成路线中, 起始原料为具有 1-四氢萘酮结构特征的天然内酯类化合物 arnottin II (**29**). OsO₄ 氧化 arnottin II 双键得到邻二醇, 随后保护羟基, 经羰基肟化、还原氨基化等步骤得到关键中间体 **30**, 该中间体皂化后还原羧酸羰基再与三氟甲基乙酸酐反应得到 Mitsunobu 反应原料 **31**. 采用 DEAD/三苯基膦体系催化 **31** 完成分子内的 Mitsunobu 反应 N₅—C₆ 成键环得到 B 环环合产物 **32** (Scheme 10).

环合反应底物的制备在 N₅—C₆ 成键合成苯并啡啉过程中非常关键. 2008 年 Fleming 等^[19]利用钌催化氮苄基保护的氮杂双环烯烃 **34** 与取代苯基硼酸中间体 **35** 偶联反应合成得到中间体 **36**, 脱去甲氧基甲醚保护基后得到中间体 **37**. 中间体 **37** 在 Mitsunobu 反应条件下无法完成 N₅—C₆ 成键反应, 但在 CBr₄ 和三苯基膦存在的 THF 溶液中 0 °C 反应 1 h 后可制得苄溴中间体, 之后在碱性条件下完成分子内的亲核取代反应形成 N₅—C₆ 单键得到 B 环环合产物 **38** (Scheme 11). 该中间体可用于全合成天然苯并啡啉类生物碱 homochelidonine (**33**)的合成前体. 反应机理如 Scheme 12 所示, 钌催化合成中间体 **36** 的过程开始于硼酸芳香基团过度金属化. 芳基硼酸 **35** 在手型配体(S)-tol-binap 作用下与硼酸化生成芳

Reagents and conditions: (a) SnCl_4 , CH_2Cl_2 , -15°C , 2.5 h, 64%; (b) $\text{BrCH}_2\text{CO}_2\text{Et}$, Zn, I_2 , THF, reflux, 0.5 h, 93%; (c) Et_3SiH , TFA, CH_2Cl_2 , 0°C , 1.5 h, 91%; (d) i) KOH aq., EtOH, reflux, 1 h, 100%; ii) POCl_3 , K_2CO_3 , CH_3CN , 55°C , 3 h, 81%; (e) i) $\text{TsOH}\cdot\text{H}_2\text{O}$, isopropenyl acetate, 95°C , 13 h, ii) DDQ, r.t., 1 h, iii) NaOH aq., EtOH, 85°C , 1 h, 89%; (f) PhCH_2Br , K_2CO_3 , DMF, 50°C , 2 h, 91%; (g) i) OsO_4 , pyridine, 30°C , 3 h, ii) Na_2SO_3 , EtOH, 75°C , 7 h, 92%; (h) i) HIO_4 , H_2O -dioxane, r.t., 24 h, ii) NaOH aq., r.t., 4 h, 100%; (i) i) Me_2SO_4 , $\text{BnN}^+\text{Bu}_3\text{Cl}^-$, NaOH aq., benzene, r.t., 3 h, 87%, ii) H_2 , Pd/C, AcOH, r.t., 3.5 h, 82%; (j) i) $i\text{-C}_5\text{H}_{11}\text{ONO}$, K_2CO_3 , DMF, r.t., 3.5 h, ii) Me_2SO_4 , r.t., 1.5 h, 86%; (k) H_2 , Pd/C, AcOH, r.t., 3.5 h, 95%

Scheme 9

Reagents and conditions: (a) (i) OsO_4 , pyridine, r.t., 1 h, then NaHSO_3 aq., r.t., 20 h, 70% in two steps. (ii) $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OCH}_3)_2$, $p\text{-TsOH}\cdot\text{H}_2\text{O}$, DMF, 90°C , 1 h, 98%. (iii) $\text{NH}_2\text{OH}\cdot\text{HCl}$, pyridine, 100°C , 6 h, 83%; (b) TiCl_3 aq., NaBH_3CN , NH_4OAc , dioxane, r.t., 5 h, 96%; (c) LiAlH_4 , THF, r.t., 1 h, 95%; (d) $(\text{CF}_3\text{CO})_2\text{O}$, pyridine, 0°C , 2 h; then NaHCO_3 aq., MeOH, r.t., 16 h, 75% in two steps; (e) DEAD, Ph_3P , THF, r.t., 3 h, 83%

Scheme 10

Reagents and conditions: (a) $[\text{Pd}(\text{MeCN})_2\text{Cl}_2]$ (5 mol%), (*S*)-tol-binap (5.5 mol%), Cs_2CO_3 , MeOH, r.t., 6 h, 80%; (b) HCl, *i*-PrOH/THF, r.t., 8 h, 75%; (c) CBr_4 , PPh_3 , CH_2Cl_2 , 80 °C, 1 h, then NaH, DMF, 0 °C, 3 h, 90% in two steps

Scheme 11

Scheme 12

香 Pd^{II} 物种 39, 39 从 *N*-杂双环烯炔(34)立体位阻较小的一侧与中间体 34 结合生成正离子复合物 40. 该离子复合物发生顺式碳钯化得到中间体 41, 接着进行 β -杂原子消除和解离得到开环化合物 36 和活性 Pd^{II} 进入下一催化循环^[20].

1.3 $\text{N}_5\text{—C}_{5a}$ 成键环合

$\text{N}_5\text{—C}_{5a}$ 成键策略在苯并吡啶类生物碱母核合成中较为少见. 2011 年 Ishihara 等^[21]利用微波辅助电环化反应 $\text{N}_5\text{—C}_{5a}$ 成键合成苯并吡啶生物碱 A-D 环基本骨架. 在该合成路线中, 起源原料为邻溴苯甲醛(42)和邻二醇硼酸酯(43). 42 和 43 在钯催化下发生 Suzuki-Miyaura 偶联反应得到另一苯甲醛中间体 44. 中间体 44 与 *O*-甲基羟胺反应得到肟醚 45. 在 180 °C 微波辐射条件下, 中间体 45 发生分子内电环化反应得到 11,12-二氢苯并吡啶

(46), 随后用 Pd-C 催化中间体 46 脱氢芳构化得到 A-D 环全芳香化目标产物 47 (Scheme 13). 上述合成路线的缺点在于邻二醇硼酸酯原料 43 合成路线步骤较多, 影响了总收率^[22].

$\text{N}_5\text{—C}_{5a}$ 成键过程也可利用一些特殊苯并吡啶类化合物 C 环 5a 位碳原子缺电子特性和 5 位氮原子的亲核性质进行分子内的芳香亲核取代反应来完成 B 环合过程. Lysén 等^[23]以 1-氟萘(48)为原料, 在 2,2,6,6-四甲基哌啶锂(LiTMP)的作用下发生选择性邻位芳香碳去质子化, 高亲核性碳负离子与异丙基硼酸酯反应得到对应的 1-氟取代硼酸酯中间体 49. 该中间体与邻碘苯腈(50)在钯催化下经 Suzuki-Miyaura 偶联制得 1-氟代-2-(2'-氰基苯基)萘(51). 苯环上氰基被正丁基锂加成后生成的氮负离子亲核取代萘环 1 位氟原子, $\text{N}_5\text{—C}_{5a}$ 成键即可得到全

Reagents and conditions: (a) $\text{PdCl}_2(\text{PPh}_3)_2$, K_2CO_3 , MeOH, DMF, 80 °C, 0.5~1 h, 97%; (b) $\text{MeONH}_2\cdot\text{HCl}$, AcONa, EtOH, 80 °C, 1 h, 98%; (c) microwave, 1,2-dichlorobenzene, 180 °C, 94%; (d) 10% Pd-C, 1,2-dichlorobenzene, 180 °C, 74%

Scheme 13

芳香化苯并啡啉母核 **52** (Scheme 14). 上述合成路线最大的优点是合成步骤大幅缩短, 而且每步转化率都很高, 极大地提高了苯并啡啉母核合成效率. 但是该方法必须采用缺电子的 1-氟萘为原料, 当萘环上有供电子基团取代时, 很难实现 $\text{N}_5\text{—C}_{5a}$ 成键.

1.4 $\text{C}_{10a}\text{—C}_{11a}$ 成键环合

苯并啡啉基本骨架 B 环 $\text{C}_{10a}\text{—C}_{11a}$ 成键环合反应是近年来这类生物碱合成方法学研究的热点, 主要成键反应类型为分子内芳基-芳基偶联反应, 其中钯催化芳基偶联反应是最近研究较多的一个反应类型. 该方法具有合成步骤少、偶联反应转化率高等优点, 在合成苯并啡啉基本骨架中的应用较为广泛^[24~27]. 钯催化偶联成

路线中一般采用邻取代苯甲酸(**53**)和取代 1-萘胺衍生物 **55** 为原料. 以取代苯甲酸 **53** 为原料制备得到对应的酰氯中间体 **54**, 该中间体与 **55** 反应得到酰胺 **56**. 醋酸钯作为催化剂可顺利催化酰胺 **56** 分子内的芳基偶联反应, $\text{C}_{10a}\text{—C}_{11a}$ 成键环合生成 6-*O*-苯并啡啉(**57**). LiAlH_4 还原 **57** 酰胺羰基生成的 6-羟基苯并啡啉在酸性条件下脱水得到季铵类苯并啡啉生物碱 **58** (Scheme 15).

Harayama 等^[28]在合成白屈菜红碱的过程中发现, PPh_3 , $\text{P}(o\text{-Tol})_3$, Bu_3P , DPPP 等不同膦配体和 Ag_2CO_3 和响到分子内偶联反应的区域选择性. 当采用 $\text{PPh}_3/\text{Ag}_2\text{CO}_3$, Na_2CO_3 等缚酸剂组合均可得催化反应发生得到较高产率的偶联产物, 但是膦配体和缚酸剂的选择可以影响到

Scheme 14

Scheme 15

分子内偶联反应的区域选择性. 当采用 $P(o\text{-Tol})_3/\text{Na}_2\text{CO}_3$ 或 $\text{PPh}_3/\text{Na}_2\text{CO}_3$ 体系时, 将会有 16%~20%的 $\text{C}_{10a}\text{—C}_4$ 偶联产物 **61** 的产生; 而采用 $P(o\text{-Tol})_3/\text{Ag}_2\text{CO}_3$ 体系时, 仅有 1%的 $\text{C}_{10a}\text{—C}_4$ 偶联产物生成, $\text{C}_{10a}\text{—C}_{11a}$ 偶联目标产物 **60** 的收率可达 96% (Eq. 1).

分子内自由基偶联反应是 B 环 $\text{C}_{10a}\text{—C}_{11a}$ 成键环合的另一有效途径, 反应所需原料与钯催化偶联反应类似^[29]. Nakanishi 等^[30]在合成具有抗癌活性的季铵类苯并吡啶生物碱 NK109 的过程中, 以邻溴代苯甲醛(**62**)和

取代 1-萘胺(**63**)为原料反应制备得到苯胺衍生物 **64**. 在自由基引发剂 $n\text{-Oct}_3\text{SnH}$ 和 AMBN 作用下 **64** 中 $\text{C}_{10a}\text{—C}_{11a}$ 偶联得到 5,6 二氢苯并吡啶, 随后经 MnO_2 氧化得到中间体 **65**, 中间体 **65** 经 N -甲基化、脱去苄基保护后得到 NK109 (**66**) (Scheme 16). 上述合成路线与钯催化偶联反应相比, 虽然目标产物收率降低, 但是反应底物 (**64**)中游离的氨基对自由基偶联反应没有影响, 无需对 5 位氮原子进行繁琐的保护-脱保护处理. Nakanishi 等^[31]还发现在 $-78\text{ }^\circ\text{C}$ 下用强碱 LDA 处理中间体 **64** 后快速升温同样可以得到较低收率的 $\text{C}_{10a}\text{—C}_{11a}$ 偶联产物, 并有大量未知副产物生成. 该反应的机理可能与形成活性苯炔中间体相关.

2007 年 Budén 等^[32]发现光照可以代替 $n\text{-Oct}_3\text{SnH}/\text{AMBN}$ 体系引发剂自由基偶联反应. 在以汞灯作为激发光源的条件下, N -(2-氯苯基)-1-萘胺(**67**)在液氨中用 $t\text{-BuOK}$ 处理反应 3 h 可以实现 $\text{C}_{10a}\text{—C}_{11a}$ 偶联得到全芳香化苯并吡啶基本骨架 **68** (Scheme 17). 该反应为典型自由基亲核取代($\text{S}_{\text{RN}}1$)机理, 目标产物收率可以达到 91%. 但是反应底物 **67** 中萘环和苯环上其它取代基的存在对偶联反应的转化率是否存在影响, 目前还没有相关文献报道.

Reagents and conditions: (a) toluene, reflux, 1.5 h; then Me_2NHBH_3 , AcOH, toluene, $20\text{ }^\circ\text{C}$, 1 h, 75% in two steps; (b) $n\text{-Oct}_3\text{SnH}$, AMBN, toluene, $110\text{ }^\circ\text{C}$, 70 min; then MnO_2 , toluene, r.t., 1 h, 57% in two steps

Scheme 16

Scheme 17

在大多数 $C_{10a}-C_{11a}$ 偶联反应成键环合策略中, 苯甲醛或苯甲酸作为反应原料, 其羰基邻位芳香碳必须进行卤代官能团化, 这样增加了合成步骤影响目标产物的最终得率. Moreno 等^[33]报道了一种利用高价碘试剂 PIFA (69)引发的自由基偶联反应. 在二氯甲烷中, 底物酰胺 70 在 PIFA 作用下, 反应 14 h 后 $C_{10a}-C_{11a}$ 成键生成 B 环环合产物 71 (Eq. 2), 得率为 40%. 该自由基反应无需采用邻位卤代苯甲酸作为原料, 有效地缩短了合成路线.

1.5 其它 B 环环合方法

1.5.1 钯催化两组份串联反应 B 环环合

$C_{10a}-C_{11a}$ 钯催化偶联 B 环环合方法一般采用分子内芳基-芳基偶联策略, 在合成苯并啡啉生物碱基本骨架研究方面发挥了重要的作用. 在此基础上, 科学家们对钯催化 B 环成环方法进行了更深入的研究, 其中以钯催化两组份串联反应构建苯并啡啉基本骨架 B 环是最近报道的较多的一个反应类型. 2006 年 Konno 等^[34]以邻溴苯甲酸叔丁酯(72)和四氢萘酮(73)为原料, 在钯催化下

发生两组份偶联反应生成内酯 74, 该化合物可以作为天然内酯类化合物 *arnottin II* (29)的合成前体. 2011 年 Ito 等^[35]以 74 为原料, 用甲胺处理后得到内酰胺衍生物 75. 中间体 75 经氧化芳构化、羰基还原、脱水后可以得到白屈菜红碱(*Chelerythrine*) (Scheme 18).

2011 年, Lv 等^[36]以 *N*-杂双环烯烃(76)和邻碘苯甲酸甲酯(77)为原料, 钯催化两组分串联反应直接构建苯并啡啉基本骨架, 该方法可用于血根碱的合成并且总收率较高. 上述合成路线与 2008 年 Fleming 等报道的 *homochelidonine* (33)合成路线存在类似之处, 主要改进在于以邻碘苯甲酸甲酯(77)为原料与氮杂双环烯烃(76)反应(Scheme 19). 串联反应可以一步实现 N_5-C_6 和 $C_{10a}-C_{11a}$ 成键构建 B 环, 但该反应过程是否具备立体专一性, 目前还未见报道. 镍催化剂 $NiBr_2(dppe)$ 可以替代钯催化类似的串联反应, 但是当 A 或 D 环上有供电子烷氧基或羟基存在时, $NiBr_2(dppe)$ 不能催化反应进行^[37,38].

2011 年 Blanchot 等^[39]发展了一类新颖的钯催化两组份串联芳基化/氮-芳基化方法用于合成苯并啡啉基本骨架. 该方法以 1-萘酚三氟甲基磺酸酯(79)和 *N*-硅基醛亚胺(80)为反应原料, 在 $Pd(OAc)_2/PPh_3/Cs_2CO_3/norbornene$ 体系催化下 N_5-C_{5a} 和 $C_{10a}-C_{11a}$ 成键得到苯并啡啉生物碱 81, 得率达到 88% (Eq. 3). Candito 等^[40]对钯催化机理进行了探讨, 零价钯催化剂和 1-萘酚三氟甲基磺酸酯(79)在缚酸剂 Cs_2CO_2 作用下与 *norbornene* 发生碳钯化产生芳基钯中间体 82, 接着与 *N*-硅基醛亚胺反应得到 $Pd(IV)$ 中间体 83, 随后经化学选择性还原消除和去碳钯化后得到中间体 84. 中间体 84 转化为 85 后经还原消除得到目标产物 81. 上述合成路线所用原料易得, 若以 *N*-硅基酮亚胺代替 80, 在相同条件下反应仍然能够顺利进行, 并能够在目标产物 81 的 6 位直接引入烷基取代基, 极大的提高了苯并啡啉类衍生物的合成效率 (Scheme 20).

Scheme 18

Scheme 19

2 C 环环合策略

2.1 分子内烯酰胺-醛环化反应 C₁₁-C_{11a} 成键环合

Cho 课题组^[41]发展了一类新颖的分子内烯酰胺-醛环化反应用于构建苯并吡啶类生物碱基本骨架。在这一合成路线中, 邻甲基苯甲酰胺(**86**)在正丁基锂的作用下甲基去质子化得到碳负离子。该碳负离子亲核加成苯甲酰(**87**)中的羰基, 生成的氮负离子活性中间体与酰胺羰基反应得到异喹啉中间体 **88**。中间体 **88** 中酰胺 *N*-甲基化后脱去 MOM 保护基, 随后氧化得到苯甲醛中间体 **90**。该中间体进一步与磷叶立德试剂反应后制得烯醇甲

Scheme 20

醚中间体 **91**. 在酸性条件下 **91** 发生分子内烯酰胺-醛环化反应, C₁₁—C_{11a} 成键得到 6-*O*-苯并啡啉(**93**), 目标产物的得率在 80% 以上(Scheme 21)^[42,43]. 该环化反应机理和 Manich 反应类似, 同时与苯并啡啉生源合成途径中的自发反应过程存在相似之处. 环化反应的底物烯醇甲醚中间体 **91** 可以直接用苯乙醇(**94**)代替^[44,45]. 在沙瑞特试剂 PCC 和醋酸钠的作用下中间体 **94** 转化为目标产物 **93**, 得率 60% 左右(Eq. 4). 若将苯乙醇中间体 **94** 转化为苯乙酸乙酯后, 环合反应可在苯并啡啉母核 11 位引入羟基得到 *O*₅-生物碱^[6,7].

2.2 分子内傅克反应 C₁₂—C_{12a} 成键环合

分子内傅克反应是 C 环环合构建苯并啡啉类生物碱基本骨架的常用方法之一^[46]. 其中傅克酰基化反应能够在苯并啡啉母核 12 位单独引入羟基得到 *O*₅-生物碱, 在合成非天然苯并啡啉生物碱衍生物中具有独特的优势. Lynch 等^[47,48]在合成具有人 DNA 拓扑异构酶 I 抑制活性和抗病毒活性的苯并啡啉生物碱过程中, 采用了该环合策略. 以苯甲胺(**95**)和苯甲醛(**96**)为原料, 反应脱水得到相应的 Schiff 碱, 随后被氰基负离子加成双键得到中间体 **97**. 该中间体在 HF 作用下发生分子内傅克反应、水解得到 3-芳基-4-羰基异喹啉中间体 **99**. 在金属 Zn 的作用下中间体 **99** 与溴乙酸乙酯发生 Reformatski 反应得到 β -羟基羧酸酯(**100**), 随后在酸性条件下经傅克酰基化反应 C₁₂—C_{12a} 成键环合制得 *O*₅-生物碱 12-羟基苯并啡啉(**101**). 此外, 也可使用乙烯基格式试剂加成中间体 **99** 制备得到中间体 **102**, 然后在酸性条件下发生傅克烷基化反应生成 12 位无取代基目标产物 **103**

(Scheme 22)^[49]. 该合成路线中起始原料均可由廉价易得的苯甲醛衍生物制备得到, 因此分子内傅克反应 C₁₂—C_{12a} 成键环合在苯并啡啉生物碱合成中得到了广泛的应用.

2006 年 Luo 等^[50]在制备 *N*-去甲基两面针碱 **110** 过程中利用分子内傅克反应实现 C₁₂—C_{12a} 成键环合, 该合成路线新颖之处在于环合反应底物芳基乙醛中间体 **109** 的制备. Luo 等以邻溴代苯甲醛(**104**)为原料与叔丁胺反应得到 Schiff 碱中间体 **105**, 以溴苯衍生物 **106** 为原料与 3-炔丁醇偶联反应生成中间体 **107**. 中间体 **105** 和 **107** 在镍催化下环合得到 3-芳基-4-羟乙基异喹啉中间体 **108**. 中间体 **108** 经 Swern 氧化后生成的芳基乙醛中间体 **109**, 随后在酸性条件下 C₁₂—C_{12a} 成键环合制得目标产物 **110** (Scheme 23). 当中间体 **105** 中的溴原子被碘取代后, 醋酸钯也能够催化环合反应进行得到 **108**, 但是目标产物收率只有 38%. 该合成策略具有反应起始原料易得, 步骤少, 转化率较高等特点, 在制备环合底物 **109** 过程中无需使用对水敏感的丁基锂或格氏试剂, 避免了氢化钾等剧毒试剂的使用, 有望在合成苯并啡啉生物碱衍生中得到更加广泛的应用.

3 重排或多组分反应直接构建苯并啡啉多环体系

在构建苯并啡啉基本骨架过程中, 无论是 B 环合还是 C 环环合策略, 其环合反应底物往往需要通过多步合成制备. 1999 年, Hergueta 等^[51]报道了一类新颖的重排反应用于直接构建苯并啡啉生物碱的基本骨架, 整个合

Reagents and conditions: (a) *n*-BuLi, THF, 50%~82%; (b) NaH, MeI, THF, 77%~90%; (c) HCl 10%; then PDC, DCM, 70%~85%; (d) Ph₃P⁺CH₂OMe⁻, *n*-BuLi, THF, 66%~74%; (e) HCl, 10%, 85%~88%

Scheme 21

Reagents and conditions: (a) KCN, H_2O/C_2H_5OH , r.t., 91%; (b) HF, brine 15 °C, 100%; (c) $BrCH_2CO_2Et$, Zn, dioxane/DMM, 80%; (d) H_2SO_4 , 78%; (e) $CH_2=CHMgBr$, THF; (f) $MeSO_3H$

Scheme 22

Reagents and conditions: (a) *tert*-butylamine, 96%; (b) $Pd(PPh_3)_2Cl_2$, CuI, 3-buten-1-ol, DIPEA, 80%; (c) $NeBr_2(dppe)$, Zn, Na_2CO_3 , DMF, 73%; (d) $(COCl)_2$, DMSO, DIPEA, DCM, 77%; (e) AcOH, 40% HBr, 78%

Scheme 23

Scheme 24

成路线仅需两步反应. 重排反应底物 **113** 由 *N*-炔甲基-*N*-甲基-1-萘胺(**111**)与方酸二甲酯(dimethyl squarate, **112**)反应得到. 以氯苯作为溶剂, 底物 **113** 在 132 °C 下重排即可转化为 5,6-二氢苯并啡啉(**114**), 得率为 45% (Scheme 24). Hergueta 等将 **113** 中醇羟基氢氘代后, 证实该热力学重排反应为自由基机理.

2005 年, Clement 等^[52]以商品化取代苯甲醛(**115**)和 2 equiv. 的邻甲基苯甲腈(**116**)为原料, 在叔丁醇钾作用下下一步反应构建苯并啡啉母核基本骨架, 同时能够在母核骨架 11 位引入芳基(Eq. 5). 这也是迄今为止文献报道的合成苯并啡啉母核最便捷的方法.

Clement 对可能的反应机理进行了探讨, 一分子邻甲基苯甲腈在叔丁醇钾的作用下与苯甲醛反应脱水得到苯乙烯中间体 **118**, 另一分子邻甲基苯甲腈在碱性条件下生成碳负离子对 **118** 中的双键加成后得到中间体 **120**. 中间体 **120** 中的一个亚甲基在碱性条件下失去质子生成的碳负离子亲核加成分子中的氰基, C 环环合后得到烯胺 **121**. 烯胺 N 原子作为亲核体加成另一氰基, B 环环合后得到目标产物 **117** (Scheme 25).

苯甲醛中取代基 R 为供电子烷氧基或卤素原子时

Scheme 25

Scheme 26

对整个反应的得率没有影响^[53]. 但是以甲醛为原料时目标产物 6-氨基-11,12-二氢苯并啡啉(**118**)的得率降低至 11%, 影响 **118** 得率的原因仍然有待研究. **118** 被叔丁基亚硝酯氧化后得到 6-*O*-苯并啡啉(**119**), 随后还原羰基, 酸性条件下脱水得到全芳香化苯并啡啉 (Scheme 26)^[54].

4 总结与展望

近年来, 具有取代基多样性和高目标产物收率的苯并啡啉生物碱合成方法的建立为这类生物碱生物活性和构效关系研究提供了便利. 特别是具有取代基兼容性的钯催化多组分串联反应极大地提高了这类生物碱的合成效率. 虽然部分合成方法具有反应步骤少, 转化率高优点, 但对反应底物取代基的性质有特殊的要求. 因此, 在苯并啡啉生物碱生物活性研究过程中, 我们可依据所需要目标产物的亚结构类型或取代基类型来选择合适的合成路线. 此外, 在所有苯并啡啉生物碱合成方法中, 仅 C₁₁—C_{11a} 成键环合过程与 6-羟基 protopine 向二氢苯并啡啉的转化过程有类似之处. 以天然 protopine 生物碱为反应底物的高效仿生化学合成将会是苯并啡啉生物碱合成研究中一个非常有意思并且具有挑战性的工作. 当然, 由于药用植物资源和天然合成原料来源的有限性, 科学家们一直致力于采用全合成手段获得苯并啡啉类生物碱, 这些工作有效地推动了生物碱合成化学的发展. 在上述研究工作的基础上, 苯并啡啉类生物碱活性和合成方法研究有望成为生物碱研究领域的一个重要研究方向.

References

- [1] Bentley, K. W. *Nat. Prod. Rep.* **2005**, 22, 249.
- [2] Dvořák, Z.; Kubáň, V.; Klejdus, B.; Hlaváč, J.; Vičar, J.; Ulrichová, J.; Šimánek, V. *Heterocycles* **2006**, 68, 2403.
- [3] Blank, R.; Muller-Siewardt, B.; Wolfram, S. *Livestock Sci.* **2010**, 134, 24.
- [4] Newman, S. E.; Roll, M. J.; Harkrader, R. J. *Hortscience* **1999**, 34, 686.
- [5] Newton, S. M.; Lau, C.; Gurcha, S. S.; Besra, G. S.; Wright, C. W. *J. Ethnopharmacol.* **2002**, 79, 57.
- [6] Mackay, S. P.; Meth-Cohn, O.; Waigh, R. D. *Adv. Heterocycl. Chem.* **1997**, 67, 345.
- [7] Ishikawa, T.; Ishii, H. *Heterocycles* **1999**, 50, 627.
- [8] Zenk, M. H. *Pure Appl. Chem.* **1994**, 66, 2023.
- [9] Morrison, G. C.; Cetenko, W.; Shavel Jr, J. J. *J. Org. Chem.* **1958**, 23, 42.
- [10] Ishii, H.; Ichikawa, Y. I.; Kawanabe, E.; Ishikawa, M.; Ishikawa, T.; Kureitani, K.; Inomata, M.; Hoshi, A. *Chem. Pharm. Bull.* **1985**, 33, 4139.
- [11] Satio, T.; Yoshida, M.; Ishikawa, T. *Heterocycles* **2001**, 54, 437.
- [12] Yoshida, M.; Watanabe, T.; Ishikawa, T. *Heterocycles* **2001**, 54, 433.
- [13] Ishikawa, T.; Shimooka, K.; Narioka, T.; Noguchi, S.; Saito, T.; Ishikawa, A.; Yamazaki, E.; Harayama, T.; Seki, H.; Yamaguchi, K. *J. Org. Chem.* **2000**, 65, 9143.
- [14] Treus, M.; Estevez, J. C.; Castedo, L.; Estevez, R. J. *Tetrahedron Lett.* **2000**, 41, 6351.
- [15] Vicario, J. L.; Badía, D.; Domínguez, E.; Carrillo, L. *Tetrahedron: Asymmetry* **2000**, 11, 1227.
- [16] Watanabe, T.; Ohashi, Y.; Yoshino, R.; Komano, N.; Eguchi, M. *Org. Biomol. Chem.* **2003**, 1, 3024.
- [17] Parenty, A.; Moreau, X.; Campagne, J. M. *Chem. Rev.* **2006**, 106, 911.
- [18] Yoshida, M.; Watanabe, T.; Ishikawa, T. *Tetrahedron Lett.* **2002**, 43, 6751.
- [19] Fleming, M. J.; McManus, H. A.; Rudolph, A.; Chan, W. H.; Ruiz, J.; Dockendorff, C.; Lautens, M. *Chem. Eur. J.* **2008**, 14, 2112.
- [20] Lautens, M.; Dockendorff, C. *Org. Lett.* **2003**, 5, 3659.
- [21] Ishihara, Y.; Azuma, S.; Choshi, T.; Kohno, K.; Ono, K.; Tsutsumi, H.; Ishizu, T.; Hbino, S. *Tetrahedron* **2011**, 67, 1320.
- [22] Kohno, K.; Azuma, S.; Choshi, T.; Nobuhiro, J.; Hibino, S. *Tetrahedron Lett.* **2009**, 50, 590.
- [23] Lysén, M.; Madden, M.; Kristensen, J. L.; Vedsø, P.; Zøllner, C.; Begtrup, M. *Synthesis* **2006**, 3478.
- [24] Bernardo, P. H.; Wan, K.; Sivaraman, T.; Xu, J.; Moore, F. K.; Hung, A. W.; Mok, H. Y. K.; Yu, V. C.; Chai, C. L. L. *J. Med. Chem.* **2008**, 51, 6699.
- [25] Yapi, A.; Desbois, N.; Chezal, J.; Chavignon, O.; Teulade, J.; Valentin, A.; Blache, Y. *Eur. J. Med. Chem.* **2010**, 45, 2854.
- [26] Harayama, T.; Akiyama, T.; Akamatsu, H.; Kawano, K.; Abe, H.; Takeuchi, Y. *Synthesis* **2001**, 444.
- [27] Harayama, T.; Akiyama, T.; Nakano, Y.; Shibaike, K.; Akamatsu, H.; Hori, A.; Abe, H.; Takeuchi, Y. *Synthesis* **2002**, 237.
- [28] Harayama, T.; Akamatsu, H.; Okamura, K.; Miyagoe, T.; Akiyama, T.; Abe, H.; Takeuchi, Y. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **2001**, 523.
- [29] Ramani, P.; Fontana, G. *Tetrahedron Lett.* **2008**, 49, 5262.
- [30] Nakanishi, T.; Suzuki, M.; Mashiba, A.; Ishikawa, K.; Yokotsuka, T. *J. Org. Chem.* **1998**, 63, 4235.
- [31] Nakanishi, T.; Suzuki, M. S. *Org. Lett.* **1999**, 7, 985.
- [32] Budén, M. E.; Rossi, R. A. *Tetrahedron Lett.* **2007**, 48, 8739.
- [33] Moreno, I.; Tellitu, I.; Etayo, J.; SanMartín, R.; Dmínguez, E. *Tetrahedron* **2001**, 57, 5403.
- [34] Konno, F.; Ishikawa, T.; Kawahata, M.; Yamaguchi, K. *J. Org. Chem.* **2006**, 71, 9818.
- [35] Ito, M.; Konno, F.; Kumamoto, T.; Suzuki, N.; Kawahata, M.; Yamaguchi, K.; Ishikawa, T. *Tetrahedron* **2011**, 67, 8041.
- [36] Lv, P.; Huang, K.; Xie, L.; Xu, X. *Org. Biomol. Chem.* **2011**, 9, 3133.
- [37] Rayabarapu, D. K.; Shukla, P.; Cheng, C.-H. *Org. Lett.* **2003**, 5, 4903.
- [38] Madan, S.; Cheng, C.-H. *J. Org. Chem.* **2006**, 71, 8312.
- [39] Blanchot, M.; Candito, D. A.; Larnaud, F.; Lautens, M. *Org. Lett.* **2011**, 13, 1486.
- [40] Candito, D. A.; Lautens, M. *Angew. Chem.* **2009**, 121, 6841.
- [41] Cho, W. J.; Park, M. J.; Imanishi, T.; Chung, B. H. *Chem. Pharm. Bull.* **1999**, 47, 900.
- [42] Le, T. N.; Gang, S. G.; Cho, W. J. *Tetrahedron Lett.* **2004**, 45, 2763.
- [43] Nguyen, T. Cho, W. J. *Chem. Pharm. Bull.* **2006**, 54, 476.
- [44] Le, T. N.; Gang, S. G.; Cho, W. J. *J. Org. Chem.* **2004**, 69, 2768.
- [45] Le, T. N.; Van, H. T. M.; Lee, S. H.; Choi, H. J.; Lee, K. Y.; Kang, B. Y.; Cho, W. J. *Arch. Pharm. Res.* **2008**, 31, 6.
- [46] Vivario, J. L.; Badía, D.; Dominguea, E.; Crespo, A.; Carrillo, L. *Tetrahedron: Asymmetry* **1999**, 10, 1947.
- [47] Lynch, M. A.; Duval, O.; Sukhanova, A.; Devy, J.; MacKay, S. P.; Waigh, R. G.; Nabiev, I. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2001**, 11, 2643.
- [48] Vanqualef, E.; Amoros, M.; Boustie, J.; Lynch, M. A.; Waigh, R. D. *J. Enzyme Inhib. Med. Chem.* **2004**, 19, 481.
- [49] Nyangulu, J. M.; Hargreaves, S. L.; Sharples, S. L.; Mackay, S. P.; Waigh, R. D.; Duval, O.; Mberu, E. K.; Watkins, W. M. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2005**, 15, 2007.
- [50] Luo, Y.; Mei, Y.; Zhang, J.; Lu, W.; Tang, J. *Tetrahedron* **2006**, 62, 9131.
- [51] Hergueta, A. R.; Moore, H. W. *J. Org. Chem.* **1999**, 64, 5979.
- [52] Clement, B.; Weide, M.; Wolschendorf, U.; Kock, I. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2005**, 44, 635.
- [53] Kock, I.; Heber, D.; Weide, M.; Wolschendorf, U.; Clement, B. *J. Med. Chem.* **2005**, 48, 2772.
- [54] Kock, I.; Clement, B. *Synthesis* **2005**, 1052.

(Qin, X.)