Petasis 反应研究进展

于涛^a 李慧^b 伍新燕^{*,a} 杨军^{*,b}^(a) 华东理工大学精细化工研究所 上海 200237)^(b) 中国科学院上海有机化学研究所 上海 200032)

摘要 Petasis 反应是构建氨基酸、氨基醇及其相应的衍生物等结构片段的有效方法之一, 其中手性 Petasis 反应已应用于天然产物和药物的片段合成。就文献中机理、组分、反应条件等方面的研究进行了综述, 并对 Petasis 反应的应用实例进行了讨论。

关键词 Petasis 反应; 有机硼化物; 多组分反应

Progress in Petasis Reaction

Yu, Tao^a Li, Hui^b Wu, Xinyan^{*,a} Yang, Jun^{*,b}^(a) Institute of Fine Chemicals, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237)^(b) Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032)

Abstract Petasis reaction is a powerful method for the synthesis of α -amino acids, β -amino alcohols and their derivatives. Chiral Petasis reaction has been applied in synthesis of nature products and drugs. This review describes the mechanism, reaction components and reaction conditions of Petasis reaction, and the applications of Petasis reaction are also discussed in the paper.

Keywords Petasis reaction; organoboron compounds; multicomponent reactions

多组分反应以其条件温和、操作简单和官能团兼容性好等优点成为有机合成化学中的重要反应^[1], 并在生物活性分子合成^[2]、新药设计^[3]和天然产物合成^[4]中得到广泛的应用。常见的多组分反应有 Ugi 反应、Passerini 反应和 Petasis 反应等。

Petasis 反应有时也被称为有机硼酸的 Mannich 反应 (Boronic acid Mannich 反应, 简称 BAM 反应)^[5]。1993 年 Petasis^[6]首次报道了有机胺、醛和有机硼酸参与的三组分反应 (Eq. 1), 该反应可“一锅法”构建新的碳-碳键并可形成烯丙基胺、手性氨基酸、手性氨基醇、2-取代的苯酚衍生物等重要有机合成中间体。Petasis 反应具有大多数多组分反应共有的优点, 无需使用严格的无水无氧处理的溶剂, 同时也不必加入金属催化剂及 Lewis 或 Brønsted 酸碱试剂^[7]。Candeias 等^[8]从不同醛组分参与的 Petasis 反应角度综述了 Petasis 反应研究近年来的进展, 本文着重就 Petasis 反应的硼组分和胺组分进行了讨论, 综述了 Petasis 反应最新进展及其在医药合成中的一些

应用^[9~12], 并且介绍了固相、微波等技术在 Petasis 反应中的应用。

1 Petasis 反应机理

Petasis 反应机理研究近年受到有机硼化学家和有机合成研究人员的关注。对 Petasis 反应的机理存在两种假设^[8]。Petasis 认为, 该反应首先由 α -羟基醛 **1** 与胺 **2** 反应形成中间体 **4**, 该中间体的羟基与有机硼的空轨道配位形成的中间体 **6** 进行分子内亲核进攻水解后得到产物氨基醇 **7** (Path 1, Scheme 1)^[11]; 而 Schlienger 等^[13]则认为 α -羟基醛 **1** 首先与有机硼酸 **3** 反应得到中间体 borate **5**, 该中间体再与胺组分 **2** 反应后得到中间体 **6**, 此后分子内进攻得到产物氨基醇 **7** (Path 2, Scheme 1)。Tao 等^[14]

* E-mail: xinyanwu@ecust.edu.cn, yangj@mail.sioc.ac.cn

Received February 9, 2012; revised April 19, 2012; published online May 21, 2012.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 20802088, 91017006, 90917017).

国家自然科学基金 (Nos. 20802088, 91017006, 90917017) 资助项目。

Scheme 1

通过热力学计算认为 Path 2 比 Path 1 需要更多的能量, 倾向于该反应以 Path 1 机理进行。

2 Petasis 反应中的硼组分

通过有机硼化物的 Petasis 反应, 可“一锅法”方便地构建较复杂的分子结构, 并应用于生物活性分子的合成^[15]和药物的合成^[16]。一般而言, 在空气中可稳定分离、贮存的有机硼化合物为有机硼酸、有机硼酸酯、有机氟硼酸钾, 这三类有机硼化合物均在 Petasis 反应中得到了应用。

2.1 有机硼酸在 Petasis 反应中的应用

有机硼酸是合成化学中的常用试剂^[17], 其中烯基硼酸和芳基硼酸在 Petasis 反应中最常应用。

2.1.1 烯基硼酸

Petasis 等^[18]报道了烯基硼酸、乙醛酸和手性胺的三组分不对称 Petasis 反应。通过该反应可以高立体选择性 ($de > 99\%$) 地制备 β -烯基- α -氨基酸的衍生物 **9** (Eq. 2)。

在某些反应中, 有机硼酸可促进底物脱水反应的进行, 如酰胺成键反应等^[19~21]。在 Petasis 反应中烯基硼酸也有促进底物脱水的应用, 例如 Petasis 等^[22]报道了利用烯基硼酸合成 piperazinones **13** 的反应 (Scheme 2)。苯基烯基硼酸 **8**、乙二胺衍生物 **10** 与乙醛酸 (**11**) 经 Petasis 反应所得中间体 **12**, 然后可在烯基硼酸的催化下脱水得到目标产物 **13**。在该反应中烯基硼酸促进了底物脱水成环, 更好地体现了“一锅法”反应的优点。

Scheme 2

2.1.2 芳基硼酸

芳基硼酸包括苯基硼酸与杂环硼酸, 在生物活性分子的合成中已较多地得到了应用^[23]。自 1997 年 Petasis 等^[24]首次报道芳基硼酸的多组分反应以来, 芳基硼酸越来越多地被应用于有机胺合成中。

在生物活性分子的合成中, 建立或引入苯基和杂环芳基的方法尤为重要。自 Petasis 多组分反应发现后, 如何实现芳基硼酸特别是杂环芳基硼酸的 Petasis 反应一直是研究的热点^[24]。

Berrée 等^[25]报道了利用芳基硼酸合成取代 2-羟基吗啡啉 **17** 的方法 (Eq. 3)。芳基硼酸 **14**、*N*-苄基-2-氨基乙醇 (**15**) 和乙二醛 (**16**) 进行反应, 可一步制备吗啡林化合物 **17**。该方法与其它合成 2-羟基吗啡啉的方法相比, 具有路线简短、操作简便和条件温和等优点, 实用性较强。

姜标等^[26]通过吡啶基硼酸 **18**、胺组分 **19** 与乙醛酸 (**11**) 的 Petasis 反应, 高收率地合成了 *N*-取代-2-吡啶基氨基酸 **20** (Eq. 4)。

Voisin 等^[27]在 2006 年研究了吡啶基硼酸 **21** 与乙醛酸(**11**)及二乙胺(**23**)的 Petasis 反应, 然而并未获得预期的氨基酸化合物. 作者通过吡啶基硼酸与乙醛酸的反应分离到新颖的 dioxaborolanones **22** (Scheme 3), 该中间体与有机胺能发生络合反应, 分离得到了新的吡啶基“ate”化合物 **24**, 作者认为这类新型络合物在医药中有潜在的应用前景.

Scheme 4

3.2 有机硼酸酯在 Petasis 反应中的应用

由于有机硼酸酯可通过柱层析纯化, 与有机硼酸相比更易制得纯品; 此外有机硼酸可与手性二醇方便地脱水酯化得到手性底物, 因此这一类硼组分的 Petasis 反应研究同样引人注目^[28,29]. Koolmeister 等^[30]首先报道了手性有机硼酸酯参与的 Petasis 反应. 手性硼酸酯 **25** 与

乙醛酸(**11**)及吗啡啉(**26**)反应, 以 78% 的收率得到一组对映异构体 **27** 和 **28** (Eq. 5), 但其 *ee* 值较低(15%).

Jourdan 等^[31]报道了有机硼酸频哪醇酯 **29**、乙醛酸(**11**)和苄胺(**30**)的 Petasis 反应, 烯基硼酸酯或芳基硼酸酯都能以较高收率得到相应的氨基酸化合物 **31** (Eq. 6). 值得关注的是, 六氟异丙醇(HFIP)对该反应有显著的促进作用.

2.3 有机氟硼酸钾在 Petasis 反应中的应用

有机氟硼酸钾是一种稳定的硼试剂, 也可应用于 Petasis 反应中^[32]. 有机氟硼酸钾参与的 Petasis 反应需要以 Lewis 酸为催化剂^[33]. Tremblay-Morin 等^[34]在研究中发现, 如果将有机硼酸与取代环己胺 **32**、多聚甲醛 **33** 进行 Petasis 反应, 产物 **34** 的收率很低(10%~20%), 并且伴有副产物 **35** 的生成(Eq. 8). 而在 Lewis 酸存在下有机氟硼酸钾作为硼组分参与反应时, 目标产物的收率明显提高, 烯基、芳基或是杂环取代的氟硼酸钾均可进行反应且收率均较高(Eq. 9).

有机氟硼酸钾还可直接与亚胺发生 Petasis 反应. Stas 等^[35]报道了 α,α -二氯亚胺(**36**)与烯基氟硼酸钾 **37** 的

反应, 在 BF₃•OEt₂ 催化下以较高收率(67%)得到烯丙胺衍生物产物 38 (Eq. 9).

由于使用烯基氟硼酸钾很好地解决了烯基硼酸的不稳定问题, 因此烯基有机硼化物的反应多采用烯基氟硼酸钾^[36]. 如 Tehrani 等^[37]利用烯基氟硼酸钾 39 与 α,α,α -三氯亚胺 40 反应, 较高收率地合成了烯丙胺衍生物 41 (Eq. 10).

4 Petasis 反应中的胺组分

在 Petasis 反应中, 胺类化合物可以活化醛酮的羰基, 在 Petasis 反应中一般是必不可少的一个组分. 多种含氮化合物可参与 Petasis 反应, 如脂肪胺^[38]、芳基胺^[39]、氨气^[40]、喹啉^[41]等, 其中最常见的是脂肪胺. 而脂肪胺中最有利于 Petasis 反应的进行, 尤其是仲胺和位阻大的伯胺^[38], 举例见 Scheme 4.

Portlock 等^[42]报道了酰肼参与的 Petasis 反应(Eq. 11), 酰肼 47、芳基硼酸 48 和乙醛酸(11)在室温下搅

Scheme 4

拌, 即可以极高的收率得到化合物 49.

羟胺也可作为胺组分参与 Petasis 反应, Naskar 等^[43]报道了羟胺 50 与芳基硼酸 48、乙醛酸(11)的反应 (Scheme 5, Reaction A). 当与羟胺氧上连接的基团为甲

Reaction A

Reaction B

Scheme 5

基时, 反应的收率最高(95%)。不但羟胺可以参与 Petasis 反应, 亚磺酰胺例如 **52** 也可发生反应 (Scheme 5, Reaction B)。

2008 年, Naskar 等^[44]又报道了利用吲哚 **54** 作为胺组分的反应, 在与对甲氧基苯基硼酸(**48**)和乙醛酸(**11**)的反应过程中, 吲哚 **54** 的 3 位氢会脱去, 进而形成 3 位取代的吲哚化合物 **55** (Eq. 12)。吲哚氮上的取代基 R^2 和苯环上的取代基 R^1 可以改变, 反应收率均在 60%~70% 之间。

叔胺由于 N 上没有脱水时需要的氢原子, 一般无法进行反应。而 Naskar 等^[39]则报道了叔胺作为胺组分的 Petasis 反应, 以芳香叔胺 **56** 与芳基硼酸 **48** 及乙醛酸 (**11**) 进行反应, 苯环上氨基对位的氢脱去, 以中等收率得到化合物 **57** (Eq. 13)。

此外也有一些不含氮的富电子芳烃 Petasis 反应的报道, 例如 Naskar 等^[45]报道了 1,3,5-三甲氧基苯(**58**)、烯基硼酸 **8** 和乙醛酸(**11**)之间的 Petasis 反应, 生成苯环上四取代的产物 **60** (Scheme 6)。该反应中富电子的苯环首先亲核进攻乙醛酸的醛羰基, 形成中间体 **59**, 之后有机硼酸亲核进攻中间体 **59**, 以良好的收率得到最终产物。

胺作为 Petasis 反应的一个组分, 通常都是与醛和有机硼酸等量地进行反应, 但 Wang 等^[46]报道了利用催化量(5 mol%)的二苄胺进行的 Petasis 反应。反应中烯基硼酸 **61**、水杨醛(**62**)和二苄胺反应, 高收率(92%)地得

Scheme 6

到了取代苯并吡喃产物 **63** (Eq. 14)。该反应中, 二苄胺相当于催化剂, 催化了有机硼酸和水杨醛的反应。

通过使用手性胺试剂可以合成具有手性的 Petasis 反应产物^[47], Southwood 等^[48]通过对比实验证明了以手性胺为手性诱导试剂所得产物的立体选择性优于使用手性有机硼酸酯的反应。

2008 年, Churches 等^[49]报道了对多种手性胺 **64** 与烯基硼酸 **8**、乙醛酸(**11**)的 Petasis 反应立体选择性的研究 (Eq. 15), 研究表明在该反应中手性仲胺是最佳的手性诱导试剂 (Table 1)。

Shevchuk 等^[50]在 2010 年报道了手性氨基磷酸酯在 Petasis 反应中的应用, 手性氨基磷酸酯 **66**、芳基硼酸 **48** 和乙醛酸(**11**)进行反应可以高立体选择性地合成磷酸酯基取代的手性氨基酸类化合物 **67** (Eq. 16), 该产物在生物医药上有着重要应用。

表 1 不同手性胺的 Petasis 反应收率和立体选择性

Table 1 Comparison of Petasis reaction yields and stereoselectivities

Amine substrate	Yield/%	dr
	1	3.3 : 1
	38	>95 : 5
	89	>95 : 5

4 Petasis 反应中的醛组分

4.1 乙醛酸在 Petasis 反应中的应用

乙醛酸是 Petasis 反应中最常用作醛组分的试剂^[23,51]. Font 等^[52]在 2008 年报道了生物活性分子嘧啶基芳胺基乙酸的合成, 其中关键步骤采用了乙醛酸(11)与胺 68 和苯基硼酸(14a)的 Petasis 反应, 所得到的产物 69 是一种嘧啶基芳胺基乙酸, 可作为中间产物继续进行反应从而得到生物活性更好的取代嘧啶基芳基乙酸(Eq. 17).

4.2 羟基醛在 Petasis 反应中的应用

羟基醛是 Petasis 反应中一种常见的醛组分, 由于连接羟基的碳原子可以具有手性, 因此从手性羟基醛出发, 利用 Petasis 反应可以合成手性产物. Prakash 等^[53]

报道了以手性三氟甲基羟基醛(70)为原料的 Petasis 反应. 羟基醛作为手性诱导试剂, 与仲胺 42、有机硼酸 71 发生反应后, 高立体选择性地得到手性产物 72 (Eq. 18). 该小组在后续研究工作中发现二氟甲基取代的羟基醛同样可以发生 Petasis 反应, 从而高立体选择性地得到生物活性和药理活性更好的二氟甲基取代的 β -氨基醇产物^[54].

4.3 水杨醛在 Petasis 反应中的应用

水杨醛是另外一种 Petasis 反应中常用到的醛, Petasis 等^[55]报道了水杨醛 73、烯基硼酸 8 与吗啡啉(26)的反应(Eq. 19), 产物为取代吗啡啉 74, 反应中水杨醛苯环上可含有硝基等吸电子取代基.

与水杨醛结构类似的邻氨基苯甲醛衍生物也可以发生 Petasis 反应. Petasis 等^[56]在 2009 年报道了磺酰胺基苯甲醛 75、烯基氟硼酸钾 37 和三乙胺(76)的反应. 该反应中三乙胺亲核进攻水杨醛的醛羰基, 生成铵盐中间体 77, 该中间体受热发生分子内环化, 得到 1,2-二氢喹啉产物 78 (Scheme 7).

4.4 其他化合物作为醛组分在 Petasis 反应中的应用

除了上述几种醛以外, 乙醛酸酯^[57]、甲酯^[58]、被保护的醛^[59]等许多化合物同样可以作为醛组分参与到 Petasis 反应中.

Kumagai 等^[59]报道了丙酮保护的(S)-2-羟基苯丙醛的 Petasis 反应, 底物 79 作为醛组分, 与手性伯胺 80 和环丙基烯基硼酸 81 反应, 高收率高立体选择性地得

Scheme 7

到手性氨基酸产物 **82** (Eq. 20).

6 Petasis 反应中的催化剂

通常情况下, Petasis 反应并不需要加入催化剂, 但有时手性催化剂的加入可以诱导产物中产生手性, 如 Schaus 等^[60]报道了手性二醇催化的烯基硼酸酯 **83**、仲胺 **42** 和乙醛酸乙酯(**84**)的 Petasis 反应, 利用手性催化剂 **85** 诱导以较高的收率和较好的立体选择性得到相应的手性氨基酸酯产物 **86** (Eq. 21).

7 Petasis 反应中的溶剂

Petasis 反应中的溶剂选择相对宽泛, 常用的多为极性较大的溶剂如乙醇、乙腈、二氯甲烷等. Nanda 等^[61]报道了六氟异丙醇(HFIP)作为溶剂时对该类反应具有促

进作用, 利用二氯甲烷和六氟异丙醇($V:V=90:10$)混合溶剂, 提高了反应的收率, 同时也大大缩短了反应时间.

Yadav 等^[62]报道了利用离子液体作为溶剂的 Petasis 反应, 在离子液体可循环利用的同时, 提高了反应收率.

水具有低毒性、低成本、使用安全等优点, 是绿色化学中最理想的溶剂, Candeias 等^[63,64]报道了水作为溶剂的 Petasis 反应, 可达到与有机溶剂同样的收率.

8 固相合成技术和微波技术在 Petasis 反应中的应用

近年来, 固相技术在有机化学反应中的应用越来越广泛. 自 2000 年 Klopfenstein 等^[65]首次报道了固相负载的 Petasis 反应以来, 陆续有多个科研小组对固相负载的 Petasis 反应进行了研究, 合成了一系列有机产物^[66~68]. Schlienger 等^[13]分别将反应的三个组分负载在高分子上进行 Petasis 反应, 并且对不同组分负载的反应做了系统比较, 结果表明固相负载在胺组分反应的收率最高, 而负载在醛组分或硼组分上时收率较差.

微波技术作为新兴的绿色化学技术在 Petasis 反应中也有着越来越重要的应用^[69], McLean 等^[70]报道了微波条件下芳基硼酸、仲胺与乙醛酸或水杨醛的反应, 在提高了反应的收率的同时只要 10 min 就达到理想的转化率.

贫电子芳胺诸如 3-氨基吡啶与苯基硼酸和乙醛酸的 Petasis 反应一般较难进行, 室温下经过一周时间反应的转化率也只有 10%, 而 Follmann 等^[71]报道了利用微波技术改进该反应, 仅 10 min 转化率就达到 60%.

8 Petasis 反应的应用

8.1 Petasis 反应在生物活性分子及药物分子合成中的应用

Petasis 反应在有机合成和药物化学中已得到很多应用, 利用该反应可以合成多种具有生物活性和药理活性的化合物^[72,73], 其中最吸引人的是可方便制备一些特殊的手性 α -氨基酸^[18]和 β -氨基醇^[38]. 例如 1,2,3,4-四氢 carbazole (**85**)是具有良好生物活性的分子, 也是重要的医药中间体. 2010 年 Neogi 等^[74]报道了取代苯基 **83**、芳基硼酸和乙醛酸的 Petasis 反应“一锅法”合成 1,2,3,4-四氢 carbazole (Scheme 8), 中间产物 **84** 不需纯化, 直接加入下一步反应试剂即得到最终产物; 取代基不同时, 总收率为 21%~51%.

Pyne 等^[75~77]在 uniflorine A 的全合成中, 采用了不对称的 Petasis 反应构建碳骨架. 他们通过苯基烯基硼酸 **8**、烯丙胺(**86**)与 *L*-木糖 (**87**)的三组分反应, 高收率地得

Scheme 8

到了单一非对映异构体中间体 **88**, 然后通过多步反应合成了 uniflorine A (Scheme 9).

Scheme 9

Hong 等^[78]在合成 sialic acid (**93**)时, 应用了有机硼酸酯(**89**)、二(4-甲氧基)苯甲胺(**90**)和 *L*-arabinose (**91**)的 Petasis 反应(Scheme 10), 高立体选择性地($de > 99\%$)构建了 sialic acids 的基本骨架. 作者随后通过两步反应得到最终产物, 该合成路线非常短, 总收率较高.

Scheme 10

Scheme 11

Au 等^[79]在合成抗癌药物(-)-swainsonine 的过程中, 利用了手性羟基醛为原料的 Petasis 反应, 以羟基醛 **94**、烯基硼酸 **8** 和脂肪胺 **86** 发生反应, 生成手性中间产物 **95**, 其 de 值较高(93%), 产物再经过一系列反应转化为最终产物(-)-swainsonine (Scheme 11).

8.2 Petasis 反应与其他多组分反应的联用

Petasis 反应可以与其他多组分反应联用, 如 Naskar 等^[80]报道了利用 Petasis 反应与 Ugi 反应联用合成生物活性分子 aza- β -lactam (**97**), 反应中首先利用 Petasis 反应得到 **96**, 再经过 Ugi 反应得到 aza- β -lactam (**97**) (Scheme 12).

9 结论与展望

自 Petasis 报道有机硼的三组分反应迄今, 十几年时间里 Petasis 反应得到了较广泛的研究. 通过应用手性胺或手性醛制备高立体选择性的手性 Petasis 反应产物如烯基、芳基取代的 α -氨基酸和 β -氨基醇及其衍生物, 在医药和合成化学中已得到了应用.

近期有很多新的有机硼化合物被合成出来, 同时 Petasis 反应与其它多组分反应也可以联合使用^[81]. Petasis 反应有望更便捷地大量制备复杂小分子, 并在组合化学、天然产物合成和医药中得到更广泛的应用.

目前, Petasis 反应还有一定的不足. 由于有机硼化合物兼具弱亲核性和空轨道的特点, 一般而言只有当羰基的 α -碳上连有羰基、羧基、羟基等基团时 Petasis 反应才能够顺利发生, 如何在反应中应用其它类型的羰基化合物发生反应还有待进一步的研究.

Scheme 12

References

- [1] Zhu, J.; Bienaymé, H. *Multicomponent Reactions*, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, **2005**, pp. 206~223.
- [2] Portlock, D. E.; Ostaszewski, R.; Naskar, D.; West, L. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 603.
- [3] Kalinski, C.; Lemoine, H.; Schmidt, J.; Burdack, C. *Synthesis* **2008**, 4007.
- [4] Jiang, B.; Xu, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2004**, *43*, 2543.
- [5] McReynolds, M. D.; Hanson, P. R. *Chemtracts* **2001**, *14*, 796.
- [6] Petasis, N. A.; Akritopoulou, I. *Tetrahedron Lett.* **1993**, *34*, 583.
- [7] Hall, D. *Boronic Acid: Preparation and Applications in Organic Synthesis and Medicine*, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, **2005**, pp. 279~304.
- [8] Candeias, N. R.; Montalbano, F.; Cal, P. M. S. D.; Gois, P. M. P. *Chem. Rev.* **2010**, *110*, 6169.
- [9] Hansen, T. K.; Schlienger, N.; Bryce, M. R. *Tetrahedron Lett.* **1999**, *40*, 3651.
- [10] Jiang, B.; Xu, M. *Org. Lett.* **2002**, *4*, 4077.
- [11] Neogi, S.; Roy, A.; Naskar, D. *J. Comb. Chem.* **2010**, *12*, 75.
- [12] Au, C. W. G.; Nash, R. J.; Pyne, S. G. *Chem. Commun.* **2010**, *46*, 713.
- [13] Schlienger, N.; Bryce, M. R.; Hansen, T. K. *Tetrahedron* **2000**, *56*, 10023.
- [14] Tao, J.; Li, S. *Chin. J. Chem.* **2010**, *28*, 41.
- [15] Kaiser, P. F.; Churches, Q. I.; Hutton, C. A. *Aust. J. Chem.* **2007**, *60*, 799.
- [16] Petasis, N. A. *Aust. J. Chem.* **2007**, *60*, 795.
- [17] Miyaoura, N.; Suzuki, A. *Chem. Rev.* **1995**, *95*, 2457.
- [18] Petasis, N. A.; Zavialov, I. A. *J. Am. Chem. Soc.* **1997**, *119*, 445.
- [19] Charville, H.; Jackson, D.; Hodges, G.; Whiting, A. *Chem. Commun.* **2010**, *46*, 1813.
- [20] Al-Zoubi, R. M.; Marion, O.; Hall, D. G. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 2876.
- [21] Ishihara, K.; Ohara, S.; Yamamoto, H. *J. Org. Chem.* **1996**, *61*, 4196.
- [22] Petasis, N. A.; Patel, Z. D. *Tetrahedron Lett.* **2000**, *41*, 9607.
- [23] Machan, T.; Davis, A. S.; Liawruangrath, B.; Pyne, S. G. *Tetrahedron* **2008**, *64*, 2725.
- [24] Petasis, N. A.; Goodman, A.; Zavialov, I. A. *Tetrahedron* **1997**, *53*, 16463.
- [25] Berrée, F.; Debache, A.; Marsac, Y.; Carboni, B. *Tetrahedron Lett.* **2001**, *42*, 3591.
- [26] Jiang, B.; Yang, C. G.; Gu, X. H. *Tetrahedron Lett.* **2001**, *42*, 2545.
- [27] Voisin, A. S.; Bouillon, A.; Lancelot, J.-C.; Lesnard, A.; Oulyadi, H.; Rault, S. *Tetrahedron Lett.* **2006**, *47*, 2165.
- [28] Kolomeitsev, A. A.; Kadyrov, A. A.; Szczepkowska-Sztolcman, J.; Milewska, M.; Koroniak, H.; Bissky, G.; Barten, J. A.; Roeschenthaler, G.-V. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 8273.
- [29] Koolmeister, T.; Sodergren, M.; Scobie, M. *Tetrahedron Lett.* **2002**, *43*, 5965.
- [30] Koolmeister, T.; Sodergren, M.; Scobie, M. *Tetrahedron Lett.* **2002**, *43*, 5969.
- [31] Jourdan, H.; Gouhier, G.; Van Hijfte, L.; Angibaud, P.; Piettre, S. R. *Tetrahedron Lett.* **2005**, *46*, 8027.
- [32] Stas, S.; Tehrani, K. A.; Laus, G. *Tetrahedron* **2008**, *64*, 3457.
- [33] Morgan, I. R.; Yazici, A.; Pyne, S. G. *Tetrahedron* **2008**, *64*, 1409.
- [34] Tremblay-Morin, J. P.; Raeppe, S.; Gaudette, F. *Tetrahedron Lett.* **2004**, *45*, 3471.
- [35] Stas, S.; Tehrani, K. A. *Tetrahedron* **2007**, *63*, 8921.
- [36] Konev, A. S.; Stas, S.; Novikov, M. S.; Khlebnikov, A. F.; Tehrani, K. A. *Tetrahedron* **2008**, *64*, 117.
- [37] Tehrani, K. A.; Stas, S.; Lucas, B.; Kimpe, N. D. *Tetrahedron* **2009**, *65*, 1957.
- [38] Petasis, N. A.; Zavialov, I. A. *J. Am. Chem. Soc.* **1998**, *120*, 11798.
- [39] Naskar, D.; Roy, A.; Seibel, W. L.; Portlock, D. E. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 5819.
- [40] Hong, Z.; Liu, L.; Sugiyama, M.; Fu, Y.; Wong, C.-H. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 8352.
- [41] Chang, Y. M.; Lee, S. H.; Nam, M. H.; Cho, M. Y.; Park, Y. S.; Yoon, C. M. *Tetrahedron Lett.* **2005**, *46*, 3053.
- [42] Portlock, D. E.; Naskar, D.; West, L.; Li, M. *Tetrahedron Lett.* **2002**, *43*, 6845.
- [43] Naskar, D.; Roy, A.; Seibel, W. L.; Portlock, D. E. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 8865.
- [44] Naskar, D.; Neogi, S.; Roy, A.; Mandal, A. B. *Tetrahedron Lett.* **2008**, *49*, 6762.
- [45] Naskar, D.; Roy, A.; Seibel, W. L. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 8861.
- [46] Wang, Q.; Finn, M. G. *Org. Lett.* **2000**, *2*, 4063.
- [47] Berree, F.; Debache, A.; Marsac, Y.; Collet, B.; Girard-Le Bleiz, P.; Carboni, B. *Tetrahedron* **2006**, *62*, 4027.
- [48] Southwood, T. J.; Curry, M. C.; Hutton, C. A. *Tetrahedron* **2006**, *62*, 236.
- [49] Churches, Q. I.; Stewart, H. E.; Cohen, S. B.; Shroder, A.; Turner, P.; Hutton, C. A. *Pure Appl. Chem.* **2008**, *80*, 687.
- [50] Shevchuk, M. V.; Sorochinsky, A. E.; Khilya, V. P.; Romanenko, V. D.; Kukhar, V. P. *Synlett* **2010**, 73.
- [51] Golebiowski, A.; Klopfenstein, S. R.; Chen, J. J.; Shao, X. *Tetrahedron Lett.* **2000**, *41*, 4841.
- [52] Font, D.; Heras, M.; Villagordo, J. M. *Tetrahedron* **2008**, *64*, 5226.
- [53] Prakash, G. K. S.; Mandal, M.; Schweizer, S.; Petasis, N. A.; Olah, G. A. *Org. Lett.* **2000**, *2*, 3173.
- [54] Prakash, G. K. S.; Mandal, M.; Schweizer, S.; Petasis, N. A.; Olah, G. A. *J. Org. Chem.* **2002**, *67*, 3718.
- [55] Petasis, N. A.; Boral, S. *Tetrahedron Lett.* **2001**, *42*, 539.
- [56] Petasis, N. A.; Butkevich, A. N. *J. Organomet. Chem.* **2009**, *694*, 1747.
- [57] Grigg, R.; Sridharan, V.; Thayaparan, A. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 9017.
- [58] Kabalka, G. W.; Venkataiah, B.; Dong, G. *Tetrahedron Lett.* **2004**, *45*, 729.
- [59] Kumagai, N.; Muncipinto, G.; Schreiber, S. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2006**, *45*, 3635.
- [60] Lou, S.; Schaus, S. E. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 6922.
- [61] Nanda, K. K.; Wesley Trotter, B. *Tetrahedron Lett.* **2005**, *46*, 2025.
- [62] Yadav, J. S.; Reddy, B. V. S.; Lakshmi, P. N. *J. Mol. Catal. A:*

- Chem.* **2007**, 274, 101.
- [63] Candeias, N. R.; Veiros, L. F.; Afonso, C. A. M.; Gois, P. M. P. *Eur. J. Org. Chem.* **2009**, 1859.
- [64] Candeias, N. R.; Cal, P. M. S. D.; Andre, V.; Duarte, M. T.; Gois, P. M. P. *Tetrahedron* **2010**, 66, 2736.
- [65] Klopfenstein, S. R.; Chen, J. J.; Golebiowski, A.; Li, M.; Peng, S. X.; Shao, X. *Tetrahedron Lett.* **2000**, 41, 4835.
- [66] Danieli, E.; Trabocchi, A.; Menchi, G.; Guarna, A. *Eur. J. Org. Chem.* **2007**, 1659.
- [67] Mieczkowski, A.; Koźmiński, W.; Jurczak, J. *Synthesis* **2010**, 221.
- [68] Thompson, K. A.; Hall, D. G. *Chem. Commun.* **2000**, 2379.
- [69] Regnier, T.; Berree, F.; Lavastre, O.; Carboni, B. *Green Chem.* **2007**, 125.
- [70] McLean, N. J.; Tye, H.; Whittaker, M. *Tetrahedron Lett.* **2004**, 45, 993.
- [71] Follmann, M.; Graul, F.; Schaefer, T.; Kopec, S.; Hamley, P. *Synlett* **2005**, 1009.
- [72] Sugiyama, S.; Arai, S.; Kiriya, M.; Ishii, K. *Chem. Pharm. Bull.* **2005**, 53, 100.
- [73] Sugiyama, S.; Arai, S.; Ishii, K. *Tetrahedron: Asymmetry* **2004**, 15, 3149.
- [74] Neogi, S.; Roy, A.; Naskar, D. *J. Comb. Chem.* **2010**, 12, 617.
- [75] Davis, A. S.; Pyne, S. G.; Skelton, B. W.; White, A. H. *J. Org. Chem.* **2004**, 69, 3139.
- [76] Ritthiwigrom, T.; Pyne, S. G. *Org. Lett.* **2008**, 10, 2769.
- [77] Ritthiwigrom, T.; Willis, A. C.; Pyne, S. G. *J. Org. Chem.* **2010**, 75, 815.
- [78] Hong, Z.; Liu, L.; Hsu, C. C.; Wong, C. H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2006**, 45, 7417.
- [79] Au, C. W. G.; Pyne, S. G. *J. Org. Chem.* **2006**, 71, 7097.
- [80] Naskar, D.; Roy, A.; Seibel, W. L.; West, L.; Portlock, D. E. *Tetrahedron Lett.* **2003**, 44, 6297.
- [81] Portlock, D. E.; Naskar, D.; West, L.; Ostaszewski, R.; Chen, J. J. *Tetrahedron Lett.* **2003**, 44, 5121.

(Cheng, F.)