含 1,2,4-三唑和 1,3,4-噁二唑硫醚类化合物的合成及结构表征

王海卫 朱文娟 于知冉 李 静 董保东 廖新成*

(郑州大学化学与分子工程学院 郑州 450052)

摘要 在 KOH 溶液中, 芳甲酰肼(2)与 CS₂ 生成钾盐 3; 然后 3 在水合肼作用下经过环化、取代、肼解得 3-巯基-4-氨基-5-苯基-4*H*-1,2,4-三唑-乙酸酰肼(6), 6 再与 CS₂ 回流成环生成化合物 5-(4-氨基-5-苯基-4*H*-1,2,4-三唑-3-巯烷基)-1,3,4-噁二唑-2-硫醇(7), 最后 7 与取代苄基氯反应得目标化合物 A1~A6, 与芳基甲醛反应得终产物 B1~B15. 目标化合物的结构均经 ¹H NMR, ¹³C NMR, IR, MS 或 HRMS 确证结构.

关键词 1,2,4-三唑; 1,3,4-噁二唑; 硫醚

Synthesis and Structure Characterization of Sulfur Ethers Containing 1,2,4-Triazole and 1,3,4-Oxadiazole

Wang, Haiwei Zhu, Wenjuan Yu, Zhiran Li, Jing

Dong, Baodong Liao, Xincheng*

(College of Chemistry and Molecular Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052)

Abstract Compound 3 was prepared by reaction of benzohydrazide (2) with CS₂ in the presence of KOH as solvent. This compound converted to (4-amino-5-phenyl-4*H*-1,2,4-triazol-3-ylsulfanyl)-acetic acid hydrazide (6) by the reactions of cyclization, substitution and hydrazinolysis in the presence of hydrazine hydrate. Then 5-(4-amino-5-phenyl-4*H*-1,2,4-triazol-3-ylsulfanylmethyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol (7) were obtained by a reflux of compound 6 with CS₂. This intermediate reacted with several substituted-benzyl chloride to afford a series of new derivatives A1~A6; in the meantime, reacted with several substituted-benzaldehyde to afford a series of new derivatives B1~B15. The structures of new products were characterized by means of ¹H NMR, ¹³C NMR, IR, MS or HRMS techniques.

Keywords 1,2,4-triazole; 1,3,4-oxadiazole; sulfur ether

在分子中同时引入两个或多个杂环活性中心, 能改善化合物的生物活性, 从而得到活性更好、应用价值更高的化合物^[1,2]. 因此双杂环化合物的合成已经成为杂环化合物研究的重要方向之一. 1,2,4-三唑类衍生物具有良好抗肿瘤^[3]、除草^[4]等多种生物活性, 广泛应用于药物分子的设计和开发; 1,3,4-噁二唑类杂环化合物也因其广泛的生物活性, 如抗菌^[5]、抗肿瘤^[6]、抗炎^[7]等, 日益引起人们重视. 因此, 合成一些新型的 1,2,4-三唑和 1,3,4-噁二唑衍生物不仅具有一定学术价值, 同时也具有潜在的应用前景.

一般情况下 1,3,4-噁二唑由苯甲酰肼在二硫化碳中成环制得^[8]; 本文以苯甲酸为原料通过酯化、肼解、成盐、再环化合成带氨基和巯基的 1,2,4-三唑^[9,10,11,12], 然

后让三唑环上的巯基通过取代、肼解、成环而合成含有 1,2,4-三唑和 1,3,4-噁二唑的双杂环化合物. 希望通过化合物结构的改变, 实现活性成分的优化叠加, 筛选出具有更高生物活性的化合物. 所得化合物结构均经 ¹H NMR, ¹³C NMR, IR, MS 或 HRMS 等测试手段加以确认. 其合成路线如 Scheme 1 所示.

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

XTA4 型显微熔点测定仪(温度未经校正); Bruker Esquire 3000 型离子阱液相质谱仪; Bruker DPX-400 型超导核磁共振仪(TMS 作内标); Shimadzuir-408 型红外光谱测定仪; Waters Micromass 公司 Q-Tof MicroTM 高分辨质谱.

* E-mail: lxc66@zzu.edu.cn; whw156@163.com

Received February 20, 2012; revised May 29, 2012; published online June 12, 2012.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21171149).

国家自然科学基金(No. 21171149)资助项目.

Scheme 1

二硫化碳(连云港市化学试剂厂); 水合肼(80%)(天津市科密欧化学试剂有限公司); 其它试剂均为市售分析纯。

1.2 苯甲酸甲酯(1)的合成

由参考文献[9]的合成方法制得苯甲酸甲酯为无色油状液体。

1.3 苯甲酰肼(2)的合成

由参考文献[11]的合成方法制得苯甲酰肼为白色片状晶体 25.0 g, 产率 91.9%, m.p. 113~114 °C(文献值^[11] 112~114 °C)。

1.4 钠盐 3 的制备

由参考文献[12]的合成方法制得钠盐为黄色固体, 抽滤, 烘干直接进行下一步反应。

1.5 3-芳基-4-氨基-5-巯基-1,2,4-均三唑(4)的合成

由参考文献[1, 12]的合成方法制得 3-芳基-4-氨基-5-巯基-1,2,4-均三唑为白色粉末 16.1 g, 产率 83.9%. m.p. 201~203 °C(文献值^[12]: 203~204 °C)。

1.6 2-(3-芳基-4-氨基-1,2,4-均三唑)巯基乙酸乙酯(5)的合成

称取 14.4 g (0.075 mol) 4 和 3 g (0.075 mol) 氢氧化钠置于 250 mL 烧瓶中, 加水约 100 mL, 搅拌溶解, 在冰水浴中缓慢滴加 12 mL (0.1 mol) 氯乙酸乙酯和 20 mL 乙醇

的混合液, 约 3 h 滴完, 室温搅拌反应 4~5 h, 有白色固体生成。抽滤, 滤饼水洗 3 次, 用无水乙醇重结晶, 得白色固体粉末 5 13.6 g, 产率 79.6%. m.p. 201~203 °C(文献值^[8]: 203~204 °C)。

1.7 3-巯基-4-氨基-5-苯基-4H-1,2,4-三唑-乙酰胺(6)的合成

称取 10.82 g (0.04 mol) 5 于烧瓶中, 加入约 80 mL 甲醇, 搅拌溶解, 冰水浴下加入 80% 水合肼($\rho = 1.032 \text{ g/cm}^3$, 50.06 g/mol) 12 mL, 回流 6 h, 旋去部分溶剂, 冷却结晶, 抽滤, 滤饼用无水甲醇重结晶得白色片状晶体 6a 6.9 g, 产率 65.3%; m.p. 168~170 °C(文献值^[13]: 166~167 °C)。

1.8 5-(4-氨基-5-苯基-4H-1,2,4-三唑-3-巯烷基)-1,3,4-噁二唑-2-硫醇(7)的合成

称取 2.64 g (0.01 mol) 6, 加入 0.84 g (0.015 mol) 氢氧化钾和 30 mL 乙醇, 搅拌溶解。室温下滴加含 2 mL CS_2 的乙醇溶液 10 mL, 约 0.5 h 滴完, 加热回流 7 h。反应结束后, 旋去部分溶剂, 残留物倒入冰水中, 用盐酸调 pH 到 3~4, 有白色沉淀生成, 静置后抽滤, 滤饼用甲醇/DMF ($V/V = 3/1$) 重结晶, 得黄色针状晶体 7 2.2 g, 产率 71.9%. m.p. 192~194 °C; $^1\text{H NMR}$ (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 14.52 (s, 1H, SH), 8.01~7.99 (m, 2H, Ph-H),

7.53~7.62 (m, 3H, Ph-H), 6.25 (s, 2H, NH₂), 4.56 (s, 2H, CH₂), 4.42 (s, 2H, CH₂); ¹³C NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 178.35, 161.19, 154.89, 152.02, 130.41, 129.05, 128.29, 126.90, 25.54; ¹³C-dept135 NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 130.42, 129.45, 128.30, 25.53; IR (KBr) ν : 3030, 2938, 2572, 1610, 1501, 1475, 1340, 1138, 936, 771, 707 cm⁻¹; ESI-MS m/z : 307.1 [M+H]⁺, 329.1 [M+Na]⁺; HRMS calcd for C₁₁H₁₁N₆OS₂ [M+H]⁺ 307.0436, found 307.0432.

1.9 3-(5-苄基-1,3,4-噁二唑-2-基甲基硫基)-5-苯基-4-胺基-4H-1,2,4-三唑(A1)的合成

称取 0.2 g 化合物 7, 加入氢氧化钠 0.02611 g, 水 15 mL, 搅拌溶解, 冰水浴下滴加含 0.18 mL 间甲基苄氯的乙醇溶液 2 mL, 室温搅拌下产生沉淀, 抽滤, 滤饼用无水甲醇重结晶得白色针状晶体 A1, A2~A6 用类似方法制得.

A1: 产率 81%, 白色针状晶体. m.p. 176~181 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 8.32 (d, J =7.4 Hz, 2H, Ph-H), 7.57~7.52 (m, 3H, Ph-H), 7.29 (s, 3H, Ph-H), 7.16~7.14 (m, 1H, Ph-H), 4.54 (s, 2H, NH₂), 3.50 (s, 4H, CH₂), 2.36 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 166.13, 138.80, 134.25, 130.42, 129.88, 129.27, 128.91, 128.86, 126.39, 126.20, 125.60, 50.81, 38.39, 21.36; IR (KBr) ν : 3036, 2965, 1526, 1436, 1408, 1368, 1286, 1116, 991, 791, 706 cm⁻¹; ESI-MS m/z : 411.1 [M+H]⁺, 433.1 [M+Na]⁺; HRMS calcd for C₉H₁₉N₆OS₂ [M+H]⁺ 411.1062, found 411.1059.

A2: 产率 74%, 米白色晶体. m.p. 133~135 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 8.05~8.04 (m, 2H, Ph-H), 7.47~7.34 (m, 3H, Ph-H), 7.28~7.11 (m, 4H, Ph-H), 5.48 (s, 2H, NH₂), 4.40~4.38 (s, 2H, CH₂), 3.99 (s, 2H, CH₂), 2.32 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 165.60, 164.47, 138.07, 131.98, 130.38, 129.51, 129.08, 129.00, 128.59, 128.37, 126.36, 125.99, 36.57, 28.07, 21.15; IR (KBr) ν : 3338, 3184, 1584, 1481, 1451, 1207, 1156, 977, 747, 722 cm⁻¹; ESI-MS m/z : 411.1 [M+H]⁺, 433.1 [M+Na]⁺; HRMS calcd for C₉H₁₉N₆OS₂ [M+H]⁺ 411.1062, found 411.1059.

A3: 产率 81%, 白色粉末. m.p. 119~122 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 8.31~8.05 (m, 2H, Ph-H), 7.47~7.40 (m, 3H, Ph-H), 7.34 (d, J =7.6 Hz, 1H, Ph-H), 7.43~7.13 (m, 3H, Ph-H), 5.47 (s, 2H, NH₂), 4.45 (s, 2H, CH₂), 4.42 (s, 2H, CH₂), 2.40 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 165.62, 164.52, 155.01, 137.12, 132.57, 130.78, 130.40, 130.24, 128.66, 128.38, 126.42,

126.39, 126.01, 35.11, 28.22, 19.17; IR (KBr) ν : 3317, 3193, 1579, 1480, 1456, 1407, 1200, 1152, 966, 770, 729 cm⁻¹; ESI-MS m/z : 411.1 [M+H]⁺, 433.1 [M+Na]⁺. HRMS calcd for C₁₉H₁₉N₆OS₂ [M+H]⁺ 411.1062, found 411.1059.

A4: 产率 84%, 黄色晶体. m.p. 161~163 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 8.05~8.03 (m, 2H, Ph-H), 7.47~7.45 (m, 3H, Ph-H), 5.46 (s, 2H, NH₂), 4.42 (s, 2H, CH₂), 4.42 (s, 2H, CH₂), 2.66 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 166.65, 164.52, 130.30, 128.33, 128.16, 126.31, 126.17, 28.16, 14.52; ¹³C-dept135NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 125.55, 123.82, 123.58, 23.41, 9.77; IR (KBr) ν : 3248, 3116, 1579, 1479, 1453, 1321, 1146, 974, 767, 693 cm⁻¹; ESI-MS m/z : 321.1 [M+H]⁺, 343.1 [M+Na]⁺. HRMS calcd for C₁₂H₁₃N₆OS₂ [M+H]⁺ 321.0592, found 321.0590.

A5: 产率 77.3%, 白色针状晶体. m.p. 156~157 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 8.05~8.03 (m, 2H, Ph-H), 7.52~7.46 (m, 3H, Ph-H), 5.48 (s, 2H, NH₂), 4.42 (s, 2H, SCH₂), 4.20 (q, J =10.6 Hz, 2H, CH₂CH₃), 3.99 (s, 2H, CH₂CO), 1.27 (t, J =7.1 Hz, 3H, CH₃); ¹³C NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 167.34, 164.86, 164.51, 130.44, 128.92, 128.62, 128.37, 126.25, 125.86, 67.99, 62.53, 34.21, 27.93, 25.61, 14.06; IR (KBr) ν : 2981, 2934, 1734, 1561, 1487, 1473, 1190, 782, 706 cm⁻¹; ESI-MS m/z : 393.0 [M+H]⁺, 415.0 [M+Na]⁺. HRMS calcd for C₁₅H₁₇N₆O₃S₂ [M+H]⁺ 393.0804, found 393.0800.

A6: 产率 79.8%, 黄色晶体. m.p. 171~172 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 8.07~8.05 (m, 2H, Ph-H), 7.55~7.48 (m, 2H, Ph-H), 7.40 (s, 1H, Ph-H), 7.38~7.34 (m, 2H, Ph-H), 7.33 (s, 1H, Ph-H), 7.30 (d, J =9.1 Hz, 2H, Ph-H), 5.46 (s, 2H, NH₂), 4.42 (s, 2H, SCH₂Ph), 4.41 (s, 2H, SCH₂); ¹³C NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 165.54, 164.52, 135.09, 130.51, 129.14, 129.10, 129.00, 128.90, 128.84, 128.64, 128.43, 128.20, 3.674, 28.21; IR (KBr) ν : 3303, 3170, 1578, 1478, 1454, 1153, 767, 693 cm⁻¹; ESI-MS m/z : 397.0 [M+H]⁺, 419.0 [M+Na]⁺. HRMS calcd for C₁₈H₁₇N₆OS₂ [M+H]⁺ 397.0905, found 397.0903.

1.10 5-(4-苄基氨基-5-苯基-4H-1,2,4-三唑-3-硫烷基)-1,3,4-噁二唑-2-硫醇(B1)的合成

称取 0.2 g 化合物 7, 加入苯甲醛约 0.1 g, 加入乙酸 15 mL, 加热回流 1.5 h. 冷却析出固体, 抽滤, 滤饼用甲醇/DMF ($V/V=2/1$)重结晶得白色固体 B1, B2~B15 用类似方法制得.

B1: 产率 85%, 米白色固体. m.p. 165~167 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 14.52 (s, 1H, SH), 9.72 (s, 1H, N=CH), 7.66~7.60 (m, 2H, Ph-H), 7.58~7.56 (m, 2H, Ph-H), 7.55~7.53 (m, 2H, Ph-H), 7.53~7.52 (m, 2H, Ph-H), 7.51 (d, $J=1.6$ Hz, 2H, Ph-H), 4.46 (s, 2H, CH₂); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 178.41, 170.28, 167.39, 162.84, 160.66, 134.01, 129.80, 129.72, 129.33, 129.19, 128.72, 128.339, 27.867; IR (KBr) ν : 3056, 2737, 1572, 1541, 1451, 1339, 1159, 937, 757, 687 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 395.1 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 417.1 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{15}\text{N}_6\text{OS}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 395.0749, found 395.0745.

B2: 产率 79%, 橘红色针状晶体. m.p. 205~208 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 14.49 (s, 1H, SH), 8.89 (s, 1H, N=CH), 7.87~7.79 (m, 6H, Ph-H), 7.53~7.51 (m, 3H, Ph-H), 4.44 (s, 2H, CH₂); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 178.38, 169.08, 160.64, 151.83, 145.01, 132.95, 131.44, 130.91, 130.72, 129.35, 128.37, 127.88, 126.56, 27.97; IR (KBr) ν : 3032, 2564, 1586, 1504, 1460, 1341, 1134, 937, 775, 696 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 473.0 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 495.0 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{BrN}_6\text{OS}_2$ 472.9854, found 472.9853.

B3: 产率 70%, 浅黄色粉末. m.p. 242~244 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 14.36 (s, 1H, SH), 10.07 (s, 1H, N=CH), 8.39 (s, 1H, Ph-H), 8.37 (s, 1H, Ph-H), 8.16 (s, 1H, Ph-H), 8.14 (s, 1H, Ph-H), 7.72 (d, $J=5.8$ Hz, 2H, Ph-H), 7.56 (s, 3H, Ph-H), 4.122 (s, 2H, CH₂); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 163.87, 162.77, 150.08, 149.36, 138.29, 131.29, 130.27, 129.23, 128.88, 125.73, 124.79; IR (KBr) ν : 3110, 2736, 1517, 1500, 1446, 1347, 1270, 964, 765, 685 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 440.1 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 462.3 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{N}_7\text{O}_3\text{S}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 440.0600, found 440.0598.

B4: 产率 84%, 黄色片状晶体. m.p. 213~215 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 14.32 (s, 1H, SH), 10.05 (s, 1H, N=CH), 8.65 (s, 1H, Ph-H), 8.44 (dd, $J=1.4, 1.5$ Hz, 1H, Ph-H), 8.33 (d, $J=7.8$ Hz, 1H, Ph-H), 7.89~7.83 (m, 3H, Ph-H), 7.57~7.54 (m, 3H, Ph-H), 3.26 (s, 2H, CH₂); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 164.89, 162.83, 150.96, 150.39, 149.29, 148.79, 134.92, 134.014, 131.44, 131.28, 129.21, 128.86, 127.35, 125.75, 123.39, 27.876; ^{13}C -dept135 NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 164.20, 134.92, 131.44, 131.28, 129.21, 128.86, 127.36, 123.40, 27.88; IR (KBr) ν : 3111, 2778, 1539, 1483, 1448, 1351, 1219, 973, 785, 717 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 440.1 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 462.3 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{N}_7\text{O}_3\text{S}_2$

$[\text{M}+\text{H}]^+$ 440.0599, found 440.0598.

B5: 产率 88%, 黄色晶体. m.p. 215~217 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 14.32 (s, 1H, SH), 10.52 (s, 1H, N=CH), 8.19 (dd, $J=1.2, 1.4$ Hz, 1H, Ph-H), 8.10 (dd, $J=1.5, 1.4$ Hz, 1H, Ph-H), 7.90~7.84 (m, 4H, Ph-H), 7.56~7.53 (m, 3H, Ph-H), 3.17 (s, 2H, CH₂); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 163.77, 162.82, 160.96, 150.19, 149.56, 149.25, 134.62, 133.60, 131.24, 129.52, 129.16, 129.03, 126.97, 125.72, 125.42, 27.88; ^{13}C -dept135 NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 160.97, 134.62, 133.60, 131.24, 129.52, 129.16, 129.03, 125.42, 27.88; IR (KBr) ν : 3105, 2754, 1600, 1528, 1447, 1341, 1158, 971, 770, 688 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 440.1 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 462.3 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{N}_7\text{O}_3\text{S}_2$ 440.0599, found 440.0598.

B6: 产率 80.5%, 浅黄色固体. m.p. 205~208 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 14.49 (s, 1H, SH), 8.89 (s, 1H, N=CH), 8.02~7.98 (m, 2H, Ph-H), 7.85 (d, $J=3.6$ Hz, 2H, Ph-H), 7.51 (s, 3H, Ph-H), 7.43 (t, $J=2.6$ Hz, 2H, Ph-H), 4.428 (s, 2H, CH₂); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 178.38, 169.12, 160.64, 151.82, 144.99, 132.47, 132.38, 130.70, 129.36, 128.34, 126.57, 117.22, 116.99, 18.989; ^{13}C -dept135 NMR (DMSO, 400 MHz) δ : 169.12, 132.47, 130.70, 129.35, 128.34, 117.23, 18.99; IR (KBr) ν : 3063, 2730, 1600, 1509, 1453, 1341, 1157, 937, 768, 690 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 412.9 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 434.9 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{FN}_6\text{OS}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 413.0655, found 413.0651.

B7: 产率 80%, 浅黄色固体. m.p. 205~208 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 14.51 (s, 1H, SH), 8.91 (s, 1H, N=CH), 7.95 (s, 1H, Ph-H), 7.93 (s, 1H, Ph-H), 7.85 (s, 2H, Ph-H), 7.67 (s, 1H, Ph-H), 7.65 (s, 1H, Ph-H), 7.51 (s, 3H, Ph-H), 4.45 (s, 2H, CH₂); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 178.38, 168.93, 160.64, 151.84, 145.01, 138.77, 131.35, 130.71, 130.59, 130.01, 129.35, 128.37, 126.56, 27.98; ^{13}C -dept135 NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 168.93, 131.35, 130.71, 130.01, 129.35, 128.37, 27.98; IR (KBr) ν : 3035, 2565, 1595, 1505, 1461, 1341, 1135, 937, 776, 696 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 429.0 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 451.0 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{ClN}_6\text{OS}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 429.0359, found 429.0357.

B8: 产率 76%, m.p. 88~90 °C, 白色针状晶体; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 14.52 (s, 1H, SH), 8.86 (s, 1H, N=CH), 7.88~7.86 (m, 2H, Ph-H), 7.52~7.46 (m, 6H, Ph-H), 7.27~7.24 (m, 1H, Ph-H), 4.46 (s, 2H, CH₂), 3.84 (s, 3H, CH₃); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ :

178.19, 169.99, 160.67, 160.15, 151.81, 145.02, 133.07, 130.98, 130.67, 129.33, 128.34, 126.62, 113.61, 55.89, 27.88; IR (KBr) ν : 3102, 2578, 1596, 1500, 1463, 1341, 1137, 937, 785, 702 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 425.1 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 447.1 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{17}\text{N}_6\text{O}_2\text{S}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 425.0854, found 425.0856.

B9: 产率 82%, 黄色固体. m.p. 193~195 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 14.52 (s, 1H, SH), 8.86 (s, 1H, N=CH), 7.88~7.86 (m, 2H, Ph-H), 7.52~7.46 (m, 6H, Ph-H), 7.27~7.24 (m, 1H, Ph-H), 4.46 (s, 2H, CH_2), 3.84 (s, 3H, CH_3); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 178.19, 169.99, 160.67, 160.15, 151.81, 145.02, 133.07, 130.98, 130.67, 129.33, 128.34, 126.62, 113.61, 55.89, 27.88; IR (KBr) ν : 2922, 2572, 1578, 1503, 1561, 1382, 1146, 934, 773, 696 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 455.1 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 477.1 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{FN}_6\text{O}_3\text{S}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 455.0960, found 455.0956.

B10: 产率 75%, 黄色粉末. m.p. 196~199 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 14.450 (s, 1H, SH), 8.81 (s, 1H, N=CH), 7.96 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, Ph-H), 7.86~7.84 (m, 2H, Ph-H), 7.51~7.49 (m, 3H, Ph-H), 6.71 (s, 0.50H, Ph-H), 6.69 (s, 1.5H, Ph-H), 4.45 (s, 2H, CH_2), 3.88 (s, 3H, CH_3), 3.84 (s, 3H, CH_3); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 178.39, 165.99, 164.47, 161.94, 160.72, 151.71, 144.99, 130.46, 129.41, 129.25, 128.29, 126.87, 112.63, 107.90, 98.79, 56.62, 56.29, 27.43; IR (KBr) ν : 3006, 2594, 1595, 1504, 1453, 1434, 1344, 1160, 920, 793, 719 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 455.1 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 477.1 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{FN}_6\text{O}_3\text{S}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 455.0960, found 455.0956.

B11: 产率 85.7%, 米黄色针状晶体. m.p. 205~207 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 14.49 (s, 1H, SH), 8.72 (s, 1H, N=CH), 8.02 (d, $J=7.2$ Hz, 2H, Ph-H), 7.52 (s, 1H, Ph-H), 7.50 (s, 2H, Ph-H), 6.34 (s, 2H, Ph-H), 4.51 (s, 2H, CH_2), 3.36~3.89 (s, 9H, OCH_3); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 178.34, 166.04, 163.49, 162.37, 160.82, 151.31, 144.64, 130.32, 129.12, 128.10, 126.99, 101.86, 31.67, 56.82, 56.30, 26.780, 19.02; ^{13}C -dept135 NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 163.49, 130.33, 129.12, 128.10, 91.66, 56.82, 56.30, 26.79; IR (KBr) ν : 3007, 2559, 1576, 1502, 1467, 1335, 1134, 926, 784, 701 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 485.1 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 507.1 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{21}\text{H}_{21}\text{FN}_6\text{O}_4\text{S}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 485.1066, found 485.1060.

B12: 产率 74.6%, 黄色粉末. m.p. 188~191 $^{\circ}\text{C}$; ^1H

NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 14.49 (s, 1H, SH), 9.06 (s, 1H, N=CH), 8.04 (d, $J=4.6$ Hz, 1H, Ph-H), 7.85~7.82 (m, 3H, Ph-H), 7.51 (s, 3H, Ph-H), 7.31~7.29 (m, 1H, Ph-H), 4.47 (s, 2H, CH_2); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 178.38, 163.97, 160.65, 151.71, 144.99, 130.46, 129.41, 129.24, 128.29, 126.87, 126.59, 27.59; ^{13}C -dept135 NMR (DMSO , 400 MHz) δ : 151.73, 150.03, 130.46, 129.22, 129.21, 128.26, 126.83, 126.59, 27.59; IR (KBr) ν : 3111, 2451, 1586, 1502, 1455, 1344, 1141, 910, 762, 694 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 401.0 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 423.0 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{13}\text{N}_6\text{OS}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 401.0313, found 401.0312.

B13: 产率 82.6%, 白色棒状晶体. m.p. 116~118 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 14.49 (s, 1H, SH), 9.076 (s, 1H, N=CH), 8.09 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, Ph-H), 7.88~7.81 (m, 3H, Ph-H), 7.63 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, Ph-H), 7.55~7.53 (m, 3H, Ph-H), 4.48 (s, 2H, CH_2); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 167.38, 158.03, 157.4, 155.84, 148.01, 134.77, 134.35, 130.91, 130.19, 130.01, 129.35, 128.77, 128.56, 128.33, 27.98; ^{13}C -dept135 NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 168.93, 131.35, 130.71, 130.01, 129.35, 128.37, 27.93; IR (KBr) ν : 3058, 2569, 1583, 1471, 1451, 1347, 1155, 936, 770, 715 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 462.9 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 485.0 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{13}\text{Cl}_2\text{N}_6\text{OS}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 462.9969, found 462.9967.

B14: 产率 89%, 黄色片状晶体. m.p. 136~138 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 14.34 (s, 1H, SH), 9.04 (s, 1H, N=CH), 8.00~7.98 (m, 1H, Ph-H), 8.09 (dd, $J=1.5, 1.9$ Hz, 2H, Ph-H), 7.83~7.81 (m, 1H, Ph-H), 7.75~7.65 (m, 2H, Ph-H), 7.63 (s, 2H, Ph-H), 4.545 (s, 2H, CH_2); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 164.80, 162.58, 160.73, 159.53, 149.79, 135.20, 135.11, 133.55, 131.22, 130.21, 130.13, 129.35, 129.29, 128.93, 127.82, 27.56; ^{13}C -dept135 NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 164.81, 159.53, 133.56, 131.22, 130.21, 129.36, 128.93, 127.82, 27.55; IR (KBr) ν : 3070, 2744, 1610, 1577, 1475, 1431, 1339, 1150, 941, 778, 690 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 462.1 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 484.1 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{13}\text{Cl}_2\text{N}_6\text{OS}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 462.9969, found 462.9967.

B15: 产率 87.5%, 黄色固体. m.p. 157~159 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 14.29 (s, 1H, SH), 9.86 (s, 1H, N=CH), 8.20~8.14 (m, 1H, Ph-H), 8.11 (d, $J=1.8$ Hz, 1H, Ph-H), 8.06 (dd, $J=1.9, 1.4$ Hz, 1H, Ph-H), 7.90~7.87 (m, 3H, Ph-H), 7.85 (s, 2H, Ph-H), 4.55 (s, 2H, CH_2); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 164.09, 162.84,

149.22, 136.67, 135.79, 133.12, 132.69, 132.06, 131.77, 131.25, 130.71, 129.20, 128.82, 128.44, 127.86, 28.23; ^{13}C -dept135 NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 164.81, 132.07, 131.26, 130.71, 129.20, 128.82, 128.77, 28.22; IR (KBr) ν : 3063, 2740, 1609, 1550, 1472, 1449, 1347, 1131, 929, 767, 690 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 462.1 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 484.1 $[\text{M}+\text{Na}]^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{13}\text{Cl}_2\text{N}_6\text{OS}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 462.9969, found 462.9967.

2 结果与讨论

在目标化合物 **B1**~**B15** 合成的最后一步中很多文献采用盐酸或醋酸作为催化剂, 乙醇作为反应溶剂, 但是这种方法的反应时间较长, 本实验用醋酸做溶剂, 大大缩短了反应的时间.

化合物 **A1**~**A6** 的 IR 谱中, 以化合物 **A2** 为例: 3338 和 3184 cm^{-1} 处的宽峰为 NH_2 的伸缩振动吸收峰; 1584 cm^{-1} 为苯环的骨架振动吸收峰; 1481 和 1451 cm^{-1} 为两个 CH_2 的弯曲振动吸收峰. ^1H NMR 谱中, 以化合物 **A4** ($\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{N}_6\text{OS}_2$) 为例: δ 8.05~7.28 为苯环上氢的化学位移; δ 5.46 处的单峰为 NH_2 化学位移值; δ 4.42 处的单峰是与 SCH_2 中氢的化学位移值; δ 2.66 处的单峰是 SCH_3 上质子的化学位移值.

化合物 **B1**~**B15** 的 IR 谱中, 以化合物 **B4** 为例: 3111 cm^{-1} 处为 NH 的伸缩振动吸收峰; 2778 cm^{-1} 处为 SH 的伸缩振动吸收峰; 1613 cm^{-1} 处为 $\text{C}=\text{N}$ 的伸缩振动吸收峰; 1539 cm^{-1} 处为苯环的骨架振动吸收峰; 1483 cm^{-1} 处为 CH_2 的弯曲振动吸收峰. ^1H NMR 谱中, 以化合物 **B6** ($\text{C}_{18}\text{H}_{13}\text{FN}_6\text{OS}_2$) 为例: δ 14.50 处的小宽峰为 SH 上氢的化学位移值; δ 8.89 处的单峰为 $\text{N}=\text{CH}$ 中氢的化学位移值; δ 8.02~7.41 为苯环上氢的化学位移; δ 4.43 处的单峰是与 SCH_2 中氢的化学位移值.

通过分析目标化合物 **A1** 的高分辨质谱数据, 由于其 $[\text{M}+\text{H}]^+$ 峰分子量的计算值为 411.1062, 而测量值为 411.1059, 误差在允许的范围内, 进一步证明了其结构的正确性.

References

- [1] Sun, Y. R.; Li, Y. P.; Liu, C. J.; Wang, J. D. *Chin. J. Org. Chem.* **2008**, 28(1), 151 (in Chinese). (孙燕荣, 李燕萍, 刘晨江, 王吉德, 有机化学, **2008**, 28(1), 151.)
- [2] Sun, W. L.; Li, Y. P.; Liu, C. J.; Li, H. L. *Chin. J. Appl. Chem.* **2009**, 26(8), 894 (in Chinese). (孙文理, 李燕萍, 刘晨江, 李海龙, 应用化学, **2009**, 26(8), 894.)
- [3] Hu, G. Q.; Dong, X. L.; Xie, S. Q.; Huang, W. L. *Acta Pharm. Sin.* **2008**, 43(1), 50 (in Chinese). (胡国强, 董秀丽, 谢松强, 黄文龙, 药学学报, **2008**, 43(1), 50.)
- [4] Yang, G. F.; Yang, H. Z. *Acta Chin. Sinica* **2001**, 59(4), 447 (in Chinese). (杨光富, 杨华铮, 化学学报, **2001**, 59(4), 447.)
- [5] Joshi, S. D.; Vagdevi, H. M.; Vaidya, V. P.; Gadaginamath, G. S. *Eur. J. Med. Chem.* **2008**, 43, 1989.
- [6] Zhang, C. R.; Wang, L.; Ge, Y. L.; Ju, X. L. *Chin. J. Org. Chem.* **2007**, 27, 1432 (in Chinese). (张成仁, 王柳, 葛燕丽, 巨修练, 有机化学, **2007**, 27, 1432.)
- [7] Omar, F. A.; Mahfouz, N. M.; Rahman, M. A. *Eur. J. Med. Chem.* **1996**, 31, 819.
- [8] Zareef, M.; Iqbal, R.; Mirza, B.; Khan, K. M.; Manan, A.; Asim, F.; Khan, S. W. *ARKIVOC* **2008**, (ii), 141.
- [9] Salomao, D. J.; Andrea, M.; Carlota Oliveira, R. Y.; Kerly Fernanda, M. P.; Leoberto, C. T. *Bioorg. Med. Chem.* **2009**, 17, 3028.
- [10] Eweiss, N. F.; Bahajaj, A. A.; Elsherbini, E. A. *J. Heterocycl. Chem.* **1986**, 23, 1451.
- [11] Li, Y.; Liu, J.; Zhang, H. Q.; Yang, X. P.; Liu, Z. J. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2006**, 16, 2278.
- [12] Prasanta, K. S.; Rajesh, S.; Priyabrata, P. *Med. Chem. Res.* **2010**, 19, 127.
- [13] Wu, X. L.; Zhu, C. F.; Lu, Z. D. *Chin. J. Org. Chem.* **2011**, 31, 824 (in Chinese). (武现丽, 朱春风, 吕志丹, 有机化学, **2011**, 31, 824.)

(Cheng, F.)