水相中铜催化含氮杂环化合物的 *N*-芳基化反应

张敬先 殷慧清 韩世清*

(南京工业大学生物与制药工程学院 南京 211816)

摘要 在水相中建立了一种简单实用、经济环保的实现含氮杂环化合物 *N*-芳基化反应的催化体系. 实验发现以廉价的 Cu_2O 为催化剂, 价廉、易获得的 8-羟基喹啉为配体, *n*- Bu_4NBr 为相转移催化剂, 在水相中 100 °C 下含氮杂环化合物与卤代芳烃顺利反应生成 C—N 偶联产物, 得到中等及优良的产率.

关键词 铜催化; 氮杂环化合物; *N*-芳基化; 水相

Copper-Catalyzed *N*-Arylations of Nitrogen-Containing Heterocycles in Water

Zhang, Jingxian Yin, Huiqing Han, Shiqing*

(College of Biotechnology and Pharmaceutical Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing 211816)

Abstract A simple, efficient, inexpensive and powerful method for the C—N coupling of nitrogen-containing heterocycles with aryl halides was developed by using cheap Cu_2O as catalyst, inexpensive and readily available 8-hydroxyquinoline as ligand, *n*- Bu_4NBr as phase transfer catalyst, water as solvent at 100 °C. Most products were synthesized in good to excellent yields.

Keywords copper-catalyst; nitrogen-containing heterocycles; *N*-arylation; aqueous media

芳香 C—N 键构建是有机化学重要的研究领域之一, 含 *N*-芳基化结构的化合物广泛存在于生物化学、药物化学以及材料科学等领域^[1]. 比如, 含氮杂环化合物具有抗过敏、抑制 COX-2 等生物活性, 也是具有生物活性化合物合成的重要中间体^[2]. 早期构建 C—N 键的 Ullmann 反应具有反应温度高、需要过量的铜试剂、反应时间长、官能团容忍性差、污染严重等缺点, 限制了反应的应用范围. 后来, Buchwald 小组^[3]和马大为小组^[4]分别报道了以邻菲咯啉类、邻二胺类和氨基酸类化合物为配体, 较低温度下很好地实现了铜催化含氮杂环化合物的 *N*-芳基化, Ullmann 偶联反应进入了配位催化的时代. 随着各种新配体的不断开发, 催化效果越来越好, 但是这些过程大都使用 DMF, DMSO 等有机溶剂为反应介质, 而有机溶剂具有毒性、挥发性、难以回收等缺点, 容易造成环境污染和对人体的伤害. 从绿色化学的角度, 需要探索使用对环境友好的反应介质, 而水是最经济环保的溶剂. 然而, 在水相中合成有机分子面临

许多的挑战, 如催化剂、配体通常在水中的耐受性差、反应底物的溶解性和活性差等问题需要克服. 2009 年, 万一千小组^[5]利用微波加热促进水相中伯胺和咪唑的 *N*-芳基化反应, 该反应体系配体使用量大以及温度高; 周向葛小组^[6]在水相中铜催化咪唑的 *N*-芳基化反应, 反应中使用的配体结构复杂, 不易获得, 底物适用范围不够广泛. 2010 年, 印度 Nageswar 小组^[7]在水相中实现了铜催化含氮杂环化合物的 *N*-芳基化反应, 反应体系使用了价格昂贵的反式-1,2-环己二胺为配体; 魏俊发小组^[8]研究了水相中无配体条件下铜催化卤代芳烃的氨基化, 该体系只适用于脂肪伯胺, 对仲胺、芳胺没有效果; 2011 年, Teo 小组^[9]报道了水相中无配体, 相转移催化下, 铜催化吡啶、吡咯、咪唑与碘代芳烃的 C—N 偶联反应, 该体系减低了毒性及污染, 但反应温度高(130 °C), 目标产物收率低. 本文报道一种反应条件温和、实用和经济环保的铜催化含氮杂环化合物的 *N*-芳基化反应体系: 在水相中使用 Cu_2O 为催化剂, 价廉易得的 8-

* E-mail: hanshiqing@njut.edu.cn

Received May 16, 2012; revised June 7, 2012; published online June 20, 2012.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 20942006, 21072095).

国家自然科学基金(Nos. 20942006, 21072095)资助项目.

羟基喹啉为配体, $n\text{-Bu}_4\text{NBr}$ 为相转移催化剂, $100\text{ }^\circ\text{C}$ 下实现含氮杂环化合物的 N -芳基化反应, 获得了满意的结果.

1 结果与讨论

1.1 反应条件的优化

我们尝试使用 1 mmol 碘苯与 1.2 mmol 吡唑的反应作为模板反应(如图 1 所示), N_2 气氛下, $100\text{ }^\circ\text{C}$ 下搅拌 24 h , 在水相中探索催化剂、配体、助剂和碱对反应的影响, 按照第 3.2 节所述的实验方法, 反应条件优化结果见表 1. 在不加配体和无相转移催化剂时反应不能发生(Entry 1); 没有相转移试剂, 只加配体 **D** 时反应也不能发生(Entry 2); 无配体加相转移催化剂 $n\text{-Bu}_4\text{NBr}$ 时产物收率只有 11% (Entry 3). 在相转移催化剂存在下所选用的 4 种结构简单价廉的配体中(Entries 4~7), 8-羟基喹啉的催化效果最好(90%); 对常用的无机碱 KOH (Entry 7), K_3PO_4 (Entry 8)和 K_2CO_3 (Entry 9)的考察实验, 结果显示使用 KOH 产率最好; 各种铜盐(Entries 7, 10~15)的筛选实验结果表明 Cu_2O 的催化效果最好.

图 1 模板反应

Figure 1 Model reaction

表 1 铜催化碘苯与吡唑的偶联反应的条件优化^a

Table 1 Copper-catalyzed coupling of iodobenzene with imidazole: optimization of conditions

Entry	Catalyst (mol%)	Ligand	$n\text{-Bu}_4\text{NBr/mol}\%$	Base	Yield ^b /%
1	Cu_2O (5)	—	—	KOH	0
2	Cu_2O (5)	D	—	KOH	0
3	Cu_2O (5)	—	10	KOH	11
4	Cu_2O (5)	A	10	KOH	18
5	Cu_2O (5)	B	10	KOH	60
6	Cu_2O (5)	C	10	KOH	48
7	Cu_2O (5)	D	10	KOH	90
8	Cu_2O (5)	D	10	K_3PO_4	46
9	Cu_2O (5)	D	10	K_2CO_3	33
10	CuI (10)	D	10	KOH	72
11	CuCl (10)	D	10	KOH	81
12	$\text{Cu}(\text{OAc})_2$ (10)	D	10	KOH	64
13	Cu (10)	D	10	KOH	36
14	CuO (10)	D	10	KOH	52
15	$\text{Cu}(\text{OH})_2$ (10)	D	10	KOH	21
16	Cu_2O (5)	D	25	KOH	90
17	Cu_2O (5)	D	10	KOH	39 ^c

^a 反应条件: 碘苯(1.0 mmol), 吡唑(1.2 mmol), 铜盐(0.1 mmol), 配体(0.2 mmol), 碱(2.0 mmol), 水(2.0 mL), N_2 , $100\text{ }^\circ\text{C}$, 24 h ; ^b 分离产率; ^c 空气中.

1.2 氮杂环化合物与卤代芳烃的偶联反应

模板反应的条件筛选得到的优化条件是: 卤代芳烃 **1** (1.0 mmol), 氮杂环化合物 **2** (1.2 mmol), Cu_2O ($5\text{ mol}\%$), KOH (2.0 mmol), $n\text{-Bu}_4\text{NBr}$ ($10\text{ mol}\%$), 配体 8-羟基喹啉($20\text{ mol}\%$), N_2 氛围下, 在 2 mL 水中 $100\text{ }^\circ\text{C}$ 反应 24 h . 为了探索该催化体系的适用范围, 我们选择了一系列的卤代芳烃与各种含氮杂环化合物进行反应, 得到的结果见表 2. 从表 2 可以看出: 碘代芳烃均可较高产率的得到产物; 而用溴苯代替碘苯在目前的反应条件下, 只发现痕量的偶联产物(Entry 15), 用含有吸电子基的溴代芳烃时可以中等产率的得到目标产物(Entry 16).

2 结论

本文发展了一种在安全、无毒的水介质中, 使用廉价的 Cu_2O , 结构简单易得的 8-羟基喹啉配体, 添加少量相转移催化剂($n\text{-Bu}_4\text{NBr}$)催化含氮杂环化合物的 N -芳基化反应. 该催化体系条件温和, 副反应少, 产物的后处理方便; 避免了使用有机溶剂造成环境污染和对人体的伤害.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

核磁共振仪: Bruker AM 300, 以 TMS 为内标, 氘代氯仿为溶剂; 熔点仪用 WRS-2A, 温度未校正; Elementar Vario ELII 型元素分析仪. 所用的药品和试剂均为市售的分析纯或化学纯, 除特别说明外, 未经进一步处理.

表2 水相中铜催化含氮杂环与卤代芳烃的偶联反应^aTable 2 Copper-catalyzed *N*-arylation of nitrogen-containing heterocycles with aryl halides

Entry	Compd. 1	Compd. 2	Product 3	Yield ^b /%
1	1a	2a	3a	90
2	1b	2a	3b	83
3	1c	2a	3c	86
4	1a	2b	3d	80
5	1d	2b	3e	62
6	1b	2b	3f	72
7	1c	2b	3g	77
8	1e	2b	3h	73
9	1a	2c	3i	78
10	1b	2c	3j	70
11	1c	2c	3k	75

续表

Entry	Compd. 1	Compd. 2	Product 3	Yield ^b /%
12	1e	2c	3l	72
13	1a	2d	3m	78
14	1f	2d	3n	81
15	1g	2b	3d	Trace
16	1h	2b	3o	58
17	1a	2e	3p + 3p'	63 (6 : 1) ^c

^a 反应条件: 卤代芳烃(1.0 mmol), 氮杂环(1.2 mmol), Cu₂O (0.05 mmol), 配体 L (0.2 mmol), KOH (2.0 mmol), 水(2.0 mL), N₂, 100 °C, 24 h; ^b 分离产率; ^c GC-MS 分析.

3.2 实验方法

将卤代芳烃 **1** (1.0 mmol), 氮杂环化合物 **2** (1.2 mmol), 铜盐(10 mol%), 碱(2.0 mmol), 四丁基溴化铵(TBAB) (10 mol%), 配体 L (20 mol%), 2 mL 水, 投入到 25 mL 容器中. N₂ 气氛中, 100 °C 下搅拌 24 h 后, 自然降至室温, 加入 10 mL H₂O, 用 10 mL × 3 乙酸乙酯萃取, 合并乙酸乙酯相, 用 5 mL 饱和食盐水洗涤, 有机层经无水硫酸钠干燥, 浓缩, 上硅胶柱层析分离, 石油醚/乙酸乙酯为洗脱剂.

3.3 产物结构表征

N-苯基吡唑(**3a**): 淡黄色油状液体^[10]. ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ: 7.83 (s, 1H), 7.64 (d, *J*=8.3 Hz, 3H), 7.33 (t, *J*=8.3 Hz, 2H), 7.21 (t, *J*=7.1 Hz, 1H), 6.37 (s, 1H); ¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) δ: 141.1, 140.2, 129.4, 126.8, 119.2, 107.6.

N-(4-甲氧基苯基)吡唑(**3b**): 淡黄色油状液体^[10]. ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ: 7.76 (d, *J*=2.3 Hz, 1H), 7.61 (s, 1H), 7.53 (d, *J*=8.3 Hz, 2H), 6.91 (d, *J*=8.3 Hz, 2H), 6.37 (s, 1H), 3.70 (s, 3H); ¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) δ: 157.5, 140.2, 133.4, 127.3, 119.9, 114.5, 107.2, 55.3.

N-(4-甲基苯基)吡唑(**3c**): 淡黄色油状液体^[10]. ¹H

NMR (300 MHz, CDCl₃) δ: 7.83 (d, *J*=2.3 Hz, 1H), 7.62 (s, 1H), 7.52 (d, *J*=8.3 Hz, 2H), 7.2 (d, *J*=8.3 Hz, 2H), 6.37 (s, 1H), 2.33 (s, 3H); ¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) δ: 140.7, 138, 136.1, 126.7, 129.9, 119.1, 107.3, 20.9.

N-苯基咪唑(**3d**): 淡黄色油状液体^[11]. ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ: 7.83 (s, 1H), 7.49~7.33 (m, 5H), 7.25 (br s, 1H), 7.18 (br s, 1H); ¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) δ: 137.5, 135.6, 130.3, 129.9, 127.5, 121.4, 118.3.

N-(2-甲基苯基)咪唑(**3e**): 淡黄色油状液体^[12]. ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ: 7.60 (br s, 1H), 7.37~7.28 (m, 3H), 7.24~7.20 (m, 2H), 7.05 (br s, 1H), 2.19 (s, 3H); ¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) δ: 148.3, 138.3, 135.6, 130.8, 130.1, 118.4, 114.1, 111.1, 11.7.

N-(4-甲氧基苯基)咪唑(**3f**): 淡黄色固体, m.p. 120~121 °C (lit.^[11] m.p. 121~122 °C); ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ: 7.72 (s, 1H), 7.29 (d, *J*=9.2 Hz, 2H), 7.14 (br s, 1H), 7.10 (br s, 1H), 6.95 (d, *J*=9.0 Hz, 2H), 3.83 (s, 3H); ¹³C NMR (75 MHz, CDCl₃) δ: 159.1, 135.7, 130.1, 130.6, 123.1, 122.8, 118.5, 114.6, 114.3, 55.2.

N-(4-甲基苯基)咪唑(**3g**): 淡黄色油状液体^[11]. ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ: 7.75 (s, 1H), 7.41~7.24 (m, 4H), 7.19 (br s, 1H), 7.13 (br s, 1H), 2.39 (s, 3H); ¹³C

NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 137.5, 135.4, 134.9, 130.3, 130.2, 121.3, 118.3, 20.9.

N-(3-甲基苯基)咪唑(**3h**): 淡黄色油状液体^[12]. ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 7.79 (s, 1H), 7.44~7.27 (m, 4H), 7.19 (s, 2H), 2.35 (s, 3H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 139.8, 137.4, 134.7, 130.2, 129.7, 129, 121.5, 116.5, 20.9.

N-苯基苯并咪唑(**3i**): 淡黄色油状液体^[11]. ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 8.08 (s, 1H), 7.82~7.88 (m, 1H), 7.42~7.60 (m, 6H), 7.47~7.3 (m, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 144, 142.1, 136.4, 133.7, 130, 127.7, 124, 123.5, 122.8, 122.6, 120.5, 110.7, 110.3.

N-(4-甲氧基苯基)苯并咪唑(**3j**): 淡黄色固体, m.p. 92~93 °C (lit.^[13] m.p. 94~95 °C); ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 8.07 (br s, 1H), 7.84~7.88 (m, 1H), 7.43~7.47 (m, 1H), 7.39 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 7.30~7.34 (m, 2H), 7.06 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 3.88 (s, 3H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 154, 146.5, 138.4, 133.8, 133.5, 130.5, 124.3, 123.6, 122.8, 122.6, 120.6, 110.6, 110.3, 55.2.

N-(4-甲基苯基)苯并咪唑(**3k**): 淡黄色油状液体^[11]. ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 8.03 (br s, 1H), 7.79~7.83 (m, 1H), 7.37~7.45 (m, 1H), 7.20~7.33 (m, 6H), 2.42 (s, 3H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 144, 142, 138, 134.1, 133.9, 130.5, 124, 123.6, 122.9, 122.7, 120.3, 110.1, 109.8, 20.9.

N-(3-甲基苯基)苯并咪唑(**3l**): 淡黄色油状液体^[13]. ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 8.05 (br s, 1H), 7.78~7.84 (m, 1H), 7.39~7.45 (m, 1H), 7.21~7.33 (m, 6H), 2.40 (s, 3H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 149, 145.6, 142, 138, 132, 130.5, 124, 123.6, 122.9, 122.7, 120.3, 110.1, 109.8, 20.5.

N-苯基咪唑(**3m**): 淡黄色油状液体^[3b]. ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 7.64 (d, $J=7.9$ Hz, 1H), 7.53~7.46 (m, 5H), 7.35~7.28 (m, 2H), 7.21~7.06 (m, 2H), 6.62 (d, $J=2.3$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 139.8, 135.7, 129.5, 129.1, 127.9, 126.5, 124.3, 122.3, 121.0, 120.5, 110.6, 103.5.

N-(4-硝基苯基)咪唑(**3n**): 黄色固体, m.p. 130~131 °C (lit.^[14] m.p. 130~132 °C); ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 8.43~8.39 (m, 2H), 7.72~7.63 (m, 4H), 7.40~7.36 (m, 1H), 7.31~7.20 (m, 2H), 6.79~6.77 (d, $J=3.8$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 148.2, 145.3, 144.2, 131, 125.6, 122.7, 120.2, 118, 111.4, 104.2.

4-(咪唑-1-基)苯乙酮(**3o**): 白色固体, m.p. 108~110 °C (lit.^[15] m.p. 110~112 °C); ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3)

δ : 8.03~8.08 (m, 2H), 7.94 (bs, 1H), 7.49~7.45 (m, 2H), 7.35 (s, 1H), 7.21 (bs, 1H), 2.61 (s, 3H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 196.5, 140.7, 135.7, 135.3, 131.1, 130.3, 120.6, 117.7, 26.6.

N-苯基-4-甲基-咪唑(**3p**)和 *N*-苯基-5-甲基-咪唑(**3p'**): 淡黄色油状液体^[16]. ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 7.49 (s, 1H), 7.46 (s, 1H), 7.39~7.16 (m, 5H), 6.96 (s, 1H), 6.79 (s, 1H), 2.32 (s, major regioisomer, 3H), 2.09 (s, minor regioisomer, 3H).

References

- [1] (a) Beletskaya, I. P.; Cheprakov, A. V. *Coord. Chem. Rev.* **2004**, 248, 2337.
(b) Beccalli, E. M.; Brogini, G.; Martinelli, M.; Sottocornola, S. *Chem. Rev.* **2007**, 107, 5318.
(c) Corbert, J. P.; Mignani, G. *Chem. Rev.* **2006**, 106, 2651.
(d) Ley, S. V.; Thomas, A. W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2003**, 42, 5400.
- [2] Sano, H.; Noguchi, T.; Tanatani, A.; Hashimoto, Y.; Miyachi, H. *Bioorg. Med. Chem.* **2005**, 13, 3079.
- [3] (a) Kiyomori, A.; Marcoux, J. F.; Buchwald, S. L. *Tetrahedron Lett.* **1999**, 40, 2657.
(b) Klapars, A.; Antilla, J. C.; Huang, X.; Buchwald, S. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, 123, 7727.
(c) Antilla, J. C.; Klapars, A.; Huang, X.; Buchwald, S. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2002**, 124, 11684.
(d) Strieter, E. R.; Bhayana, S. B.; Buchwald, S. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, 131, 78.
- [4] (a) Ma, D. W.; Zhang, Y. D.; Yao, J. C.; Wu, S. H.; Tao, F. G. *J. Am. Chem. Soc.* **1998**, 120, 12459.
(b) Ma, D. W.; Cai, Q.; Zhang, H. *Org. Lett.* **2003**, 5, 2453.
(c) Zhang, H.; Cai, Q.; Ma, D. W. *J. Org. Chem.* **2005**, 70, 5164.
- [5] Zhu, X. H.; Su, L.; Huang, L. Y.; Chen, G.; Wang, J. L.; Song, H. C.; Wan, Y. Q. *Eur. J. Org. Chem.* **2009**, 635.
- [6] (a) Wang, Y.; Wu, Z. Q.; Wang, L. X.; Li, Z. K.; Zhou, X. G. *Chem. Eur. J.* **2009**, 15, 8971.
(b) Liang, L.; Li, Z. K.; Zhou, X. G. *Org. Lett.* **2009**, 11, 3294.
- [7] Swapna, K.; Murthy, S. N.; Nageswar, Y. V. *Eur. J. Org. Chem.* **2010**, 34, 6678.
- [8] Jiao, J.; Zhang, X. R.; Chang, N. H.; Wang, J.; Wei, J. F. *J. Org. Chem.* **2011**, 76, 1180.
- [9] Yong, F. F.; Teo, Y. C.; Tay, S. H.; Lim, K. H. *Tetrahedron Lett.* **2011**, 52, 1161.
- [10] Correa, A.; Bolm, C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2007**, 46, 8862.
- [11] Kantam, M. L.; Venkanna, G. T.; Sridhar, C.; Sreedhar, B.; Choudary, B. M. *J. Org. Chem.* **2006**, 71, 9522.
- [12] Collman, J. P.; Zhong, M. *Org. Lett.* **2000**, 2, 1233.
- [13] Zhang, Z. J.; Mao, J. C.; Zhu, D.; Wu, F.; Chen, H. L.; Wan, B. S. *Tetrahedron* **2006**, 62, 4435.
- [14] Yang, K.; Qiu, Y. T.; Li, Z.; Wang, Z. Y.; Jiang, S. J. *J. Org. Chem.* **2011**, 76, 3151.
- [15] Liu, J. P.; Chen, J. B.; Zhao, J. F.; Zhao, Y. H.; Li, L.; Zhang, H. B. *Synthesis* **2003**, 2661.
- [16] Zhu, L. B.; Guo, P.; Lan, J. B.; Xie, R. G.; You, J. S. *J. Org. Chem.* **2007**, 72, 8535.

(Li, L.; Lu, Z.)