抗肿瘤活性四氢异喹啉类抗生素的生物合成研究进展

唐满成 唐功利*

(中国科学院上海有机化学研究所 生命有机化学国家重点实验室 上海 200032)

摘要 四氢异喹啉类生物碱因其独特的化学结构和良好的抗肿瘤活性, 长期以来备受化学家和生物学家的广泛关注. 特别是近十年来, 随着生物技术的不断进步, 有关这类抗生素生物合成的研究取得了突飞猛进的发展. 主要综述了该家族成员如 Safracin B, Saframycin A, Naphthyridinomycin, Quinocarcin, Ecteinasidin 743 等近年来生物合成研究的主要成果, 特别是有关这类化合物共有的核心结构四氢异喹啉环的前体来源和前体的生物合成途径, 以及四氢异喹啉环独特的形成机制.

关键词 四氢异喹啉生物碱; 四氢异喹啉环; 前体来源; 生物合成途径; Pictet-Spengler 反应

Biosynthetic Progress of the Tetrahydroisoquinoline Antitumor Antibiotics

Tang, Man-Cheng Tang, Gong-Li*

(State Key Laboratory of Bioorganic and Natural Products Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032)

Abstract Due to the unique chemical structures and antitumor activity, tetrahydroisoquinoline alkaloids have long been the focus of widespread concern of chemists and biologists. In particular, with the continuous progress of new biotechnology, the biosynthetic studies of this type of antibiotics have made rapid development over the past decade. In this paper, the main achievements of these studies are reviewed, including the biosynthesis of safracin B, saframycin A, naphthyridinomycin, quinocarcin, and ecteinascidin 743, especially the biosynthetic studies of their core tetrahydroisoquinoline ring structure, such as the core structure precursor resources, the biosynthetic pathway of these precursors, and the formation mechanism of the tetrahydroisoquinoline ring.

Keywords tetrahydroisoquinoline alkaloid; tetrahydroisoquinoline ring; precursor resource; biosynthetic pathway; Pictet-Spengler reaction

首例四氢异喹啉类生物碱 naphthyridinomycin (NDM)是由加拿大科学家 Kluepfel 等^[1]在 1974 年从土壤来源的葡萄牙链霉菌 *Streptomyces lusitanus* AYT-1206 中分离得到的. 迄今为止, 该家族已报道的成员有 60 余例^[2]. 根据这类化合物化学结构上的相似和差别, 可以分为 3 个亚家族: Saframycin 亚家族, 包含 Saframycins, Renieramycins, Safracins 和 Ecteinascidins 等, 其主要的结构特征是都含有 2 个四氢异喹啉环; Naphthyridinomycin 亚家族, 如 NDM, Bioxalomycins, Cyanocyclines, Dnacins 和 Aclindomycins 等, 该亚家族化合物只含有 1 个四氢异喹啉环, 但在复杂的并环体系中还含有 1 个四

氢噁唑环; Quinocarcin 亚家族是该家族中结构相对简单的一类化合物, 如 quinocarcin (QNC), tetrazomine 和 lemomycin 等, 这类化合物也只含有 1 个四氢异喹啉环, 并且它们的核心骨架结构仅由简单的 4 个六元环组成的并环体系构成. 尽管这三类亚家族化合物的骨架结构不完全相同, 但它们都具有四氢异喹啉家族成员典型的核心理结构特征(图 1B): 至少拥有 1 个由 4 个六元环构成的并环体系, 并且其中包含一个四氢异喹啉环结构单元.

研究表明, 该家族化合物除具有一定的抗菌活性外, 大多具有很强的抗肿瘤活性. 而其发挥抗肿瘤活性

* E-mail: gltang@sioc.ac.cn

Received July 5, 2012; revised July 18, 2012; published online July 29, 2012.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 81102337, 20832009) and the National Basic Research Program of China (No. 2012CB721100).

国家自然科学基金(Nos. 81102337, 20832009)和国家重点基础研究发展计划(No. 2012CB721100)资助项目.

图1 四氢异喹啉生物碱家族部分成员的化学结构(A)及核心特征结构(B)

Figure 1 Structures of the representative members of tetrahydroisoquinoline family natural products (A) and the core structures of this family (B)

主要是通过自身形成亚胺正离子或类似中间体对 DNA 进行烷基化修饰来实现的^[2]。其中, ecteinasidin 743 (ET-743)作为抗肿瘤活性最高的成员之一,目前已经在欧洲上市,主要用于软组织瘤患者的治疗^[3]。由于该家族化合物良好的生物活性和独特的化学结构,长期以来一直是化学家和生物学家等研究的热点之一。1982 年 Fukuyama 等^[4]就完成了首例该家族化合物 saframycin B (SAC-B)的全合成,随后二十余年间化学家们采用不同的合成路线和方法先后完成了 saframycin A (SFM-A), renieramycin A, ET-743, cyanocycline A, QNC 等的全合成^[2,5]。其中,仅 ET-743 的全合成就有数例报道^[6]。近年来随着新型生物技术的不断进步,这类化合物生物合成的研究也取得了突飞猛进的发展,不少成员的生物合成基因簇被先后克隆和报道。它们所共有的四氢异喹啉核心结构的生物合成机制被逐渐揭示,特别是其前体的来源和前体的生物合成途径以及四氢异喹啉环的形成机制等被逐渐阐明。本文将对四氢异喹啉家族化合物生物合成机制方面近年来主要的研究进展做一综述。

1 四氢异喹啉生物碱家族部分成员的前体标记实验研究

在早期的工作中,由于生物技术手段和相关理论的

欠缺,研究者们主要通过前体标记实验来研究这类化合物的生物合成。

1982 年 Zmijewski 等^[7a]分别用 ^{14}C 和 ^{13}C 标记的氨基酸对 NDM 的产生菌 *Streptomyces lusitanus* 进行喂饲,通过对分离纯化的 NDM 进行检测分析,发现 NDM 的多环骨架结构主要来源于酪氨酸、鸟氨酸和甘氨酸,而三个甲基都来自于甲硫氨酸(图 2A)。随后, Zmijewski 等^[7b,7c]又通过标记实验证实 NDM 中的四氢噁唑环来源于两分子甘氨酸转化而成的丝氨酸。几乎同时, Palaniswamy 等^[7d]也利用 ^{13}C 标记的酪氨酸衍生物对 NDM 的产生菌 *Streptomyces lusitanus* 进行了标记喂饲实验,结果表明 3-甲基酪氨酸及 3-羟基-5-甲基酪氨酸均可作为生物合成前体,参与形成 NDM 的四氢异喹啉环,这在一定程度上说明酪氨酸可能需要经过一系列的后修饰才能真正参与 NDM 的骨架合成。

1985 年, Mikami 等^[8]也用 ^{13}C 标记方法对 SFM-A 的生源合成前体进行了研究。结果显示,其骨架结构来源于两分子的酪氨酸,丙酮酰胺侧链来源于一分子丙氨酸和一分子甘氨酸形成的二肽,而 5 个甲基,与 NDM 类似,都来自于甲硫氨酸(图 2B)。

随后, Kerr 等^[9]利用 *Ecteinasidin turbinata* 无细胞提取物体系对 ET-743 的前体来源也做了一些研究,发

图2 四氢异喹啉生物碱家族部分成员的前体标记实验结果

Figure 2 Primary biosynthetic precursors to naphthyridinomycin (A), saframycin A (B), and ecteinsacidin 743 (C)

现 ^{14}C 标记的酪氨酸和 ^{35}S 标记的半胱氨酸都可以参与 ET-743 的生物合成. 不仅如此, 标记的酪氨酸二聚体和多巴二聚体也可以被无细胞提取物体系所利用, 这说明酪氨酸需要先被羟化形成多巴才进一步参与 ET-743 的生物合成(图 2C).

根据上述标记实验的结果, 我们初步了解该家族部分成员的一些前体来源信息, 但还有一些结构单元的生源前体仍不清楚, 如 NDM 和 ET-743 中的羟乙基二碳结构单元等. 另外, 这些前体是通过怎样的途径及机制参与到这些复杂结构化合物的生物合成中, 仅通过简单的前体标记实验是无法回答的, 需要进一步的基因和分子水平上的研究.

2 四氢异喹啉生物碱家族部分成员的生物合成基因簇

随着基因组学和蛋白质组学的不断发展, 越来越多天然产物的生物合成基因簇被克隆. 部分天然产物的生物合成机制被逐渐揭示和阐明, 标志着有关天然产物生物合成的研究进入了分子和基因水平时代. 在这一时期, 先后报道了 4 例四氢异喹啉家族成员的生物合成基因簇, 下面我们将对此做一简单的介绍和分析.

1995 年, Pospiech 等^[10]发现了 saframycin Mx1 (SFM-Mx1) 的部分生物合成基因簇, 其中含有两个编码非核糖体聚肽合成酶的基因和一个编码氧甲基转移酶

的基因. 尽管该基因簇不完整, 但却是该家族成员生物合成基因簇的第一例报道, 并且第一次揭示了该家族成员可能是通过非核糖体途径合成的.

此后, Velasco 等^[11]又利用 PCR 克隆非核糖体聚肽合成酶同源基因的方法获得了 SAC-B 的生物合成基因簇, 并通过异源表达的方法证实了该基因簇的完整性. 该基因簇中除了含有编码非核糖体聚肽合成酶的 3 个基因外, 还有几个负责非蛋白源氨基酸前体 3-羟基-5-甲基-*O*-甲基酪氨酸生物合成的基因和一系列后修饰基因. 这是该家族成员公开报道的第一例完整的生物合成基因簇.

同一时期, 我们课题组^[12]也通过类似方式获得了 SFM-A 完整的生物合成基因簇. 与 SAC-B 相比, 两者大部分结构基因高度同源. 不过, SFM-A 的基因簇中还多了一系列的后修饰基因. 这和两者结构上的相似性与差异性是一致的: 两者骨架结构一样, 而 SFM-A 中部分结构单元的氧化修饰程度高于 SAC-B.

2011 年, Rath 等^[13]通过宏基因组测序和基因组挖掘相结合的方法克隆了 ET-743 的生物合成基因簇. 与前面几例相比, 该基因簇也包含了非核糖体聚肽合成酶基因和负责非蛋白源氨基酸前体生物合成的基因. 但从目前所公开的基因信息和 ET-743 的化学结构上判断, 该基因簇并不完整.

最近, 我们课题组和 Oikawa 研究小组^[14]还分别独

立克隆了分属于其他两个亚家族的化合物 NDM 和 QNC 的生物合成基因簇(未发表),发现它们也是采用类似的非核糖体途径合成的,这里不做进一步的详细介绍。

通过上述基因簇的比对分析(图 3),我们不难发现该家族化合物的骨架结构都是采用类似的非核糖体途径合成的,这部分一般由两到三个独立的蛋白组成,其中每个蛋白一般有一到两个负责起始或延伸的模块组成,NDM 和 QNC 稍有不同。但由于这类化合物骨架结构的后修饰程度不同,部分成员的基因簇中还包含了大量编码氧化还原酶、甲基转移酶等的基因。虽然我们可以通过基因簇的分析初步预测这类化合物的生物合成途径,但要真正揭示其复杂的生物合成机制,还需要通过进一步的基因功能研究和酶学机制研究来加以阐明。

3 四氢异喹啉环前体的生物合成机制

四氢异喹啉家族化合物典型的结构特征就是分子中都拥有至少一个四氢异喹啉环,该环又由两个亚结构单元组成(图 4):一个是不同程度修饰的苯基乙胺亚结

构单元,另一个则是氨基乙基或羟乙基亚结构单元。结合前面体标记实验的结果和基因簇的序列分析,我们发现不同分子中这些亚结构单元的前体来源和生物合成机制不完全相同。如在 QNC 及 Tetrazomine 中,苯基乙胺亚结构单元推测来源于苯丙氨酸,而在其他四氢异喹啉家族成员中,则来源于经过修饰的酪氨酸。对于氨基乙基结构单元,在目前报道基因簇的几个分子中都来源于甘氨酸。而羟乙基结构单元,根据本课题组最新的研究成果,则来源于初级代谢中的酮糖。本部分主要介绍有关这些亚结构单元的前体来源和生物合成机制近期的研究进展。

3.1 四氢异喹啉环前体 3-羟基-5-甲基-O-甲基酪氨酸的生物合成机制

2005 年, Velasco 等^[11]通过突变喂饲的方式证实 3-羟基-5-甲基-O-甲基酪氨酸是 SAC-B 中四氢异喹啉环的前体之一。同时,他们还通过基因盒 *sacDEFG* 异源表达的方式证实它们所编码蛋白可以催化 3-羟基-5-甲基-O-甲基酪氨酸的合成,而 *sacEFG* 的异源表达仅能产生 3-

图 3 四氢异喹啉家族部分成员的生物合成基因簇 SFM-Mx1, SAC-B, SFM-A 和 ET-743(虚线相连的表示为同源基因)

Figure 3 Comparison of biosynthetic gene clusters of saframycin Mx1 (SFM-Mx1), safracin B (SAC-B), saframycin A (SFM-A), and ecteinsacidin 743 (ET-743) (Homologous genes are indicated by dotted line)

图 4 四氢异喹啉环结构单元部分的结构特点及其可能的前体来源

Figure 4 Structural characteristics of the tetrahydroisoquinoline ring unit and its possible precursor resources

甲基-O-甲基酪氨酸^[11]。其中, SacF 和 SacG 是与 *S*-腺苷甲硫氨酸依赖的甲基转移酶高度同源,推测可能是负责酪氨酸衍生物中两个甲基的引入; SacE 与 MbtH 家族蛋白同源,在这里的功能未知; SacD 仅与一些未知功能的蛋白有很低的同源性,根据异源表达的结果推测其可能负责酪氨酸衍生物前体中 3-位羟基的引入。但这些蛋白具体的功能、催化顺序和机理仅根据上述实验结果无法获悉。随后,本课题组通过对该基因盒中 *sacE* 及异源宿主菌中 *sacE* 同源基因的失活证实其与酪氨酸衍生物的合成不相关^[15],说明 3-羟基-5-甲基-O-甲基酪氨酸的生物合成只需 SacD, SacF 及 SacG 的参与。

同时,我们课题组^[15]在 SFM-A 的生物合成基因簇中也发现了类似的 3 个同源基因: *sfmD*(与 *sacD* 同源)、*sfmM2*(与 *sacF* 同源)和 *sfmM3*(与 *sacG* 同源)。并通过异

源表达实验证实它们的功能是一致的,也是负责 SFM-A 中 3-羟基-5-甲基-*O*-甲基酪氨酸前体的合成。

进一步,我们还对部分蛋白进行了酶学机制研究^[16]。首先在大肠杆菌中纯化了 SfmM2,通过体外测活证实其是 *S*-腺苷甲硫氨酸依赖的碳甲基转移酶,可以催化酪氨酸苯环上 C-3 位的甲基化。而对于 SfmD,根据前面的推测其可能是负责酪氨酸衍生物的羟化的。在目前已知的天然产物生物合成报道中,酪氨酸或其衍生物的羟化主要由以下几种酶负责:以四氢喋呤为辅因子的酪氨酸羟化酶、铜离子依赖的酪氨酸酶以及黄素依赖的单加氧酶。这些酶的共同特点是它们催化的反应是氧气依赖的。SfmD 与这些蛋白不具有任何同源性,预示着在 SFM-A 的生物合成途径中可能含有一种全新机制的酪氨酸或其衍生物的羟化酶。我们首先通过紫外光谱及蛋白质谱检测证实 SfmD 是一种血红素-铁依赖的蛋白,进一步我们通过一系列的体外生化实验证实 SfmD 是一种全新的过氧化酶,可以在过氧化氢存在下将酪氨酸或者 3-甲基酪氨酸羟化或多巴或者 3-甲基多巴。血红素-铁依赖的过氧化酶作为过氧化酶中的一个重要分支,虽然可以催化多种类型的氧化还原反应,但在过氧化氢存在下催化酪氨酸羟化还是首次发现。这一发现不仅增加了酪氨酸羟化酶的种类,而且丰富了血红素-铁依赖的过氧化酶催化的反应类型。随后,我们还通过 SfmD 的酶反应动力学实验证实 3-甲基酪氨酸是 SfmD 的最适底物。结合上述实验结果,我们证实了 SFM-A 中 3-羟基-5-甲基-*O*-甲基酪氨酸前体的生物合成途径(图 5A):酪氨酸首先被 SfmM2 催化发生 3-位碳甲基化,然后经 SfmD 的作用形成 3-羟基-5-甲基酪氨酸,最后在 SfmM3 的催化下形成 3-羟基-5-甲基-*O*-甲基酪氨酸。

随后,我们课题组对 SAC-B 体系中的 SacD, SacF 和 SacG 也进行了类似的酶学机制研究(未发表),发现二者 3-羟基-5-甲基-*O*-甲基酪氨酸前体的生物合成途径基本一致。这与之之前 NDM 的前体标记实验结果也比较吻合,说明这 3 个分子中其酪氨酸衍生物前体的生物合成途径是类似的。而在 ET-743 的基因簇中,也存在类似的三个同源基因: *etuH*, *etuM1* 和 *etuM2*。不过, Rath 等认为在 ET-743 中:酪氨酸先在羟化酶 *EtuH* 的作用下转化为多巴,然后在氧甲基转移酶 *EtuM2* 的催化下生成 3-羟基-*O*-甲基酪氨酸,最后在 *EtuM1* 催化下发生碳甲基化而形成 3-羟基-5-甲基-*O*-甲基酪氨酸(图 5B)。此外, Schmidt 等^[17]证实了 SFM-Mx1 的生物合成中多巴是氧甲基转移酶 *SafC* 的最适底物,与 Rath 等提出的途径一致。这些结果说明,尽管 3-羟基-5-甲基-*O*-甲基酪氨酸可能是大多数四氢异喹啉家族成员共同的生物合成前体,但在不同分子体系中可能存在不同的生物合成途

径。

图 5 推测的 3-羟基-5-甲基-*O*-甲基酪氨酸的生物合成途径
Figure 5 Proposed biosynthetic pathways of 3-hydroxy-5-methyl-*O*-methyltyrosine

3.2 四氢异喹啉环前体羟基乙酰结构单元的生物合成机制

NDM 和 QNC 分别属于四氢异喹啉类化合物中两个不同的亚家族,二者虽然都具有类似的四氢异喹啉环结构单元,但它们亚结构单元的生源合成前体不尽相同。其中,NDM 的苯基乙胺结构单元来源于酪氨酸衍生物,而在 QNC 中则来源于苯丙氨酸衍生物。此外,根据我们课题组^[18]最新的研究结果显示,这两个分子中另一亚结构单元羟乙基可能具有相似的前体来源和合成机制。我们在两个分子的生物合成基因簇中发现了两个高度同源的基因盒, *napB-napC-napD* 和 *qncN-qncM-qncL*。其中, NapC 和 QncM 为酰基承载蛋白的同源蛋白; NapB 和 QncN 与丙酮酸脱氢酶 E1 α 组分具有较高同源性,同时也与转酮酶中二磷酸硫胺素结合域具有一定的同源性; NapD 和 QncL 为多结构域蛋白,第一个结构域与丙酮酸脱氢酶 E1 β 组分或转酮酶中的嘧啶结合域同源,第二个与转酮酶的碳端结构域同源,第三个与丙酮酸脱氢酶 E2 组分的硫辛酸结合域同源,最后一个结构域与酰基转移酶催化活性结构域同源(图 6)。在基础代谢中,丙酮酸脱氢酶系是负责将丙酮酸转化成乙酰辅酶 A 的,转酮酶的作用是将磷酸酮糖上的羟基乙酰二碳单元转移至磷酸醛糖上,从而实现不同酮糖之间的相互转化。结合 QNC 和 NDM 结构上的相似性,我们推测这两个基因盒可能与羟乙基二碳单元的合成相关,而丙酮酸或者酮糖可能是二碳单元的合成前体。

我们首先利用 ^{13}C 标记的丙酮酸、果糖及葡萄糖对

NDM 进行了标记实验, 结果显示丙酮酸不是羟乙基结构单元的前体, 糖才是其前体. 随后, 我们在 NDM 产生菌体系中对上述基因盒中的 3 个基因 *napB*, *napC*, *napD* 分别进行了基因敲除和回补实验, 发现这三个基因都是 NDM 骨架合成所必需的, 进一步我们还通过基因盒 *qncN-qncM-qncL* 的异源回补证实了这两个同源基因盒体内功能的一致性. 在此基础上, 我们还对基因盒 *qncN-qncM-qncL* 编码的三个蛋白进行了体外酶学研究, 发现在磷酸酮糖(5-磷酸木酮糖、6-磷酸果糖或者 7-磷酸景天庚酮糖)、镁离子及二磷酸硫胺素存在下, QncN/QncL 复合体可以将磷酸酮糖底物上的羟基乙酰二碳单元转移至 QncM 的磷酸泛酰巯基乙胺臂上, 但转化效率不高. 如果在体系中再加入丙酮酸脱氢酶 E3 组分以及其辅因子 NAD^+ , 则 QncM 可以被完全转化成承载有羟基乙酰二碳结构单元的蛋白.

上述研究结果表明, NDM 和 QNC 中羟乙基结构单元的前体都是磷酸酮糖来源的羟基乙酰二碳单元, 并且该前体的合成机制非常独特, 如图 6 中所示: 首先 QncN/QncL(NapB/NapD)复合体采用类似于转酮酶从磷酸酮糖中攫取羟基乙酰二碳单元的方式将底物中的羟基乙酰二碳单元转移至 QncN(NapB)所结合的辅因子二磷酸硫胺素上, 然后采取类似丙酮酸脱氢酶复合体系催化丙酮酸形成乙酰辅酶 A 的机制将羟基乙酰二碳单元转移至承载蛋白 QncM(NapC)上, 并利用丙酮酸脱氢酶 E3 组分的功能完成催化循环, 而承载在 QncM(NapC)上

的羟基乙酰二碳单元进一步作为非核糖体聚肽合成酶体系的合成砌块参与四氢异喹啉环的形成. 在目前报道的例子中, 非核糖体聚肽合成酶催化体系中的合成砌块主要是天然氨基酸及其衍生物, 近期还发现其他一些可以被利用的合成砌块, 如芳基酸、脂肪酸、 α -酮酸以及 α -羟基酸等. 而在非核糖体聚肽合成酶-聚酮酶杂合体系中, 延伸中的聚酮链也可成为合成砌块. 我们这里所报道的羟基乙酰二碳单元作为这类体系中的合成砌块尚属首例, 这一发现不仅丰富了合成砌块的结构多样性, 而且为天然产物的组合生物合成提供了新的工具. 而在 ET-743 的生物合成基因簇中, 也存在与上述两个分子类似的同源基因盒^[13], 说明这类化合物羟乙基结构单元的前体的来源和合成机制可能是类似的.

4 四氢异喹啉环骨架结构的形成机制

除四氢异喹啉家族化合物外, 还有许多其他天然产物中也具有四氢异喹啉环结构, 如苄基四氢异喹啉类化合物等. 对于四氢异喹啉环的构建, 在有机合成化学中可以通过经典的 Pictet-Spengler 反应来实现. 在天然产物的生物合成中, 也可以通过类似的方式来实现, 如在 *norcoclaurine* 的生物合成中, 以多巴胺与 4-羟基苯基乙醛为前体, 在 *norcoclaurine* 合酶(*norcoclaurine synthase*)的催化下即可完成四氢异喹啉环的构建^[19]. 但是在已报道的四氢异喹啉家族化合物的生物合成基因簇中, 并

图 6 推测的羟基乙酰二碳结构单元的生物合成机制

Figure 6 Proposed mechanism for the hydroxyacetyl unit assembly in the biosynthesis of naphthyridinomycin and quinocarcin

没有发现编码此类酶的同源基因存在. 最近 Oikawa 研究小组^[20]通过实验证实 SFM-A 中四氢异喹啉环骨架结构是通过非核糖体聚肽合成酶 SfmC 催化的 Pictet-Spengler 反应来构建的.

其中, SfmC 含有 4 个结构域, 分别为缩合结构域(C)、腺苷化结构域(A)、酰基承载蛋白(PCP)以及还原结构域(RE). 在他们所报道的包含完整四个结构域的 SfmC 催化体系中, 只要加入 3-羟基-5-甲基-*O*-甲基酪氨酸、肉豆蔻酰-丙氨酸-甘氨酸辅酶 A 衍生物以及 SfmC 中各功能结构域催化活性所需辅因子(如腺苷化结构域辅因子 Mg^{2+} , ATP 和还原结构域所需辅因子 NAD(P)H 等), 一段时间后就可以检测到醛 I、具有一个四氢异喹啉环的化合物醛 II 及具有两个四氢异喹啉环的化合物 III 的生成(结构参见图 7). 如果使用缺少缩合结构域的 SfmC, 则只能检测到醛 I. 如果使用缺少还原结构域的 SfmC, 则上述 3 种产物都不能被检测到. 而如果用醛 I 代替肉豆蔻酰-丙氨酸-甘氨酸辅酶 A 衍生物, 并使用缺少还原结构域的 SfmC 进行测试, 在对反应后的蛋白进行化学处理前, 并不能检测到任何产物, 而如果对该反应体系中缺少还原结构域的 SfmC 用硼氢化钠进行还原

处理, 则可以检测到醛 II 的醇形式. 上述实验证实 SfmC 可以催化相应底物发生 Pictet-Spengler 反应形成四氢异喹啉环.

据此, Oikawa 等提出了 SFM-A 中四氢异喹啉环骨架结构的形成机制, 如图 7 所示: 首先, 肉豆蔻酸、丙氨酸、甘氨酸等前体在非核糖体聚肽合成酶 SfmA, SfmB 的催化下形成肉豆蔻酰-丙氨酸-甘氨酸结构单元, 然后在 SfmC 的还原结构域(SfmC-RE)的作用下被进一步还原成醛 I. 同时, SfmC 的腺苷化结构域(SfmC-A)负责 3-羟基-5-甲基-*O*-甲基酪氨酸的活化并将其承载至 SfmC 的酰基承载蛋白(SfmC-PCP)上, 然后在 SfmC 的缩合结构域(SfmC-C)的催化下, 该酪氨酸衍生物与醛 I 发生 Pictet-Spengler 反应形成第一个四氢异喹啉环, 并进一步被 SfmC-RE 还原成醛 II. 随后醛 II 再经过类似的方式与另一分子酪氨酸衍生物反应形成第二个四氢异喹啉环, 并在 SfmC-RE 作用下发生还原解离, 最终形成 SFM-A 的五环刚性骨架结构 III. 这种由非核糖体聚肽合成酶中的缩合结构域来催化 Pictet-Spengler 反应报道尚属首例. 并且, 由一个非核糖体聚肽合成酶经过重复催化循环完成如此复杂结构的合成, 在次级代谢产物

图 7 推测的 SFM-A 中五环刚性骨架的形成机制

Figure 7 Proposed mechanism for the biosynthesis of the pentacyclic tetrahydroisoquinoline scaffold of saframycin A (SFM-A)

的生物合成中也非常罕见。同时,我们在其他四氢异喹啉家族成员的生物合成基因簇中也发现了类似的与 *sfmC* 高度同源的基因(图 8),这说明这类化合物特征的四氢异喹啉环核心骨架可能是通过相似的途径合成的。

图 8 *sfmC* 与其同源基因的组织结构比较示意图(PS 表示 Pictet-Spengler 反应结构域)

Figure 8 Comparison of *sfmC* and its homologous genes (PS, Pictet-Spengler reaction domain)

5 结语与展望

有关四氢异喹啉家族抗肿瘤抗生素的生物合成研究已经走过了二十多年的历程,从早期的同位素标记实验到后来部分成员生物合成基因簇的克隆,以及近期有关基因功能和酶学机制的研究,国内外数个研究小组在不同分子体系中都取得了一定的成果,特别是有关这类化合物核心结构四氢异喹啉环的前体来源和前体的生物合成途径以及四氢异喹啉环的形成机制等近几年取得了突破性的进展。基于这些研究成果,我们比较明确的是这类化合物一般都是以天然氨基酸、非天然氨基酸以及酮糖来源的二碳单元等为前体在非核糖体聚肽合成酶的催化下经过包含 Pictet-Spengler 反应在内的一系列复杂反应过程来合成其核心骨架结构的,而且不同的分子体系中其前体的类型和具体的合成途径稍有不同。但是,不同分子中复杂的多环体系具体是按照什么机制合成的以及基因簇中一系列后修饰基因是怎样发挥作

用的还需要进一步的研究。同时,考虑到目前临床上使用的抗癌药物 ET-743 由于天然来源的有限,主要是以氰基化的 SAC-B 为原料经过化学半合成得到,并不十分经济和绿色^[21]。所以,我们希望能在今后的研究过程中,全面揭示这类化合物完整的生物合成途径和酶催化机制,在此基础上,发现一些有应用价值的新型酶催化反应,为进一步综合运用遗传学、生物化学、合成生物学和化学相结合的手段,获得 ET-743 或其结构类似物提供新的思路 and 工具。

References

- [1] Kluepfel, D.; Baker, H. A.; Piattoni, G.; Sehgal, S. N.; Sidorowicz, A.; Singh, K.; Vezina, C. *J. Antibiot.* **1975**, *28*, 497.
- [2] Scott, J. D.; Williams, R. M. *Chem. Rev.* **2002**, *102*, 1669.
- [3] Molinski, T. F.; Dalisay, D. S.; Lievens, S. L.; Saludes, J. P. *Nat. Rev. Drug. Discovery* **2009**, *8*, 69.
- [4] Fukuyama, T.; Sachleben, R. A. *J. Am. Chem. Soc.* **1982**, *104*, 4957.
- [5] (a) Siengalewicz, P.; Rinner, U.; Mulzer, J. *Chem. Soc. Rev.* **2008**, *37*, 2676.
(b) Liao, X.; Dong, W.; Liu, W.; Chen, S.; Liu, Z. *Chin. J. Org. Chem.* **2010**, *30*, 317 (in Chinese)
(廖祥伟, 董文芳, 刘伟, 陈世智, 刘站柱, 有机化学, **2010**, *30*, 317.)
(c) Wang, Y.; Tang, Y.-F.; Liu, Z.-Z.; Chen, S.-Z.; Liang, X.-T. *Chin. J. Org. Chem.* **2005**, *25*, 42 (in Chinese)
(王晔, 唐叶峰, 刘站柱, 陈世智, 梁晓天, 有机化学, **2005**, *25*, 42.)
- [6] (a) Corey, E. J.; Gin, D. Y.; Kania, R. S. *J. Am. Chem. Soc.* **1996**, *118*, 9202.
(b) Endo, A.; Yanagisawa, A.; Abe, M.; Tohma, S.; Kan, T.; Fukuyama, T. *J. Am. Chem. Soc.* **2002**, *124*, 6552.
(c) Chen, J.; Chen, X.; Zhu, J. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 87.
(d) Zheng, S.; Chan, C.; Danishefsky, S. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2006**, *45*, 1754.
- [7] (a) Zmijewski, M. J., Jr.; Mikolajczak, M.; Viswanatha, V.; Hruby, V. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1982**, *104*, 4969.
(b) Zmijewski, M. J., Jr.; Palaniswamy, V. A.; Gould, S. J. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1985**, 1261.
(c) Zmijewski, M. J., Jr. *J. Antibiot.* **1985**, *38*, 819.
(d) Palaniswamy, V. A.; Gould, S. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1986**, *108*, 5651.
- [8] (a) Mikami, Y.; Takahashi, K.; Yazawa, K.; Arai, T.; Namikoshi, M.; Iwasaki, S.; Okuda, S. *J. Biol. Chem.* **1985**, *260*, 344.
(b) Arai, T.; Yazawa, K.; Takahashi, K.; Maeda, A.; Mikami, Y. *Antimicrob. Agents Chemother.* **1985**, *28*, 5.
- [9] (a) Kerr, R. G.; Miranda, N. F. *J. Nat. Prod.* **1995**, *58*, 1618.
(b) Jeedigunta, S.; Krenisky, J. M.; Kerr, R. G. *Tetrahedron* **2000**, *56*, 3303.
- [10] Pospiech, A.; Cluzel, B.; Bietenhader, J.; Schupp, T. *Microbiology* **1995**, *141*, 1793.
- [11] Velasco, A.; Acebo, P.; Gomez, A.; Schleissner, C.; Rodriguez, P.; Aparicio, T.; Conde, S.; Munoz, R.; De La Calle, F.; Luis Garcia, J.; Sanchez-Puelles, J. M. *Mol. Microbiol.* **2005**, *56*, 144.
- [12] Li, L.; Deng, W.; Song, J.; Ding, W.; Zhao, Q. F.; Peng, C.; Song, W. W.; Tang, G. L.; Liu, W. *J. Bacteriol.* **2008**, *190*, 251.
- [13] Rath, C. M.; Janto, B.; Earl, J.; Ahmed, A.; Hu, F. Z.; Hiller, L.; Dahlgren, M.; Kreft, R.; Yu, F.; Wolff, J. J.; Kweon, H. K.;

- Christiansen, M. A.; Håkansson, K.; Williams, R. M.; Ehrlich, G. D.; Sherman, D. H. *ACS Chem. Biol.* **2011**, *6*, 1244.
- [14] Koketsu, K.; Minami, A.; Watanabe, K.; Oguri, H.; Oikawa, H. *Curr. Opin. Chem. Biol.* **2012**, *16*, 142.
- [15] Fu, C.-Y.; Tang, M.-C.; Peng, C.; Li, L.; He, Y.-L.; Liu, W.; Tang, G.-L. *J. Microbiol. Biotechnol.* **2009**, *19*, 439.
- [16] Tang, M.-C.; Fu, C.-Y.; Tang, G.-L. *J. Biol. Chem.* **2012**, *287*, 5112.
- [17] Nelson, J. T.; Lee, J.; Sims, J. W.; Schmidt, E. W. *Appl. Environ. Microbiol.* **2007**, *73*, 3575.
- [18] Peng, C.; Pu, J.-Y.; Song, L.-Q.; Jian, X.-H.; Tang, M.-C.; Tang, G.-L. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **2012**, *109*, 8540.
- [19] Hawkins, K. M.; Smolke, C. D. *Nat. Chem. Biol.* **2008**, *4*, 564.
- [20] Koketsu, K.; Watanabe, K.; Suda, H.; Oguri, H.; Oikawa, H. *Nat. Chem. Biol.* **2010**, *6*, 408.
- [21] (a) Cuevas, C.; Francesch, A. *Nat. Prod. Rep.* **2009**, *26*, 322.
(b) Cuevas, C.; Pérez, M.; Martín, M. J.; Chicharro, J. L.; Fernández-Rivas, C.; Flores, M.; Francesch, A.; Gallego, P.; Zarzuelo, M.; de La Calle, F.; García, J.; Polanco, C.; Rodríguez, I.; Manzanares, I. *Org. Lett.* **2000**, *2*, 2545.

(Li, L.)