Statine 及其类似物不对称合成研究进展

张伟

(复旦大学药学院 上海 201203)

摘要 Statine 及其类似物是一类特殊的 β -羟基- γ -氨基酸, 是许多活性化合物的核心结构单元。综述了其不对称合成研究的进展。

关键词 statine; β -羟基- γ -氨基酸; 不对称合成

Progress in the Asymmetric Synthesis of Statine and Its Analogs

Zhang, Wei

(School of Pharmacy, Fudan University, Shanghai 201203)

Abstract Statine and its analogs are special kind of β -hydroxy- γ -amino acids, which are usually core segments in many bio-active compounds. In this paper, several synthetic strategies are summarized.

Keywords statine; β -hydroxy- γ -amino acid; asymmetric synthesis

20 世纪 70 年代, 日本研究者 Umezawa 等^[1]分离到天冬氨酰蛋白酶抑制剂 pepstatin, 它的结构中首次出现了一种全新的 β -羟基- γ -氨基酸——(3*S*,4*S*)-4-氨基-3-羟基-6-甲基庚酸(statine) (图 1)。深入研究发现, statine 为母体化合物的活性必需片段, 通过模拟肽链酶解的四面体过渡态而发挥药理作用。

图 1 Pepstatin 及 statine 的结构

Figure 1 Structures of pepstatin and statine

后来, 人们又陆续在多种具有重要药理活性的天然产物中发现了 statine 及其结构类似物(表 1), 如 didemnin B 结构中含有(3*S*,4*R*,5*S*)-isostatine, dolastatin 10 结构中含有(3*R*,4*S*,5*S*)-dolaisoleuine 和(2*R*,3*R*,4*S*)-dolaproine。

鉴于这类化合物的结构(尤其是立体结构)对母体化合物的活性有重要的影响, 所以寻找高立体选择性的合成方法是弥补天然产物稀少的重要手段, 也有利于对这些天然产物进行改造, 以期达到增强活性、降低毒性的

目的。这里需要指出的是, 就 pepstatin 而言, statine 单元的氨基与醇羟基处于顺式的构型(3*S*,4*S*)是活性必需的。从药物研究的角度来说, 其它的异构体及结构类似物也是构效关系研究的重要内容, 将其引入母体化合物, 有可能会产生活性更高、毒副作用更低的药物分子。本文对近年来比较有代表性的 statine 及其结构类似物的不对称合成方法做一介绍。

1 以氨基醛为原料, 以烯醇、格氏试剂等对其进行亲核加成

1.1 底物控制型的醛醇缩合

这种方法的优点是原料易得、路线简短, 一般一步即可构建所需 β -羟基- γ -氨基酸骨架, 在 statine 合成研究的初期得到较广泛的应用^[6-10]。所用原料氨基醛多由相应的氨基酸转化而来, 本身含有手性中心; 亲核体多为乙酸酯的烯醇形式。此类反应为底物(手性氨基醛)控制型的醛醇缩合, 立体选择性一般不高。

Rich 等^[6]从 Boc-Leu-OMe 出发(Scheme 1), 首先将其转化成氨基醛, 然后与乙酸乙酯的烯醇锂盐进行反应, 构建了 statine 的骨架。加成一步的立体选择性为

* E-mail: zhangw416@hotmail.com

Received July 20, 2012; revised August 29, 2012; published online September 3, 2012.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 81001392), the Fundamental Research Funds for the Central Universities (No. 10FX070), and the School of Pharmacy, Fudan University.

国家自然科学基金(No. 81001392)、复旦大学新教师科研启动基金(No. 10FX070)和复旦大学药学院新教师科研启动基金资助项目。

表 1 含 statine 及其类似物的天然活性化合物
Table 1 Bioactive natural products bearing statine units

名称	结构	母体化合物	母体化合物活性
Statine		Pepstatin ^[1]	天冬氨酰蛋白酶抑制剂
Isostatine		Didemnins ^[2] A, B, C	抗肿瘤、抗病毒
Dolaisoleuine		Dolastatin 10 ^[3]	抗肿瘤
Dolaproine		Dolastatin 10 ^[3]	抗肿瘤
AHPPA		Hapalosin ^[4]	抗肿瘤
AHMPA		Bleomycins ^[5]	抗肿瘤

3:2, 两种非对映异构体可以通过硅胶柱层析分离。不过, 并不是所有的非对映体都可以通过这种简单的方法得以分离, 如 Sham 等^[8]在合成如 Scheme 2 所示的 statine 类似物时, 加成后的混合物无法分离, 在引入第三个手性中心后才将二者分开。

Scheme 1

Scheme 2

在某些特定的抗衡离子存在下, 这类反应的立体选择性可能会有较大的提高^[11~13]。如 Mikami 等^[12]证实, 氨基以双苄基保护的氨基醛, 在 EtAlCl_2 存在的情况下, 醛醇缩合表现出高度的 *anti* 选择性; 而氨基以 Boc 保护的氨基醛, 在 SnCl_4 介导下则给出较高的 *syn* 选择性 (Scheme 3)。

Kiyooka 等^[13]使用 DIBAL 在低温下将氨基酸甲酯还原为醛后, 直接加入 $\text{TiCl}_2(\text{OPr-}i)_2$ 及烯醇, 观测到生成的醛醇缩合产物有较好的 *syn* 选择性, 在某些情况下甚至完全得到 *syn* 产物 (表 2)。

作者推测, 还原反应后残余的铝离子可能协同参与了后续的螯合控制型亲核加成。

除使用上述的烯醇盐对醛进行加成外, 还可以使用条件更温和的 Reformatsky 反应^[14], 收率为 30%~87%, 加成产物以 *anti* 为主, 两种异构体的比例在 1.6:1~4:1 之间 (Eq. 1)。

Scheme 3

表 2 添加 $\text{TiCl}_2(\text{OPr-}i)_2$ 的醛醇缩合Table 2 Aldol condensation in the presence of $\text{TiCl}_2(\text{OPr-}i)_2$

Entry	R ¹	P	R ²	R ³	Yield(syn+anti)/%	syn : anti
1	Me	Cbz	Me	Me	66	15 : 1
2	Me	Cbz	H	Ph	53	4.6 : 1
3	<i>i</i> -Pr	Cbz	Me	Me	68	syn only
4	<i>i</i> -Pr	Cbz	H	Ph	59	>46 : 1
5	<i>s</i> -Bu	Cbz	Me	Me	69	7 : 1
6	<i>s</i> -Bu	Cbz	H	Ph	53	2.5 : 1
7	Bn	Cbz	Me	Me	60	23 : 1
8	Bn	Cbz	H	Ph	59	3.2 : 1
9	<i>t</i> -Bu	Boc	Me	Me	50	syn only

最近, 有研究者^[15]采用 SmI_2 介导的 Reformatsky 反应来制备 statine 结构类似物, 产物的立体选择性较传统方法有较大幅度提高.

1.2 氨基醛与烯醇盐的双不对称反应

第 1.1 节中所列例子均为非手性的烯醇盐对手性醛的加成, 在这种情况下, 反应的立体选择性按 Cram-Felkin-Ahn 规则由优势过渡态来决定. 为进一步提高反应的立体选择性, 研究者曾使用手性烯醇对手性氨基醛进行加成^[5,16~19].

Devant 等^[16]使用如 Scheme 4 所示的手性烯醇与氨基醛进行加成, 反应收率 49%~61%, syn/anti 比值在 9 : 1 左右.

Woo^[19]使用如 Scheme 5 所示的 Evans 手性辅剂型烯醇供体与氨基醛进行双不对称亲核加成. (3*S*,4*S*)产物的 *de* 值在 90%以上且可以非常方便地通过短柱层析将其余非对映异构体除去.

Scheme 4

Scheme 8

与醛醇缩合加入抗衡离子的情况类似, Kiyooka 等^[13]使用 DIBAL 在低温下将氨基酸甲酯还原后, 直接加入 $\text{TiCl}_2(\text{OPr-}i)_2$ 及烯丙基三丁基锡(Eq. 2), 产物的 *syn/anti* 比例最高能达到 14 : 1, 不过反应的收率偏低, 仅 40%左右.

R = Me, yield = 44%, *syn* : *anti* = 10 : 1
 R = *i*-Pr, yield = 43%, *syn* : *anti* = 14 : 1
 R = *s*-Bu, yield = 42%, *syn* : *anti* = 4.8 : 1
 R = Bn, yield = 43%, *syn* : *anti* = 7 : 1

2 不对称还原 β -酮酯

这种策略也比较简捷, 可以使用氨基被保护的 α -氨基酸或酯为起始原料, 经 Claisen 酯缩合得到所需的 β -酮酯. 若使用羧基游离的底物, 需先将其转化为活化酯的形式以提高羟基的离去能力; 若使用酯的形式, 则可直接进行 Claisen 缩合(Scheme 9). 此类方法的关键在于酮羰基还原为醇羟基时的立体选择性. 底物的结构、还原试剂及 γ -氨基上的保护基团, 对生成 β -羟基的立体选择性都有很大影响.

Scheme 9

Rich 等^[28]报道, 使用 NaBH_4 对 Eq. 3 中具有不同侧链的酮酯进行还原, 收率均在 90%以上, 产物构型以 *anti* 为主. 对于同样的底物, 若换用大位阻的还原试剂(Eq. 4), 则生成 *syn* 构型产物的比例会大幅提高, 不过收率不够理想.

R = $\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, yield = 92%, *syn* : *anti* = 31 : 69
 R = CH_2Ph , yield = 98%, *syn* : *anti* = 37 : 63
 R = $\text{CH}_2(\text{CH}_2)_3\text{NHCbz}$, yield = 94%, *syn* : *anti* = 35 : 65

R = $\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, yield = 10% ~ 20%, *syn* : *anti* = 90 : 10
 R = CH_2Ph , yield = 24%, *syn* : *anti* = 96 : 4

Joullié 等^[29]在制备 statine 衍生物时, 曾经详细探讨了常见的还原试剂对还原反应立体选择性的影响(Scheme 10, 表 4).

他们发现, 对于底物 **1**~**4**, 还原反应收率良好(70%~93%), 产物 β -羟基酯的两种非对映体均可以通过简单的柱层析加以分离. 从硼氢化锂到硼氢化钠再到硼氢化钾, 反应的立体选择性逐渐提高; 而使用硼氢化锌立体选择性有所下降. 对底物 **3** 和 **4** 而言(对应的产物为 **3a/3b** 及 **4a/4b**), 还原的立体选择性在总体上要优于 **1** 和 **2**(对应的产物为 **1a/1b** 及 **2a/2b**). 相对来说, 硼氢化钾可以给出最好的结果(收率 80~89%; *dr* 3.7 : 1~10.6 : 1).

在这一类方法中, 已经使用过的 γ -氨基保护基团有 Boc^[28], Cbz^[30], Fmoc^[31]及 *N,N*-双苄基^[32]. 当氨基上的保护基团是氨基甲酸酯的形式(Boc/Cbz/Fmoc)时, 还原可

Scheme 10

表 4 金属硼氢化物对 β -酮酯的立体选择性还原Table 4 Stereoselective reduction of β -ketone esters with metal borohydrides

还原剂	1 Yield/% (1a : 1b)	2 Yield/% (2a : 2b)	3 Yield/% (3a : 3b)	4 Yield/% (4a : 4b)
LiBH ₄	87 (1.7 : 1)	93 (1.7 : 1)	90 (1.5 : 1)	88 (5.2 : 1)
NaBH ₄	83 (3.0 : 1)	83 (3.0 : 1)	82 (7.1 : 1)	80 (9.3 : 1)
KBH ₄	80 (7.1 : 1)	88 (3.7 : 1)	83 (10.6 : 1)	89 (10.5 : 1)
Zn(BH ₄) ₂	72 (2.9 : 1)	75 (4.1 : 1)	70 (4.6 : 1)	73 (6.9 : 1)

能经历螯合过渡态^[30], 反应的选择性可以用图 3 所示模型来解释. 还原产物中以氨基与羟基处反式构型的异构体为主, 对于制备具有(3*S*,4*S*)立体结构的 *syn*-statine 来说效率太低. Reetz 等^[32]首次使用的 *N,N*-双苄基策略则是对此方法的一个有效补充. 在这种情况下, 产物立体

构型以顺式的(3*S*,4*S*)为主, *de* 值在 80%以上. 一般认为, 还原产物 *syn* 选择性的提高归因于大位阻基团倾向于生成非螯合型 Felkin-Ahn 过渡态^[33].

有别于以上的负氢转移还原, Noyori 等^[34]使用手性的 Ru(II)-BINAP 对 β -羰基酮酯进行催化还原, 以很好的收率和立体选择性得到(3*S*,4*S*)-statine 及其结构类似物; 反应规模可以达到 20 g 级. 换用不同手性的催化剂, 也能得到(3*R*,4*S*)型的产物, 结果也很理想. 该法的不足之处是需要长达 40~180 h 的反应时间; 条件也较为苛刻, 需要 1.01×10^7 Pa 的高压(表 5).

表 5 β -酮酯的不对称氢化还原Table 5 Asymmetric hydrogenation of β -ketone esters

Substrate	Catalyst	Yield/%	<i>syn</i> : <i>anti</i>
5a	RuBr ₂ [(<i>R</i>)-BINAP]	97	>99 : 1
5a	RuBr ₂ [(<i>S</i>)-BINAP]	96	9 : 91
5b	RuBr ₂ [(<i>R</i>)-BINAP]	99	>99 : 1
5c	RuBr ₂ [(<i>R</i>)-BINAP]	92	>99 : 1

图 3 螯合及非螯合过渡态

Figure 3 Chelation and non-chelation conformations in the transition state

上述所列的均是以化学方法对 β -酮酯进行还原. 除此之外, 还可以用生物方法进行还原. E. Merck 公司的研究人员^[35]通过对 74 种酵母菌株的筛选, 发现使用酵母 *Hansenula anolala* 能以 92% *de* 得到(3*S*,4*S*)-AHPPA; 而使用 *Candida boidinii* 则能以 90% *de* 得到(3*R*,4*S*)型的产物(Eq. 5). 对前者反应条件进行优化后, 能在一釜中将 50 g 的 β -酮酯底物顺利还原, 收率为 96%, *de* 值为 92%; 经过两次重结晶, 其 *de* 值可提高到 99% 以上.

3 以 tetramic 酸为关键中间体的途径

5-位取代的 tetramic 酸(图 4)是许多天然活性化合物中的必需单元, 也是制备 β -羟基- γ -氨基酸的前体化合物. 该化合物有烯醇和酮式两种互变结构.

图 4 Tetramic 酸的互变结构

Figure 4 Tautomeric structures of tetramic acid

以 tetramic 酸为关键中间体的合成策略大致可分为

Scheme 11

Scheme 12

两类(Scheme 11).

途径 A 是先将 N-保护的氨基酸羧端活化(方法有: DCC/DMAP^[36,37]、氯甲酸异丙酯^[38]、DIC/DMAP^[39,40]、酸酐^[41,42]等), 然后与 Meldrum 酸缩合, 得到中间体 6, 其经过环化脱羧即可得到 tetramic 酸中间体 8. 另一种途径是以氨基酸酯为原料制备化合物 7, 其经过狄克曼环合及脱羧^[43~45], 同样可以得到 tetramic 酸中间体 8. 接下来是将化合物 8 的 4-位还原为仲醇. 可以使用的还原方法有: NaBH_4 ^[38,43,46], $\text{PtO}_2\text{-H}_2$ ^[37~42,45,47], Pt-H_2 ^[44], Raney-Ni^[45]等. 产物一般以 4*β* 为主, 在某些情况下甚至是立体专一性的^[46]. 在强酸或强碱条件下, 将 9 中的内酰胺环打开, 即可得到相应的 β -羟基- γ -氨基酸.

4 2-噁唑(啉)酮中间体途径

该策略设法在 2-噁唑(啉)酮 10 的 4-位及 5-位引入所需的取代基(Scheme 12), 然后在温和的条件下将环打开, 即得到 β -羟基- γ -氨基酸的结构.

Kunieda 等^[48~50]首先将手性辅基连接到噁唑酮上(Scheme 13), 然后用溴/1,1,1-三甲氧基乙烷对其进行加成, 以 79% 的收率、96% 的 *de* 值得到 11. 后续的操作中, 通过引入羧基的潜在基团烯丙基、切除辅基、引入目标产物 γ -氨基上的侧链等步骤, 最终实现了(3*S*,4*S*)-statine 的合成.

Kano 等^[51]将原料 α -羟基甲酯转化为氨基甲酸酯 12 (Scheme 14), 然后将甲酯还原为醛, 经历分子内的亲核加成, 得到 2-噁唑啉酮 13. 此中间体用锡烷处理, 在 4-

Scheme 13

Scheme 14

位上高选择性地引入异丁烯基得 **14**。为实现后续的氧化步骤, 化合物 **14** 经 4 步操作得到 **15**。15 中的苯基作为羧基的潜在基团, 在 $\text{RuCl}_3/\text{NaIO}_4$ 条件下被氧化。再经噁唑啉酮开环及去除保护基, 最终得到 (3*S*,4*S*)-statine。

还有其它使用 2-噁唑啉酮法合成 statine 及其类似物的相关报道^[52-54], 与上述方法基本类似, 这里就不一一赘述。

5 使用苹果酸作为起始原料的方法

(*S*)-苹果酸(**17**, Scheme 15)是常用的手性合成原料, 其在 statine 的制备中也多有应用。这种方法大致可以分为两类, 一类^[55,56]是首先将内酰胺 **18** 的 2-位还原, 然后在同一位置烷基取代引入终产物结构中的 γ -位侧链后水解开环; 另一类^[57-60]是首先在内酰胺 **18** 的 2-位引入烷基, 然后消除同碳叔羟基, 经水解开环同样可以得到 statine 或其结构类似物。根据终产物结构不同, 中间可能还会对内酰胺环进行官能团转换及保护基操作。

第一类的例子(Scheme 16), 如 Hiemstra 等^[56]使用 NaBH_4 将内酰胺 **19** 还原, 以 85% 的收率得到 *cis* 产物 **20**。使用 Lewis 酸三氟化硼, 以异丁烯基三甲基硅烷对 **20** 进行烷基取代, 结果以 95% 的收率及 11 : 1 的 *trans/cis*

比得到所需的产物 **21**。接下来进行一系列的保护基操作及水解打开内酰胺环, 最终得到 (3*S*,4*R*)-statine。

第二类的例子(Scheme 17), 如黄培强等^[57]使用甲基碘化镁对内酰胺 **22** 进行加成, 反应的区域选择性为 94 : 6, 所需 2-位加成产物 **23** 是一对非对映体的混合物, *dr* 值为 82 : 18。将 **23** 以 $\text{TES}/\text{BF}_3\cdot\text{Et}_2\text{O}$ 处理, 得到产物 *trans*-**25**, 收率为 89%, 立体选择性 > 95%。**25** 经后续的保护基操作及水解开环即可得到 (3*S*,4*R*) 型的 statine 类似物。

6 不对称环氧化、双羟化或羟氨化途径

与以上几类方法不同, 这种策略^[61-70]使用无手性的烯烃为原料(Scheme 18), 借助手性催化剂的不对称诱导来构建相邻的两个手性中心, 再经过官能团转化及保护基操作, 得到 statine 或其结构类似物。

Bertelli 等^[62]以烯丙醇 **26** 为起始原料(Scheme 19), 经 Sharpless 不对称环氧化(SAE)一步完成相邻两个手性中心的构建。以叠氮化锂对环氧 **27** 开环得到化合物 **28**。经官能团转化及延长一个碳原子, 最终得到 (3*R*,4*S*)-statine。对于 (3*S*,4*S*)-statine, 则中间再经历一步羟基所连手性碳的构型反转即可。

Scheme 15

Scheme 16

Scheme 17

Scheme 18

Scheme 19

由于 SAE 反应的高可靠性、产物的高光学纯度及构型可预见性, 因此通过使用不同构型的催化剂再配合羟基构型反转等操作, 该方法从理论上来说可以推广到 statine 四种非对映异构体的制备。

Ko^[69]对 α,β -不饱和酯 **29** 进行不对称双羟基化 (Scheme 20), 以高收率、高 *ee* 值得到邻二醇 **30**。将 β -位羟基转化为氨基的潜在基团叠氮基得 **31**。再经过 α -羟基保护、Arndt-Eistert 重氮化及 Wolff 重排向 C-端延长一个碳原子, 最终制得 (3*S*,4*S*)-statine。

Scheme 20

与上述二例相比, 不对称羟氨化可以一步引入羟基、氨基所在的手性中心, 可以有效地减少官能团转化步骤。如 Kondekar 等^[70]以二氢奎宁手性配体为诱导试剂 (Scheme 21), 对 **32** 进行不对称羟氨化, 以中等收率和较高的 *ee* 值一步将 N/O 两个杂原子引入到烯键上。经保护基操作及向 C 端延长一个碳原子, 得到 (3*S*,4*S*)-AHPPA。

Scheme 21

7 其它方法

除以上介绍的几类方法, 还有其它多种方法^[71~80]可以实现 statine 及其类似物的不对称合成, 因为这些方法难以归类这里就不再一一列举。

8 结语

自从 Umezawa 等首次发现 pepstatin 以来, 近几十年间关于其核心活性单元 β -羟基- γ -氨基酸的合成方法不断涌现。从最初使用氨基醛进行醛醇缩合得到低对映选择性甚至与所需构型相反的产物, 到近些年来采用新方法新试剂高收率高立体选择性地制备各种异构体, 可以说 statine 及其类似物的合成方法学日益丰富多彩。但也应该看到, 迄今为止很难有一种方法能兼顾到各方面的要求, 如原料廉价易得、步骤简短、适于大量制备, 且反应具有高立体选择性、高光学纯度等。研究者在实际应用中可根据具体情况选择最适宜的路线。

References

- [1] Umezawa, H.; Aoyagi, T.; Morishima, H.; Matauzaki, H.; Hamada, M.; Takeuchi, T. *J. Antibiot.* **1970**, *23*, 259.
- [2] Rinehart, K. L.; Gloer, J. B.; Cook, J. C.; Mizesak, S. A.; Scathill, T. A. *J. Am. Chem. Soc.* **1981**, *103*, 1857.
- [3] Pettit, G. R.; Kamano, Y.; Herald, C. L.; Tuinman, A. A.; Boettner, F. E.; Kizu, H.; Schmidt, J. M.; Baczynskyj, L.; Tomer, K. B.; Bontems, R. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1987**, *109*, 6883.
- [4] Stratmann, K.; Burgoyne, L.; Moore, R. E.; Patterson, G. M. L. *J. Org. Chem.* **1994**, *59*, 7219.
- [5] Boger, D. L.; Colletti, S. L.; Horda, T.; Menezes, R. F. *J. Am. Chem. Soc.* **1994**, *116*, 5607.
- [6] Rich, D. H.; Sun, E. T.; Boparai, A. S. *J. Org. Chem.* **1978**, *43*, 3624.
- [7] Rittle, K. E.; Homnick, C. F.; Ponticello, G. S.; Evans, B. E. *J. Org. Chem.* **1982**, *47*, 3016.
- [8] Sham, H. L.; Rempel, C. A.; Stein, H.; Cohen, J. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1987**, 683.
- [9] Hanson, G. J.; Baran, J. S.; Lindberg, T. *Tetrahedron Lett.* **1986**, *27*, 3577.
- [10] Pettit, G. R.; Singh, S. B.; Srirangam, J. K.; Pierson-Hogan, F.; Williams, M. D. *J. Org. Chem.* **1994**, *59*, 1796.
- [11] Takemoto, Y.; Matsumoto, T.; Ito, Y.; Terashima, S. *Tetrahedron Lett.* **1990**, *31*, 217.
- [12] Mikami, K.; Kaneko, M.; Loh, T.-P. *Tetrahedron Lett.* **1990**, *31*,

- 3909.
- [13] Kiyooka, S.; Suzuki, K.; Shirouchi, M.; Kaneko, Y.; Tanimori, S. *Tetrahedron Lett.* **1993**, 34, 5729.
- [14] Andrés, J. M.; Pedrosa, R.; Pérez, A.; Pérez-Encabo, A. *Tetrahedron* **2001**, 57, 8521.
- [15] Nelson, C. G.; Burke, T. R. Jr. *J. Org. Chem.* **2012**, 77, 733.
- [16] Devant, R. M.; Radunz, H. E. *Tetrahedron Lett.* **1988**, 29, 2307.
- [17] Rivero, R. A.; Greenlee, W. J. *Tetrahedron Lett.* **1991**, 32, 2453.
- [18] Cooke, J. W. B.; Davies, S. G.; Naylor, A. *Tetrahedron* **1993**, 49, 7955.
- [19] Woo, P. W. K. *Tetrahedron Lett.* **1985**, 26, 2973.
- [20] Reetz, M. T.; Rivadeneira, E.; Niemeyer, C. *Tetrahedron Lett.* **1990**, 31, 3863.
- [21] Gennari, C.; Pain, G.; Moresca, D. *J. Org. Chem.* **1995**, 60, 6248.
- [22] Tsukamoto, M.; Iio, H.; Tokoroyama, T. *Tetrahedron Lett.* **1985**, 26, 4471.
- [23] Iio, H.; Mizobuchi, T.; Tsukamoto, M.; Tokoroyama, T. *Tetrahedron Lett.* **1986**, 27, 6373.
- [24] Tsukamoto, M.; Iio, H.; Tokoroyama, T. *Tetrahedron Lett.* **1987**, 28, 4561.
- [25] Franciotti, M.; Mann, A.; Taddei, M. *Tetrahedron Lett.* **1991**, 32, 6783.
- [26] Veerasha, G.; Datta, A. *Tetrahedron Lett.* **1997**, 38, 5223.
- [27] Prasad, J. V. N. V.; Rich, D. H. *Tetrahedron Lett.* **1990**, 31, 1803.
- [28] Maibaum, J.; Rich, D. H. *J. Org. Chem.* **1988**, 53, 869.
- [29] Harris, B. D.; Joullie, M. M. *Tetrahedron* **1988**, 44, 3489.
- [30] Dufour, M.-N.; Jouin, P.; Poncet, J.; Pantaloni, A.; Castro, B. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1986**, 1895.
- [31] Kessler, H.; Schudok, M. *Synthesis* **1990**, 457.
- [32] Reetz, M. T.; Drewes, M. W.; Matthews, B. R.; Lennick, K. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1989**, 1474.
- [33] Reetz, M. T. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1991**, 30, 1531.
- [34] Nishi, T.; Kitamura, M.; Ohkuma, T.; Noyori, R. *Tetrahedron Lett.* **1988**, 29, 6327.
- [35] Raddatz, P.; Radunz, H.-E.; Schneider, G.; Schwartz, H. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1988**, 27, 426.
- [36] Ma, D.; Ma, J.; Ding, W.; Dai, L. *Tetrahedron: Asymmetry* **1996**, 7, 2365.
- [37] Maibaum, J.; Rich, D. H. *J. Med. Chem.* **1989**, 32, 1571.
- [38] Jouin, P.; Castro, B. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1987**, 1177.
- [39] Xiao, K.; Wang, X.; Shen, J.-K. *Chin. J. Synth. Chem.* **2006**, 14, 373 (in Chinese).
(肖坤, 王昕, 沈竞康, 合成化学, **2006**, 14, 373.)
- [40] Cadicamo, C. D.; Asante, V. A.; Ammar, M. A.; Borelli, C.; Korting, H. C.; Koks, B. *J. Pept. Sci.* **2009**, 15, 272.
- [41] Fehrentz, J.-A.; Bourdel, E.; Califano, J.-C.; Chaloin, O.; Devin, C.; Garrouste, P.; Lima-Leite, A.-C.; Llinares, M.; Rieunier, F.; Vivavonna, J.; Winternitz, F.; Loffet, A.; Martinez, J. *Tetrahedron Lett.* **1994**, 35, 1557.
- [42] Fehrentz, J.-A.; Genu-Dellac, C.; Amblard, M.; Winternitz, F.; Loffet, A.; Martinez, J. *J. Pept. Sci.* **1995**, 1, 124.
- [43] Poncet, J.; Jouin, P.; Castro, B. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1990**, 611.
- [44] Klutcho, S.; O'Brien, P.; Hodges, J. C. *Synth. Commun.* **1989**, 19, 2573.
- [45] Katsuki, T.; Ymaguchi, M. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **1976**, 49, 3287.
- [46] Galeotti, N.; Poncet, J.; Chiche, L.; Jouin, P. *J. Org. Chem.* **1993**, 58, 5370.
- [47] Schmidt, U.; Riedl, B.; Haas, G.; Griesser, H.; Vetter, A.; Weinbrenner, S. *Synthesis* **1993**, 216.
- [48] Ishizuka, T.; Ishibuchi, S.; Kunieda, T. *Tetrahedron* **1993**, 49, 1841.
- [49] Yamamoto, T.; Ishibuchi, S.; Ishizuka, T.; Haratake, M.; Kunieda, T. *J. Org. Chem.* **1993**, 58, 1997.
- [50] Kano, S.; Yuasa, Y.; Yokomatsu, T.; Shibuya, S. *J. Org. Chem.* **1988**, 53, 3381.
- [51] Kano, S.; Yuasa, Y.; Yokomatsu, T.; Shibuya, S. *J. Org. Chem.* **1988**, 53, 3865.
- [52] Sakaitani, M.; Ohfuné, Y. *J. Am. Chem. Soc.* **1990**, 112, 1150.
- [53] Sakaitani, M.; Ohfuné, Y. *Tetrahedron Lett.* **1987**, 28, 3987.
- [54] Misiti, D.; Zappia, G. *Tetrahedron Lett.* **1990**, 31, 7359.
- [55] Bernardi, A.; Micheli, F.; Potenza, D.; Scolastico, C.; Villa, R. *Tetrahedron Lett.* **1990**, 31, 4949.
- [56] Koot, W.-J.; Ginkel, R.; Dranenburg, M.; Hiemstra, H.; Louwrier, S.; Moolenaar, M. J.; Speckamp, W. N. *Tetrahedron Lett.* **1991**, 32, 401.
- [57] He, B.-Y.; Wu, T.-J.; Yu, X.-Y.; Huang, P.-Q. *Tetrahedron: Asymmetry* **2003**, 14, 2101.
- [58] Luo, J.-M.; Dai, C.-F.; Lin, S.-Y.; Huang, P.-Q. *Chem. Asian J.* **2009**, 4, 328.
- [59] Huang, P. Q.; Wang, S. L.; Ye, J. L.; Ruan, Y. P.; Huang, Y. Q.; Zheng, H. Z.; Goa, J. X. *Tetrahedron* **1998**, 54, 12547.
- [60] Ohta, T.; Shiokawa, S.; Sakamoto, R.; Nozoe, S. *Tetrahedron Lett.* **1990**, 31, 7329.
- [61] Catasús, M.; Moyano, A.; Pericàs, M. A.; Riera, A. *Tetrahedron Lett.* **1999**, 40, 9309.
- [62] Bertelli, L.; Fiaschi, R.; Napolitano, E. *Gazz. Chim. Ital.* **1993**, 123, 521.
- [63] Bessodes, M. S. M.; Antonakis, K. *Tetrahedron: Asymmetry* **1991**, 2, 111.
- [64] Cestejón, P.; Moyano, A.; Pericàs, M. A.; Riera, A. *Tetrahedron* **1996**, 52, 7063.
- [65] Bessodes, M.; Saïah, M.; Antonakis, K. *J. Org. Chem.* **1992**, 57, 4441.
- [66] Maier, M. E.; Hermann, C. *Tetrahedron* **2000**, 56, 557.
- [67] Hermann, C.; Giammasi, C.; Geyer, A.; Maier, M. E. *Tetrahedron* **2001**, 57, 8999.
- [68] Castejón, P.; Moyano, A.; Pericàs, M. A.; Riera, A. *Tetrahedron* **1996**, 52, 7063.
- [69] Ko, S. Y. *J. Org. Chem.* **2002**, 67, 2689.
- [70] Kondekar, N. B.; Kandula, R. S. V.; Kumar, P. *Tetrahedron Lett.* **2004**, 45, 5477.
- [71] Danishefsky, S.; Kobayashi, S.; Kerwin, J. F. *J. Org. Chem.* **1982**, 47, 1983.
- [72] Midland, M. M.; Afonso, M. M. *J. Am. Chem. Soc.* **1989**, 111, 4368.
- [73] Kawabata, T. K.; Kiryu, Y.; Sugiura, Y.; Fujii, K. *Tetrahedron Lett.* **1993**, 34, 5127.
- [74] Takahata, H.; Yamazaki, K.; Takamatsu, T.; Yamazaki, T.; Mose, T. *J. Org. Chem.* **1990**, 55, 3947.
- [75] Williams, R. M.; Closon, P.-J.; Zhai, W. *Tetrahedron Lett.* **1994**, 35, 9371.
- [76] Kang, S. H.; Ryu, D. H. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **1995**, 5, 2959.
- [77] Nebois, P.; Greene, A. E. *J. Org. Chem.* **1996**, 61, 5210.
- [78] Enders, D.; Reinhold, U. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1995**, 34, 1219.
- [79] Ghosh, A. K.; Shurrush, K.; Kulkarni, S. *J. Org. Chem.* **2009**, 74, 4508.
- [80] Bäck, M.; Nyhlén, J.; Kvarnström, I.; Appelgren, S.; Borkakoti, N.; Jansson, K.; Lindberg, J.; Nyström, S.; Hallberg, A.; Rosenquist, Å.; Samuelsson, B. *Bioorg. Med. Chem.* **2008**, 16, 9471.

(Zhao, C.)