2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌/ H^+ 作用下 4-苯亚甲基-3-异色酮的
分子内氧化偶联反应戢得蓉^a 粟立丹^a 张成刚^{*,a,b}^(a) 四川师范大学化学与材料科学学院 成都 610066^(b) 先进功能材料四川省高校重点实验室 成都 610066

摘要 多甲氧基菲-9-甲酸及酯是合成娃儿藤生物碱及其类似物的关键中间体. 以 4-(3,4-二甲氧基苯亚甲基)-6,7-二甲氧基-3-异色酮(**6**)为底物, 2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌(DDQ)/CH₃SO₃H 作为氧化体系, 没有得到预期的多甲氧基菲-9-甲酸内酯(**1**), 意外产物经核磁共振等确定为两个新的 3-取代苯基香豆素 **2**, **3**. 进一步的实验研究显示: 底物发生分子内脱氢偶联为香豆素 **2** 而非菲环化合物 **1**, 是因为异色酮 **6** 苯环 A 上 2 位取代基的存在所致, 其内酯环开环化合物 **10** 以及 2,3-二苯基丙烯酸(**12**)的对比实验印证了该取代基对脱氢偶联反应选择性的影响; 异色酮 **6** 氧化偶联为香豆素 **2** 的反应机理可能为酸解开环以及途经自由基正离子的脱氢偶联, 香豆素 **3** 为 DDQ 氧化 **2** 的前体化合物 **8** 所得.

关键词 多甲氧基菲; 3-异色酮; 3-苯基香豆素; 脱氢偶联; 自由基正离子; 分子内氧化偶联; DDQ

Intramolecular Oxidative Coupling Reaction of 4-Phenylmethylene-3-isochromanones with 2,3-Dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone as an Oxidant

Ji, Derong^a Su, Lidan^a Zhang, Chenggang^{*,a,b}^(a) College of Chemistry and Materials, Sichuan Normal University, Chengdu 610066^(b) Key Laboratory of Advanced Functional Materials, Sichuan Province Higher Education System, Chengdu 610066

Abstract Polymethoxy-substituted phenanthrene-9-carboxylic acid or methylate is key intermediate for synthesis of tylophora alkaloids. (E)-4-(3,4-Dimethoxybenzylidene)-6,7-dimethoxy-1*H*-isochromen-3(4*H*)-one (**6**), oxidized by 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone (DDQ)/CH₃SO₃H in CH₂Cl₂, gave no polymethoxy-substituted phenanthrene derivative (**1**) but unexpected 3-(2-(hydroxymethyl)-4,5-dimethoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-2*H*-chromen-2-one (**2**) and 4,5-dimethoxy-2-(6,7-dimethoxy-2-oxo-2*H*-chromen-3-yl)benzaldehyde (**3**). Further experiments showed that the steric hindrance of a ring of isochromen-3-one (**6**) resulted in coumarin (**2**) not phenanthrene derivative (**1**), supported by comparative experiments of 2,3-diphenylacrylic acid (**10**, **12**). The possible mechanism of **2** via radical cation and **3** through oxidation of precursor of **2** was proposed based on the result of experiments.

Keywords polymethoxyphenanthrene; 3-isochromanone; 3-phenylcoumarin; cross dehydrogenative coupling (CDC); radical cation; intramolecular oxidative coupling; DDQ

娃儿藤生物碱是一类含有多甲氧基取代的菲环骨架的生物碱, 该类生物碱的抗肿瘤、抗病毒等生理活性引起了化学家和药物学家的极大兴趣^[1,2]. 多甲氧基菲环的构建是合成这类生物碱及其类似物的瓶颈. 采用 2,3-二苯丙烯酸及甲酯, 通过分子内氧化偶联合成菲甲

酸及其甲酯是近年来一个研究热点^[3]. 为了研究密花娃儿藤碱(tylocrebrine)类似物的抗肿瘤活性, 采用 Scheme 1 所示路线合成重要中间体多取代菲环化合物 **1**. 没有得到预期的菲环产物 **1**, 意外的两个产物经 ¹H NMR, ¹³C NMR, IR, HRESIMS 确定为 3-(2-羟甲基-4,5-

* E-mail: zhangcg2008@yahoo.com.cn

Received July 20, 2012; revised August 28; published online September 3, 2012.

Project supported by the Department of Education of Sichuan Province (No. 12ZA141) and the Key Laboratory of Advanced Functional Materials of Sichuan Province Higher Education System (No. KFKT2013-01).

四川省教育厅(No. 12ZA141)及先进功能材料四川省高校重点实验室(No. KFKT2013-01)资助项目.

Reagents and conditions: (a) HCHO (40%, aq.), acetic acid, conc. HCl, reflux for 1 h; (b) 3,4-dimethoxybenzaldehyde, piperidine, 140 °C for 1 h; (c) DDQ (1.2 equiv.), CH₃SO₃H/CH₂Cl₂, 0~5 °C for 1.5 h

Scheme 1

二甲氧基)苯基-6,7-二甲氧基香豆素(**2**)和 3-(2-甲酰基-4,5-二甲氧基)苯基-6,7-二甲氧基香豆素(**3**)。本文报道这两个新的香豆素的合成及结构分析,并提出了可能的反应历程,就没有菲环产物生成的原因做了初步研究。

1 结果与讨论

以苯乙酸**4**为起始原料,制备得到 3-异色酮(**5**)^[4],**5**在哌啶催化下与 3,4-二甲氧基苯甲醛缩合得到 4-(3,4-二甲氧基苯亚甲基)-(6,7-二甲氧基)-3-异色酮(**6**)。研究表明^[5],这类化合物的 *Z* 式/*E* 式构型,可以通过烯键氢原子的化学位移值确认,化合物**6**的核磁氢谱在 δ 7.70 的单峰有一个氢原子,提示其构型为 *E* 式。文献[3]报道了在氧化剂作用下,2,3-二取代苯基丙烯酸(及其甲酯)很容易偶联生成菲环化合物,基于化合物**6**与 2,3-二取代苯基丙烯酸(及其甲酯)结构上的相似性,并且 *E* 式结构的两个苯环在烯键同侧,我们首先采用 FeCl₃ 作为氧化剂,出乎预料,没有菲环产物, TLC 显示反应产物复杂,接着尝试了 VOCl₃, IDA, MnO₂, *m*-CPBA 等多种氧化体系,均没有所预期的菲环化合物。我们采用 DDQ (1.2 equiv.)/甲磺酸作为氧化剂,分离得到一个主要的产物和一个次要产物,主要产物的核磁氢谱上低场出现 4 个单峰 [δ 7.69 (s, 1H), 7.08 (s, 1H), 6.91 (s, 2H), 6.77 (s, 1H)], 积分面积表明 5 个氢原子,这与预期的菲环化合物**1**的结构不相符,化合物**1**的氢谱低场对应为 4 个氢原子。异色酮**6**的内酯环上亚甲基的化学位移值 δ 5.26 (s, 2H),但所得主要产物的亚甲基化学位移值为 δ 4.54 (s, 2H),提示其所处化学环境发生了明显变化。高分辨质谱给出分子量为 372,这与**1**的分子量 354 不相符。核磁和质谱数据表明,主要产物不是预期的菲环衍生物**1**。苯丙酸^[6,7]或 3-苯基丙烯酸^[8]在氧化剂作用下,可以发生

分子内氧化生成香豆素类化合物。基于产物**2**的核磁与质谱数据,推测化合物**6**的内酯环发生了开环,生成 (*E*)-2,3-二苯基丙烯酸(**7**, Scheme 2),然后氧化偶联生成了化合物**8**,**8**水解生成香豆素**2**。对比试验显示,2.0 equiv. DDQ 参与反应时,产物**2**产率有所降低,而产物**3**产率有所提高;3.0 equiv. DDQ 参与反应时,仅分离得到产物**3**。以上实验过程中未检测到化合物**9**。与产物**2**对比,产物**3**的氢谱在 δ 4.2~5.5 之间没有亚甲基峰,而在 δ 9.91 新出现一单峰,提示醛基的存在;产物**3**的碳谱上 δ 63.4 附近没有峰,新出现 δ 188.5 峰,且质谱给出分子量为 370,佐证产物**3**为化合物**8**苯环 A 苄位 C—H 被 DDQ 氧化成缩醛,然后水解所得^[9]。

异色酮**6**发生分子内氧化脱氢偶联反应,没有预期的多取代菲环化合物生成,可能因内酯 C 环的存在影响苯环 A 和苯环 B 之间的脱氢偶联(Scheme 1)。于是通过水解将 C 环开环,得到 (*E*)-2,3-二取代苯基丙烯酸**10** (Scheme 2),其 *E* 式构型可以从化学位移值 δ 7.93 单峰得到确认^[5]。许多研究表明,2,3-多甲氧基取代苯基丙烯酸,其 *E* 式构型和 *Z* 式结构均能顺利地氧化偶联生成菲环化合物,*E* 式构型脱氢偶联反应速率较 *Z* 式构型快^[3]。将**10**在 DDQ (1.2 equiv.)/甲磺酸氧化体系下反应,出乎意料地没有菲环化合物**11**生成,分离得到的产物为香豆素**2**和**3**,与异色酮**6**在相同反应条件下的反应产物一致。这个实验结果说明:**6**的内酯 C 环的存在不是影响苯环 A 和苯环 B 之间的脱氢偶联的关键因素;异色酮**6**内酯 C 环可能开环为 (*E*)-2,3-二苯基丙烯酸(**7**),然后其羧基与苯环 B 发生脱氢偶联生成香豆素**2**和**3**^[8,9]。

2,3-二苯基丙烯酸(**12**),其 *E* 式构型和 *Z* 式结构均能顺利地氧化偶联生成菲环化合物**13**^[3],且没有生成香豆素类化合物的报道。我们重复了**12**的 *E* 式和 *Z* 式结构

Scheme 2

分别在 DDQ/甲烷磺酸作用下的反应, 与文献报道一致, 无论 *E* 式还是 *Z* 式均顺利生成菲-9-甲酸(**13**), 并没有香豆素 **14** 生成. 特别地, **12** 的 *E* 式结构与 **10** 的唯一差别在于后者的苯环 A 多一个邻位的羟甲基, 这个取代基的存在是导致苯环 A 和苯环 B 之间未能脱氢偶联生成菲环化合物的关键因素. 由于 **12** 的 *Z* 式结构在反应过程中会发生键的旋转成为 *E* 式构型, 从而顺利偶联得到唯一的菲环产物, 因此, 可以推测, 2,3-二苯基丙烯酸在 DDQ/ H^+ 氧化下, 通常发生两个苯环间的脱氢偶联生成菲环化合物, 而当 A 苯环的 2, 5 位均有取代基时, 其空间位阻效应阻碍了苯环 A 对苯环 B 自由基正离子的亲核进攻, 其竞争反应即羧基与苯环 B 的脱氢偶联才得以发生.

基于香豆素 **2** 的结构和丙烯酸 **10** 的偶联反应, 推测异色酮 **6** 的分子内氧化偶联反应的可能的反应机理如 Scheme 3 所示. 首先, 底物在酸环境下内酯 C 环开环为丙烯酸 **7**, DDQ 作用下化合物 **7** 的苯环 B 发生单电子氧化, 生成自由基正离子 **15**, 然后羧基氧原子对自由基正离子亲核进攻, 脱去质子形成自由基 **16**, 在 DDQ 作用下单电子氧化 **16** 为正离子 **17**, **17** 脱去质子生成 **8**, **8** 水解生成香豆素 **2**. 在水解前, 部分化合物 **8** 被剩余的 DDQ 氧化成缩醛 **18**, **18** 水解得香豆素 **3**^[9].

2 结论

以 3,4-二甲氧基苯乙酸为起始原料, 羟甲基化得到

6,7-二甲氧基-3-异色酮(**5**), 然后与 3,4-二甲氧基苯甲醛缩合制得异色酮 **6**, **6** 在 DDQ/ H^+ 氧化作用下没有得到预期的多取代菲环化合物 **1**, 意外的两个产物经 1H NMR, ^{13}C NMR, IR, HRESIMS 确定为两个新的香豆素类化合物 3-(2-羟甲基-4,5-二甲氧基)苯基-6,7-二甲氧基香豆素(**2**)和 3-(2-甲酰基-4,5-二甲氧基)苯基-6,7-二甲氧基香豆素(**3**). (*E*)-2,3-二取代苯基丙烯酸(**10**)在与化合物 **6** 同样反应条件下, 反应产物一致, 提示异色酮 **6** 的内酯环不是导致没有菲环产物的关键因素, 据我们所知, 这是首例关于 2,3-二取代苯基丙烯酸分子内脱氢偶联为香豆素产物而非菲环化合物的报道. 进一步的对比实验结果显示, 丙烯酸 **7** 和异色酮 **6** 的苯环 A 的 2 位上的取代基阻碍了苯环 A 对苯环 B 自由基正离子的亲核进攻, 而其竞争反应即羧基氧原子对苯环 B 自由基正离子的亲核进攻得以发生, 从而生成香豆素产物 **2**. 同时香豆素 **2** 的部分前体化合物 **8** 被多余的 DDQ 氧化成缩醛 **18**, **18** 水解得到香豆素 **3**.

3 实验部分

3.1 4-(3,4-二甲氧基苯亚甲基)-6,7-二甲氧基-3-异色酮(**6**)的制备

在带支口反应管中, 加入化合物 **5** (208 mg, 1.0 mmol), 3,4-二甲氧基苯甲醛(180 mg, 1.1 mmol), 置换氮气 3 次, 注入 5 滴哌啶. 搅拌, 升温至 140 $^{\circ}C$, 1 h 后停止反应, 稍冷, 用二氯甲烷(50 mL $\times$ 3)溶解, 水洗涤

Scheme 3

(100 mL $\times$ 3), 有机层用无水 MgSO_4 干燥, 过滤, 浓缩. 柱层析(二氯甲烷)得到产物, 乙酸乙酯重结晶, 得到细针状黄色晶体 **6**^[5], 重结晶产率 55.6%, m.p. 182~185 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.70 (s, 1H, C=CH), 7.13 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.08 (s, 1H), 6.99 (d, $J=1.2$ Hz, 1H), 6.82 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.72 (s, 1H), 5.26 (s, 2H), 3.91 (s, 6H), 3.73 (s, 3H), 3.56 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 168.8, 150.2, 149.3, 148.6, 148.3, 136.5, 127.0, 125.5, 123.8, 122.9, 122.6, 112.1, 110.8, 109.8, 107.7, 69, 56.0, 55.9, 55.84, 55.83; IR (KBr) ν : 3082, 3012, 2951, 2841, 1725, 1602, 1513, 1463, 1420, 1380, 1351, 1276, 1241, 1222, 1194, 1149, 1035, 868, 811 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{NaO}_6$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 379.1152, found 379.1149.

3.2 3-(2-羟甲基-4,5-二甲氧基)苯基-6,7-二甲氧基香豆素(2)和 3-(2-甲酰基-4,5-二甲氧基)苯基-6,7-二甲氧基香豆素(3)的合成

在一干燥两口 50 mL 圆底烧瓶中加入 DDQ (1.09 g, 4.8 mmol), 置换 N_2 3 次, 于冰水浴上, 将化合物 **6** (1.43 g, 4.0 mmol) 的二氯甲烷溶液(120 mL)注射入反应瓶中, 搅拌, 液体呈墨绿色. 15 min 后, 注入甲烷磺酸(13 mL),

溶液变为棕黑色, 搅拌 1.5 h 后, 水淬灭, 饱和 NaHCO_3 调 pH 至中性, 二氯甲烷萃取(100 mL $\times$ 3), 饱和食盐水洗有机层, 无水 MgSO_4 干燥, 过滤, 浓缩. 柱层析得到化合物 **2** (580 mg, 38.9%) 和 **3** (286 mg, 19.1%). 在同样反应条件下: 当加入 DDQ (454 mg, 2.0 mmol), 化合物 **6** (356 mg, 1.0 mmol) 时, 柱层析分离得到化合物 **2** (119 mg, 33.6 %) 和 **3** (91 mg, 25.7%); 当加入 DDQ (681 mg, 3.0 mmol), 化合物 **6** (356 mg, 1.0 mmol) 时, 柱层析仅分离得到化合物 **3** (188 mg, 53.1%).

化合物 **2** 用二氯甲烷与石油醚混合溶剂重结晶, 得黄色絮状固体, m.p. 229~232 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.69 (s, 1H), 7.08 (s, 1H), 6.91 (s, 2H), 6.77 (s, 1H), 4.54 (s, 2H, CH_2O), 3.98 (s, 3H), 3.95 (s, 3H), 3.94 (s, 3H), 3.90 (s, 3H), 3.08 (brs, 1H, OH); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 162.6, 152.9, 149.6, 149.5, 148.5, 146.7, 142.4, 132.5, 126.4, 125.3, 113.0, 112.9, 112.0, 107.8, 99.7, 63.4, 56.5, 56.4, 56.1, 56.0; IR (KBr) ν : 3539, 3001, 2936, 2834, 1687, 1617, 1574, 1514, 1460, 1419, 1388, 1275, 1250, 1146, 1093, 1009, 949, 867 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{NaO}_7$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 395.1101, found 395.1099.

化合物 **3** 用二氯甲烷重结晶, 析出黄色透明方形晶体. m.p. 199~203 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 9.913 (s, 1H, CHO), 7.61 (s, 1H), 7.52 (s, 1H), 6.95 (s, 1H), 6.91 (s, 2H), 3.99 (s, 9H), 3.94 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 189.5, 161.2, 153.4, 152.3, 149.9, 149.5, 146.7, 142.9, 132.9, 128.1, 122.3, 113.0, 111.6, 110.1, 107.9, 99.8, 56.5, 56.4, 56.3, 56.1; IR (KBr) ν : 3001, 2963, 2838, 1698, 1679, 1618, 1590, 1511, 1461, 1404, 1342, 1280, 1139, 1083, 1005, 875, 778 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{18}\text{NO}_7\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 393.0945, found 393.0942.

3.3 (E)-(2-羟甲基-4,5-二甲氧基)苯基-3-(3,4-二甲氧基)苯基丙烯酸(10)的合成

在单口 50 mL 圆底烧瓶中加入化合物 **6** (712 mg, 2.0 mmol), NaOH (400 mg, 10.0 mmol)、无水乙醇(40 mL)和蒸馏水(2 mL), 回流 23 h. 减压蒸去乙醇, 加水溶解, 乙醚萃取(20 mL $\times$ 3), 水相用稀盐酸调 pH 至 2, 出现黄色浑浊物, 二氯甲烷萃取(50 mL $\times$ 3), 有机相用无水 MgSO_4 干燥, 过滤, 浓缩. 柱层析得回收化合物 **6** (252 mg)和白色固体 **10**. **10** 用二氯甲烷与石油醚混合溶剂重结晶, 得白色絮状固体(400 mg, 53.5%), m.p. 116~120 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.93 (s, 1H), 7.13 (s, 1H), 6.80 (d, $J=12.0$ Hz, 1H), 6.80 (s, 1H), 6.74 (s, 1H), 6.72 (s, 1H), 6.68 (s, 1H), 6.48 (s, 1H), 4.52 (d, $J=12.0$ Hz, 1H, PhCH_2O), 4.38 (d, $J=12.0$ Hz, 1H, PhCH_2O), 3.94 (s, 3H), 3.85 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 3.48 (s, 3H).

3.4 (E)-2,3-二(3,4-二甲氧基)苯基丙烯酸(12E)和(Z)-2,3-二(3,4-二甲氧基)苯基丙烯酸(12Z)的合成

在单口 50 mL 圆底烧瓶中加入 3,4-二甲氧基苯乙酸 (392 mg, 2.0 mmol), 3,4-二甲氧基苯甲醛(398 mg, 2.4 mmol)、醋酸酐(10 mL)和三乙胺(5 mL), 搅拌, 回流 24 h 后, 冷却至室温, 倒入装有 10 mL 水烧杯中, 加 K_2CO_3 水溶液, 出现固体, 加热至固体全部溶解. 冷却后, 乙

醚萃取(30 mL $\times$ 3), 水相用稀盐酸调 pH=5, 有白色固体析出, 抽滤、水洗涤, 干燥得白色固体 **12E** (516 mg, 75%), m.p. 214~216 °C^[3b]; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.87 (s, 1H), 6.93 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.86~6.84 (m, 2H), 6.81 (s, 1H), 6.73 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.85 (s, 3H), 3.82 (s, 3H), 3.49 (s, 3H). 滤液继续用稀盐酸调 pH=3, 有白色固体析出, 抽滤、水洗涤, 干燥得白色固体 **12Z** (85 mg, 12.4%), m.p. 170~171 °C^[3b]; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.06~7.02 (m, 4H), 6.94 (s, 1H), 6.90~6.84 (m, 2H), 3.92~3.90 (m, 9H), 3.86 (s, 3H).

3.5 2,3,6,7-四甲氧基菲-9-甲酸(13)的合成

将 **12E** 和 **12Z** 分别在与实验 3.2 相同反应条件下进行(DDQ 为 1.2 equiv.), 所得产物均为 **13**, 产率分别为 95%和 92%, 白色固体, m.p. 285~287 °C^[3b]; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 12.8 (brs, 1H, COOH), 8.55 (s, 1H), 8.42 (s, 1H), 8.05 (s, 1H), 8.01 (s, 1H), 7.56 (s, 1H), 4.06 (s, 3H), 4.05 (s, 3H), 3.92 (s, 3H), 3.89 (s, 3H).

References

- [1] Li, Z.; Jin, Z.; Huang, R. Q. *Synthesis* **2001**, 2365.
- [2] Zhang, C. G.; Li, J. J.; Chen, W. M. *Chin. J. Med. Chem.* **2010**, *20*, 379 (in Chinese).
(张成刚, 李建军, 陈文明, 中国药物化学杂志, **2010**, *20*, 379.)
- [3] (a) Su, B.; Li, L.; Hu, Y.; Liu, Y.; Wang, Q. M. *Adv. Synth. Catal.* **2012**, 354, 383.
(b) Wang, K. L.; Hu, Y.; Wu, M.; Li, Z.; Liu, Z. H.; Su, B.; Yu, A.; Liu, Y.; Wang, Q. M. *Tetrahedron* **2010**, *66*, 9135.
(c) Lu, M. Y.; Wang, K. L.; Cai, F.; Wang, H. Y.; Wang, Q. M. *Chin. J. Chem.* **2008**, *26*, 2241.
- [4] Finkelstein, J.; Brossi, A. *Org. Synth. Coll.* **1988**, *6*, 471.
- [5] Tamas, L.; Peter, F.; Földesi, A.; Osz, E.; Prokai, L. *Eur. J. Org. Chem.* **2002**, *17*, 2996.
- [6] Gu, Y. H.; Xue, K. *Tetrahedron Lett.* **2010**, *51*, 192.
- [7] Hata, K.; Hamamoto, H.; Shiozaki, Y.; Kita, Y. *Chem. Commun.* **2005**, *19*, 2465.
- [8] Pandeyx, G.; Krishna, A.; Rao, J. M. *Tetrahedron Lett.* **1986**, *27*, 4075.
- [9] Lee-ruff, E.; Ablenas, F. J. *Can. J. Chem.* **1989**, *67*, 699.

(Zhao, X.)