氯化铯催化羧酸钠(钾)与 α -氯代乙酸酯及溴(氯)代烃反应刘文奇^a 奇建永^b 陈锦杨^b 李宁波^b 邱仁华^b 许新华^{*,b}^(a) 湘南学院湘南稀贵金属化合物及其应用湖南省重点实验室 郴州 423000^(b) 湖南大学化学化工学院 长沙 410082

摘要 以 DMF 为溶剂, 在催化量氯化铯存在下, 羧酸钠(钾)与 α -氯代乙酸酯在室温下反应及其与溴(氯)代烃在 60 °C 反应, 分别形成对应的羧酸(α -烷氧甲酰)甲酯与羧酸酯, 产率 90% 以上, 讨论了催化机理。

关键词 氯化铯; 羧酸钠(钾); α -氯代乙酸酯; 酯化反应

Cesium Chloride Catalyzed the Reaction of Sodium (Potassium) Carboxylates with Alkyl Bromides (Chlorides)

Liu, Wenqi^a Qi, Jianyong^b Chen, Jinyang^b Li, Ningbo^b Qui, Renhua^b
Xu, Xinhua^{*,b}^(a) Hunan Provincial Key Laboratory of Xiangnan Rare-Precious Metals Compounds Research and Application, Xiangnan University, Chenzhou 42300^(b) College of Chemistry Chemical and Engineering, Hunan University, Changsha 410082

Abstract In the presence of catalytic amounts of cesium chloride, using DMF as solvent, sodium (potassium) carboxylates reacted with α -chloroacetates at room temperature or reacted with alkyl bromides (chlorides) at 60 °C to give the corresponding (α -alkoxyformacyl)methyl carboxylic esters and carboxylic esters in >90% yields. The catalytic mechanism was discussed.

Keywords cesium chloride; sodium (potassium) carboxylates; alkyl bromides (chlorides); esterification

铯离子能活化与之结合的阴离子, 这是因为铯离子体积大, 它与阴离子之间的静电作用较弱, 在极性的非质子溶剂中, 铯离子易被溶剂化, 而由于溶剂偶极不易靠近阴离子, 使阴离子不易被溶剂化而呈“裸露”的离子。导致与之键合的氢氧根离子表现出强碱性, 与之键合的阴离子具有强的亲核能力。碱金属氢氧化物碱性是按 LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH 依次增强, 氢氧化铯称之为超强碱^[1], 它能与弱酸性的物质如端炔形成对水稳定的炔负离子, 炔负离子能发生各种亲核反应^[1~3]; 阴离子具有强的亲核性, 可以降低反应活化能, 使需要高温进行的反应在室温或温和条件下就能进行, 可有效避免副反应发生, 达到提高反应选择性之目的。根据上述原理, 本课题组^[4~8]进行了铯离子催化端炔与二杂醚反应研究。

酯在自然界的分布很广, 许多鲜花和水果的愉悦气

味和芳香均来源于酯。很多药物的分子结构都含有酯基。酯的制备一般通过强酸催化下的羧酸与醇缩合, 但是大多数情况下需要加热, 有时需要高温。所以这一方法仅适合制备简单的酯, 不适用于含有对酸或热敏感官能团的底物。通过羧酸盐与卤代烃反应是制备酯的另一条途径。羧酸盐亲核性弱, 一般只与活性高的卤代烃如碘代烃或苄基卤反应, 但碘代烃价格昂贵, 导致其应用受到限制; 对于活性低的溴或氯代烃, 与羧酸盐反应要使用相转移催化剂, 且需要在高温条件下反应才能有效进行^[9~13]。我们根据铯离子活化阴离子原理, 设计用铯离子催化羧酸盐与 α -氯代乙酸酯和溴代烃反应制备相应的 α -烷氧甲酰甲酯与羧酸酯。本文报道研究结果。

1 结果与讨论

羧酸盐与 α -氯代乙酸酯反应制备 α -烷氧甲酰甲酯。

* E-mail: xhx1581@yahoo.com.cn

Received August 13, 2012; revised September 8, 2012; published online September 21, 2012.

Project supported by the Natural Science Foundation of Hunan Province (No. 08JJ3018).

湖南省自然科学基金(No. 08JJ3018)资助项目。

以 α -氯代乙酸苯甲酯与乙酸钠反应为模型, 考察氯化铯对反应的影响. 实验表明, 不加氯化铯时, 乙酸钠(1.0 mmol)和 α -氯代乙酸苯甲酯(1.0 mmol)在 *N,N*-二甲基甲酰胺(DMF) (3.0 mL)中室温下反应 10 h, 产率仅为 40%. 加入 5.0 mol%氯化铯(0.05 mmol), 室温下反应 5.0 h, 产率 62%. 这结果表明氯化铯对这反应有明显的催化效果. 继而考察 α -氯代乙酸苯甲酯与乙酸钠, 氯化铯用量与反应时间与产率之关系, 结果见表 1.

表 1 氯化铯用量与时间对 α -氯代乙酸苯甲酯与乙酸钠反应的影响

Table 1 Influence of amount of cesium chloride and time on the reaction of methyl α -chloro-phenylacetate with sodium acetate

Entry	CsCl/mol%	Time/h	Yield/%
1	5.0	5.0	62
2	5.0	10.0	73
3	5.0	20.0	81
4	10.0	5.0	75
5	10.0	10.0	82
6	10.0	20.0	88
7	20.0	5.0	91
8	30.0	5.0	93

由表 1 可知, 随着氯化铯用量增加, 反应速度增加; 在氯化铯用量一定情况下, 延长反应时间, 可提高产率. 当氯化铯用量为 30.0 mol%, 与用量 20.0 mol% 相比, 产率无明显变化. 20.0 mol% 氯化铯的量是较佳选择. 在此条件下, 考察其他羧酸盐与 α -氯代乙酸酯反应(Eq. 1), 结果见表 2.

由表 1 可知, 乙酸钠、苯甲酸钠、硬脂酸钾与不同 α -氯代乙酸酯反应, 均取得高的收率. 取代基对反应有一定影响. 羧酸盐及 α -氯代乙酸酯中取代基 R^1 及 R^2 的大小影响反应速度. 随着 R^1 及 R^2 的增大, 反应所需时间增加.

羧酸盐与溴代烃反应制备羧酸酯,以溴代正辛烷(1.0 mmol)与苯甲酸钠(1.0 mmol)反应为模型,考察氯化铯用量、温度及时间对反应的影响. 在没有氯化铯时,室温下溴代正辛烷(1.0 mmol)与苯甲酸钠(1.0 mmol)在无水 DMF (3.0 mL)中反应 10 h, 苯甲酸正辛酯产率仅为 10%; 反应 24 h, 产率为 30%; 加热到 60 °C, 反应 10 h 后产率为 40%. 在氯化铯(10.0 mol%, 0.10 mmol)存在下, 在室温下反应, 反应 10 h, 产率为 35%; 反应 24 h, 产率为 66%, 60 °C 下反应 10 h, 产率达到 83%. 上述实验表明, 催化剂用量及温度对反应有明显影响. 通过系统探索, 得出较佳的反应条件是: 氯化铯用量为 20.0 mol%, 温度为 60 °C, 时间 10.0 h. 在此条件下, 考察多种羧酸盐与溴代烃反应(Eq. 2), 结果见表 3.

由表 2 知, 羧酸盐与活泼的苄溴反应, 在 3.0 h 即可达 90% 产率; 羧酸盐与伯卤代烃的反应大部分能在 10 h 能完成反应; 溴代烃比对应氯代反应快; 取代基越大, 反应速度越慢, 如硬脂酸钾与伯卤代烃反应需要较长反应时间。

上述反应可能的机理如 Scheme 1.

Scheme 1

表2 羧酸盐与 α -氯代乙酸酯反应结果
Table 2 Reaction results of carboxylates and α -chloroacetates

Compd.	R ¹ COOM	ClCH ₂ COOR ²	Time/h	Isolated yield/%
3a	CH ₃ COONa	ClCH ₂ COOCH ₂ Ph	5.0	91
3b	CH ₃ COONa	ClCH ₂ COOCH ₂ CH ₂ Ph	5.0	93
3c	CH ₃ COONa		10.0	92
3d	PhCOONa	ClCH ₂ COOCH ₃	5.0	95
3e	PhCOONa	ClCH ₂ COOCH ₂ Ph	5.0	92
3f	PhCOONa	ClCH ₂ COOCH ₂ CH ₂ Ph	10.0	91
3g	PhCOONa		15.0	90
3h	CH ₃ (CH ₂) ₁₅ CH ₂ COOK	ClCH ₂ COOCH ₃	20.0	93

表 3 羧酸盐与溴代烃反应结果
Table 3 Reaction results of carboxylates and alkyl bromides

Compd.	R ¹ COOM	R ³ X	Time/h	Isolated yield/%
5a	CH ₃ COONa	PhCH ₂ Br	3.0	90
5b	CH ₃ COONa	CH ₃ (CH ₂) ₆ CH ₂ Br	10.0	94
5c	PhCOONa	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ Br	10.0	91
5d	PhCOONa	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ Cl	10.0	82
5e	PhCOONa	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ Cl	15.0	90
5f	PhCOONa	CH ₃ (CH ₂) ₆ CH ₂ Br	10.0	94
5g	PhCOONa	PhCH ₂ Br	3.0	90
5h	CH ₃ (CH ₂) ₁₅ CH ₂ COOK	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ Br	20.0	90
5i	CH ₃ (CH ₂) ₁₅ CH ₂ COOK	CH ₃ (CH ₂) ₆ CH ₂ Br	20.0	91
5j	CH ₃ (CH ₂) ₁₅ CH ₂ COOK	PhCH ₂ Br	8.0	92
5k	CH ₂ =CH(CH ₂) ₈ COOK	PhCH ₂ CH ₂ Br	18.0	92

由 Scheme 1 可知, 羧酸钠或羧酸钾与氯化铯通过离子交换产生亲核性高的羧酸铯, 羧酸铯与溴代烃反应形成羧酸酯及溴化铯, 溴化铯随后再与羧酸盐进行离子交换产生羧酸铯。

2 结论

本文研究工作表明, 催化量氯化铯可以加速羧酸盐与卤代烃反应, 提高产率。本方法为改善羧酸酯的制备提供了一条新途径。

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

¹H NMR(以 TMS 为内标), ¹³C NMR(以 TMS 为内标)用 INOVA-400 型仪测定, 质谱由 HP5989A 测定。DMF 用氢化钙干燥, 硅胶为青岛海洋化工厂产品。

3.2 实验方法

3.2.1 羧酸盐与 α-氯代乙酸酯反应合成 α-烷氧甲酯甲酯

在圆底烧瓶中依次加入羧酸盐(1.0 mmol), 无水 DMF (3.0 mL), α-氯代乙酸酯(1.0 mmol), 氯化铯(0.2 mmol), 在室温搅拌, 反应时间见表 1。反应后减压蒸出溶剂, 加入 50 mL 石油醚稀释, 水洗, 无水硫酸钠干燥, 用石油醚/乙醚(V:V=30:1)作洗脱剂进行柱层析纯化。

乙酸(α-苯甲氧甲酯)甲酯(3a)^[19]: 浅黄色油状液体; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 2.13 (s, 3H), 4.43 (s, 2H), 4.63 (s, 2H), 7.32~7.36 (m, 5H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 170.3, 169.1, 136.1, 128.9, 127.1, 66.1, 60.4, 20.4; MS (EI) m/z: 208 (M⁺)。

乙酸(α-苯乙氧甲酯)甲酯(3b)^[14]: 浅黄色油状液体。 ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 2.13 (s, 3H), 2.95 (t, J=8.0 Hz, 2H), 4.37 (t, J=8.0 Hz, 2H), 4.57 (s, 2H), 7.19~7.32

(m, 5H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 170.5, 169.4, 138.5, 128.7, 127.6, 125.9, 64.7, 60.4, 34.6, 20.3; MS (EI) m/z: 222 (M⁺)。

乙酸[(3,7-二甲基-2,6-二烯)辛氧甲酯]甲酯(3c)^[14]: 浅黄色油状液体。 ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 1.60~1.71 (m, 9H), 2.16 (s, 3H), 2.04~2.09 (m, 4H), 4.60 (s, 2H), 4.68 (d, J=8 Hz, 2H), 5.06~5.09 (m, 1H), 5.31~5.35 (m, 1H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 170.3, 167.1, 132.0, 129.5, 123.5, 120.0, 61.7, 35.9, 26.3, 24.6, 20.4, 18.6, 15.5; MS (EI) m/z: 240 (M⁺)。

苯甲酸(α-甲氧甲酯)甲酯(3d)^[15]: 黄色油状液体。 ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 3.78 (s, 3H), 4.86 (s, 2H), 7.43~8.10 (m, 5H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 166.9, 165.7, 133.1, 130.3, 129.8, 128.5, 61.2, 51.6; MS (EI) m/z: 194 (M⁺)。

苯甲酸(α-苯甲氧甲酯)甲酯(3e)^[16]: 黄色油状液体。 ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 4.89 (s, 2H), 5.23 (s, 2H), 7.36~8.11 (m, 10H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 169.3, 167.2, 138.8, 136.1, 133.4, 128.9, 127.6, 127.1, 126.8, 66.2, 63.5; MS (EI) m/z: 270 (M⁺)。

苯甲酸(α-苯乙氧甲酯)甲酯(3f)^[16]: 黄色油状液体。 ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 2.95 (t, J=8.0 Hz, 2H), 4.38~4.41 (t, J=8.0 Hz, 2H), 4.83 (s, 2H), 7.17~8.09 (m, 10H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 169.4, 165.8, 138.2, 133.0, 130.1, 129.9, 128.6, 128.5, 127.7, 125.8, 64.9, 61.5, 34.5; MS (EI) m/z: 284 (M⁺)。

苯甲酸[(3,7-二甲基-2,6-二烯)辛氧甲酯]甲酯(3g)^[17]: 黄色油状液体。 ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 1.60~1.70 (m, 9H), 2.04~2.10 (m, 4H), 4.72 (d, J=8 Hz, 2H), 4.85 (s, 2H), 5.06 (t, J=6.0 Hz, 1H), 5.35 (t, J=6.0 Hz, 1H), 7.26~8.11 (m, 5H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 167.1, 165.8, 133.0, 132.0, 130.1, 129.9, 129.7, 128.5, 123.5, 120.1, 61.6, 35.9, 26.1, 24.6, 18.6, 12.5; MS

(EI) m/z : 302 (M^+).

硬脂酸(α -甲氧甲酰)甲酯(**3h**)^[17]: 黄色粘稠液体. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (t, $J=6.0$ Hz, 3H), 1.25~1.68 (m, 28H), 2.42 (t, $J=6.0$ Hz, 2H), 3.77 (s, 3H), 4.62 (s, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 173.1, 166.7, 60.4, 51.6, 33.7, 29.6, 29.3, 29.0, 25.1, 21.4, 14.1; MS (EI) m/z : 356 (M^+).

3.2.2 羧酸盐与 α -氯代乙酸酯反应合成 α -烷氧甲酰甲酯

在圆底烧瓶中依次加入羧酸盐(1.0 mmol), 无水 DMF (3.0 mL), 溴代烃(1.0 mmol), 氯化铯(0.2 mmol), 在 60 $^\circ\text{C}$ 搅拌, 反应时间见表 2. 反应后减压蒸出溶剂, 加入石油醚(50 mL)稀释, 水洗, 无水硫酸钠干燥, 用石油醚/乙醚($V:V=30:1$)作洗脱剂进行柱层析纯化.

乙酸苯甲酯(**5a**)^[18]: 油状液体. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 2.08 (s, 3H), 5.09 (s, 2H), 7.30~7.35 (m, 5H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 170.3, 136.2, 128.8, 127.4, 127.2, 66.4, 20.3; MS (EI) m/z : 150 (M^+).

乙酸正辛酯(**5b**)^[19]: 油状液体. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (t, $J=6.0$ Hz, 3H), 1.28~1.36 (m, 10H), 1.60~1.63 (m, 2H), 2.05 (s, 3H), 4.05 (t, $J=6.0$ Hz, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 170.1, 65.4, 30.2, 29.1, 28.6, 25.4, 22.6, 20.5, 14.3; MS (EI) m/z : 172 (M^+).

苯甲酸正丁酯(**5c**)^[19]: 油状液体. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.98 (t, $J=6.4$ Hz, 3H), 1.48~1.54 (m, 2H), 1.76~1.83 (m, 2H), 4.33 (t, $J=6.4$ Hz, 2H), 7.26~8.06 (m, 5H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 167.1, 133.6, 130.4, 129.8, 128.4, 64.7, 31.4, 18.5, 14.4; MS (EI) m/z : 178 (M^+).

苯甲酸正辛酯(**5f**)^[20]: 油状液体. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (t, $J=6.4$ Hz, 3H), 1.28~1.46 (m, 10H), 1.73~1.76 (m, 2H), 4.31 (t, $J=6.4$ Hz, 2H), 7.48~8.06 (m, 5H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 165.8, 132.9, 130.1, 129.6, 128.5, 64.5, 31.9, 30.6, 29.7, 25.6, 22.4, 14.2; MS (EI) m/z : 234 (M^+).

苯甲酸苯甲酯(**5g**)^[20]: 浅黄色油状液体. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 5.09 (s, 2H), 7.39~8.09 (m, 10H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 167.3, 136.5, 133.7, 130.5, 129.7, 128.7, 128.3, 127.6, 127.1, 65.5; MS (EI) m/z : 212 (M^+).

硬脂酸正丁酯(**5h**)^[21]: 浅黄色油状液体. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (t, $J=6.0$ Hz, 3H), 0.93 (t, $J=6.2$ Hz, 3H), 1.25~1.39 (m, 30H), 1.59~1.63 (m, 4H), 2.29 (t, $J=6.4$ Hz, 2H), 4.07 (t, $J=6.4$ Hz, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 173.3, 64.8, 33.7, 31.1, 29.6, 29.3,

29.0, 25.0, 22.6, 18.7, 14.3, 13.7; MS (EI) m/z : 340 (M^+).

硬脂酸正辛酯(**5i**)^[21]: 浅黄色油状液体. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.86~0.90 (m, 6H), 1.25~1.28 (m, 40H), 1.60~1.63 (m, 4H), 2.29 (t, $J=6.4$ Hz, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 173.1, 65.2, 33.6, 31.5, 29.6, 29.3, 29.0, 28.7, 25.8, 25.1, 22.7, 18.7, 14.1; MS (EI) m/z : 396 (M^+).

硬脂酸苯甲酯(**5j**)^[22]: 浅黄色油状液体. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.88 (t, $J=6.4$ Hz, 3H), 1.25~1.28 (m, 28H), 1.62~1.65 (m, 4H), 2.35 (t, $J=6.4$ Hz, 2H), 5.11 (s, 2H), 7.26~7.38 (m, 5H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 173.2, 136.4, 128.8, 127.6, 127.1, 66.2, 33.8, 31.7, 29.6, 29.3, 29.0, 25.1, 22.6, 14.1; MS (EI) m/z : 374 (M^+).

11-烯十一酸(2-苯基)乙酯(**5k**)^[22]: 浅黄色油状液体. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 1.27~1.33 (m, 10H), 1.36~1.40 (m, 2H), 1.58~1.65 (m, 2H), 2.04 (dt, $J=1.2$, 8.0 Hz, 2H), 2.27 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 2.93 (t, $J=7.2$ Hz, 2H), 4.38 (t, $J=7.2$ Hz, 2H), 4.94 (dd, $J=1.2$, 10.4 Hz, 1H), 4.99 (dd, $J=1.6$, 17.2 Hz, 1H), 5.81~5.88 (m, 1H), 7.20~7.24 (m, 3H), 7.28~7.32 (m, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 174.5, 139.8, 138.6, 128.3, 127.5, 125.7, 115.6, 65.4, 33.9, 34.4, 29.8, 29.3, 28.7, 25.1; MS (EI) m/z : 288 (M^+).

References

- [1] Tzalis, D.; Knochel, P. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1999**, 38, 1463.
- [2] Salvatore, R. N.; Nagle, A. S.; Jung, K. W. *J. Org. Chem.* **2002**, 67, 674.
- [3] Tzalis, D.; Koradin, C.; Knochel, P. *Tetrahedron Lett.* **1999**, 40, 6193.
- [4] Li, X. W.; Liu, W. Q.; Zou, K. B. *Chin. J. Org. Chem.* **2007**, 27, 1176 (in Chinese).
(黎小武, 刘文奇, 邹康兵, 许新华, 有机化学, **2007**, 27, 1176.)
- [5] Xia, X.; Zou, K. B.; Fang, D. W.; Xu, X. H. *Chin. J. Org. Chem.* **2008**, 28, 1487 (in Chinese).
(夏湘, 邹康兵, 方大为, 许新华, 有机化学, **2008**, 28, 1487.)
- [6] Zou, K. B.; Qiu, R. H.; Fang, D. W.; Liu, X. Y.; Xu, X. H. *Synth. Commun.* **2008**, 38, 237.
- [7] Zou, K. B.; Yin, X. H.; Liu, W. Q.; Qiu, R. H.; Li, L. X.; Shao, L. L.; Li, Y. H.; Xu, X. H.; Yang, R. H. *Synth. Commun.* **2009**, 39, 646.
- [8] Xia, X.; Zou, K. B.; Li, N. X.; Zhang, Z. Y.; Shao, L. L.; Xu, X. H. *Acta Chim. Sinica* **2008**, 66, 1749.
(夏湘, 邹康兵, 李诺信, 张尊英, 邵玲玲, 许新华, 化学学报, **2008**, 66, 1749.)
- [9] Steven, C. W.; Rayman, Y. W. *Tetrahedron Lett.* **1972**, 13, 1853.
- [10] Douglas, J. R.; Patrick, G.; Albert, O. B. *J. Org. Chem.* **1979**, 44, 1149.
- [11] Zaher, M. A. J.; Hao, Y. S.; Bun, C. C. *Tetrahedron Lett.* **2002**, 43, 9381.
- [12] Cheng, B. C.; Xie, W. L. *J. Central South Univ. Technol.* **1998**, 29,

- 401 (in Chinese).
(成本诚, 谢文林, 中南工业大学学报, **1998**, 29, 401.)
- [13] Chen, D. M.; Yang, H. R.; Li, B. N. *Petrochem. Technol.* **1999**, 28, 528 (in Chinese).
(陈达美, 杨辉荣, 黎碧娜, 石油化工, **1999**, 28, 5.)
- [14] Barratt, B. J. W.; Easton, C. J.; Simpson, J. S. *PCT Int. Appl.* **2004**, 47, 87.
- [15] Nielsen, N. M.; Bundgaard, H. *Int. J. Pharm.* **1987**, 391, 75.
- [16] Murai, K.; Akazome, G. *Kogyo Kagaku Zasshi* **1959**, 62, 1094.
- [17] Liu, Y.; Wei, M.; Liu, Z.-D. *China Food Additives* **2011**, 4, 8.
- [18] Sadieva, N. F.; Iskenderova, S. A.; Agaev, B. K.; Magerramova, S. N. *Azerb. Khim. Zh.* **2010**, (4), 68.
- [19] Nudelman, N. S.; Mendiara, S. *Tetrahedron Lett.* **1997**, 38(13), 2245.
- [20] Long, L.-P.; Zhong, T.-S.; Ding, L.-Z.; Yu, S.-X. *Chin. J. Synth. Chem.* **2002**, 10(6), 542.
- [21] Vijayakumar, B.; Nagendrappa, G.; Prakash, B. S. J. *Indian J. Chem. Technol.* **2009**, 16(5), 377.
- [22] Zhang, M.; Hanson, P. R. *Sci. Synth.* **2006**, 20, 863.

(Li, L.; Lu, Z.)