1-对甲苯基-5-取代苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酸/甲酰胺的合成及生物活性研究

彭春勇 辛春伟 李建发 戢 丹 鲍秀荣 卢俊瑞*

(天津理工大学化学化工学院 天津 300384)

摘要 以对甲基苯胺为原料, 经过重氮化反应生成对甲基叠氮苯(**1**). 在强碱性条件下, **1** 分别与氰基乙酸乙酯、氰基乙酰胺反应, 制得中间体 1-对甲苯基-5-氨基-1,2,3-三唑甲酸乙酯(**2**)和 1-对甲苯基-5-氨基-1,2,3-三唑甲酰胺(**5**); 中间体 **2** 经水解生成 1-对甲苯基-5-氨基-1,2,3-三唑甲酸(**3**), 进而在弱酸性条件下与取代苯甲醛反应得到 6 个未见文献报道的目标化合物 1-对甲苯基-5-取代苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酸(**4a~4f**), **5** 与取代苯甲醛反应得到 6 个未见文献报道的目标化合物 1-对甲苯基-5-取代苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酰胺(**6a~6f**), 化合物的结构均经 IR, ^1H NMR, ^{13}C NMR 确证. 初步生物测试表明, 12 个化合物均表现出良好的抑菌活性, 其中化合物 **4d~4f** 和 **6d~6f** 对金黄色葡萄球菌、白色念球菌的最小抑菌浓度(MIC)值为 $2\sim 8\ \mu\text{g/mL}$, 抗菌效果优于氟康唑和三氯生.

关键词 1-对甲苯基-5-氨基-1,2,3-三唑甲酸; 1-对甲苯基-5-氨基-1,2,3-三唑甲酰胺; 1-对甲苯基-5-取代苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酸; 1-对甲苯基-5-取代苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酰胺; 合成; 抗菌活性

Synthesis and Biological Activities of 1-(4-Methyl)phenyl-5-substituted phenylimino-1,2,3-triazole Carboxylic Acid/Carboxylic Acid Amide

Peng, Chunyong Xin, Chunwei Li, Jianfa Ji, Dan Bao, Xiurong Lu, Junrui*

(School of Chemistry and Chemical Engineering, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384)

Abstract 4-Methylphenylazide (**1**) was synthesized through diazotization reactions from 4-methylaniline, and then reacted with ethyl cyanoacetate or 2-cyanoacetamide to obtain 1-(4-methyl)phenyl-5-amino-1,2,3-triazole carboxylic ethyl ester (**2**) and 1-(4-methyl)phenyl-5-amino-1,2,3-triazole carboxylic acid amide (**5**) in strong alkaline condition. Compound **2** hydrolyzed into 1-(4-methyl)phenyl-5-amino-1,2,3-triazole carboxylic acid (**3**). Then, in weak acidic condition, 1-(4-methyl)phenyl-5-substituted phenylimino-1,2,3-triazole carboxylic acids (**4a~4f**) were obtained from compound **3** and substituted benzaldehyde. Meanwhile, other 6 novel 1-(4-methyl)phenyl-5-substituted phenylimino-1,2,3-triazole carboxylic acid amides (**6a~6f**) were synthesized from compound **5** and substituted benzaldehyde. The structures of all compounds have been confirmed by ^1H NMR, ^{13}C NMR and IR. The preliminary bioassay showed that, all target compounds possessed efficient antibacterial activities. Especially, the mic values of compounds **4d~4f** and **6d~6f** were $2\sim 8\ \mu\text{g/mL}$, lower than fluconazole and triclosan.

Keywords 1-(4-methyl)phenyl-5-amino-1,2,3-triazole carboxylic acid; 1-(4-methyl)phenyl-5-Amino-1,2,3-triazole carboxylic acid amide; 1-(4-methyl)phenyl-5-substituted phenylimino-1,2,3-triazole carboxylic acid/carboxylic acid amide; synthesis; antibacterial activity

1,2,3-三唑是五元氮杂环, 是酰胺键的电子等排物, 它在代谢转化、氧化还原及酸碱条件下都具有相当强的稳定性, 很多含 1,2,3-三唑的化合物具有良好的抗

HIV^[1]、抗菌^[2,3]、抗高血糖^[4]、抗痉挛^[5]等活性, 是良好的药效基团. 席夫碱类化合物因其分子中含有亚胺结构, 其杂化轨道的 N 原子具有孤对电子, 有良好的配位

* E-mail: lujunrui@tjut.edu.cn

Received September 28, 2012; revised October 14, 2012; published online October 26, 2012.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 20976135, 21176194).

国家自然科学基金(Nos. 21176194, 20976135)资助项目.

能力,常常表现出良好的生物活性,如抗癌^[6]、抗细菌^[7,8]、抗病毒^[9]等活性.近年来,我们课题组^[10~12]利用“邻羟苯基”对 FabI, InhA 基因等病原体靶标的良好亲合性,以及“三唑环”对细菌、真菌、HIV-RT 等靶标较强的亲合性和特异性,设计合成了一批具有良好生物活性的邻羟苯基三唑类化合物.

根据上述研究,为了进一步探讨邻羟苯基修饰三唑类化合物的合成技术,深入研究其生物活性及构效关系规律,本文依据生物叠加原理,将“邻羟苯基”、“三唑环”、“CH=N”片段进行合理组装,设计合成了系列未见报道的1-对甲基苯基-5-取代苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酸/甲酰胺化合物,利用 ¹H NMR, ¹³C NMR 和 IR 对其结构进行表征,并研究上述化合物对金黄色葡萄球菌(革兰氏阳性菌)、大肠杆菌(革兰氏阴性菌)与白色念珠菌(真菌)的抗菌活性.测试结果显示,所有的目标化合物均表现出良好的抗菌活性,进一步研究发现,5 取代苯环的 5 位引入卤素能大幅提高目标化合物的抗菌活性,其中,Cl 原子的引入使目标化合物的抗菌活性提高最多.其合成路线见 Scheme 1.

1 实验部分

1.1 仪器和试剂

美国尼高力仪器公司的 Avatar 370 型红外光谱仪(KBr 压片);德国 Bruker 公司的 AM 400 型核磁共振仪(TMS 为内标, DMSO-*d*₆ 为溶剂);天津市分析仪器厂的 RY-1 型熔点测定仪测定(温度计未校准);广东省医疗器械厂的 LRH-250A 型生化培养箱;日本 Yanaco 公司 Yanaco CHN Corder MT-3 型元素自动分析仪;上海亚荣生化仪器厂 RE-52AA 型旋转蒸发器.

5-溴水杨醛、3,5-二溴水杨醛按文献[13, 14]制备,对甲基叠氮苯按文献[15]制备;大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等菌株由天津医科大学微生物实验室提供;其它试剂均为国产市售 AR 或 CP 级.

1.2 中间体 2, 3 和 5 的合成

1.2.1 1-对甲基苯基-5-氨基-1,2,3-三唑甲酸乙酯(2)的合成

将 0.53 g (25 mmol)金属钠加入到 13 mL 的无水乙醇中,配制乙醇钠的乙醇溶液备用.向 50 mL 的三口瓶中加入 2.83 g (25 mmol)氰基乙酸乙酯和 3.33 g (25 mmol)对甲基叠氮苯,再滴加上述配制好的乙醇钠溶液,反应液中出现大量白色沉淀,温度升至 45 °C,滴加完后,降至室温, TLC 跟踪反应[V(石油醚):V(乙酸乙酯)=1:1],原料点消失,停止反应,抽滤,水洗,乙醇重结晶,得白色针状晶体 5.25 g,产率 85.2%. m.p. 151~152 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 400 MHz) δ : 7.42~7.35 (m, 4H, ArH), 5.28 (s, 2H, NH₂), 4.43 (dd, *J*=14.0, 6.8 Hz, 2H, CH₂), 2.44 (s, 3H, CH₃), 1.44 (t, *J*=5.6 Hz, 3H, CH₃).

1.2.2 1-对甲基苯基-5-氨基-1,2,3-三唑甲酸(3)的合成

向 250 mL 三口瓶中加入 2.00 g (8.0 mmol)中间体 2 和 100 mL 的无水乙醇,搅拌升温至回流,反应液澄清,再加入 0.45 g (8.0 mmol) KOH, 10 min 后反应液浑浊, 2 h 后 TLC 跟踪[V(石油醚):V(乙酸乙酯)=4:1]显示原料点消失,停止反应,冷却至室温,冰乙酸的水溶液调 pH 到 6,室温下搅拌 6 h,析出大量白色固体,抽滤,水洗,乙醇重结晶,干燥,得白色粉末固体 1.50 g,产率 84.8%. m.p. 124~125 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 400

4a: R¹=OH, R²=H, R³=H, R⁴=H; 4b: R¹=Br, R²=H, R³=H, R⁴=H; 4c: R¹=H, R²=H, R³=OH, R⁴=OCH₃; 4d: R¹=OH, R²=H, R³=H, R⁴=Cl; 4e: R¹=OH, R²=H, R³=H, R⁴=Br; 4f: R¹=OH, R²=Br, R³=H, R⁴=Br; 6a: R¹=OH, R²=H, R³=H, R⁴=H; 6b: R¹=Br, R²=H, R³=H, R⁴=H; 6c: R¹=H, R²=H, R³=OH, R⁴=OCH₃; 6d: R¹=OH, R²=H, R³=H, R⁴=Cl; 6e: R¹=OH, R²=H, R³=H, R⁴=Br; 6f: R¹=OH, R²=Br, R³=H, R⁴=Br

Scheme 1

MHz) δ : 12.67 (s, 1H, COOH), 7.44 (dd, $J=12.4, 8.4$ Hz, 4H, ArH), 6.40 (s, 2H, NH₂), 2.41 (s, 3H, CH₃).

1.2.3 1-对甲基苯基-5-氨基-1,2,3-三唑甲酰胺(**5**)的合成

将 0.53 g (25 mmol) 金属钠加入到 13 mL 的无水乙醇中, 配制乙醇钠的乙醇溶液备用. 向 50 mL 的三口瓶中加入 2.10 g (25 mmol) 氰基乙酰胺和 3.33 g (25 mmol) 对甲基叠氮苯, 再滴加上述配制好的乙醇钠溶液, 反应液中出现大量白色沉淀, 温度升至 45 °C, 滴加完后, 降至室温, TLC 跟踪反应 [V (石油醚): V (乙酸乙酯) = 1:1], 原料点消失, 停止反应, 抽滤, 水洗, 乙醇重结晶, 得白色粉末状晶体 4.79 g, 产率 88.4%. m.p. 204~206 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 400 MHz) δ : 7.43 (dd, $J=20.0, 8.8$ Hz, 4H, ArH), 6.80 (s, 1H, CONH₂), 5.41 (s, 1H, CONH₂), 5.29 (s, 2H, NH₂), 2.48 (s, 3H, CH₃).

1.3 目标化合物 4a~4f 和 6a~6f 的合成

1.3.1 1-对甲基苯基-5-取代苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酸(**4a~4f**)的合成

向 50 mL 的三口瓶中加入 1.46 g (12 mmol) 水杨醛, 25 mL 无水乙醇, 搅拌升温至 60 °C, 加入 2.18 g (10 mmol) 中间体(**3**), 继续升温至回流, 反应液澄清, 用 3 mol/L 的盐酸溶液调反应液的 pH 至 4~5, 回流反应, TLC 跟踪反应 [V (石油醚): V (乙酸乙酯) = 1:1], 原料点消失后, 停止反应, 冷却至室温, 静置, 析出大量浅黄色固体, 抽滤, 固体用乙醇重结晶, 得黄色絮状固体 **4a**. 参照上述方法制得目标化合物 **4b~4f**.

1-对甲基苯基-5-邻羟苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酸(**4a**): 黄色絮状固体, 产率 74.2%. m.p. 186~188 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 400 MHz) δ : 11.74 (s, 1H, OH), 8.83 (s, 1H, N=CH), 7.53 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, ArH), 7.45 (t, $J=7.6$ Hz, 2H, ArH), 7.39 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 7.00 (d, $J=8.8$ Hz, 2H, ArH), 2.47 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 100 MHz) δ : 165.6, 161.0, 144.1, 139.8, 135.0, 133.2, 133.0, 130.1, 124.4, 121.2, 120.0, 118.5, 117.6, 77.2, 21.3; IR (KBr) ν : 3445, 3240, 3125, 1609, 1518, 1379, 1279, 816 cm⁻¹. Anal. calcd for C₁₇H₁₄N₄O₃: C 63.35, H 4.38, N 17.38; found C 63.23, H 4.45, N 17.33.

1-对甲基苯基-5-邻溴苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酸(**4b**): 米黄色粉末状固体, 产率 69.8%. m.p. 123~124 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 400 MHz) δ : 9.13 (s, 1H, N=CH), 8.15~8.13 (m, 1H, ArH), 7.67 (d, $J=4.8$ Hz, 3H, ArH), 7.41~7.38 (m, 2H, ArH), 7.36 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 2.47 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 100 MHz) δ : 162.2, 145.7, 138.9, 133.7, 133.6, 133.5, 130.4, 129.7, 129.3, 127.9, 126.8, 124.1, 121.4, 77.2, 21.2; IR (KBr) ν :

3237, 3116, 1636, 1516, 1439, 1381, 809, 756 cm⁻¹. Anal. calcd for C₁₇H₁₃N₄O₂Br: C 53.00, H 3.40, N 14.54; found C 53.12, H 3.37, N 14.49.

1-对甲基苯基-5-[(3-甲氧基-4-羟基)苯基]亚胺基-1,2,3-三唑甲酸(**4c**): 黄色粉末状固体, 产率 71.3%. m.p. 218~220 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 400 MHz) δ : 9.85 (s, 1H, OH), 8.61 (s, 1H, N=CH), 7.72 (d, $J=2.4$ Hz, 2H, ArH), 7.50 (d, $J=1.6$ Hz, 1H, ArH), 7.38~7.33 (m, 3H, ArH), 7.03 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, ArH), 3.97 (s, 3H, OCH₃), 2.46 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 100 MHz) δ : 162.9, 150.3, 147.1, 146.3, 138.6, 133.9, 129.5, 128.1, 125.9, 123.9, 120.8, 114.6, 109.3, 77.2, 56.1, 21.2; IR (KBr) ν : 3449, 3247, 3128, 1619, 1581, 1523, 1404, 1376, 1295, 1255, 818 cm⁻¹. Anal. calcd for C₁₈H₁₆N₄O₄: C 61.36, H 4.58, N 15.90; found C 61.48, H 4.24, N 16.07.

1-对甲基苯基-5-[(5-氯-2-羟基)苯基]亚胺基-1,2,3-三唑甲酸(**4d**): 黄色絮状固体, 产率 79.1%. m.p. 233~234 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 400 MHz) δ : 11.70 (s, 1H, OH), 8.77 (s, 1H, N=CH), 7.51 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 7.43~7.37 (m, 4H, ArH), 6.94 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, ArH), 2.48 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 100 MHz) δ : 164.2, 159.4, 143.6, 140.0, 134.7, 132.8, 131.9, 130.2, 124.6, 124.4, 121.4, 119.2, 119.1, 77.2, 21.3; IR (KBr) ν : 3447, 3235, 3112, 2365, 1636, 1515, 1475, 1279, 817 cm⁻¹. Anal. calcd for C₁₇H₁₃N₄O₃Cl: C 57.23, H 3.67, N 15.70; found C 57.14, H 3.80, N 15.56.

1-对甲基苯基-5-[(5-溴-2-羟基)苯基]亚胺基-1,2,3-三唑甲酸(**4e**): 黄色絮状固体, 产率 82.7%. m.p. 235~236 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 400 MHz) δ : 11.70 (s, 1H, OH), 8.76 (s, 1H, N=CH), 7.57 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, ArH), 7.53~7.50 (m, 3H, ArH), 7.34 (d, $J=4.0$ Hz, 2H, ArH), 6.89 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, ArH), 2.48 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 100 MHz) δ : 164.1, 160.2, 159.9, 143.6, 140.0, 137.5, 135.0, 132.8, 130.2, 124.4, 121.4, 119.9, 119.6, 72.2, 21.3; IR (KBr) ν : 3448, 3234, 3109, 2364, 1639, 1517, 1384 1078, 816 cm⁻¹. Anal. calcd for C₁₇H₁₃N₄O₃Br: C 50.89, H 3.27, N 13.96; found C 50.76, H 3.33, N 13.80.

1-对甲基苯基-5-[(3,5-二溴-2-羟基)苯基]亚胺基-1,2,3-三唑甲酸(**4f**): 黄色片状固体, 产率 77.5%. m.p. 236~237 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 400 MHz) δ : 12.30 (s, 1H, OH), 8.74 (s, 1H, N=CH), 7.82 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, ArH), 7.56 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, ArH), 7.49 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 7.41 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, ArH), 2.49 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 100 MHz) δ : 163.4, 156.5, 143.1, 140.2,

139.8, 134.3, 132.6, 130.3, 124.3, 121.8, 120.2, 112.4, 111.3, 77.2, 21.3; IR (KBr) ν : 3449, 3230, 3104, 2363, 1638, 1514, 1400, 1377, 1212, 805 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{12}\text{N}_4\text{O}_3\text{Br}_2$: C 42.53, H 2.52, N 11.67; found C 42.49, H 2.87, N 11.51.

1.3.2 1-对甲基苯基-5-取代苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酰胺(**6a**~**6f**)的合成

向 50 mL 的三口瓶中加入 1.46 g (12 mmol) 水杨醛, 25 mL 甲苯, 搅拌升温至 60 $^{\circ}\text{C}$, 加入 2.17 g (10 mmol) 中间体 **5**, 继续升温至回流, 反应液澄清, 用 3 mol/L 的盐酸溶液调反应液的 pH 至 4~5, 回流反应, TLC 跟踪反应 [$V(\text{石油醚}) : V(\text{乙酸乙酯}) = 2 : 1$], 原料点消失后, 停止反应, 冷却至室温, 静置, 析出大量浅黄色固体, 抽滤, 固体用乙醇重结晶, 得黄色絮状固体 **6a**. 参照上述方法得目标化合物 **6b**~**6f**.

1-对甲基苯基-5-邻羟苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酰胺(**6a**): 黄色絮状固体, 产率 75.1%. m.p. 225~226 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 11.15 (s, 1H, OH), 9.55 (s, 1H, N=CH), 8.04 (s, 1H, NH_2), 7.69 (d, $J=6.0$ Hz, 1H, NH_2), 7.56 (d, $J=8.4$ Hz, 3H, ArH), 7.49~7.45 (m, 1H, ArH), 7.42 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 6.99~6.94 (m, 2H, ArH), 2.41 (s, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 100 MHz) δ : 168.4, 162.8, 145.3, 140.8, 138.2, 135.1, 135.0, 133.4, 126.6, 123.4, 122.5, 120.7, 119.8, 119.2, 21.2; IR (KBr) ν : 3749, 3450, 3242, 3127, 2365, 1625, 1563, 1523, 1476, 1391, 1273, 1187, 823 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{N}_5\text{O}_2$: C 63.54, H 4.71, N 21.79; found C 63.47, H 4.77, N 21.83.

1-对甲基苯基-5-邻溴苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酰胺(**6b**): 浅黄色针状固体, 产率 71.3%. m.p. 232~234 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 9.71 (s, 1H, N=CH), 8.05 (s, 1H, NH_2), 8.00 (d, $J=4.4$ Hz, 1H, NH_2), 7.81~7.79 (m, 1H, ArH), 7.59 (d, $J=8.4$ Hz, 3H, ArH), 7.55~7.51 (m, 2H, ArH), 7.41 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, ArH), 2.41 (s, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 100 MHz) δ : 166.4, 143.2, 136.7, 133.2, 133.1, 132.8, 129.2, 128.5, 128.1, 126.8, 125.9, 123.2, 120.2, 117.6, 21.3; IR (KBr) ν : 3744, 3240, 3124, 2366, 1628, 1568, 1523, 1477, 1395, 1275, 1188, 824 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{N}_5\text{OBr}$: C 53.14, H 3.67, N 18.23; found C 53.00, H 3.87, N 18.19.

1-对甲基苯基-5-[(3-甲氧基-4-羟基)苯基]亚胺基-1,2,3-三唑甲酰胺(**6c**): 黄色粉末状固体, 产率 73.2%. m.p. 254~256 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 9.63 (s, 1H, OH), 9.43 (s, 1H, N=CH), 8.08 (s, 1H, NH_2), 7.79 (d, $J=2.8$ Hz, 1H, NH_2), 7.68 (d, $J=2.4$ Hz, 2H, ArH), 7.45 (d, $J=1.6$ Hz, 1H, ArH), 7.34~7.30 (m, 3H,

ArH), 6.96 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, ArH), 4.01 (s, 3H, OCH_3), 2.43 (s, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 100 MHz) δ : 166.7, 154.1, 151.8, 150.3, 142.5, 136.9, 133.3, 131.8, 129.0, 126.7, 123.4, 117.3, 112.1, 109.6, 56.8, 21.3; IR (KBr) ν : 3747, 3449, 3250, 3129, 1617, 1585, 1521, 1407, 1382, 1290, 1250, 1136, 1030, 820 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{N}_5\text{O}_3$: C 61.53, H 4.88, N 19.93; found C 61.46, H 4.93, N 19.71.

1-对甲基苯基-5-[(5-氯-2-羟基)苯基]亚胺基-1,2,3-三唑甲酰胺(**6d**): 黄色絮状固体, 产率 78.5%. m.p. 267~268 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 11.16 (s, 1H, OH), 9.52 (s, 1H, N=CH), 8.04 (s, 1H, NH_2), 7.71 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, NH_2), 7.57 (d, $J=8.4$ Hz, 3H, ArH), 7.48 (dd, $J=8.8, 2.8$ Hz, 1H, ArH), 7.41 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, ArH), 7.00 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, ArH), 2.41 (s, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 100 MHz) δ : 168.2, 162.6, 159.1, 145.8, 139.8, 134.8, 133.1, 130.2, 129.6, 128.9, 125.2, 123.7, 122.1, 119.4, 21.2; IR (KBr) ν : 3748, 3452, 3238, 3123, 2362, 1622, 1560, 1522, 1475, 1393, 1274, 1184, 819 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{N}_5\text{O}_2\text{Cl}$: C 57.39, H 3.97, N 19.68; found C 57.28, H 4.06, N 19.55.

1-对甲基苯基-5-[(5-溴-2-羟基)苯基]亚胺基-1,2,3-三唑甲酰胺(**6e**): 黄色絮状固体, 产率 81.6%. m.p. 265~266 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 11.17 (s, 1H, OH), 9.50 (s, 1H, N=CH), 8.04 (s, 1H, NH_2), 7.84 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, NH_2), 7.61 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, ArH), 7.57 (d, $J=8.4$ Hz, ArH), 7.42 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 6.95 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, ArH), 2.41 (s, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 100 MHz) δ : 167.6, 163.1, 162.7, 146.1, 143.3, 140.2, 137.1, 134.8, 131.1, 129.7, 123.2, 121.1, 120.7, 118.5, 21.1; IR (KBr) ν : 3745, 3447, 3235, 3118, 2366, 1618, 1503, 1383, 1112, 807 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{N}_5\text{O}_2\text{Br}$: C 51.02, H 3.53, N 17.50; found C 50.89, H 3.73, N 17.44.

1-对甲基苯基-5-[(3,5-二溴-2-羟基)苯基]亚胺基-1,2,3-三唑甲酰胺(**6f**): 黄色粉末状固体, 产率 77.1%. m.p. 230~231 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 400 MHz) δ : 12.20 (s, 1H, OH), 9.51 (s, 1H, N=CH), 8.15 (s, 1H, NH_2), 8.04 (d, $J=3.2$ Hz, 1H, NH_2), 7.91 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, ArH), 7.58 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, ArH), 7.44 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 7.09 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 2.42 (s, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 100 MHz) δ : 171.3, 162.4, 156.4, 144.2, 140.3, 139.6, 134.8, 132.8, 130.5, 129.9, 125.4, 121.8, 116.4, 111.3, 21.2; IR (KBr) ν : 3748, 3450, 3231, 3114, 2363, 1623, 1525, 1390, 1218, 1015, 820 cm^{-1} . Anal. calcd for

$C_{17}H_{13}N_5O_2Br_2$: C 42.62, H 2.73, N 14.62; found C 42.45, H 2.96, N 14.54.

2 结果与讨论

2.1 关键中间体的合成

在乙醇钠存在下, 1-对甲苯基-5-氨基-1,2,3-三唑甲酸乙酯(中间体 **2**)由对甲基叠氮苯和氰基乙酸乙酯发生 [3+2] 闭环反应得到. 首先, EtO^- 从氰基乙酸乙酯的 α 上夺取 H 质子形成碳负离子, 此碳负离子进攻叠氮上电子云密度较低的 3-N, 进而 1-N 进攻氰基 C, 经质子转移重排得到中间体 **2**, 推测闭环机理如 Scheme 2. 进一步研究发现, 碱的强弱对上述闭环反应影响较大, 使用三乙胺、NaOH 等较弱的碱催化, 因催化活性较低, 反应较难完成, 而且产率很低, 使用乙醇钠、甲醇钠等较强的碱催化, 反应速率大大提高, 产率达到 85% 以上.

Scheme 2

2.2 目标化合物的合成

化合物 **3**, **5** 与取代苯甲醛反应制备目标化合物 1-对甲苯基-5-取代苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酸(4a~4f)/甲酰胺(6a~6f)需要在酸性环境下进行, 化合物 **3** 与取代苯甲醛在乙醇介质中回流即可顺利反应, 高收率地制得化合物 4a~4f, 而化合物 **5** 与取代苯甲醛在相同条件下反应较难进行, 制备化合物 6a~6f 产率很低, 为此, 分别选用沸点较高的正丁醇和甲苯作介质进行回流反应, 有效提高了反应速度和化合物 6a~6f 的产率. 化合物 **3** 反应活性较高的原因可能是化合物 **3** 中的 $COOH$ 部分电离, 此处存在一个电离平衡, 电离出的 COO^- 相对化合物 **5** 中的 $CONH_2$ 有一定的给电子作用, 使得化合物 **3** 中 5 位上的 NH_2 的电子云密度较化合物 **5** 中的高, 当电离的化合物 **3** 与醛形成西弗碱后, 上述电离平衡就会向电离更多 COO^- 的方向移动, 从而提高反应速率, 因此, 为了确保反应顺利进行, 选用沸点较高的正丁醇或甲苯作溶剂.

2.3 中间体及目标化合物的波谱分析

IR 中, 目标化合物 4a, 4c~4f, 6a, 6c~6f 在 3440 cm^{-1} 左右出现较强的 O—H 吸收峰, 3100 cm^{-1} 左右出现 $N=C-H$ 吸收峰, 3250 cm^{-1} 左右出现较强的 N—H 吸收峰, 1650 cm^{-1} 左右出现 $C=O$ 的伸缩振动吸收峰. 苯环上取代基对 $CH=N$ 的吸收峰有一定影响, 拉电基使苯环电子云密度降低, 其红外吸收移向高波数段. 1600 cm^{-1} 左右出现苯环的 $C=C$ 吸收, 2300 cm^{-1} 左右出现了苯环的倍频峰. 化合物 6a~6f 在 3700 cm^{-1} 左右有 N—H 的吸收峰, 1400 cm^{-1} 左右出现较强的 C—N 吸收峰.

中间体 **2** 在 $\delta 4.54$ 处出现 dd 峰, 在 $\delta 1.49$ 处出现的 t 峰证明 OC_2H_5 的存在, 中间体 **3** 在 $\delta 12.67$ 处出现 s 峰说明有 $COOH$, 而中间体 **5** 在 $\delta 6.80$ 处的 s 峰和 $\delta 5.41$ 处的 d 峰说明了 $CONH_2$ 的存在. 化合物 4a~4f 中的亚胺结构($CH=N$)的氢质子峰出现在 $\delta 8.70$ 左右, 而 6a~6f 中的亚胺结构($CH=N$)的氢质子峰出现在 $\delta 9.50$ 左右, 说明可能其 N 原子与 $CONH_2$ 中的氢原子形成了氢键, 同时 $CONH_2$ 中的两个氢的化学位移不相同也与此吻合. 1 位取代苯环上 CH_3 基团受到苯环的超共轭效应的影响, 目标化合物 4a~4f 中 1 位苯环上的 CH_3 出现在 $\delta 2.47$ 左右, 对应 6a~6f 中的 CH_3 出现在 $\delta 2.41$ 左右.

2.4 化合物的生物活性研究

为了考察邻羟基苯基三唑环、亚胺结构和不同取代基团对化合物生物活性的影响, 采用溶液梯度稀释法定量测定其对大肠杆菌(*Escherichia coli*)、金黄色葡萄球菌(*Staphylococcus aureus*)和白色念珠菌(*Monilia albican*)等的抑菌效果, 具体方法参照美国国立临床实验室标准化委员会(NCCLS)最小抑菌浓度(MIC)测定法规, 以氟康唑和三氯生为参照药品, 测定结果见表 1.

结果表明, 所有化合物对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌均有良好的抑制效果, 对大肠杆菌的抑菌活性均优于氟康唑, 其中 4d~4f 和 6d~6f 对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的抗菌效果优于或近似于氟康唑和三氯生. 总体看, 化合物 6a~6f 比 4a~4f 的 MIC 值更优, 说明 1-对甲苯基-5-取代苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酸类化合物 6a~6f 抗菌活性优于 1-对甲苯基-5-取代苯基亚胺基-1,2,3-三唑甲酸类化合物 4a~4f, 表明酰胺基团的引入有利于提高化合物的抗菌活性. 与其他化合物相比, 化合物 4b 和 6b 对三种菌株的 MIC 值较高, 表明 5 位-取代苯环中羟基(尤其是邻羟基)的引入有利于提高化合物的抗菌活性. 5 位-取代苯环上的卤原子对目标化合物的抗菌活性影响较大, 4d~4f 和 6d~6f 等含有卤原子的化合物的 MIC 值普遍小于其他化合物, 抗菌活性较高. 因此, 5 位-取代苯环上邻位的羟基和 5 位的卤

表 1 化合物 4a~4f 和 6a~6f 抑菌活性数据
Table 1 Antibacterial activity data of 4a~4f and 6a~6f

Compd.	Minimal inhibitory concentration MIC/($\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)		
	<i>Escherichia coli</i> (E.c.)	<i>Staphylococcus aureus</i> (S.a.)	<i>Monilia albican</i> (M.a.)
4a	16	16	16
4b	64	16	32
4c	16	16	32
4d	16	2	8
4e	16	4	8
4f	4	4	8
6a	32	32	16
6b	32	32	16
6c	32	16	16
6d	16	2	8
6e	8	4	8
6f	8	2	8
Fluconazole	128	16	2
Triclosan	2	4	32

素修饰、三唑环 4 位上引入酰胺均可提高化合物的抗菌活性.

References

- [1] (a) Alvarez, R.; Velazquez, S.; San-Felix, A.; Aquaro, S.; De-Clercq, E.; Perno, C.-F.; Karlsson, A.; Balzarini, J.; Carmarasa, M. J. *J. Med. Chem.* **1994**, *37*, 4185.
(b) Velaquez, S.; Alvarez, R.; Perez, C.; Gogo, F.; De, C.; Balzarini, J.; Carmarasa, M. J. *Antiviral Chem. Chemother.* **1998**, *9*, 481.
- [2] Dalip, K.; Buchi, R. V.; Anil, K.; Deendayal, M.; Rakesh, T.; Keykavous, P. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2011**, *21*, 449.
- [3] Dabak, K.; Sezer, O.; Akar, A.; Anac, O. *Eur. J. Med. Chem.* **2003**, *38*, 215.
- [4] Zhang, S.-S.; Wan, J.; Li, X.-M.; Li, C.-L.; Xu, L.-Z. *Chem. Res. Chin. Univ.* **2007**, *23*, 120.
- [5] Kelley, J. L.; Koble, C. S.; Davis, R. G.; McLean, E. W.; Soroko, F. E.; Cooper, B. R. *J. Med. Chem.* **1995**, *38*, 4131.
- [6] Genin, M. J.; Allwine, D. A.; Anderson, D. J.; Barbachyn, M. R.; Emmert, D. E.; Garmon, S. A.; Graber, D. R.; Grega, K. C.; Hester, J. B.; Hutchinson, D. K.; Morris, J.; Reischer, R. J.; Ford, C. W.; Zurenko, G. E.; Hamel, J. C.; Schaadt, R. D.; Stapert, D.; Yagi, B. H. *J. Med. Chem.* **2000**, *43*, 953.
- [7] Sun, X.-H.; Tao, Y.; Liu, Y.-F.; Jia, Y.-Q.; Chen, B.; Yang, J.-W. *Chin. J. Org. Chem.* **2008**, *28*, 155 (in Chinese).
(孙晓红, 陶燕, 刘源发, 贾婴琦, 陈邦, 杨建武, 有机化学, **2008**, *28*, 155.)
- [8] Wang, B.-L.; Shi, Y.-X.; Ma, Y.; Liu, X.-H.; Li, Y.-H.; Song, H.-B.; Li, B.-J.; Li, Z.-M. *J. Agric. Food Chem.* **2010**, *58*, 5515.
- [9] Liliana, M.; Finkelsztejn, E. F.; Castro, L. E.; Fabian, L. E.; Mol-trasio, G. Y. *Eur. J. Med. Chem.* **2008**, *43*, 1767.
- [10] Zhao, Q.; Lu, J.-R.; Xin, C.-W.; Bao, X.-R.; Gao, H.-Y.; Zhao, X.; Li, S.; Rui, T.-T. *Chem. J. Chin. Univ.* **2011**, *32*, 2806 (in Chinese).
(赵炎, 卢俊瑞, 辛春伟, 鲍秀荣, 高海燕, 赵旭, 李莎, 芮甜甜, 高等学校化学学报, **2011**, *32*, 2806.)
- [11] Zhao, X.; Lu, J.-R.; Xin, C.-W.; Lu, B.-W.; Bao, X.-R.; Li, J.-F.; Liu, Y.; Yang, X.-Y.; Yuan, Y. *Chem. Res. Chin. Univ.* **2012**, *28*(3), 1.
- [12] Mu, M.-M.; Lu, B.-W.; Lu, J.-R.; Xin, C.-W.; Ji, D.; Li, J.-F.; Bao, X.-R. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, *32*, 1101 (in Chinese).
(穆曼曼, 卢博为, 卢俊瑞, 辛春伟, 戢丹, 李建发, 鲍秀荣, 有机化学, **2012**, *32*, 1101.)
- [13] Bucking, J. *Dictionary of Organic Compounds*, 5th ed, Chapman and Hall, New York, **1982**, p. 808.
- [14] Elzbieta, C.; Zygmunt, E.; Romuald, K. *Diss. Pharm.* **1964**, *15*(5), 369.
- [15] Charansingh, G.; Ganesh, J.; Mohammad, S.; Rajesh, K.; Anant, G.; Deepak, N.; Mahendra, S. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2008**, *18*, 6244.

(Li, L.; Fan, Y.)