N-[3-(4-甲基苯基)-3-氧代-1-芳基丙基]乙酰胺的三氟乙酸催化合成

任正红 李 晟 张兴花 范 莉* 周光明 杨大成*

(西南大学化学化工学院 重庆 400715)

摘要 以对甲基苯乙酮、芳香醛和乙腈为主要原料, 通过三氟乙酸催化的改进的 Dakin-West 反应, 顺利得到 28 个 N-[3-(4-甲基苯基)-3-氧代-1-芳基丙基]乙酰胺, 最高收率可达 95%. 18 个新化合物的结构经 ^1H NMR, ^{13}C NMR 和 HRMS 证实. 结构测试发现, 羟基苯甲醛参与 Dakin-West 反应后得到的全部是羟基乙酰化的产物. 作者首次证实, 羟基苯甲醛参与的 Dakin-West 反应不是串联反应, 而是羟基苯甲醛首先经 TFA 催化转化为乙酰氧基苯甲醛, 然后参与 Dakin-West 反应, 最终生成羟基乙酰化产物. 通过碱性水解, 可以选择性高收率地制备对应的羟基化 β -乙酰氨基酮, 同时也反证了羟基乙酰化产物的存在. 该研究扩展了 TFA 催化的 Dakin-West 反应, 为 β -乙酰氨基酮的合成提供了新的方法.

关键词 Dakin-West 反应; 多组分反应; 三氟乙酸; β -乙酰氨基酮; 对甲基苯乙酮; 芳香醛

One-Pot Synthesis of N-[3-(4-Methylphenyl)-3-oxo-1-arylpropyl]acetamides Employing Trifluoroacetic Acid as an Efficient Catalyst

Ren, Zhenghong Li, Sheng Zhang, Xinghua Fan, Li*

Zhou, Guangming Yang, Dacheng*

(School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest University, Chongqing 400715)

Abstract The synthesis of a series of N-[3-(4-methylphenyl)-3-oxo-1-arylpropyl]acetamides using trifluoroacetic acid (TFA) as the catalyst was reported in this paper. It was achieved by a modified Dakin-West reaction using 4-methylacetophenone, aromatic aldehydes and acetonitrile as starting materials. The highest yield was up to 95% among the twenty eight target compounds synthesized. All the new compounds were characterized by ^1H NMR, ^{13}C NMR and HRMS spectra. This one-pot reaction offered several advantages including small catalyst loading (0.3 mol%), moderate reaction temperatures (28~35 °C) and simple post treatment procedure. A reaction mechanism was for the first time established, in which hydroxybenzaldehyde was first catalytically converted into corresponding acetoxybenzaldehyde prior to be involved in the subsequent Dakin-West reaction that eventually led to hydroxyl acetylated target compounds. The resultant hydroxyl acetylated β -acetamido ketones were selectively deacetylated in LiOH to produce the corresponding hydroxyl products with excellent yields. The current work further demonstrated that TFA was an efficient catalyst for Dakin-West reaction involving arylalkyl ketones, aromatic aldehydes and acetonitrile, which expanded significantly the scope of the substrates and provided a new synthetic route to β -acetamido ketones.

Keywords Dakin-West reaction; multi-component reaction; trifluoroacetic acid; β -acetamido ketone; 4-methylacetophenone; aromatic aldehyde

β -乙酰氨基酮是制备 β -氨基酸^[1]、内酰胺^[2]以及 1,3-氨基醇^[3]等的重要前体. 作为多功能中间体和生物活性片段, β -乙酰氨基酮在有机合成、生物学和药学等领域中的应用日益广泛^[4], 因此有关其合成的研究工作备受

关注. β -乙酰氨基酮的合成方法较多, 常见的有 α,β -不饱和酮的 Michael 加成^[5], Mannich 反应^[6,7], β -氨基酮的乙酰化反应^[8]以及改进的 Dakin-West 反应等, 而目前最有效的合成方法为 Iqbal 等^[9]于 1994 年报道的改进

* E-mail: hxfanl@swu.edu.cn, hxydc@swu.edu.cn

Received November 7, 2012; revised December 13, 2012; published online January 7, 2013.

Project supported by the Chongqing Science and Technology Research Project (Nos. 2011AB5001, 2011AC1053), the National Natural Science Foundation of China (No. 21172181) and the Fundamental Research Funds for the Central Universities (No. XDJK2010C067).

重庆市科技攻关计划(Nos. 2011AB5001, 2011AC1053)、国家自然科学基金(No. 21172181)、中央高校基本科研业务费专项资金(No. XDJK2010C067)资助项目.

Dakin-West 反应.

Dakin-West 反应是一类形成碳-碳键及碳-氮键的重要多组分反应(MCRs)^[10], 在天然产物、药物和精细化工中间体的合成中应用较多. 近年来, 有关 Dakin-West 反应的研究工作主要集中在两方面: 新型高效催化剂的开发和手性 β -乙酰氨基酮合成方法的改进^[11]. 目前已报道的催化剂种类较多, 如 montmorillonite K-10 clay^[12], $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ^[13], $\text{Fe}(\text{ClO}_4)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ^[14], $\text{Zr}(\text{HSO}_4)_4$ 和 $\text{Mg}(\text{HSO}_4)_2$ ^[15], $\text{H}_6\text{P}_2\text{W}_{18}\text{O}_{62}$ ^[16], $\text{H}_5\text{PW}_{10}\text{V}_2\text{O}_{40}$ ^[17], $\text{K}_5\text{CoW}_{12}\text{O}_{40} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ^[18], cellulose sulfuric acid^[19], 多聚苯胺负载强酸盐 (polyaniline-supported acid salts)^[20], $\text{HClO}_4\text{-SiO}_2$ ^[21], $\text{H}_2\text{SO}_4\text{-ZrO}_2$ ^[22] 以及离子液体^[23,24], 沸石 $\text{H}\beta$ ^[25], Nafion H 树脂^[26], SelectfluorTM^[27] 等. 尽管上述催化剂可以催化某些 Dakin-West 反应, 并且各有所长, 但都存在催化剂价格昂贵、反应时间长、反应温度高、后处理繁琐或操作不便等局限性, 因此, 寻找和开发新型的 Dakin-West 反应催化剂仍具有重要意义.

含氟化合物具有独特的化学和药学性质^[28,29]. 三氟乙酸(TFA)具有较低的亲核性和化学惰性, 常作为氟化、硝化及卤化等反应的优良溶剂; TFA 也是引入三氟甲基的重要试剂, 广泛地应用于含氟医药、含氟农药和染料的合成; TFA 的强质子酸特性以及和许多有机物的互溶性, 因此被广泛地用作芳香族化合物酰基化^[30]、烷基化^[31]以及烯烃聚合等反应的催化剂; 三氟乙酰基对羟基和氨基的优良保护作用, 使得酰化反应可以在温和的条件下进行, 这在氨基酸衍生物合成^[32]和多肽裂解^[33]方面有着非常重要的应用. 本研究室发现, TFA 可以有效催化某些芳烷酮、芳香醛和乙腈之间的改进 Dakin-West 反应, 具有其它催化剂所不具备的优点, 如催化剂用量少(0.3 mol%)、反应条件温和(28~35 °C)、后处理简便等^[34,35]. 为了进一步研究 TFA 催化 Dakin-West 反应的适用范围及有效性, 我们选取对甲苯乙酮、芳香醛和乙腈为反应底物, 合成对应的 β -乙酰氨基

基酮(Scheme 1).

通过反应条件的系统研究, 实现了 28 个目标分子的有效合成, 所得 18 个新化合物的结构都经过 ^1H NMR, ^{13}C NMR 和 HRMS 证实. 相关生物活性仍在研究之中.

1 结果与讨论

1.1 实验结果

采用优化的合成条件, 得到 28 个目标化合物, 其实验条件及结果见表 1.

1.2 实验讨论

本实验室前期研究发现, 某些 β -氨基酮类化合物显示抗糖尿病^[36]、抗结核^[37]及非甾体雄激素受体调节活性^[38], 含有对甲苯乙酮结构单元的某些 Mannich 碱型 β -氨基酮具有抗肿瘤活性^[39]. 但是, 所合成的分子多数含有 3 个芳香环, 分子水溶性较差. 为寻求水溶性较好的新型分子, 我们设计了和 β -氨基酮结构类似但只有 2 个芳香环的 β -乙酰氨基酮. 通过条件探索, 发现 TFA 可以有效催化某些芳烷酮、芳香醛和乙腈之间的 Dakin-West 反应^[34,35], 由此合成了多个系列的 β -乙酰氨基酮, 并且首次发现某些 β -乙酰氨基酮具有过氧化物酶体增殖物激活受体(PPAR)激动活性和/或二肽基肽酶-4 (DPP-IV) 抑制活性^[34], 部分展现了该类分子的发展前景.

为了获取更多的新分子以进一步研究生物活性, 同时考察 TFA 的适用范围及有效性, 作者选取含有供电子基的对甲苯乙酮、各种取代基的芳香醛和乙腈以合成新的 β -乙酰氨基酮. 基于上述目标, 我们选取对甲苯乙酮、苯甲醛和乙腈为模式反应(Scheme 2), 通过对反应温度、反应溶剂及催化剂等的系统考察, 找到选定底物之间发生 Dakin-West 反应的最佳条件, 为底物分子的扩展奠定基础.

$\text{R} = 4\text{-NO}_2, 3\text{-NO}_2, 2\text{-NO}_2, 3,4\text{-Cl}_2, 2,4\text{-Cl}_2, 4\text{-CF}_3, 3\text{-CF}_3, 2\text{-CF}_3, 4\text{-F}, 3\text{-F}, 2\text{-F}, 4\text{-Cl}, 3\text{-Cl}, 2\text{-Cl}, 4\text{-Br}, 3\text{-Br}, 2\text{-Br}, \text{H}, 4\text{-CH}_3, 3\text{-CH}_3, 4\text{-OCH}_3, 3\text{-OCH}_3, 2\text{-OCH}_3, 3,4,5\text{-(OCH}_3)_3, 4\text{-OH}, 3\text{-OH}; \text{R}' = 4\text{-OAc}, 3\text{-OAc}$

Scheme 1

表 1 目标化合物 1~28 部分实验结果

Table 1 Experimental results of target compound 1~28

Compound	R/R'	Temp./°C	Time/h	Purif. ^a	Yield/%
1	4-NO ₂	28	48	b	75
2	3-NO ₂	28	56	c	61
3	2-NO ₂	35	62	e	49
4	2,4-diCl	35	61	a	91
5	3,4-diCl	32	85	c	61
6	4-CF ₃	35	38	a	79
7	3-CF ₃	35	42	d	60
8	2-CF ₃	35	53	b	57
9	4-F	33	33	b	96
10	3-F	35	35	a	92
11	2-F	33	41	b	93
12	4-Cl	30	45	a	95
13	3-Cl	30	48	a	75
14	2-Cl	35	52	a	93
15	4-Br	28	47	f	91
16	3-Br	35	48	b	80
17	2-Br	35	53	a	85
18	H	30	44	f	91
19	4-CH ₃	28	45	f	93
20	3-CH ₃	28	53	f	55
21	4-OCH ₃	30	46	b, e	61
22	3-OCH ₃	29	48	f	91
23	2-OCH ₃	34	54	c	73
24	3,4,5-triOCH ₃	30	35	c	60
25	4-OAc	35	99	c	67
26	3-OAc	35	101.5	f	61
27	4-OH	35	1.2	—	97
28	3-OH	35	1	—	83

^a a: PE(石油醚, 沸程 60~90 °C, 下同)/EtOAc (*V*: *V*=6:1, 下同)分散; b: PE/Et₂O (*V*: *V*=3:1)分散; c: EtOAc-PE 重结晶; d: 柱层析(梯度洗脱, PE/EtOAc, *V*: *V*=8:1~1:1); e: MeOH 洗涤; f: 按粘稠物的后处理及纯化方法进行纯化。

Scheme 2

1.2.1 温度对反应的影响

前期研究表明, TFA 催化的取代苯乙酮、取代苯甲醛和乙腈的 Dakin-West 反应在 25~40 °C 一般可以很好地进行^[34,35]。为获取对甲基苯乙酮参与的 Dakin-West 反应的最佳反应条件, 借鉴前期经验, 在 5~50 °C 间选取多个温度点, 以考察温度对模式反应的影响。实验结果见表 2。

表 2 温度对模式反应的影响^a

Table 2 Effect of temperature on the model reaction

Entry	Temp./°C	Time/h	Yield/%
1	5	36	55
2	20	36	82
3	35	36	91
4	50	12	61

^a 0.3 mol% TFA 催化, 0.4 mL AcCl 助催化, 醛酮各 1 mmol 在 MeCN 中反应。

TLC 监测及后处理发现, 反应温度为 50 °C 时, 反应 12 h 原料就可消失, 但杂质点多, 产品收率低; 温度为 35 °C 时, 反应 36 h 后原料点几乎消失, 产品点较浓, 反应体系为亮黄色透明液体, 产物的光泽好、收率高; 反应温度为 20 °C 时, 反应较好; 反应温度为 5 °C 时, 虽然产品的光泽好、纯度高, 但因部分原料未参与反应, 反应收率不算高(表 2)。可见, 温度降低, 副反应相对减少, 产品纯度更高, 但反应速度较慢, 转化效果较差, 不适于快速制备; 温度升高、反应速度更快, 但副产物增多, 纯化难度加大, 有效产品量不一定增加。综合考虑, 35 °C 为反应的最佳温度。

1.2.2 溶剂对反应的影响

溶剂的选择一般以能够很好地溶解反应物而又有利于产物的析出为基本原则。Dakin-West 反应通常在二

氯甲烷(DCM)、氯仿(CHCl_3)和乙腈等溶剂中进行. 对模式反应, 尝试了不同极性的甲苯(Tol)、乙二醇二甲醚(DME)、四氢呋喃(THF)、乙酸乙酯、二甲亚砜(DMSO)、*N*-甲基吡咯烷酮(NMP)等 10 种溶剂, 反应具体情况见表 3.

表 3 溶剂对模式反应的影响^a

Table 3 Effect of solvents on the model reaction

Entry	Solvent	Yield/%
1	Tol	22
2	DME	8
3	DCM	71
4	THF	—
5	EtOAc	6
6	CHCl_3	80
7	MeCN	92
8	MeOH	—
9	DMSO	—
10	NMP	—

^a 0.3 mol% TFA 催化, 0.4 mL AcCl 助催化, 醛酮各 1 mmol, 2 mL 溶剂, 35 °C 反应 38 h.

TLC 监测发现, 表 3 中 Entry 4, Entries 8~10 无产品点生成, Entries 1, 2, 5 仅有少量产品生成; Entries 3, 6 得到黄色透明液体, 相应的 Dakin-West 反应能顺利进行, 但产品点下方 $R_f=0.01$ 及 $R_f=0.02$ [$V(\text{石油醚}):V(\text{乙酸乙酯})=1:1$] 有 2 个杂质点, 收率中等到良好, 产物为米白色颗粒; Entry 7 反应结束时为亮黄色透明液体, 原料醛酮消失, 无明显杂质点, 后处理后收率最高, 纯度最好, 产物为白色粉末(颜色纯正), 表明 MeCN 是反应最好的溶剂(同时作为反应的原料, 有利于反应的快速完成).

1.2.3 催化剂的选择

三组分化合物参与的 Dakin-West 反应, 已经报道的催化剂较多, 常见的有路易斯酸、杂多酸、异相酸等^[12~27]. 报道的催化剂大多具有独特的优点, 但其适用范围有限. 为了寻找价格、来源以及反应温度、后处理均适宜的催化剂, 对模式反应试用部分催化剂, 实验结果见表 4.

实验结果显示: 采用 Lewis 酸作催化剂时, 都存在着用量大、分离困难、后处理繁琐等缺点, 如加水后处理时, 只有表 4 中 Entries 1, 4, 7, 8 为颗粒状固体, 其余均为粘稠状物, 导致抽滤困难. 此外, 后处理时的酸碱性直接影响产品纯度, 如 $\text{pH}=7\sim 8$ 时, 会出现收率超过 100% 的情况, 此时再以有机溶剂溶解产品, 发现有不溶物残留, 经检查为金属氢氧化物, 这应该是 Lewis 酸在弱碱性水溶液中生成氢氧化物、继而包裹进入产品的缘故. 因此, 金属 Lewis 酸催化的 Entries 1~6 后处理时要防止金属离子的残留和氢氧化物的生成; Entry 7

表 4 催化剂对模式反应收率的影响^a

Table 4 Effect of catalyst on the model reaction

Entry	Cat.	Cat. amount/mol%	Yield/%
1	FeCl_3	20.0	44
2	CoCl_2	5.0	20
3	$\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	5.0	61
4	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	5.0	73
5	$\text{CeCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	10.0	38
6	$\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$	20.0	19
7	$\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$	10.0	80
8	TFA	0.3	93
9	HOAc	5.0	62

^a 35 °C 下, 0.4 mL AcCl 助催化, 醛酮各 1 mmol 在 MeCN 中反应 36 h.

中, 生成的不溶白色固体可与酸反应, 可能是生成的硼络合物混杂于产物之中; 而对于 Entry 8, 没有有机溶剂不溶的固体产生, 后处理方便. 进一步, 相对于 Entry 9, Entry 8 催化剂用量最少, 反应收率最高, 因此 TFA 是最适宜的催化剂.

1.2.4 乙酰氯的作用

目前报道的 Dakin-West 反应, 多数都添加了助催化剂, 乙酰氯是常见的助催化剂^[12~22,23~27,34,35]. 为了考察乙酰氯添加的必要性, 我们就模式反应做了以下实验, 实验结果见表 5.

表 5 乙酰氯对模式反应的影响^a

Table 5 Effect of the acyl chlorides on the model reaction

Entry	Cat.	Yield/%
1	—	<5
2	AcCl	<5
3	TFA	56
4	TFA, AcCl	81

^a 35 °C 下, 醛酮各 1 mmol 在 MeCN 中反应 26 h.

上述结果表明, TFA 为主催化剂, AcCl 是助催化剂, 其作用机理可能和文献^[35]一致.

1.2.5 后处理对反应收率的影响

文献中该类分子的后处理主要是柱层析、乙醇/水或正己烷/乙酸乙酯重结晶, 但是柱层析需要大量的有机溶剂且操作较为麻烦, 而重结晶需要多次试验且会造成产品较大损失. 采用 TFA 催化的此类反应, 反应结束后为澄清液体、粘稠状或油状, 我们一般先加入冰水搅拌, 再用饱和的 NaHCO_3 溶液调至中性, 继续搅拌, 多数情况会有固体析出, 析出的固体再用 $\text{Et}_2\text{O}/\text{PE}$ 分散处理, 通常可除去杂质得到纯品. 这种操作相对简单, 固体产品损失小, 色泽也较好. 对于那些中和后仍无固体析出的体系, 我们采用的是 EtOAc 萃取、无水 Na_2SO_4 干燥、减压旋蒸除去大部分的溶剂后, 再加入少量的 $\text{Et}_2\text{O}-\text{PE}$ 搅拌, 一般有固体析出, 固体经抽滤、洗涤, 可得纯品. 为进行结构分析, 我们一般再以 EtOAc/PE 重结晶.

一般来说, 卤代醛参与的反应, 常规后处理即有固体析出, 固体分散或重结晶, 可得纯品(**9**~**17**). 而对于含硝基的醛, 后处理相对繁琐, 因为这些固体醛和产品(**1**~**3**)的溶解性相近, 很难简单地从体系中除去, 如邻硝基苯甲醛作原料时, 得到灰色粗品(**3**), TLC 监测发现, 产品点上下皆有杂质点, 采用重结晶及分散法都未成功; 柱层析溶解粗品时发现, 粗品在 THF, EtOAc 或 DCM 中都不溶解; 尝试 MeOH 时, 只有部分溶解, 溶液为棕色, 不溶物为白色, 抽滤, TLC 监测, 发现白色固体为纯净的目标分子. 为提高收率, 将溶液及滤液再旋蒸、再部分溶解、再抽滤, 又可得部分产品, 多次处理, 即可完成纯化, 从而避免了柱层析. 此外发现, 许多反应收率低, 主要是原料未反应完全, 导致后处理困难和产品损失.

1.2.6 芳香醛上取代基对反应的影响

实验发现, 试验的多数芳香醛都能发生反应; 取代基相同而取代位置不同的芳香醛, 其反应完成时间一般是 4-位<3-位<2-位, 这可能与空间位阻有关. 反应收率和取代基的关系(图 1) 则有多种规律: 强吸电子的取代基, 其反应收率一般是 4-位>3-位>2-位, 如 **1** (4-NO₂)>**2** (3-NO₂)>**3** (2-NO₂), **6** (4-CF₃)>**7** (3-CF₃)>**8** (2-CF₃); 供电子基的规律类似, 如 **19** (4-CH₃)>**20** (3-CH₃), **25** (4-OH)>**26** (3-OH), 可能和空间位阻更相关. 卤素一族的规律不同, 通常是 4-位>2-位>3-位, 如 **9** (4-F)>**11** (2-F)>**10** (3-F), **12** (4-Cl)>**14** (2-Cl)>**13** (3-Cl), **15** (4-Br)>**17** (2-Br)>**16** (3-Br), 显然和定位规律更一致. 然而, 2-氯苯甲醛、2,4-二氯苯甲醛收率超过

90%, 反应收率 **22** (3-OCH₃)>>**21** (4-OCH₃), 其原因尚不清楚, 可能与反应完成程度及产物的溶解性有关. 幸运的是, 对羟基苯甲醛和间羟基苯甲醛的反应都发生了, 虽然收率仅达中等、得到的是羟基乙酰化产物(**25**, **26**); 然而邻羟基苯甲醛的反应, 虽经多次试验, 仍以失败告终. 有必要说明的是, 4-吡啶甲醛、3-吡啶甲醛、2-吡啶甲醛以及糠醛, 在我们的实验条件下, 都不能得到相应的 β -乙酰氨基酮.

图 1 反应时间-取代基-收率图

Figure 1 Time-yield-substituent relationships

有意思的是, 羟基苯甲醛参与的反应, 最终得到羟基乙酰化产物. 这既可能是先发生醛的羟基乙酰化、所生成的醛再参与 Dakin-West 反应(生成 **B**), 也可能是先发生 Dakin-West 反应(生成 **A**)而后羟基乙酰化(生成 **B**) (Scheme 3).

Scheme 3

有文献[40]报道类似结果,但未见对其反应过程的研究。对此,我们设计了如下的实验:(a)加入羟基苯甲醛和乙酰氯,搅拌,TLC跟踪;(b)加入羟基苯甲醛、乙酰氯和TFA,搅拌,TLC跟踪;(c)常规操作(第3.3.2节A法)合成化合物C;(d)加入羟基苯甲醛、乙酰氯和TFA,搅拌2 h,加入酮和乙腈,继续反应,常规后处理(第3.3.2节B法);(e)按第3.3.2节C法操作,但以乙酰氧基苯甲醛代替羟基苯甲醛;(f)C作原料,合成化合物D(第3.3.3节法)。

实验发现,按(a)操作,羟基苯甲醛和乙酰氯最终生成乙酰氧基苯甲醛,但反应较慢(TLC显示,几小时后才大量的新物质生成);若同时加入TFA[按(b)操作],TLC监测发现,1 h内即有大量的新物质生成,表明TFA可促进乙酰氧基苯甲醛的生成。

操作(d)过程中TLC分析发现,4 h内即发现非乙酰氧基苯甲醛的新物质生成,与常规Dakin-West反应的现象类似,与(c)及(e)操作生成的新物质对照,为同一产物,即产物C;同时发现,操作(b)中羟基苯甲醛经44 h反应后依然存在,(d)操作中羟基苯甲醛在44 h内完全消失,但仍有乙酰氧基苯甲醛存在,表明目标分子的生成可促进羟基苯甲醛转化为乙酰氧基苯甲醛;上述实验表明,羟基苯甲醛参与的Dakin-West反应,应该是先生成乙酰氧基苯甲醛、而后发生Dakin-West反应。

从(c)~(e)操作的结果看,反应时间依次减少很多,说明乙酰氧基苯甲醛代替羟基苯甲醛后,反应相对较快,这也反证了前述推测。

实验发现,对羟基苯甲醛或对乙酰氧基苯甲醛参与的反应较间位者快,这符合一般的反应规律。

为得到羟基型产物以及验证反应过程中的新物质,设计了操作(f)。实验表明,该条件下可以选择性脱除酚羟基上的乙酰基,高纯度高收率得到羟基型的 β -乙酰氨基酮。

2 结论

通过对反应条件的探索和后处理方法的改进,首次发现TFA作为催化剂可实现对甲基苯乙酮、不同取代的芳香醛和乙腈的Dakin-West反应,成功合成了28个N-[3-(4-甲基苯基)-3-氧代-1-芳基丙基]乙酰胺化合物,反应条件温和,收率良好。同时首次证明了羟基苯甲醛参与的Dakin-West反应不是串联反应。本研究扩大了TFA催化剂的适用范围,为进一步研究奠定了基础。

3 实验

3.1 主要仪器及试剂

超导核磁共振仪(AV-300型,300MHz,Bruker,USA;

600 DD2型,600MHz,Agilent,USA;TMS为内标);QFT-ESI HRMS (Varian 7.0T, USA); X-6型精密显微熔点测定仪(北京福凯仪器有限公司)。

对甲基苯乙酮(上海达瑞精细化学品有限公司,>98%);乙酰氯、乙腈(成都市科龙化工试剂厂,AR);三氟乙酸(成都凯捷生物医药科技发展有限公司,AR)。

3.2 目标化合物1~26的一般制备方法

于100 mL圆底烧瓶中加入芳香醛(1.0 mmol)及乙腈(3.0 mL),冰浴搅拌。固体全部溶解后,缓慢滴加AcCl (0.4 mL);稍后,逐滴加入TFA (0.3 mol%),反应几分钟后加入对甲基苯乙酮(1.0 mmol)。30 min后,控温(28~35 °C)电磁搅拌,TLC监测反应进程。反应结束后,加入冰水(15 mL),搅拌,饱和NaHCO₃溶液调至中性,有块状或粘稠状物出现。对于块状物,经抽滤、冰水洗涤得粗品,然后用EtOAc/PE (V:V=1:6)或Et₂O/PE (V:V=1:3)分散,或者以EtOAc-PE混合溶剂法重结晶,一般都能得到纯品,但极少数粗品需要柱层析纯化;对于粘稠物,则以EtOAc萃取、分液,合并有机层,冰水洗涤,无水Na₂SO₄干燥,减压旋蒸,得到的油状物再用EtOAc-PE混合溶剂法重结晶,可得固态纯品。真空干燥,称重,计算收率及结构表征。

3.3 反应过程推理实验

3.3.1 乙酰氧基苯甲醛的制备

于100 mL圆底烧瓶中加入羟基苯甲醛(1.0 mmol),冰浴搅拌下缓慢滴加AcCl (0.4 mL);30 min后,控温35 °C电磁搅拌,TLC监测反应进程;反应停止后,乙醚萃取,水洗,干燥,减压旋蒸,得油状物。冰箱4 °C放置,对乙酰氧基苯甲醛成白色固体析出,间乙酰氧基苯甲醛仍为液体。

3.3.2 N-[(1-乙酰氧基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)]丙基乙酰胺(25, 26)的制备

A法:于100 mL圆底烧瓶中加入羟基苯甲醛,按第3.2节的通法进行合成与后处理。反应100 h。

B法:于100 mL圆底烧瓶中加入羟基苯甲醛(1.0 mmol),冰浴搅拌下缓慢滴加AcCl (0.4 mL);稍后,逐滴加入TFA (0.3 mol%),TLC监测反应进程。2 h后加入对甲基苯乙酮(1.05 mmol)及MeCN (3.0 mL)。控温35 °C电磁搅拌,TLC监测反应进程。反应停止(69 h)后,按第3.2节的后处理方法进行后处理。

C法:羟基苯甲醛换为乙酰氧基苯甲醛,按照第3.2节的方法进行合成及后处理。反应进行了48 h。

3.3.3 N-[(1-羟基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)]丙基乙酰胺(27, 28)的制备

所得产品25或26 (1.0 mmol)加入1 mol·L⁻¹

LiOH-H₂O 8 mL, 冰浴下搅拌反应. TLC 监测反应进程, 大约 1 h 后停止反应. 冰浴下以 2 mol·L⁻¹ H₂SO₄ 调节 pH=3~4, 瞬间析出大量白色固体. 抽滤, 以水洗涤滤饼, 干燥, 验纯及结构表征.

3.4 新化合物的数据表征

N-[1-(2-硝基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**3**): 土黄色固体, 收率 49%. m.p. 179.3~180.6 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 300 MHz) δ: 1.99 (s, 3H, COCH₃), 2.40 (s, 3H, CH₃), 3.59 (dd, *J*=5.4, 16.8 Hz, 1H, CH₂), 3.68 (dd, *J*=6.0, 17.1 Hz, 1H, CH₂), 5.92~5.95 (m, 1H, CHN), 7.13 (d, *J*=3.9 Hz, 1H, NH), 7.24 (d, *J*=8.4 Hz, 2H, ArH), 7.38 (t, *J*=8.1 Hz, 1H, ArH), 7.57 (t, *J*=6.3 Hz, 1H, ArH), 7.70 (d, *J*=6.6 Hz, 1H, ArH), 7.82 (d, *J*=7.2 Hz, 2H, ArH), 7.93 (d, *J*=8.1 Hz, 1H, ArH); ¹³C NMR (CDCl₃, 75 MHz) δ: 198.1, 169.7, 148.4, 144.9, 137.1, 133.8, 133.6, 129.6, 129.5 (2×C), 128.4 (2×C), 128.3, 125.0, 47.3, 42.3, 23.2, 21.8; HRMS calcd for C₁₈H₁₈N₂O₄Na [M+Na]⁺ 349.1159, found 349.1154.

N-[1-(3,4-二氯苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**5**): 白色固体, 收率 61%. m.p. 126.1~128.4 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ: 1.80 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.38 (dd, *J*=6.0, 16.8 Hz, 1H, CH₂), 3.55 (dd, *J*=8.4, 17.1 Hz, 1H, CH₂), 5.28~5.35 (m, 1H, CHN), 7.31~7.36 (m, 3H, ArH), 7.56~7.61 (m, 2H, ArH), 7.86 (d, *J*=8.4 Hz, 2H, ArH), 8.38 (d, *J*=6.9 Hz, 1H, NH); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 75 MHz) δ: 196.6, 169.0, 144.9, 144.1, 134.4, 131.3, 130.8, 129.7, 129.6 (2×C), 129.2, 128.6 (2×C), 127.6, 48.6, 44.4, 23.0, 21.6; HRMS calcd for C₁₈H₁₇Cl₂NO₂Na [M+Na]⁺ 372.0529, found 372.0536.

N-[1-(4-三氟甲基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**6**): 白色固体, 收率 79%. m.p. 135.5~137.3 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ: 1.80 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.38~3.62 (m, 2H, CH₂), 5.37~5.44 (m, 1H, CHN), 7.32 (d, *J*=7.5 Hz, 2H, ArH), 7.57 (d, *J*=7.8 Hz, 2H, ArH), 7.68 (d, *J*=7.8 Hz, 2H, ArH), 7.86 (d, *J*=7.5 Hz, 2H, ArH), 8.46 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, NH); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 75 MHz) δ: 196.6, 169.0, 148.4, 144.1, 134.5, 134.4, 129.6 (2×C), 128.5 (2×C), 127.9 (2×C), 127.7 (2×C), 125.5, 49.2, 44.4, 23.0, 21.5; HRMS calcd for C₁₉H₁₈F₃NO₂Na [M+Na]⁺ 372.1182, found 372.1184.

N-[1-(3-三氟甲基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**7**): 白色固体, 收率 60%. m.p. 126.3~127.8 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ: 1.80 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.38~3.62 (m, 2H, CH₂), 5.38~5.45 (m, 1H, CHN), 7.32 (d, *J*=7.8 Hz, 2H, ArH), 7.52~7.57 (m,

2H, ArH), 7.65~7.70 (m, 2H, ArH), 7.86 (d, *J*=7.2 Hz, 2H, ArH), 8.44 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, NH); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 75 MHz) δ: 196.7, 169.0, 145.1, 144.1, 134.4, 131.4, 129.8, 129.7 (2×C), 129.6, 128.6 (2×C), 124.1, 124.0, 123.6, 49.1, 44.6, 23.0, 21.6; HRMS calcd for C₁₉H₁₈F₃NO₂Na [M+Na]⁺ 372.1182, found 372.1186.

N-[1-(2-三氟甲基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**8**): 白色固体, 收率 57%. m.p. 161.3~162.9 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ: 1.76 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.39~3.64 (m, 2H, CH₂), 5.69~5.73 (m, 1H, CHN), 7.32 (d, *J*=7.5 Hz, 2H, ArH), 7.46 (t, *J*=7.2 Hz, 1H, ArH), 7.66~7.75 (m, 3H, ArH), 7.86 (d, *J*=7.8 Hz, 2H, ArH), 8.47 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, NH); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 75 MHz) δ: 196.1, 168.8, 144.2, 143.2, 134.4, 133.2, 129.7 (2×C), 128.8, 128.6 (2×C), 127.8, 126.7, 126.5, 126.0, 45.7, 45.2, 23.0, 21.6; HRMS calcd for C₁₉H₁₈F₃NO₂Na [M+Na]⁺ 372.1182, found 372.1185.

N-[1-(3-氟苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**10**): 白色固体, 收率 92%. m.p. 100.2~101.1 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ: 1.79 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.30~3.39 (m, 1H, CH₂), 3.52 (dd, *J*=8.4, 17.4 Hz, 1H, CH₂), 5.32~5.39 (m, 1H, CHN), 7.05 (t, *J*=7.5 Hz, 1H, ArH), 7.17 (d, *J*=7.5 Hz, 2H, ArH), 7.31~7.38 (m, 3H, ArH), 7.86 (d, *J*=8.1 Hz, 2H, ArH), 8.36 (d, *J*=7.8 Hz, 1H, NH); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 75 MHz) δ: 196.8, 169.0, 162.6, 146.7, 144.2, 134.5, 130.6, 129.7 (2×C), 128.6 (2×C), 123.2, 114.1, 113.8, 49.0, 44.7, 23.1, 21.6; HRMS calcd for C₁₈H₁₈FNO₂Na [M+Na]⁺ 322.1214, found 322.1211.

N-[1-(2-氟苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**11**): 白色固体, 收率 93%. m.p. 170.8~172.5 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ: 1.79 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.28~3.37 (m, 1H, CH₂), 3.52 (dd, *J*=8.7, 17.1 Hz, 1H, CH₂), 5.57~5.64 (m, 1H, CHN), 7.11~7.19 (m, 2H, ArH), 7.26~7.34 (m, 3H, ArH), 7.43 (t, *J*=7.5 Hz, 1H, ArH), 7.85 (d, *J*=7.5 Hz, 2H, ArH), 8.39 (d, *J*=7.2 Hz, 1H, NH); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 75 MHz) δ: 196.7, 168.9, 159.9, 144.1, 134.4, 130.2, 129.7 (2×C), 129.2, 128.7, 128.5 (2×C), 124.8, 115.6, 43.8, 43.6, 22.9, 21.5; HRMS calcd for C₁₈H₁₈FNO₂Na [M+Na]⁺ 322.1214, found 322.1217.

N-[1-(2-氯苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**14**): 白色固体, 收率 93%. m.p. 152.3~153.4 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ: 1.80 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.25 (dd, *J*=3.9, 17.1 Hz, 1H, CH₂), 3.46 (dd,

$J=9.6, 17.1$ Hz, 1H, CH₂), 5.66~5.72 (m, 1H, CHN), 7.24~7.37 (m, 4H, ArH), 7.41 (d, $J=7.8$ Hz, 1H, ArH), 7.48 (d, $J=7.8$ Hz, 1H, ArH), 7.88 (d, $J=7.8$ Hz, 2H, ArH), 8.41 (d, $J=7.2$ Hz, 1H, NH); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 75 MHz) δ : 196.5, 168.9, 144.1, 141.0, 134.4, 132.0, 129.8 (2×C), 129.7, 128.9, 128.6 (2×C), 128.1, 127.8, 46.7, 43.6, 23.0, 21.6; HRMS calcd for C₁₈H₁₈ClNO₂Na [M+Na]⁺ 338.0918, found 338.0926.

N-[1-(4-溴苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**15**): 米白色固体, 收率 91%. m.p. 155.9~157.3 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ : 1.79 (s, 3H, COCH₃), 2.38 (s, 3H, CH₃), 3.31~3.39 (m, 1H, CH₂), 3.52 (dd, $J=6.0, 16.8$ Hz, 1H, CH₂), 5.28~5.34 (m, 1H, CHN), 7.28~7.34 (m, 4H, ArH), 7.50 (d, $J=8.7$ Hz, 2H, ArH), 7.85 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 8.32 (d, $J=7.8$ Hz, 1H, NH); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 75 MHz) δ : 196.8, 168.9, 144.1, 143.0, 134.5, 131.5 (2×C), 129.7 (2×C), 129.4 (2×C), 128.5 (2×C), 120.2, 48.9, 44.6, 23.0, 21.6; HRMS calcd for C₁₈H₁₈BrNO₂Na [M+Na]⁺ 382.0413, found 382.0419.

N-[1-(3-溴苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**16**): 白色固体, 收率 80%. m.p. 124.2~125.4 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ : 1.79 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.32~3.43 (m, 1H, CH₂), 3.53 (dd, $J=8.1, 17.1$ Hz, 1H, CH₂), 5.28~5.35 (m, 1H, CHN), 7.25~7.31 (m, 2H, ArH), 7.32 (d, $J=8.1$ Hz, 2H, ArH), 7.42 (dt, $J=7.8, 1.8$ Hz, 1H, ArH), 7.54 (s, 1H, ArH), 7.86 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 8.37 (d, $J=7.5$ Hz, 1H, NH); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 75 MHz) δ : 196.7, 168.9, 146.5, 144.1, 134.4, 130.9, 130.1, 129.8, 129.7 (2×C), 128.6 (2×C), 126.3, 122.1, 49.0, 44.6, 23.1, 21.6; HRMS calcd for C₁₈H₁₈BrNO₂Na [M+Na]⁺ 382.0413, found 382.0410.

N-[1-(3-甲基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**20**): 白色固体, 收率 55%. m.p. 113.6~115.3 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ : 1.78 (s, 3H, COCH₃), 2.28 (s, 3H, CH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.32 (dd, $J=6.3, 16.5$ Hz, 1H, CH₂), 3.48 (dd, $J=8.4, 16.8$ Hz, 1H, CH₂), 5.28~5.35 (m, 1H, CHN), 7.02 (d, $J=6.9$ Hz, 1H, ArH), 7.11~7.21 (m, 3H, ArH), 7.32 (d, $J=8.1$ Hz, 2H, ArH), 7.85 (d, $J=8.1$ Hz, 2H, ArH), 8.28 (d, $J=8.1$ Hz, 1H, NH); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 75 MHz) δ : 197.1, 168.7, 144.0, 143.4, 137.7, 134.6, 129.7 (2×C), 128.6 (3×C), 127.9, 127.7, 124.1, 49.4, 44.9, 23.1, 21.6, 21.5; HRMS calcd for C₁₉H₂₁NO₂Na [M+Na]⁺ 318.1465, found 318.1460.

N-[1-(3-甲氧基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**22**): 浅黄色固体, 收率 91%. m.p. 142.7~143.5 °C;

¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ : 1.78 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.28~3.35 (m, 1H, CH₂), 3.48 (dd, $J=6.3, 16.5$ Hz, 1H, CH₂), 3.73 (s, 3H, OCH₃), 5.29~5.36 (m, 1H, CHN), 6.78 (d, $J=7.2$ Hz, 1H, ArH), 6.91 (s, 2H, ArH), 7.18~7.24 (m, 1H, ArH), 7.32 (d, $J=6.9$ Hz, 2H, ArH), 7.85 (d, $J=8.1$ Hz, 2H, ArH), 8.31 (d, $J=8.1$ Hz, 1H, NH); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 75 MHz) δ : 197.1, 168.8, 159.6, 145.2, 144.0, 134.6, 129.7, 129.6 (2×C), 128.6 (2×C), 119.3, 112.9, 112.4, 55.4, 49.4, 45.0, 23.1, 21.6; HRMS calcd for C₁₉H₂₁NO₃Na [M+Na]⁺ 334.1414, found 334.1417.

N-[1-(2-甲氧基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**23**): 土黄色固体, 收率 73%. m.p. 152.7~154.0 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ : 1.79 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.23~3.36 (m, 2H, CH₂), 3.80 (s, 3H, OCH₃), 5.58~5.65 (m, 1H, CHN), 6.89~6.98 (m, 2H, ArH), 7.20~7.28 (m, 2H, ArH), 7.33 (d, $J=7.5$ Hz, 2H, ArH), 7.88 (d, $J=7.5$ Hz, 2H, ArH), 8.26 (d, $J=7.8$ Hz, 1H, NH); ¹³C NMR (CDCl₃, 75 MHz) δ : 198.4, 169.1, 156.7, 144.1, 134.4, 129.4, 129.3 (2×C), 128.7, 128.5, 128.4 (2×C), 120.8, 110.8, 55.4, 47.9, 43.0, 23.5, 21.7; HRMS calcd for C₁₉H₂₁NO₃Na [M+Na]⁺ 334.1414, found 334.1410.

N-[1-(3,4,5-三甲氧基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**24**): 灰白色固体, 收率 60%. m.p. 156.8~157.9 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ : 1.79 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.27~3.34 (m, 1H, CH₂), 3.47 (dd, $J=8.1, 16.2$ Hz, 1H, CH₂), 3.61 (s, 3H, OCH₃), 3.75 (s, 6H, OCH₃), 5.26~5.34 (m, 1H, CHN), 6.65 (s, 2H, ArH), 7.32 (d, $J=8.1$ Hz, 2H, ArH), 7.86 (d, $J=7.8$ Hz, 2H, ArH), 8.27 (d, $J=8.1$ Hz, 1H, NH); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 75 MHz) δ : 197.2, 168.7, 153.1 (2×C), 144.0, 139.3, 136.7, 134.7, 129.6 (2×C), 128.6 (2×C), 104.4 (2×C), 60.3, 56.2 (2×C), 49.8, 45.2, 23.1, 21.6; HRMS calcd for C₂₁H₂₅NO₅Na [M+Na]⁺ 394.1625, found 394.1630.

N-[1-(4-乙酰氧基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**25**): 浅黄色固体, 收率 67%. m.p. 142.2~143.7 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 300 MHz) δ : 2.01 (s, 3H, COCH₃), 2.27 (s, 3H, OCOCH₃), 2.41 (s, 3H, CH₃), 3.41 (dd, $J=6.0, 17.1$ Hz, 1H, CH₂), 3.70 (dd, $J=5.1, 17.1$ Hz, 1H, CH₂), 5.52~5.58 (m, 1H, CHN), 6.76 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, NH), 7.02 (d, $J=8.7$ Hz, 2H, ArH), 7.25 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 7.35 (d, $J=8.1$ Hz, 2H, ArH), 7.80 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH); ¹³C NMR (CDCl₃, 75 MHz) δ : 197.2, 169.7,

169.4, 149.5, 144.1, 139.1, 133.9, 129.2 ($2\times C$), 28.1 ($2\times C$), 127.6 ($2\times C$), 121.4 ($2\times C$), 49.2, 43.5, 22.9, 21.5, 20.9; HRMS calcd for $C_{20}H_{21}NO_4Na$ $[M+Na]^+$ 362.1363, found 362.1360.

N-[1-(3-乙酰氧基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**26**): 米白色固体, 收率 61%. m.p. 114.8~116.0 °C; 1H NMR ($CDCl_3$, 300 MHz) δ : 2.02 (s, 3H, $COCH_3$), 2.28 (s, 3H, $OCOCH_3$), 2.40 (s, 3H, CH_3), 3.41 (dd, $J=6.0$, 17.1 Hz, 1H, CH_2), 3.71 (dd, $J=5.1$, 17.1 Hz, 1H, CH_2), 5.52~5.58 (m, 1H, CHN), 6.81 (d, $J=7.8$ Hz, 1H, NH), 6.97 (d, $J=7.2$ Hz, 1H, ArH), 7.08 (s, 1H, ArH), 7.18 (d, $J=8.1$ Hz, 1H, ArH), 7.25 (d, $J=9.0$ Hz, 2H, ArH), 7.30 (t, $J=7.8$ Hz, 1H, ArH), 7.80 (d, $J=8.1$ Hz, 2H, ArH); ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 75 MHz) δ : 197.9, 169.7, 169.5, 150.8, 144.6, 143.1, 134.0, 129.6, 129.4 ($2\times C$), 128.3 ($2\times C$), 124.0, 120.6, 119.9, 49.5, 43.0, 23.6, 21.7, 21.2; HRMS calcd for $C_{20}H_{21}NO_4Na$ $[M+Na]^+$ 362.1363, found 362.1366.

N-[1-(4-羟基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**27**): 米白色固体, 收率 97%. m.p. 202.6~203.5 °C; 1H NMR ($DMSO-d_6$, 600 MHz) δ : 1.76 (s, 3H, $COCH_3$), 2.37 (s, 3H, CH_3), 3.31 (dd, $J=6.6$, 16.2 Hz, 1H, CH_2), 3.42 (dd, $J=7.8$, 16.2 Hz, 1H, CH_2), 5.26 (dd, $J=7.8$, 15.0 Hz, 1H, CHN), 6.68 (d, $J=9.0$ Hz, 2H, ArH), 7.12 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 7.32 (d, $J=7.8$ Hz, 2H, ArH), 7.84 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 8.21 (d, $J=7.8$ Hz, 1H, NH), 9.30 (s, 1H, OH); ^{13}C NMR ($DMSO-d_6$, 151 MHz) δ : 197.3, 168.6, 156.7, 144.0, 134.6, 133.5, 129.7 ($2\times C$), 128.6 ($2\times C$), 128.2 ($2\times C$), 115.4 ($2\times C$), 49.1, 45.1, 23.1, 21.6.

N-[1-(3-羟基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基]乙酰胺(**28**): 橘黄色固体, 收率 83%. m.p. 98.8~99.7 °C; 1H NMR ($DMSO-d_6$, 600 MHz) δ : 1.78 (s, 3H, $COCH_3$), 2.37 (s, 3H, CH_3), 3.31 (dd, $J=6.0$, 16.8 Hz, 1H, CH_2), 3.44 (dd, $J=8.4$, 16.8 Hz, 1H, CH_2), 5.27 (dd, $J=8.4$, 14.4 Hz, 1H, CHN), 6.60 (dd, $J=1.8$, 7.8 Hz, 1H, ArH), 6.73 (s, 1H, ArH), 6.74 (d, $J=7.2$ Hz, 1H, ArH), 7.08 (t, $J=7.8$ Hz, 1H, ArH), 7.32 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 7.85 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 8.27 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, NH), 9.34 (s, 1H, OH); ^{13}C NMR ($DMSO-d_6$, 151 MHz) δ : 197.1, 168.8, 157.7, 145.0, 144.1, 134.6, 129.8 ($2\times C$), 129.7, 128.6 ($2\times C$), 117.6, 114.2, 114.1, 49.4, 44.9, 23.1, 21.6.

致谢 西南大学化学化工学院核磁室罗群力老师、龚成斌老师、王宁老师给予帮助, 在此表示衷心的感谢!

辅助材料(Supporting Information) 主要包括实验非主要仪器、已知化合物结构表征以及高分辨质谱图.

References

- [1] Rajamohan-Reddy, P.; Balraju, V.; Madhavan, G. R.; Banerji, B.; Iqbal, J. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 353.
- [2] Rao, I. N.; Prabhakaran, E. N.; Das, S. K.; Iqbal, J. *J. Org. Chem.* **2003**, *68*, 4079.
- [3] Enders, D.; Moser, M.; Geibel, G.; Laufer, M. C. *Synthesis* **2004**, 2040.
- [4] Zare, A. *Eur.-J. Chem.* **2012**, *9*, 2322.
- [5] Jeffs, P. W.; Redfearn, R.; Wolfram, J. *J. Org. Chem.* **1983**, *48*, 3861.
- [6] Pandey, G.; Singh, R. P.; Garg, A.; Singh, V. K. *Tetrahedron Lett.* **2005**, *46*, 2137.
- [7] Mao, H.; Wan, J. P.; Pan, Y. J. *Tetrahedron* **2009**, *65*, 1026.
- [8] Vovk, M. V.; Golovach, N. M.; Sukach, V. A. *J. Fluorine Chem.* **2010**, *131*, 229.
- [9] Bhatia, B.; Reddy, M. M.; Iqbal, J. *Chem. Commun.* **1994**, 713.
- [10] Zhang, C.-G.; Chen, W.-M.; Li, J.-J. *Chin. J. Org. Chem.* **2009**, *29*, 174 (in Chinese).
(张成刚, 陈文明, 李建军, 有机化学, **2009**, *29*, 174.)
- [11] Zhang, X.-H. *M. S. Thesis*, Southwest University, Chongqing, **2011** (in Chinese).
(张兴花, 硕士学位论文, 西南大学, 重庆, **2011**.)
- [12] Bahulayan, D.; Das, S. K.; Iqbal, J. *J. Org. Chem.* **2003**, *68*, 5735.
- [13] Behbahani, F. K.; Doragi, N.; Heravi, M. M. *Synth. Commun.* **2012**, *42*, 705.
- [14] Heravi, M. M.; Behbahani, F. K.; Daraie, M.; Oskooie, H. A. *Mol. Diversity* **2009**, *13*, 375.
- [15] Momeni, A. R.; Sadeghi, M. *Appl. Catal., A* **2009**, *357*, 100.
- [16] Heravi, M. M.; Ranjbar, L.; Derikvand, F.; Bamoharram, F. F. *Catal. Commun.* **2007**, *8*, 289.
- [17] Tayeb, R.; Tizabi, S. *Chin. J. Catal.* **2012**, *33*, 923.
- [18] Nagarapu, L.; Kantevari, S.; Cheemalapati, V. N.; Apuri, S.; Kumari, N. V. *J. Mol. Catal. A: Chem.* **2007**, *264*, 22.
- [19] Oskooie, H. A.; Heravi, M. M.; Tahershamsi, L.; Sadjadi, S.; Tajbakhsh, M. *Synth. Commun.* **2010**, *40*, 1772.
- [20] Nabil, M. R.; Tabatabaei Rezaei, S. J. *Appl. Catal., A* **2009**, *366*, 108.
- [21] Shaterian, H. R.; Hosseini, A.; Ghashang, M. *Synth. Commun.* **2008**, *38*, 3766.
- [22] Das, B.; Krishnaiah, M.; Laxminarayana, K.; Reddy, K. R. *J. Mol. Catal. A: Chem.* **2007**, *270*, 284.
- [23] Davoodnia, A.; Heravi, M. M.; Rezaei-Daghighi, L.; Tavakoli-Hoseini, N. *Chin. J. Chem.* **2010**, *28*, 429.
- [24] Tiwari, A. K.; Kumbhare, R. M.; Agawane, S. B.; Ali, A. Z.; Kumar, K. V. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2008**, *18*, 4130.
- [25] Bhat, R. P.; Raje, V. P.; Alexander, V. M.; Patil, S. B.; Samant, S. D. *Tetrahedron Lett.* **2005**, *46*, 4801.
- [26] Yakaiah, T.; Lingaiah, B. P. V.; Reddy, G. V.; Narsaiah, B.; Rao, P. S. *ARKIVOC* **2007**, *13*, 227.
- [27] Shinu, V. S.; Sheeja, B.; Purushothaman, E.; Bahulayan, D. *Tetrahedron Lett.* **2009**, *50*, 4838.
- [28] Hagmann, W. K. *J. Med. Chem.* **2008**, *51*, 4359.
- [29] Qing, F.-L. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, *32*, 815 (in Chinese).
(卿凤翎, 有机化学, **2012**, *32*, 815.)
- [30] Kawase, M.; Hirabayashi, M.; Kumakura, H.; Saito, S.; Yamamoto, K. *Chem. Pharm. Bull.* **2000**, *48*, 114.
- [31] Cadierno, V.; Francos, J.; Gimeno, J. *Chem. Commun.* **2010**, *46*,

- 4175.
- [32] Beushev, A. A.; Kon'shin, V. V.; Chemeris, N. A.; Chemeris, M. M. *Russ. J. Appl. Chem.* **2008**, *81*, 1856.
- [33] Sharma, I.; Crich, D. *J. Org. Chem.* **2011**, *76*, 6518.
- [34] Zhang, X. H.; Yan, J. F.; Fan, L.; Wang, G. B.; Yang, D. C. *Acta Pharm. Sin. B* **2011**, *1*, 100.
- [35] Zhang, X. H.; Fan, L.; Liu, J.; Yang, D. C. *Res. Chem. Intermed.* **2011**, *37*, 811.
- [36] (a) Wang, H.; Yan, J. F.; Song, X. L.; Fan, L.; Xu, J.; Zhou, G. M.; Jiang, L.; Yang, D. C. *Bioorg. Med. Chem.* **2012**, *20*, 2119.
(b) Zhang, K.; Yan, J.-F.; Tang, X.-M.; Liu, H.-P.; Fan, L.; Zhou, G.-M.; Yang, D.-C. *Acta Pharm. Sin.* **2011**, *46*, 412 (in Chinese).
(张坤, 晏菊芳, 唐雪梅, 刘红萍, 范莉, 周光明, 杨大成, 药化学报, **2011**, *46*, 412.)
(c) Zhou, Z.-W.; Yan, J.-F.; Tang, X.-M.; Zhang, W.-Y.; Zhang, Y.-X.; Chen, X.; Su, X.-Y.; Yang, D.-C. *Chin. J. Org. Chem.* **2010**, *30*, 582 (in Chinese).
(周祖文, 晏菊芳, 唐雪梅, 张蔚瑜, 张映霞, 陈欣, 苏小燕, 杨大成, 有机化学, **2010**, *30*, 582.)
(d) Zhang, Y.-X.; Yan, J.-F.; Fan, L.; Zhang, W.-Y.; Su, X.-Y.; Chen, X.; Tang, X.-M.; Zhou, Z.-W.; Yang, D.-C. *Chin. J. Appl. Chem.* **2010**, *27*, 1026 (in Chinese).
(张映霞, 晏菊芳, 范莉, 张蔚瑜, 苏小燕, 陈欣, 唐雪梅, 周祖文, 杨大成, 应用化学, **2010**, *27*, 1026.)
(e) Yang, D.-C.; Yan, J.-F.; Xu, J.; Ye, F.; Zhou, Z.-W.; Zhang, W.-Y.; Fan, L.; Chen, X. *Acta Pharm. Sin.* **2010**, *45*, 66 (in Chinese).
(杨大成, 晏菊芳, 许苾, 叶飞, 周祖文, 张蔚瑜, 范莉, 陈欣, 药化学报, **2010**, *45*, 66.)
(f) Yang, D.-C.; Yan, J.-F.; Song, X.-L.; Zhang, W.-Y.; Tang, X.-M.; Fan, L. *Acta Chim. Sin.* **2010**, *68*, 515 (in Chinese).
(杨大成, 晏菊芳, 宋小礼, 张蔚瑜, 唐雪梅, 陈欣, 范莉, 化学学报, **2010**, *68*, 515.)
(g) Zhang, Y.-X.; Yan, J.-F.; Fan, L.; Zhang, W.-Y.; Zhou, Z.-W.; Chen, X.; Su, X.-Y.; Tang, X.-M.; Yang, D.-C. *Acta Pharm. Sin.* **2009**, *44*, 1244 (in Chinese).
(张映霞, 晏菊芳, 范莉, 张蔚瑜, 周祖文, 陈欣, 苏小燕, 唐雪梅, 杨大成, 药化学报, **2009**, *44*, 1244.)
(h) Tang, X.-M.; Yan, J.-F.; Chen, X.; Zhang, Y.-X.; Zhou, Z.-W.; Zhang, W.-Y.; Su, X.-Y.; Yang, D.-C. *Chin. J. Org. Chem.* **2009**, *29*, 1790 (in Chinese).
(唐雪梅, 晏菊芳, 陈欣, 张映霞, 周祖文, 张蔚瑜, 苏小燕, 杨大成, 有机化学, **2009**, *29*, 1790.)
(i) Song, X.-L.; Yan, J.-F.; Fan, L.; Chen, X.; Xu, J.; Zhou, Z.-W.; Yang, D.-C. *Chin. J. Org. Chem.* **2009**, *29*, 606 (in Chinese).
(宋小礼, 晏菊芳, 范莉, 陈欣, 许苾, 周祖文, 杨大成, 有机化学, **2009**, *29*, 606.)
(j) Yang, D.-C.; Yan, J.-F.; Fan, L.; Chen, X.; Xu, J.; Zhang, W.-Y.; Song, X.-L.; Ye, F.; Liu, H.-P.; Jiang, H.-W.; Zhou, Z.-W.; Tang, X.-M.; Zhang, Y.-X.; Li, T.-J.; Su, X.-Y. *CN 101538230*, **2009** [*Chem. Abstr.* **2009**, *151*, 448057].
(k) Li, Q.-L.; Yang, D.-C.; Yan, J.-F.; Fan, L.; Chen, X.; Liu, H.-P.; Zhang, W.-Y.; Song, X.-L.; Yan, Y.-H.; Xu, J.; Zhang, J. *CN 101768149*, **2009** [*Chem. Abstr.* **2010**, *153*, 232223].
- [37] Yang, D.-C.; Xie, J.-P.; Fan, L.; Ji, L.; Liu, H.-P.; Long, Q.-X.; Tang, X.-M.; Zhou, Z.-W.; Zhang, Y.-X.; Su, X.-Y. *CN 101612143*, **2009** [*Chem. Abstr.* **2010**, *152*, 184268].
- [38] Wang, M.-W.; Den, Y.; Zhou, C.-H.; Yang, D.-C.; Hui, X.; Su, H.-R.; Gao, J. *WO 2006125397*, **2006** [*Chem. Abstr.* **2006**, *146*, 27617].
- [39] Yang, D.-C.; Fan, L.; Liu, H.-P.; Song, X.-L.; Xu, J.; Zhao, J.; Deng, Y.; Li, C.-B. *CN 101381320*, **2009** [*Chem. Abstr.* **2009**, *150*, 374117].
- [40] (a) Mukhopadhyay, M.; Bhatia, B.; Iqbal, J. *Tetrahedron Lett.* **1997**, *38*, 1083.
(b) Prabhakaran, E. N.; Iqbal, J. *J. Org. Chem.* **1999**, *64*, 3339.
(c) Ghosh, R.; Maiti, S.; Chakraborty, A. *Synlett* **2005**, 115.
(d) Ghosh, R.; Maiti, S.; Chakraborty, A.; Chakraborty, S.; Mukherjee, A. K. *Tetrahedron* **2006**, *62*, 4059.
(e) Hassankhani, A.; Maghsoudlou, M. T.; Habibi-Khorassani, S. M.; Hosseini-Mahdiabad, H.; Marandi, G. *ARKIVOC* **2008**, 134.
(f) Das, B.; Kumar, R. A.; Thirupathi, P.; Srinivas, Y. *Synth. Commun.* **2009**, *39*, 3305.
(g) Shinu, V. S.; Pramitha, P.; Bahulayan, D. *Tetrahedron Lett.* **2011**, *52*, 3110.

(Li, L.; Fan, Y.)

N-[3-(4-甲基苯基)-3-氧代-1-芳基丙基]乙酰胺的三氟乙酸催化合成

任正红 李 晟 张兴花 范 莉* 周光明 杨大成*

(西南大学化学化工学院 重庆 400715)

1 实验非重要仪器及试剂

旋转蒸发仪(RE-2000, 上海亚荣生化仪器厂), 紫外分析仪(ZF-I, 上海顾村电光仪器厂), 集热式恒温加热磁力搅拌器(DF-101S, 郑州长城科工贸有限公司)

4-硝基苯甲醛、3-硝基苯甲醛(北京化学试剂公司, CP), 2,4-二氯苯甲醛、3,4,5-三甲氧基苯甲醛、3-羟基苯甲醛、2-氟苯甲醛(上海达瑞精细化学品有限公司), 4-氯苯甲醛、3-氯苯甲醛、2-氯苯甲醛、3,4-二氯苯甲醛(爱斯特(成都)医药技术有限公司), 4-溴苯甲醛、3-溴苯甲醛、2-溴苯甲醛、4-氟苯甲醛、3-氟苯甲醛(Fluka, AR), 2-硝基苯甲醛、2-甲氧基苯甲醛、4-三氟甲基苯甲醛、3-三氟甲基苯甲醛、2-三氟甲基苯甲醛(韶远化学科技(上海)有限公司), 苯甲醛(上海试剂一厂, CP), 4-甲氧基苯甲醛、3-甲氧基苯甲醛(Alfa Aesar, AR), 4-甲基苯甲醛、3-甲基苯甲醛(Merck, AR), 4-羟基苯甲醛(国药集团试剂总厂, AR), $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{CeCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (成都市科龙化工试剂厂), 甲醇、乙酸乙酯、乙醚、石油醚、无水硫酸钠、碳酸氢钠(重庆化学试剂总厂, AR)

2 已知化合物的结构表征结果如下

N-(1-(4-硝基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基)乙酰胺(1): 金黄色固体, 收率 75%. m.p. 82.8-83.4 °C (文献值^[1] Liquid); ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz, ppm) δ : 1.81 (s, 3H, COCH₃), 2.36 (s, 3H, CH₃), 3.33-3.44 (m, 1H, CH₂), 3.60 (dd, *J*=8.4 and 17.1 Hz, 1H, CH₂), 5.38-5.46 (m, 1H, CHN), 7.31 (d, *J*=8.1 Hz, 2H, Ar-H), 7.62 (d, *J*=8.7 Hz, 2H, Ar-H), 7.84 (d, *J*=7.8 Hz, 2H, Ar-H), 8.17 (d, *J*=8.7 Hz, 2H, Ar-H), 8.48 (d, *J*=7.2 Hz, 1H, NH).

N-(1-(3-硝基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基)乙酰胺(2): 浅黄色固体, 收率 61%. m.p. 104.1-105.9 °C (文献值^[2] 94-97 °C); ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz, ppm) δ : 1.82 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.44 (dd, *J*=5.7 and 17.4 Hz, 1H, CH₂), 3.64 (dd, *J*=8.1 and 17.4 Hz, 1H, CH₂), 5.41-5.48 (m, 1H, CHN), 7.32 (d, *J*=7.8 Hz, 2H, Ar-H), 7.62 (t, *J*=8.1 Hz, 1H, Ar-H), 7.83-7.88 (m, 3H, Ar-H), 8.10 (dd, *J*=2.1 and 8.4 Hz, 1H, Ar-H), 8.23 (s, 1H, Ar-H), 8.59 (d, *J*=7.2 Hz, 1H, NH).

N-(1-(2,4-二氯苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基)乙酰胺(4): 白色固体, 收率 91%. m.p. 129.8-131.1 °C (文献值^[3] 112-114 °C); ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz, ppm) δ : 1.80 (s, 3H, COCH₃), 2.38 (s, 3H, CH₃), 3.23 (dd, *J*=3.9 Hz and 17.4 Hz, 1H, CH₂), 3.48 (dd, *J*=9.0 Hz and 16.8 Hz, 1H, CH₂), 5.61-5.65 (m, 1H, CHN), 7.33 (d, *J*=7.8 Hz, 2H, Ar-H), 7.43-7.50 (m, 2H, Ar-H), 7.58 (s, 1H, Ar-H), 7.87 (d, *J*=8.1 Hz, 2H, Ar-H), 8.44 (d, *J*=6.9 Hz, 1H, NH).

N-(1-(4-氟苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基)乙酰胺(9): 白色固体, 收率 96%. m.p. 115.7-117.3 °C (文献值^[1] 104-106 °C); ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz, ppm) δ : 1.78 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.33-3.39 (m, 1H, CH₂), 3.51 (dd, *J*=8.1 and 17.4 Hz, 1H, CH₂), 5.31-5.38 (m, 1H, CHN), 7.13 (t, *J*=8.1 Hz, 2H, Ar-H), 7.31-7.40 (m, 4H, Ar-H), 7.85 (d, *J*=7.5 Hz, 2H, Ar-H), 8.33 (d, *J*=7.2 Hz, 1H, NH); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 75 MHz) δ : 196.9, 168.8, 161.5, 144.1, 139.7, 134.5, 129.7(2×C), 129.0(2×C), 128.5 (2×C), 115.3 (2×C), 48.8, 44.8, 23.1, 21.6.

N-(1-(4-氯苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基)乙酰胺(12): 白色固体, 收率 95%. m.p. 131.3-132.6 °C (文献值^[4] 130-132 °C); ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz, ppm) δ : 1.79 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.31-3.39 (m, 1H, CH₂), 3.52 (dd, *J*=8.4 and 17.1 Hz, 1H, CH₂), 5.29-5.37 (m, 1H, CHN), 7.32 (d, *J*=7.8 Hz, 2H, Ar-H), 7.37 (s, 4H, Ar-H), 7.85 (d, *J*=8.4 Hz, 2H, Ar-H), 8.38 (d, *J*=7.8 Hz, 1H, NH).

N-(1-(3-氯苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基)乙酰胺(13): 白色固体, 收率 75%. m.p. 124.3-125.8 °C (文献^[5] ¹H NMR (DMSO-*d*₆,

300 MHz, ppm) δ : 1.80 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.33-3.41 (m, 1H, CH₂), 3.53 (dd, J = 8.4 and 17.1 Hz, 1H, CH₂), 5.30-5.38 (m, 1H, CHN), 7.27-7.34 (m, 5H, Ar-H), 7.41 (s, 1H, Ar-H), 7.86 (d, J = 8.1 Hz, 2H, Ar-H), 8.36 (d, J = 7.8 Hz, 1H, NH).

***N*-(1-(2-溴苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基)乙酰胺(17)**: 白色固体, 收率 85%. m.p. 163.5-165.1 °C(文献值^[6]165 °C); ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz, ppm) δ : 1.80 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.21 (dd, J = 3.9 Hz and 17.4 Hz, 1H, CH₂), 3.42-3.49 (m, 1H, CH₂), 5.59-5.66 (m, 1H, CHN), 7.20 (t, J = 7.5 Hz, 1H, Ar-H), 7.33 (d, J = 8.1 Hz, 2H, Ar-H), 7.39 (t, J = 7.2 Hz, 1H, Ar-H), 7.46 (d, J = 6.6 Hz, 1H, Ar-H), 7.59 (d, J = 7.8 Hz, 1H, Ar-H), 7.89 (d, J = 8.1 Hz, 2H, Ar-H), 8.43 (d, J = 7.2 Hz, 1H, NH).

***N*-(1-苯基-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基)乙酰胺(18)**: 白色固体, 收率 91%. m.p. 123.6-124.9 °C(文献值^[1] 121-123 °C); ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz, ppm) δ : 1.79 (s, 3H, COCH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.31-3.36 (m, 1H, CH₂), 3.50 (dd, J = 8.1 Hz and 16.8 Hz, 1H, CH₂), 5.32-5.39 (m, 1H, CHN), 7.21-7.24 (m, 2H, Ar-H), 7.28-7.33 (m, 5H, Ar-H), 7.85 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Ar-H), 8.34 (d, J = 8.1 Hz, 1H, NH).

***N*-(1-(4-甲基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基)乙酰胺(19)**: 白色固体, 收率 93%. m.p. 115.2-116.1 °C(文献值^[4] 118-119 °C); ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz, ppm) δ : 1.77 (s, 3H, COCH₃), 2.25 (s, 3H, CH₃), 2.37 (s, 3H, CH₃), 3.32 (dd, J = 6.3 Hz and 16.8 Hz, 1H, CH₂), 3.48 (dd, J = 7.8 Hz and 16.8 Hz, 1H, CH₂), 5.28-5.35 (m, 1H, CHN), 7.10 (d, J = 7.8 Hz, 2H, Ar-H), 7.21 (d, J = 8.1 Hz, 1H, Ar-H), 7.32 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Ar-H), 7.84 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Ar-H), 8.27 (d, J = 8.1 Hz, 1H, NH).

***N*-(1-(4-甲氧基苯基)-3-氧-3-(4-甲基苯基)丙基)乙酰胺(21)**: 米白色固体, 收率 61%. m.p. 218.1-220.0 °C (文献值^[7] 218-220 °C); ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz, ppm) δ : 1.78 (s, 3H, COCH₃), 2.38 (s, 3H, CH₃), 3.31 (dd, J = 6.3 Hz and 16.5 Hz, 1H, CH₂), 3.46 (dd, J = 7.5 Hz and 16.2 Hz, 1H, CH₂), 3.70 (s, 3H, OCH₃), 5.28-5.35 (m, 1H, CHN), 6.86 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Ar-H), 7.26 (d, J = 8.7 Hz, 2H, Ar-H), 7.33 (d, J = 8.1 Hz, 2H, Ar-H), 7.85 (d, J = 7.8 Hz, 2H, Ar-H), 8.30 (d, J = 8.1 Hz, 1H, NH).

References

- [1] Yakaiah, T.; Venkat Reddy, G.; Lingaiah, B. P. V.; Narsaiah, B.; Shanthan Rao, P. *Synth. Commun.* **2005**, 35, 1307.
- [2] Shaterian, H. R.; Hosseinian, A.; Ghashang, M. *Synth. Commun.* **2008**, 38, 3766.
- [3] Nagarapu, L.; Bantu, R.; Puttireddy, R. *Appl. Catal., A* **2007**, 332, 304.
- [4] Zolfogol, M. A.; Khazaei, A.; Mokhlesi, M.; Zare, A.; Safaiee, M.; Derakhshan-Panah, F.; Keypour, H.; Ali, D.-F. A.; Merajoddin, M. *Chin. J. Chem.* **2012**, 30, 345.
- [5] Maghsoodlou, M. T.; Hassankhani, A.; Shaterian, H. R.; Habibi-Khorasani, S. M.; Mosaddegh, E. *Tetrahedron Lett.* **2007**, 48, 1729.
- [6] Shinu, V. S.; Sheeja, B.; Purushothaman, E.; Bahulayan, D. *Tetrahedron Lett.* **2009**, 50, 4838.
- [7] Selvam, N. P.; Perumal, P. T. *ARKIVOC* **2009**, 265.

3 新化合物测试方给回的数据及高分辨质谱图

测试方给回高分辨数据

化合物编号	分子式	分子量	分子离子峰	理论值	测量值
3	C ₁₈ H ₁₈ N ₂ O ₄	326.13	(M+Na) ⁺	349.1159	349.1154
		326.35			
5	C ₁₈ H ₁₇ Cl ₂ NO ₂	350.24	(M+Na) ⁺	372.0536	372.0529
		349.06			
6	C ₁₉ H ₁₈ F ₃ NO ₂	349.13	(M+Na) ⁺	372.1182	372.1184
		349.35			
7	C ₁₉ H ₁₈ F ₃ NO ₂	349.13	(M+Na) ⁺	372.1182	372.1186
		349.35			
8	C ₁₉ H ₁₈ F ₃ NO ₂	349.13	(M+Na) ⁺	372.1182	372.1185
		349.35			
10	C ₁₈ H ₁₈ FNO ₂	299.13	(M+Na) ⁺	322.1214	322.1211
		299.34			
11	C ₁₈ H ₁₈ FNO ₂	299.13	(M+Na) ⁺	322.1214	322.1217
		299.34			
14	C ₁₈ H ₁₈ ClNO ₂	315.79	(M+Na) ⁺	338.0926	338.0918
		315.10			
15	C ₁₈ H ₁₈ BrNO ₂	360.25	(M+Na) ⁺	382.0419	382.0413
		359.05			
16	C ₁₈ H ₁₈ BrNO ₂	359.05	(M+Na) ⁺	382.0413	382.0410
		360.25			
20	C ₁₉ H ₂₁ NO ₂	295.38	(M+Na) ⁺	318.1460	318.1465
		295.16			
22	C ₁₉ H ₂₁ NO ₃	311.37	(M+Na) ⁺	334.1417	334.1414
		311.15			
23	C ₁₉ H ₂₁ NO ₃	311.15	(M+Na) ⁺	334.1414	334.1410

24	$C_{21}H_{25}NO_5$	311.37	$(M+Na)^+$	394.1630	394.1625
		371.43			
		371.17			
25	$C_{20}H_{21}NO_4$	339.15	$(M+Na)^+$	362.1363	362.1360
		339.39			
26	$C_{20}H_{21}NO_4$	339.15	$(M+Na)^+$	362.1363	362.1366
		339.39			

Varian QFT-ESI
File: Rzh-S_ESI.trans

Mode: Positive
Scans: 1
Date: 07-MAY-2012
Time: 17:48:59
Scale: 2.3955

Compound 3

Varian QFT-ESI
File: DW48_ESI.trans

Sample Tracking No. 48

Mode: Positive
Scans: 1
Date: 16-JAN-2011
Time: 11:04:50
Scale: 10.0501

Compound 5

Varian QFT-ESI
File: Rzh+7_ESI.trans

Mode: Positive
Scans: 1

Date: 07-MAY-2012
Time: 17:58:18
Scale: 7.5768

Compound 6

Varian QFT-ESI
File: Rzh+8_ESI.trans

Mode: Positive
Scans: 1

Date: 07-MAY-2012
Time: 17:59:01
Scale: 4.7021

Compound 7

Varian QFT-ESI
File: Rzh9_ESI.trans

Mode: Positive
Scans: 1
Date: 07-MAY-2012
Time: 17:55:02
Scale: 3.6687

Compound 8

Varian QFT-ESI
File: Rzh4_ESI.trans

Mode: Positive
Scans: 1
Date: 07-MAY-2012
Time: 17:46:17
Scale: 2.6854

Compound 10

Varian QFT-ESI
File: Rzh10_ESI.trans

Mode: Positive
Scans: 1

Date: 07-MAY-2012
Time: 17:53:02
Scale: 2.6735

Compound 11

Varian QFT-ESI
File: DW49_ESI.trans

Sample Tracking No. 49

Mode: Positive
Scans: 1

Date: 16-JAN-2011
Time: 11:03:22
Scale: 17.3217

Compound 14

Varian QFT-ESI
File: DIW53_ESI.trans Sample Tracking No. 53

Mode: Positive Date: 16-JAN-2011
Scans: 1 Time: 10:50:47
Scale: 8.2645

Compound 15

Varian QFT-ESI
File: Rzh-2_ESI.trans

Mode: Positive Date: 07-MAY-2012
Scans: 1 Time: 17:40:34
Scale: 25.6781

Compound 16

Compound 20

Compound 22

Varian QFT-ESI
File: R21n3_ESI.trans

Mode: Positive
Scans: 1
Date: 07-MAY-2012
Time: 17:44:35
Scale: 2.1019

Compound 23

Varian QFT-ESI
File: DW50_ESI.trans

Sample Tracking No. 50

Mode: Positive
Scans: 1
Date: 18-JAN-2011
Time: 11:02:00
Scale: 3.2831

Compound 24

Compound 25

Compound 26