分子内氧化偶联反应在合成复杂吲哚生物碱骨架中的应用

谢卫青^{*,a} 左智伟^a 资伟伟^a 马大为^{*,a}^(a) 中国科学院上海有机化学研究所 生命有机化学国家重点实验室 上海 200032)

摘要 通过含有吲哚底物的分子内氧化偶联反应,成功地构建了 Communesin 家族生物碱的螺吲哚季碳中心,从而完成了(一)-Communesins A, B 和 F 的对映选择性合成。接下来我们发展了分子内氧化偶联/缩合串联反应策略,得到了天然产物(一)-Vincorine 的核心四环骨架,然后再经过五步转化完成了 Vincorine 的全合成。从药物化学角度来看,分子内氧化偶联/缩合串联提供了一个快速方便地合成含有多环吲哚骨架的方法。采用相同的串联反应策略,我们分别从色胺衍生的 β -酮酸酰胺和丙二酸二酰胺出发,一步构建了多环螺吲哚和多环吲哚并吡咯环骨架分子。

关键词 分子内氧化偶联; 吲哚生物碱; 全合成; 多环螺吲哚; 吲哚并吡咯环

Intramolecular Oxidative Coupling: Applications in Synthesis of Complex Indole Alkaloid Scaffolds

Xie, Weiqing^{*,a} Zuo, Zhiwei^a Zi, Weiwei^a Ma, Dawei^{*,a}^(a) State Key Laboratory of Bioorganic and Natural Products Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Science, Shanghai 200032)

Abstract Intramolecular oxidative coupling of tryptamine incorporated amide was used to create the quaternary spiroindoline carbon center of communesins, which enabled a short asymmetric synthesis of (–)-communesins A and B and F. The fused tetra-ring framework of Vincorine was established by an intramolecular oxidative coupling/condensative cyclization process, which was further advanced to (–)-vincorine in 5 steps. From a medicinal standpoint, such a cascade process provides a highly diverse, efficient method for the construction of polycyclic spiroindoline scaffolds. Starting from easily accessible tryptamine incorporated β -ketoamides and malonamides, polycyclic spiroindolines and pyrroloindolines could be directly obtained by adopting the same cascade strategy.

Keywords intramolecular oxidative coupling; indole alkaloids; total synthesis; polycyclic spiroindoline; pyrroloindoline

烯醇负离子氧化偶联反应是一种高效的形成碳碳键反应^[1,2]。它不需要预先对反应底物进行官能团化,仅仅通过强碱将羰基化合物去质子化形成烯醇负离子,然后加入氧化剂就可以将两个羰基 α 位碳连接起来,一步得到 1,4-二羰基化合物。从合成经济角度来看,由于不需要预先对参与反应的碳原子进行官能团化,从而可以有效地提高一个全合成的效率。虽然早在 1935 年 Ivanoff 等^[1a]就发现了这一反应,但在之后的 70 年中这一类反应始终没有在合成复杂天然产物得到应用。究其原因在于不同分子间的烯醇负离子氧化偶联时往往存在较多的竞争反应(如同分子的氧化偶联反应, Claisen 缩合反应及卤代反应),从而限制了氧化偶联反应在有

机合成中的应用。

直到 2004 年, Baran 等^[3a,3c]在对吲哚萜类生物碱全合成研究中发现,吲哚作为烯胺也可以参与分子间的氧化偶联反应。通过吲哚和羰基化合物的烯醇负离子氧化偶联实现了羰基 α 位的直接吲哚化。正是基于这一反应, Baran 小组^[3]完成了一系列复杂吲哚生物碱的全合成,如 Hapalindole 家族生物碱, Fisherindole 家族生物碱及 Welwitindolinone 的全合成。为了克服分子间偶联反应的复杂性,提高反应的选择性,另外一种策略是采用分子内氧化偶联的方法。这样不但可以提高反应的收率,同时能够构建复杂环系骨架。正是基于这一思路, Baran 等^[4]通过分子内氧化偶联反应,构建了合成 Stephacidin

* E-mail: xiewq@sioc.ac.cn; madw@sioc.ac.cn

Received January 15, 2013; revised January 31, 2013; published online February 1, 2013.

Project supported by the National Basic Research Program of China (973 Program, No. 2010CB833200).

国家重点基础研究发展计划(973 计划, No. 2010CB833200)资助项目。

的关键的桥环中间体. 而 Overman 小组^[5]在合成 Actinophyllic acid 中, 也是基于分子内氧化偶联反应构建了合成的关键的桥环中间体, 最后高效地完成了对 Actinophyllic acid 的全合成. 从两个合成来看, 分子内氧化偶联反应在构建多环骨架起到了重要的作用. 而且从合成策略上来看, 分子内氧化偶联反应的应用有效地提高了整个合成的效率.

我们小组^[6]通过设计含有吲哚的关环前体, 以分子内的氧化偶联反应为关键合成步骤完成了对 (一)-Communesins A, B 和 F 的对映选择性合成, 并由此确定了天然产物的绝对构型(图 1). 而通过采用分子内氧化偶联、关环串联反应策略, 完成了复杂天然生物碱 (一)-Vincorine 的全合成^[7]. 由于这些天然产物的合成路线比较长, 从药物化学角度来说, 也制约了对这些天然产物进行构效关系的研究. 我们运用分子内氧化偶联、关环串联反应, 从简单的底物出发, 一步构建了多环螺吲哚骨架^[8]和多环吡咯并吲哚骨架^[9]. 得到的多环骨架分子和已知天然产物有一定的相似性, 可以推断这一类产物可能表现出较好的生物活性. 而且由于底物合成简单, 从而我们可以对这些多环骨架的产物进行系统的构效关系的研究.

图 1 应用分子内氧化偶联反应构建的复杂生物碱骨架
Figure 1 Complex alkaloid scaffolds created by employing intramolecular oxidative coupling as key step

1 分子内氧化偶联反应在 Communesin 家族生物碱合成中的应用

1993 年, Numata 等^[10a]从生长在海藻(Enteromorpha

intestinalis)上的青霉菌(Penicillium sp.)中分离出两个结构新颖且具有重要生理活性的生物碱, Communesins A 和 B(图 2). 在此之后, 与它们结构类似的 Communesin C~H 被陆续分离并鉴定^[10b~10d]. 初步的生物活性测试表明, 这一系列生物碱均具有较好的抗癌和杀虫活性. 从结构上来看, Communesins A~H 都具有七环的稠环结构, 手性中心密集, 含有的两个缩醛胺结构分别位于分子上下两端, 其中 C(7), C(8)为两个连续的手性季碳. 复杂的稠环结构和密集的手性中心给这类生物碱的合成带来了很大的挑战, 同时也吸引了多个合成小组的兴趣^[6,11]. 在我们的工作完成之前, 有两个小组报道了 (±)-Communesin F 的全合成^[11].

Compd.	Communesin	X	R	R'
1	A	O	CH ₃	CH ₃
2	B	O	CH ₃	2,4-Pentadienyl
3	C	O	H	2,4-Pentadienyl
4	D	O	CHO	2,4-Pentadienyl
5	E	O	H	2,4-Pentadienyl
6	F	H, H	CH ₃	CH ₃
7	H	O	CH ₃	CH ₂ CH ₃
8	H	O	CH ₃	CH ₂ CH ₂ CH ₃

图 2 Communesin 家族生物碱的结构
Figure 2 Structures of communesin family

为了使合成更为高效, 我们设想通过 C(3)位取代的吲哚和酰胺 α 位的烯醇负离子的分子内氧化偶联来构建 Communesin 生物碱的 BE 螺环结构(Eq. 1)^[6a]. 由于文献中没有报道过 3 位有取代的吲哚参与氧化偶联反应来构建季碳中心的先例, 因此我们对模型反应进行了尝试.

首先我们对酰胺 9a 的分子内氧化偶联反应进行了研究. 在 LiHMDS 的作用下形成双负离子, $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下滴加碘, 即可以 38% 的收率分离到吲哚啉 10a. 但是遗

憾的是带有 Boc 保护氨基的酰胺 **9b** 在此条件下未能发生反应. 令我们高兴的是, 含硝基的酰胺 **9c** 在该条件下能以 83% 的收率, 2 : 1 的 *dr* 值得到吡啶啉 **10c**. 从这些数据中可以得出初步的结论: 羰基参与烯醇负离子的氧化偶联反应活性可能与其活性亚甲基的 pK_a 的大小有关.

在模型反应成功之后, 我们展开了对 Communesin F 的合成工作(Scheme 1)^[6a]. 为了完成对 Communesin F 对映选择性合成, 我们计划在氧化偶联的底物酰胺上引入手性辅基来控制生成的两个手性中心的构型. 以 4-溴色醇为原料, 通过 3 步合成了带有手性辅基的酰胺 **11**. 在与模型反应相同的条件下氧化偶联得到吡啶啉, 接着用铁粉还原硝基环化, 然后选择性甲基化得到一对非对映异构体可以通过柱层析分离. 两个异构体比例约为 3 : 1, 主要产物 **12** 的收率为 50%, 它的绝对构型通过单晶衍射确定.

化合物 **12** 在 KHMDS/Boc₂O 的条件对缩醛胺的氮进行保护. 接着以叔丁醇钾为碱, 烯丙基碘为亲电试剂引入第二个季碳中心. 结果以 96% 的收率, 单一的立体选择性得到化合物 **13**. 之后我们通过 Heck 反应引入芳基侧链, 得到五环化合物 **14**. 接着在甲磺酰氯促进下形

成 G 环并通过 Staudinger/Aza-Wittig 反应顺利构建了最后的 A 环. 去保护和乙酰化之后, 我们顺利的得到了 (-)-Communesin F. 通过和天然产物的旋光比较, 我们确定了天然产物绝对构型为(6*R*,7*R*,8*R*,9*S*,11*R*).

在合成了大量的(-)-Communesin F 后, 我们试图通过直接对 Communesin F 环氧化来构建结构最为复杂的 Communesins A 和 B. 由于分子中存在多个叔胺结构, 我们尝试了多种氧化剂, 但均未能取得成功. 于是我们决定放弃直接转化的方法, 转而在合成的早期在侧链引入二醇结构, 发展一条新路线来合成含有环氧官能团的 Communesins A 和 B^[6b].

含有缩酮保护的邻二醇单元的仲胺 **16** 在 BOPCl 的促进下与邻硝基苯乙酸缩合, 以 91% 的收率得到了酰胺 **17** (Scheme 2). 参照之前的条件, 以 LiHMDS 为碱, THF 为溶剂的条件下, 化合物 **17** 形成双负离子. 在 -78 °C 下加入碘溶液然后升至室温反应时, 生成了大量的碘代物 **20** (以一对非对映异构体存在). 我们试图将碘代产物 **20** 在强碱如 LiHMDS 的作用下通过 S_N2 机理形成关环产物 **19**. 但是一旦升温反应体系就变得异常复杂, 没能检测到任何桥环产物 **19** 的生成. 经过研究我们发现,

Scheme 1

Scheme 2

将低温下生成的双负离子升至室温后再滴加碘溶液, 15 min 后停止反应, 能以 66% 的收率分离到螺环吲哚啉 **19** (基于回收原料的收率为 73%)。

含有螺吲哚林环结构的化合物 **19** 通过还原环化, 接着甲基化得到缩醛胺 **21**。由于分子的位阻增大的原因, 采用之前烯丙基化条件来构建 C(8) 位季碳中心的方法完全不能得到产物。我们转而采用活性更高的烷基化试剂碘乙腈, 结果能以 67% 收率得到烷基化产物 **22**。最后我们需要关上 A 环, 并在氮上引入酰基。经过多次失败的尝试, 我们发现 A 环可以通过两步串联反应形成: LiAlH_4 同时还原扭曲酰胺和腈基得到半缩醛, 其后在 $\text{NH}_4\text{OAc}/\text{NaBH}(\text{OAc})_3$ 的条件下形成缩醛胺。化合物 **23** 通过酰化引入侧链, 脱除缩酮保护后通过 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应即可

构建环氧, 顺利的合成了 (-)-Communesins A 和 B (Scheme 3)。

2 通过分子内氧化偶联反应合成 Vincorine

吲哚类生物碱 Akuammiline 从生源上讲是生物碱 Geissoschizine 的 C(7) 和 C(16) 关环衍生出来的一系列生物碱 (图 3)^[12]。Vincorine^[13] 是 Akuammiline 家族中的代表化合物。和其它 Akuammiline 生物碱诸如 Aspidophylline A^[14], Strictamine^[15], Scholarisine A^[16] 一样都含有手性中心富集的一个五环形成的稠环结构, 一个螺吲哚啉季碳中心。由于它们结构的复杂性以及优异的生物活性, 吸引了众多合成小组的兴趣^[17]。

Scheme 3

图 3 Akuammiline 家族代表性生物碱及其特征骨架结构

Figure 3 Representative akuammiline alkaloids and Akuammiline-type skeleton

基于分子内氧化偶联反应在合成吲哚生物碱的高效性, 我们开始了对 Vincorine 的合成研究(Scheme 4)^[7]. 为了完成对 Vincorine 的不对称合成, 我们采用小分子催化的不对称 Michael 加成反应来构建 Vincorine C(4) 位的手性中心. 从 5-甲氧基吲哚出发, 经过几步转化得到 Michael 加成前体 **25**. 通过有机小分子催化的醛 **26** 和不饱和酯 **25** 的 Michael 加成反应得到化合物 **27**, 两个异构体比例为 5 : 1. 然后经过几步官能团转化得到了氧化偶联前体 **28**. 由于醛 **27** α 位手性被消除, 最后得到的产物 **28** 的 *er* 值只有 82 : 18. 化合物 **28** 在 -40°C 下用 2 equiv. 的 LHMDS 攫氢, 然后加入碘作为氧化剂, 缓慢升至室温, 即可以 67% 的收率得到氧化偶联的产物 **29**. 该反应一步构建了 Vincorine 骨架中的两个环, 而且得到季碳的构型也与天然产物中一致. 之后通过 Krapcho 脱羧反应, 脱除硅保护基后将烯丙醇氯代, 得到化合物 **30**. 最后脱除仲胺的 Boc 保护, 通过分子内烷基化反应形成了 Vincorine 的最后一个七元环. 甲基化后即顺利完成了(-)-Vincorine 的全合成.

3 分子内氧化偶联启动的串联反应在构建多环吲哚骨架中的应用

虽然我们运用分子内氧化偶联反应为关键步骤完成了复杂生物碱 Communesin 及 Vincorine 的全合成^[6,7], 但从药物化学的角度来讲, 合成这些生物碱的合成步骤

太长, 从而限制了对这两类生物碱进行构效关系研究. 由于多环吲哚生物碱一般都有较好的生物活性, 因此发展出一条高效的构建多环吲哚生物碱骨架方法有助于活性化合物的筛选. 在 Vincorine 的合成中, 我们通过分子内的氮原子捕获分子内氧化偶联生成的亚胺中间体, 从而一步构建了四环体系. 我们设想如 Scheme 5 所示, 如果在酰胺 **31** 中还存在另外一个亲核基团, 则在分子内氧化偶联反应之后得到亚胺 **32**, 亲核试剂进攻亚胺就得到了三环化合物 **33**. 这样通过在酰胺中引入亲核基团我们就可以一步从简单酰胺化合物 **31** 合成多环吲哚骨架 **33**. 而且 **33** 可以进一步进行结构修饰从而得到一些结构新颖的吲哚生物碱化合物. 由于直链酰胺 **31** 可以很方便地从色胺经过两步反应得到, 因此通过这样的串联反应可以快速得到一类含有多环吲哚生物碱分子库, 从而为这类化合物的构效关系的研究打下坚实的基础.

我们首先对 β -酮酸酰胺 **34** 的氧化偶联进行研究^[8]. 我们的设想是, 在分子内氧化偶联反应之后, 由于 β -酮酸酰胺 **34** 羰基容易烯醇化而且烯醇氧原子有一定的亲核性, 这样烯醇氧原子进攻亚胺关环就得到了多环的螺吲哚环产物.

经过条件的优化, 我们发现用只有 I_2 作氧化剂才可以较好收率得到产物, 而金属氧化剂(二价铜盐和三价铁盐)则不能够促进反应的发生. 得到最优条件之后,

Scheme 4

Scheme 5

我们对反应适用底物范围进行了考察. 首先合成了有不同取代基的吲哚酰胺, 将之应用在氧化偶联/氧关环串联反应中(表 1, Entries 1~7). 我们发现吲哚的电性对反应的产率有一定的影响. 4 位或 5 位含有强给电子基团的底物的反应产率一般比较低(表 1, Entries 6, 7), 而含有吸电子基团的底物的反应产率都比较高(表 1, Entries 2~4, 9). 另外 4 位含有取代基的底物可能由于位阻作用往往会阻碍氧化偶联反应的发生(回收部分底物), 从而导致产率降低(表 1, Entries 3, 7). 接下来我们对 β -酮酸酰胺的取代基进行了改变. 我们发现 β 位取代基对反应的产率有较大的影响. 增大取代基位阻之后, 反应产率大大降低(表 1, Entries 10~12). 反应中虽然底物完全消失, 但分离得到了第二步没有关环的产物(表 1, Entry 13), 说明位阻加大阻碍了第二步关环反应的发生.

表 1 β -酮酸酰胺 **34** 分子内氧化偶联/氧关环串联反应

Table 1 Intermolecular oxidative coupling/O-cyclization cascade reaction of β -ketoamide **34**

Entry	X	R	Yield ^b /%
1	H	CH ₃	74
2	6-F	CH ₃	87
3	4-F	CH ₃	66
4	5-Br	CH ₃	75
5	7-MeO	CH ₃	80
6	5-MeO	CH ₃	51 ^c
7	4-MeO	CH ₃	38 ^d
8	6-Benzoxo	CH ₃	76
9	7-Cl	CH ₃	78
10	H	Benzyl	42
11	H	<i>n</i> -Butyl	63
12	H	<i>t</i> -Butyl	20 ^e
13	H	Phenyl	48

^a Reaction conditions: **34** (0.2 mmol), LiHMDS (0.44 mmol), THF (3 mL), -78 °C, 30 min, then addition of iodine (0.22 mmol), -78 °C, then r.t., 30 min.

^b Isolated yield. ^c 15% starting material was recovered. ^d 22% starting material was recovered. ^e Simple oxidative coupling product was isolated in 37% yield.

4 分子内氧化偶联启动的串联反应在构建吡咯并吲哚骨架中的应用

通过 β -酮酸酰胺 **34** 分子内氧化偶联/氧关环串联反应可以一步构建复杂的环吲哚啉体系. 但从产物的结构上看, 吲哚啉并吡咯的结构在天然产物中不是很常见. 而通过文献的调研, 我们发现在天然产物中, 吲哚啉并吡咯结构是很普遍的一种骨架, 而且这一类生物碱都有较好的生物活性^[18]. 因此, 我们设想能否在分子

内引入氮原子, 捕获分子内氧化偶联反应形成的亚胺, 从而可以一步构建多环的吲哚并吡咯体系.

考虑到合成的方便性, 我们设计了丙二酸酰胺 **36**. 由于氮原子的亲核性受其保护基的影响, 我们首先对氮原子的保护基进行了考察(表 2, Entries 1~5). 可以看出当没有保护基时, 仅以 21% 的收率得到关环产物. 而引入烷基或芳基保护基后反应产率虽然有所提高, 但仍不够理想(表 2, Entries 2, 3). 最后我们发现吸电子保护基可以极大地提高反应的产率, 甲氧羰基和对甲苯磺基都可以得到较好的产率(表 2, Entries 4, 5).

表 2 丙二酸酰胺 **36** 分子内氧化偶联/氮关环串联反应

Table 2 Intermolecular oxidative coupling/N-cyclization cascade reaction of malonamide **36**

Entry	X	R ¹	R ²	R ³	Yield/%
1	H	H	H	H	21 ^c
2	H	H	H	Ph	43
3	H	H	H	Bn	59
4	H	H	H	CO ₂ Me	80
5	H	H	H	Ts	80
6	6-F	H	H	CO ₂ Me	61
7	4-F	H	H	CO ₂ Me	82
8	5-Br	H	H	CO ₂ Me	70
9	4-MeO	H	H	CO ₂ Me	87
10	5-MeO	H	H	CO ₂ Me	83
11	7-MeO	H	H	CO ₂ Me	80
12	6-Benzoxo	H	H	CO ₂ Me	87
13	7-Cl	H	H	CO ₂ Me	87
14	5-Me	H	H	CO ₂ Me	66
15	H	Me	H	CO ₂ Me	80
16	H	Ph	H	CO ₂ Me	77
17	H	H	Me	CO ₂ Me	0 ^d
18	H	H	Me	Ts	25 ^e
19	H	H	Ph	Ts	71
20	H	Me	Ph	Ts	21

^a Reaction conditions: **36** (0.2 mmol), LiHMDS (0.44 mmol), THF (3 mL), -78 °C, 30 min, then addition of iodine (0.22 mmol), -78 °C, then r.t., 30 min. ^b Isolated yield. ^c 30% dimerization product was isolated. ^d 50% starting material was recovered. ^e 7% starting material was recovered.

接下来我们对吲哚上的取代基进行了考察. 我们发现和 O 关环反应不同, N 关环不受吲哚环的电性的影响(表 2, Entries 6~14). 无论是吸电子还是给电子取代基, 都能以优秀的收率得到产物. 而且反应的收率也不受吲哚 4 位的位阻影响(表 2, Entries 7, 9). 而在吲哚环 2 位引入取代基, 同样可以较好的收率得到含有两个连续的季

碳的多环骨架(表 2, Entries 15, 16). 我们进一步在考察了丙二酸 α 位取代基对反应的影响. 在丙二酸的 α 位引入一个甲基后, 完全不能分离得到产物, 只回收了部分原料(表 2, Entry 17). 而把氮上保护基改为 Ts 后, 也仅能以 25% 收率得到关环产物(表 2, Entry 18). 而丙二酸 α 位为苯基时, 反应产率大大提高(70%, 表 2, Entry 19). 由此可以看到, 氧化偶联反应不仅和丙二酸 α 的位阻有关, 而且和其 pK_a 有关. 最后我们同时在咪唑环 2 位和丙二酸 α 位引入取代基, 发现同样可以得到关环产物. 虽然反应的产率偏低, 但一步构建了三个连续的季碳, 这在有机合成中是很少见的.

5 总结与展望

以含色胺的底物为原料, 我们发展了一类分子内氧化偶联构建复杂咪唑生物碱骨架的方法. 首先通过分子内氧化偶联反应, 我们成功构建了天然产物 Communesin 家族化合物的螺咪唑骨架, 从而完成了 (一)-Communesins A, B 和 F 的对映选择性合成. 而采用分子内氧化偶联/关环的串联反应一步构建了复杂生物碱 Vincorine 的多环骨架, 然后再经过五步完成了 (一)-Vincorine 的全合成. 通过对 Vincorine 的全合成, 我们展现了分子内氧化偶联启动的串联反应合成复杂咪唑生物碱骨架的高效性. 为了快速, 多样地合成与天然产物类似结构的小分子, 我们从易得的色胺衍生 β -酮酸酰胺和丙二酸二酰胺为底物出发, 通过分子内氧化偶联/关环串联反应, 一步构建了多环螺咪唑和多环咪唑并吡咯骨架. 通过对复杂天然产物 Communesin 和 Vincorine 的合成, 证明了分子内氧化偶联反应是一种非常有效的构建螺咪唑的季碳的方法. 同时通过其它的亲核试剂捕获分子内氧化偶联反应生产的亚胺中间体可以进一步启动后续的反应, 从简单的底物出发, 一步构建含复杂环系骨架的分子, 这样可以大大提高全合成的效率. 可以预见通过相同的策略在合成其它复杂生物碱中应当能够得到广泛的应用.

作者简介

谢卫青副研究员于 2002 年毕业于兰州大学化学化工学院, 2007 年在中国科学院上海有机化学研究所获得博士学位. 2007~2009 年在马大为研究员小组任助理研究员. 2009~2011 年在美国达拉斯西南医学中心进行博

士后研究. 2011 年, 在中国科学院上海有机化学研究所马大为研究员小组任副研究员.

左智伟博士于 2007 年在南京大学获得学士学位, 之后进入中国科学院上海有机化学研究所攻读博士学位. 于 2012 年在马大为研究员指导下获得博士学位. 博士期间主要从事于复杂咪唑生物碱 Communesin 的全合成研究.

资伟伟博士于 2006 年毕业于兰州大学化学化工学院, 同年进入中国科学院上海有机所攻读博士学位, 师从马大为研究员. 博士期间致力于具有重要生物活性的复杂天然产物 GB13 和 Vincorine 的全合成研究.

马大为研究员于 1984 年毕业于山东大学化学系, 1989 年于中国科学院上海有机化学研究所获博士学位. 1990~1994 年在美国匹兹堡大学化学系和 Mayo Clinic 神经化学和神经生物学研究部进行博士后研究. 研究方向为化学生物学导向的有机合成及药物化学.

References

- [1] Selected examples for oxidative homo-coupling: (a) Ivanoff, D.; Spassoff, A. *Bull. Soc. Chim. Fr.* **1935**, 2, 76.
- (b) Rathke, M. W.; Lindert, A. *J. Am. Chem. Soc.* **1971**, 93, 4605.
- (c) Brocksom, T. J.; Petragnani, N.; Rodrigues, R.; La Scala Teixeira, H. *Synthesis* **1975**, 396.
- (d) Frazier, R. H.; Harlow, R. L. *J. Org. Chem.* **1980**, 45, 5408.
- (e) Belletire, J. L.; Fry, D. F. *J. Org. Chem.* **1987**, 45, 2549.
- (f) Renaud, P.; Fox, M. A. *J. Org. Chem.* **1988**, 45, 3745.
- (g) Quermann, R.; Maletz, R.; Schafer, H. *Liegigs Ann. Chem.* **1993**, 11, 1219.
- (h) Kise, N.; Tokioka, K.; Aoyama, Y. *J. Org. Chem.* **1995**, 60, 1100.
- (i) Langer, T.; Illich, M.; Felmchen, G. *Tetrahedron Lett.* **1995**, 36,

4409.
(j) Kim, J. W.; Lee, J. J.; Lee, S.-H.; Ahn, K.-H. *Synth. Commun.* **1998**, *28*, 1287.
- [2] Selected examples for oxidative hetero-coupling: (a) Ito, Y.; Konoike, T.; Harada, T.; Saegusa, T. *J. Am. Chem. Soc.* **1977**, *99*, 1487.
(b) Baran, P. S.; Richter, J. M.; Lin, D. W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2005**, *44*, 609.
(c) Baran, P. S.; DeMartino, M. P. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2006**, *45*, 7083.
(d) Richter, J. M.; Whitefield, B.; Maimone, T. J.; Lin, D. W.; Castroviejo, P.; Baran, P. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 12857.
(e) Richter, J. M.; Whitefield, B.; Maimone, T. J.; Lin, D. W.; Castroviejo, P.; Baran, P. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 12857.
(f) DeMartino, M. P.; Chen, K.; Baran, P. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 11546.
- [3] (a) Baran, P. S.; Richter, J. M. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, *126*, 7450.
(b) Baran, P. S.; Richter, J. M. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 15394.
(c) Richter, J. M.; Whitefield, B.; Maimone, T. J.; Lin, D. W.; Castroviejo, P.; Baran, P. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 12857.
(d) Baran, P. S.; Maimone, T. J.; Richter, J. M. *Nature* **2007**, *446*, 404.
(e) Richter, J. M.; Ishihara, Y.; Masuda, T.; Whitefield, B. W.; Llamas, T.; Pohjakallio, A.; Baran, P. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 17938.
- [4] (a) Baran, P. S.; Richter, J. M. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, *126*, 7450.
(b) Baran, P. S.; Richter, J. M. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 15394.
(c) Baran, P. S.; Maimone, T. J.; Richter, J. M. *Nature* **2007**, *446*, 404.
(d) Richter, J. M.; Ishihara, Y.; Masuda, T.; Whitefield, B. W.; Llamas, T.; Pohjakallio, A.; Baran, P. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 17938.
- [5] (a) Martin, C. L.; Overman, L. E.; Rohde, J. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 4894.
(b) Martin, C. L.; Overman, L. E.; Rohde, J. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 7568.
Fore review see: (c) Guo, F.; Clift, M. D.; Thomson, R. J. *Eur. J. Org. Chem.* **2012**, *26*, 4881.
For other examples see: (d) Li, Q.; Fan, A.; Lu, Z.; Cui, Y.; Lin, W.; Jia, Y. *Org. Lett.* **2010**, *12*, 4066.
(e) Li, Q.; Jiang, J.; Fan, A.; Cui, Y.; Jia, Y. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 312.
- [6] (a) Zuo, Z.; Xie, W.; Ma, D. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 13226.
(b) Zuo, Z.; Ma, D. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 12008.
- [7] Zi, W.; Xie, W.; Ma, D. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *132*, 9126.
- [8] Fan, F.; Xie, W.; Ma, D. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 1405.
- [9] Fan, F.; Xie, W.; Ma, D. *Chem. Commun.* **2012**, *48*, 7571.
- [10] (a) Numata, C.; Takahashi, Y.; Ito, T.; Takada, K.; Kawai, Y.; Usami, E.; Matsumura, M.; Imachi, T.; Ito, T.; Hasegawa, T. *Tetrahedron Lett.* **1993**, *34*, 2355.
(b) Jadulco, R.; Edrada, R. A.; Ebel, R.; Berg, A.; Schaubman, K.; Wray, V.; Steube, K.; Proksch, P. *J. Nat. Prod.* **2004**, *67*, 78.
(c) Hayashi, H.; Matsumoto, H.; Akiyama, K. *Biosci. Biotechnol. Biochem.* **2004**, *68*, 753.
(d) Dalsgaard, P. W.; Blunt, J. W.; Munro, M. H. G.; Frisvad, J. C.; Christophersen, C. *J. Nat. Prod.* **2005**, *68*, 258.
- [11] For synthetic studies see: (a) May, J. A.; Stoltz, B. M. *Tetrahedron* **2006**, *62*, 5262.
(b) Crawley, S. L.; Funk, R. L. *Org. Lett.* **2006**, *8*, 3995.
(c) George, J. H.; Adlington, R. M. *Synlett* **2008**, *14*, 2093.
- For total syntheses see Refs. [6] and (d) Yang, J.; Wu, H.; Shen, L.; Qin, Y. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 13794.
(e) Liu, P.; Seo, J. H.; Weinreb, S. M. *Angew. Chem.* **2010**, *122*, 2044; *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, *49*, 2000.
(f) Belmar, J.; Funk, R. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 16941.
- [12] (a) Smith, G. F. *Chem. Ind.* **1961**, 1120.
(b) Wenkert, E.; Wickberg, B. *J. Am. Chem. Soc.* **1965**, *87*, 1580.
For an overview of the akuammiline alkaloid family, see: (c) Ramirez, A.; Garcia-Rubio, S. *Curr. Med. Chem.* **2003**, *10*, 1891.
- [13] (a) Mokry, J.; Dubravkova, L.; Sefcovic, P. *Experientia* **1962**, *18*, 564.
(b) Das, B. C.; Cosson, J. P.; Lukacs, G.; Potier, P. *Tetrahedron Lett.* **1974**, *15*, 4229.
(c) Mamatas-Kalamaras, S.; Sevenet, T.; Thal, C.; Potier, P. *Phytochemistry* **1975**, *14*, 1637.
- [14] Subramaniam, G.; Hiraku, O.; Hayashi, M.; Koyano, T.; Komiyama, K.; Kam, T. S. *J. Nat. Prod.* **2007**, *70*, 1783.
- [15] (a) Schnoes, H.; Biemann, K.; Mokry, J.; Kompis, I.; Chatterjee, A.; Ganguli, G. *J. Org. Chem.* **1966**, *31*, 1641.
(b) Ahmad, Y.; Fatima, K.; Rahman, A.; Occolowitz, J.; Solheim, B.; Clardy, J.; Garnick, R.; Le Quesne, P. *J. Am. Chem. Soc.* **1977**, *99*, 1943.
- [16] Cai, X. H.; Tan, Q. G.; Liu, Y. P.; Feng, T.; Du, Z. Z.; Li, W. Q.; Luo, X. D. *Org. Lett.* **2008**, *10*, 577.
- [17] (a) Dounay, D. B.; Vollhardt, K. P. C. *J. Am. Chem. Soc.* **1990**, *112*, 5653.
(b) Lévy, J.; Sapi, J.; Laronze, J. Y.; Royer, D.; Toupet, L. *Synlett* **1992**, *7*, 601.
(c) Dounay, A. B.; Overman, L. E.; Wroblewski, A. D. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 10186.
(d) Shen, L.; Zhang, M.; Wu, Y.; Qin, Y. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 3618.
(e) Jones, S. B.; Simons, B.; Macmillan, D. W. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 13606.
(f) Yasui, Y.; Kinugawab, T.; Takemoto, Y. *Chem. Commun.* **2009**, *28*, 4275.
(g) Zhang, M.; Huang, X.; Shen, L.; Qin, Y. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 6013.
(h) Zhang, D.; Song, H.; Qin, Y. *Acc. Chem. Res.* **2011**, *44*, 447.
(i) Zu, L.; Boal, B. W.; Garg, N. K. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 8877.
(j) Adams, G. L.; Carroll, P. J.; Smith, A. B. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 4037.
- [18] For reviews, see: (a) Anthoni, U.; Christophersen, C.; Nielsen, P. H. In *Alkaloids: Chemical and Biological Perspectives*, Vol. 13, Ed.: Pelletier, S. W., Pergamon, New York, **1999**, p. 163.
(b) Cordell, G. A.; Saxton, J. E. In *the Alkaloids: Chemistry and Physiology*, Vol. 20, Eds.: Manske, R. H. F.; Rodrigo, R. G. A., Academic Press, New York, **1981**, p. 3.
(c) Hino, T.; Nakagawa, M. In *the Alkaloids: Chemistry and Pharmacology*, Vol. 34, Ed.: Brossi, A., Academic Press, New York, **1989**, p. 1.
(d) Sévenet, T.; Pusset, J. In *the Alkaloids: Chemistry and Pharmacology*, Vol. 48, Ed.: Cordell, G. A., Academic Press, New York, **1996**, p. 1.
(e) Steven, A.; Overman, L. E. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2007**, *46*, 5488.
(f) Ruiz-Sanchis, P.; Savina, S. A.; Albericio, F.; Álvarez, M. *Chem. Eur. J.* **2011**, *17*, 1388.

(Zhao, C.)