CuI 催化的酚与富电子对溴苯甲醚和缺电子间溴苯甲醚的
O-芳基化反应研究杏朝刚^a 俞建忠^a 张培志^b 吴 军^{*,a}^a 浙江大学化学系 杭州 310027^b 浙江科技学院生物与化学工程学院 杭州 310012

摘要 报道碘化亚铜催化的酚与富电子的对溴苯甲醚与缺电子的间溴苯甲醚的 O-芳基化反应。研究发现缺电子的间溴苯甲醚在反应时表现出更高的反应活性, 而富电子的对溴苯甲醚反应活性较低。通过提高反应温度和延长反应时间可使对溴苯甲醚发生 O-芳基化反应, 产物的收率和缺电子的间溴苯甲醚相当。用此方法成功合成了 4-(4-氯苯氧基)苯甲醚, 并进一步合成了除草剂 Clofop。

关键词 交叉偶联; 富电子; 缺电子; CuI 催化; O-芳基化

CuI-Catalyzed O-Arylation of Phenols with Electron-Rich
4-Bromoanisole and Electron-Deficient 3-BromoanisoleXing, Chaogang^a Yu, Jianzhong^a Zhang, Peizhi^b Wu, Jun^{*,a}^a Department of Chemistry, Zhejiang University, Hangzhou 310027^b School of Biological and Chemistry Engineering, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310012

Abstract CuI-catalyzed O-arylation of phenols with electron-rich 4-bromoanisole and electron-deficient 3-bromoanisole was described. Electron-deficient 3-bromoanisole showed high reactivity, and electron-rich 4-bromoanisole had low reactivity. O-Arylation of 4-bromoanisole occurred to afford the product by increasing reaction temperature and time. This reaction was applied to the synthesis of 1-chloro-4-(4-methoxyphenoxy)benzene, which was further synthesized to herbicide Clofop.

Keywords cross-coupling; electron-rich; electron-deficient; CuI-catalyzed; O-arylation

二苯醚是一类重要的有机化合物, 它在医药^[1]、农药^[2]和高分子材料^[3]等领域有着广泛的应用。含芳氧苯氧结构单元的二苯醚类化合物同样表现出良好的生物活性(图 1), 如氧化氮合酶抑制剂(nNOS inhibitor)^[4]、生物膜合成抑制剂(Biofilm formation inhibitor)^[5]、白细胞三烯 4 水解酶抑制剂(LTA₄H inhibitor) DG-051^[6]和除草剂 Clofop^[2a]等。

酚与卤代苯的 Ullmann 反应是合成二苯醚化合物的传统方法^[7], 然而, 比较苛刻的反应条件限制了该反应的广泛应用^[8]。Buchwald^[9]和 Hartwig 等^[10]发展了钯催化的酚与卤代芳烃的 O-芳基化反应, 克服了上述 Ullmann 反应的缺点。钯催化的 O-芳基化反应具有产率高、官能

图 1 含有芳氧苯氧结构单元的二苯醚活性化合物
Figure 1 Selected biologically active diaryl ethers containing phenoxyphenol motifs

* E-mail: wujunwu@zju.edu.cn

Received January 25, 2013; revised February 27, 2013; published online March 1, 2013.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 31071720) and the Natural Science Foundation of Zhejiang Province (No. D3080282).

国家自然科学基金(No. 31071720)和浙江省自然科学基金(No. D3080282)资助项目。

团相容性好的优点,但是价格昂贵的钯和有毒且结构复杂的膦配体的应用限制了该反应在工业上的应用^[7c,8b,11].终于在2001年,Taillefer和Buchwald等^[12]报道了高效的铜/配体催化体系,该体系在催化量的金属和温和的条件下(90~110 °C)成功实现了C—C、C—N和C—O的成键反应.这一发现是对Ullmann反应的一个重大突破,重新点燃了众多学者研究Ullmann反应的热情^[13].为了提高该反应的效率并拓宽底物适应性,科学家们在寻求高效催化剂方面做了大量工作并取得了很大的进步.随着特殊结构的N,N-^[11a,14]、O,O-^[15]或者N,O-^[16]双齿配体和绿色高效异相催化剂^[17]的发现,很多铜催化的O-芳基化反应可以在更加温和的条件下进行.

与缺电子的卤代苯相比,富电子卤代苯的C—X(X=N, O, S)交叉偶联反应很难在温和的条件下顺利进行^[18].2009年,Hartwig等^[19]在卤代苯的胺化反应中就发现缺电子的间溴苯甲醚和氨水以钯为催化剂(0.5 mol%)在80 °C就可以发生C—N交叉偶联反应,产物收率高达99%;然而对于富电子的对溴苯甲醚,反应温度需提高至100 °C,催化剂用量增加(1.0 mol%),在延长反应时间的情况下才能发生反应,但产物收率降低,仅为53%.2012年,Otto等^[20]研究了以铜为催化剂的富电子的对溴苯甲醚和对甲氧基苯酚的O-芳基化反应,筛选了大量的配体,却发现原料转化率最高的仅为25%.本文报道铜催化的酚与富电子的对溴苯甲醚和缺电子的间溴苯甲醚的O-芳基化反应,考察各种酚对反应的影响,并尝试合成除草剂Clofop.

1 结果与讨论

首先以对叔丁基苯酚(**1**)和间溴苯甲醚(**2**)为反应底物进行O-芳基化反应的探索研究,结果见表1.当以2-吡啶甲酸(**L1**, Entry 1), 8-羟基喹啉(**L2**, Entry 2), L-脯氨酸(**L3**, Entry 3)和2-甲基-8-羟基喹啉(**L4**, Entry 4)为配体时,以37%~81%的收率得到目标产物**3am**,很显然2-吡啶甲酸可以显著地促进O-芳基化反应.进一步的实验表明,以二甲基亚砜(DMSO)为溶剂可有效地促进反应,但当溶剂为甲苯或者N,N-二甲基甲酰胺(DMF)时,产率明显降低(Entries 5, 6).在碱的筛选中发现,K₃PO₄表现出了很高的活性,而铜催化的偶联反应中最常用的Cs₂CO₃或者K₂CO₃则分别只得到7%和12%的收率(Entries 10, 11).在催化剂的筛选中发现,除二价铜盐CuCl₂外(Entry 9),所有一价铜盐均表现出较好的催化性能(Entries 1, 7, 8),说明催化剂铜盐(通常是一价铜)阴离子的改变对偶联反应的影响不大^[21];该反应对空气比较敏感^[22],当反应在空气中进行时产率下降(Entry 1

表1 碘化亚铜催化的对叔丁基苯酚(**1**)与间溴苯甲醚(**2**)的O-芳基化反应^a

Table 1 CuI-catalyzed O-arylation of 4-*tert*-butylphenol (**1**) with 3-bromoanisole (**2**)

Entry	[Cu] source	Ligand	Base	Solvent	Yield ^b /%
1	CuI	L1	K ₃ PO ₄	DMSO	81
2	CuI	L2	K ₃ PO ₄	DMSO	66
3	CuI	L3	K ₃ PO ₄	DMSO	37
4	CuI	L4	K ₃ PO ₄	DMSO	40
5	CuI	L1	K ₃ PO ₄	DMF	42
6	CuI	L1	K ₃ PO ₄	Toluene	43
7	CuBr	L1	K ₃ PO ₄	DMSO	69
8	CuCl	L1	K ₃ PO ₄	DMSO	76
9	CuCl ₂	L1	K ₃ PO ₄	DMSO	36
10	CuI	L1	Cs ₂ CO ₃	DMSO	7
11	CuI	L1	K ₂ CO ₃	DMSO	12
12	CuI	L1	K ₃ PO ₄	DMSO	74 ^c

^a Reaction conditions: **1** (0.55 mmol), **2** (0.5 mmol), [Cu] catalyst (0.1 mmol), L (0.1 mmol), and base (1.0 mmol) in indicated solvent (1.0 mL) at 110 °C under N₂ for 25 h. ^b Isolated yield. ^c The reaction was carried out under air atmosphere. DMSO=dimethylsulfoxide, DMF=N,N-dimethylformamide.

vs. 12). 因此, O-芳基化反应较优化的反应条件是: DMSO为溶剂, 20 mol% CuI为催化剂, 20 mol% 2-吡啶甲酸(**L1**)为配体, K₃PO₄ (2.0 equiv.)为碱, 反应需在氮气中进行.

随后,进一步考察了反应温度和反应时间对O-芳基化反应的影响(图2).温度变化对反应有极大的影响,对于间溴苯甲醚,随着反应温度从90 °C升高到110 °C,产率从10%增加到81%,当温度继续升高到130 °C时对产率几乎没有影响(图2a 浅灰色条带);对于对溴苯甲醚,随着反应温度从90 °C升高到130 °C,产率从8%增加到80%,当温度继续升高到140 °C时产率并没有随之增加(图2a 灰色条带);当温度升至110 °C时,二种溴代苯的活性呈现出较大的差异性,间溴苯甲醚的反应产率是对溴苯甲醚的2.5倍.从图2b中可以看出,间溴苯甲醚和对溴苯甲醚的最合适的反应时间分别为25和30 h,当反应时间超过30 h后,产率降低(图2b).实验结果表明,缺电子间溴苯甲醚的反应活性要比富电子的对

图2 反应温度和时间对 *O*-芳基化反应的影响Figure 2 The effect of reaction temperature and time on the *O*-arylation

(a) Reaction conditions: 4-*tert*-butylphenol (0.55 mmol), 3-bromoanisole (or 4-bromoanisole) (0.5 mmol), CuI (0.1 mmol), 2-picolinic acid (0.1 mmol), and K_3PO_4 (1.0 mmol) in DMSO (1.0 mL) at indicated temperature under N_2 for 25 h. (b) Reaction conditions: 4-*tert*-butyl-phenol (0.55 mmol), 3-bromoanisole (or 4-bromoanisole) (0.5 mmol), CuI (0.1 mmol), 2-picolinic acid (0.1 mmol), and K_3PO_4 (1.0 mmol) in DMSO (1.0 mL) at 110 °C (or 130 °C) under N_2 for indicated time (h)

溴苯甲醚高,其原因可能是间溴苯甲醚间位的甲氧基表现出吸电子诱导效应,从而使得C—Br键上碳原子的电子云密度降低,提高了间溴苯甲醚的反应活性.因此,*O*-芳基化反应的优化条件为:间溴苯甲醚 110 °C 反应 25 h,对溴苯甲醚 130 °C 反应 30 h.

接着,以对溴苯甲醚和间溴苯甲醚为亲电试剂,在上述优化条件下考察了多种酚对 *O*-芳基化反应的影响(表 2).当给电子的叔丁基、甲基在酚的对位或间位时,可使产率提高 2%~20% (3bp vs. 3ap, 3dp, 3ep; 3bm vs. 3am, 3dm, 3em).而吸电子的氯和氟在酚的对位和间位时使产率降低 4%~15% (3bp vs. 3fp, 3gp, 3hp; 3bm vs. 3fm, 3gm, 3hm).含有强吸电子基团的对硝基苯酚使反应受阻,即使将反应时间延长到 48 h 仍然没有产物生成 (3np, 3nm),这一结果与多种文献报道的一致^[15c].有空间位阻的邻甲苯酚与对溴苯甲醚的反应产率降低了 21% (3bp vs. 3cp),与间溴苯甲醚的反应产率降低了 6% (3bm vs. 3cm),可见空间位阻对间溴苯甲醚反应活性的影响要比对溴苯甲醚的小的多.对于 α -萘酚和 β -萘酚,除了 α -萘酚和对溴苯甲醚的反应产率较低外(3ip),其它都以中等收率得到了目标产物(3im, 3jp, 3jm).更重要的是该反应体系还适合多环酚的 *O*-芳基化反应,如苯并呋喃类(3kp, 3km)、香豆素类(3lp, 3lm)和芝麻酚(3mp, 3mm),而以前文献少有这方面的报道^[23].上述研究结果表明,通过提高温度和适当延长反应时间,富电子的溴代芳烃也可发生相应的 *O*-芳基化反应,其产率和缺电子的间溴苯甲醚相当.

最后将已优化的 *O*-芳基化反应用于除草剂 Clofop 的合成中(Scheme 1).即以对氯苯酚和富电子的对溴苯

甲醚为原料,经铜催化偶联生成 3fp,然后脱甲基得到 4-(4-氯苯氧基)苯酚^[24],与 2-溴丙酸乙酯经亲核取代反应得到 4^[25],然后经碱性水解、酸化并经重结晶即可获得除草剂 Clofop^[25,26].

2 结论

本文报道了 *O*-芳基化反应,发现缺电子的间溴苯甲醚和酚反应时表现出更高的反应活性,相反,富电子的对溴苯甲醚反应活性较低.研究还发现,通过提高反应温度和适当延长反应时间,富电子的对溴苯甲醚也可生成相应的 *O*-芳基化产物,收率和缺电子的间溴苯甲醚相当.并且用该方法成功地合成了除草剂 Clofop.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

1H NMR 和 ^{13}C NMR 在 Bruker Advance DMX400 (400 M)上测定,部分化合物 ^{13}C NMR 在 Bruker Advance DMX500 (500 M)上测定, $CDCl_3$ 为溶剂, TMS 为内标;高分辨质谱在 HP5973GCMS 气相色谱质谱联用仪上进行测定.反应进程用 TLC 跟踪检测,用紫外灯或者碘显色.所用的快速柱层析是在 300~400 目硅胶上进行,实验所用试剂均为市售 AR 或 CP 试剂.

3.2 实验方法

对溴苯甲醚与酚的 *O*-芳基化反应:在干燥的 Schlenk 反应管中分别加入酚(0.55 mmol),对溴苯甲醚 (0.5 mmol), CuI (0.1 mmol), 2-吡啶甲酸(0.1 mmol), K_3PO_4 (1.0 mmol)和溶剂 DMSO (1.0 mL).将反应管抽

表 2 碘化亚铜催化的多种酚与对溴苯甲醚和间溴苯甲醚的 *O*-芳基化反应Table 2 CuI-catalyzed *O*-arylations of various phenols with 4-bromoanisole and 3-bromoanisole

$\text{Ar-O-C}_6\text{H}_4\text{-OMe} \xleftarrow[\text{K}_3\text{PO}_4 (1.0 \text{ mmol}), \text{DMSO}, \text{N}_2, 130^\circ\text{C}, 30 \text{ h}]{\text{4-Bromoanisole (0.5 mmol), CuI (0.1 mmol), L1 (0.1 mmol)}} \text{ArOH (0.55 mmol)} \xrightarrow[\text{K}_3\text{PO}_4 (1.0 \text{ mmol}), \text{DMSO}, \text{N}_2, 110^\circ\text{C}, 25 \text{ h}]{\text{3-Bromoanisole (0.5 mmol), CuI (0.1 mmol), L1 (0.1 mmol)}} \text{Ar-O-C}_6\text{H}_3\text{(OMe)-OMe}$					
Compd.	Product	Yield ^a /%	Compd.	Product	Yield ^a /%
3ap		80	3am		81
3bp		69	3bm		61
3cp		48	3cm		55
3dp		71	3dm		71
3ep		77	3em		76
3fp		54	3fm		55
3gp		57	3gm		57
3hp		57	3hm		47
3ip		27	3im		45
3jp		54	3jm		58
3kp		54	3km		59
3lp		21	3lm		15
3mp		31	3mm		32
3np		0	3nm		0

^a Isolated yield.

Reagents and conditions: (a) K_3PO_4 (2.0 equiv.), CuI (0.2 equiv.), 2-picolinic acid (0.2 equiv.), DMSO, 130 °C, 30 h; (b) 48% HBr (2.0 equiv.), acetic acid, reflux, 20 h; (c) Ethyl 2-bromopropionate (1.2 equiv.), K_2CO_3 (2.0 equiv.), acetone, reflux, 10 h; (d) NaOH (1.2 equiv.), MeOH, reflux, 2 h, 83% for three steps (b~d). DMSO = Dimethyl sulfoxide

Scheme 1

真空后充氮气, 反复 3 次, 然后密封反应管. 先在室温下搅拌 0.5 h, 然后在 130 °C 下继续反应 30 h. 将反应混合物冷却至室温, 过滤除去固体, 用 20 mL 乙酸乙酯洗涤滤饼, 滤液用饱和食盐水洗涤(5 mL×3), 无水硫酸镁干燥, 旋蒸除去溶剂, 粗产物以石油醚/乙酸乙酯混合溶剂为洗脱剂, 经硅胶柱层析分离得到目标产物 **3ap**~**3mp**.

4-(4-叔丁基苯氧基)苯甲醚(**3ap**)^[27]: 无色液体, 产率 80%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.33 (d, $J=8.1$ Hz, 2H), 7.00 (d, $J=8.7$ Hz, 2H), 6.90 (d, $J=7.8$ Hz, 4H), 3.82 (s, 3H), 1.33 (s, 9H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 156.0, 155.6, 150.4, 145.2, 126.3, 120.6, 117.1, 114.7, 55.6, 34.2, 31.5.

4-苯氧基苯甲醚(**3bp**)^[16b]: 无色液体, 产率 69%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.34 (t, $J=7.8$ Hz, 2H), 7.05 (m, 5H), 6.93 (d, $J=8.9$ Hz, 2H), 3.84 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 158.4, 155.8, 150.0, 129.5, 122.3, 120.8, 117.5, 114.8, 55.6.

4-(2-甲基苯氧基)苯甲醚(**3cp**)^[28]: 无色液体, 产率 48%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.25 (d, $J=6.9$ Hz, 1H), 7.14 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.03 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 6.95~6.87 (m, 4H), 6.82 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 3.81 (s, 3H), 2.31 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 155.8, 155.2, 151.0, 131.2, 129.0, 126.9, 123.0, 119.3, 117.9, 114.7, 55.6, 16.2.

4-(3-甲基苯氧基)苯甲醚(**3dp**)^[29]: 无色液体, 产率 71%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.19 (t, $J=7.7$ Hz, 1H), 7.00 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 6.91~6.86 (m, 3H), 6.77 (d, $J=11.8$ Hz, 2H), 3.82 (s, 3H), 2.33 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 158.4, 155.7, 150.1, 139.7, 129.3, 123.2,

120.7, 118.2, 114.7, 114.5, 55.6, 21.3.

4-(4-甲基苯氧基)苯甲醚(**3ep**)^[30]: 无色液体, 产率 77%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.33 (d, $J=8.1$ Hz, 2H), 7.00 (d, $J=8.7$ Hz, 2H), 6.90 (d, $J=7.8$ Hz, 4H), 3.82 (s, 3H), 1.33 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 156.0, 155.5, 150.7, 131.9, 130.0, 120.3, 117.7, 114.7, 55.6, 20.6.

4-(4-氯苯氧基)苯甲醚(**3fp**)^[23b]: 无色液体, 产率 54%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.29 (s, 2H), 6.99 (d, $J=8.9$ Hz, 2H), 6.93~6.87 (m, 4H), 3.84 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 157.1, 156.0, 149.6, 129.4, 127.2, 120.8, 118.6, 114.8, 55.6.

4-(3-氯苯氧基)苯甲醚(**3gp**)^[29]: 无色液体, 产率 57%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.21 (t, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.04~6.97 (m, 3H), 6.93~6.89 (m, 3H), 6.84 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 3.82 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 159.5, 156.3, 149.1, 134.9, 130.3, 122.3, 121.2, 117.4, 115.5, 114.9, 55.5.

4-(4-氟苯氧基)苯甲醚(**3hp**)^[16b]: 无色液体, 产率 57%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.03~6.87 (m, 8H), 3.81 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 159.4, 157.0, 155.8, 154.2, 150.6, 120.2, 119.1, 119.0, 116.1, 115.9, 114.8, 55.5.

1-(4-甲氧基苯氧基)萘(**3ip**)^[31]: 无色液体, 产率 27%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 8.37~8.28 (m, 1H), 7.88 (dd, $J=6.4, 2.8$ Hz, 1H), 7.58~7.51 (m, 3H), 7.35 (t, $J=7.9$ Hz, 1H), 7.06 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 6.93 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 6.82 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 3.83 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 155.8, 154.4, 150.5, 134.8, 127.6, 126.5, 126.3, 125.7, 122.3, 122.0, 120.6, 114.8, 111.2, 55.6.

2-(4-甲氧基苯氧基)萘(**3jp**)^[16b]: 无色液体, 产率 54%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.82 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 7.68 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.47~7.37 (m, 2H), 7.27 (dd, $J=8.8, 2.1$ Hz, 1H), 7.20 (d, $J=1.9$ Hz, 1H), 7.07 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 6.94 (d, $J=8.9$ Hz, 2H), 3.84 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 156.4, 156.0, 149.9, 134.2, 129.7, 127.6, 126.9, 126.4, 124.3, 121.0, 119.3, 114.9, 112.1, 55.6.

7-(4-甲氧基苯氧基)-2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃(**3kp**): 无色液体, 产率 54%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 6.99 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 6.87 (dd, $J=11.4, 8.2$ Hz, 3H), 6.75~6.64 (m, 2H), 3.79 (s, 3H), 3.07 (s, 2H), 1.52 (s, 6H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 155.4, 150.4, 148.9, 141.9, 129.3, 120.3, 119.7, 119.5, 117.3, 114.5,

87.8, 55.5, 43.2, 28.1; HRMS (EI-TOF) calcd for $C_{17}H_{18}O_3$ 270.1256, found 270.1260.

7-(4-甲氧基苯氧基)-4-甲基香豆素(**3lp**)^[32]: 无色液体, 产率 21%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.41 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.35 (d, $J=1.1$ Hz, 1H), 7.02~6.94 (m, 4H), 6.90~6.86 (m, 2H), 3.81 (s, 3H), 2.22 (s, 3H); ^{13}C NMR (125 MHz, $CDCl_3$) δ : 159.9, 158.2, 153.4, 140.6, 129.1, 118.7, 114.5, 114.0, 110.1, 109.5, 108.0, 107.6, 104.0, 103.4, 101.9, 54.3, 6.9; HRMS (EI-TOF) calcd for $C_{16}H_{14}O_3$ (M^+-CO) 254.0943, found 254.0945.

5-(4-甲氧基苯氧基)-1,3-苯并二噁茂(**3mp**)^[23b]: 无色液体, 产率 31%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 6.94 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 6.86 (d, $J=8.9$ Hz, 2H), 6.72 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 6.54 (d, $J=2.2$ Hz, 1H), 6.46~6.36 (m, 1H), 5.94 (s, 2H), 3.79 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 155.4, 152.9, 151.0, 148.2, 143.0, 119.7, 114.7, 110.4, 108.1, 101.3, 101.0, 55.6.

间溴苯甲醚与酚的 *O*-芳基化反应: 在干燥的 Schlenk 反应管中分别加入酚(0.55 mmol)、间溴苯甲醚(0.5 mmol)、CuI (0.1 mmol)、2-吡啶甲酸(0.1 mmol)、 K_3PO_4 (1.0 mmol)和溶剂 DMSO (1.0 mL). 将反应管抽真空后充氮气, 反复 3 次, 然后密封反应管. 先在室温下搅拌 0.5 h, 然后在 110 $^{\circ}C$ 下继续反应 25 h. 将反应混合物冷却至室温, 过滤除去固体, 用 20 mL 乙酸乙酯洗涤滤饼, 滤液用饱和食盐水洗涤(5 mL $\times$ 3), 无水硫酸镁干燥, 旋蒸除去溶剂, 粗产物以石油醚/乙酸乙酯混合溶剂为洗脱剂, 经硅胶柱层析分离得到目标产 **3am**~**3mm**.

3-(4-叔丁基苯氧基)苯甲醚(**3am**)^[33]: 无色液体, 产率 81%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.35 (d, $J=8.5$ Hz, 2H), 7.21 (t, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.96 (d, $J=8.5$ Hz, 2H), 6.64 (d, $J=9.1$ Hz, 1H), 6.59 (d, $J=6.9$ Hz, 2H), 3.78 (s, 3H), 1.33 (s, 9H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 160.8, 158.8, 154.3, 146.2, 130.0, 126.5, 118.6, 110.6, 108.4, 104.5, 55.3, 34.2, 31.4.

3-苯氧基苯甲醚(**3bm**)^[28]: 无色液体, 产率 61%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.35 (t, $J=7.9$ Hz, 2H), 7.22 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.12 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 7.04 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 6.69~6.64 (m, 1H), 6.60 (d, $J=6.6$ Hz, 2H), 3.79 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 160.8, 158.4, 156.9, 130.0, 129.7, 123.3, 119.0, 110.8, 108.8, 104.7, 55.3.

3-(2-甲基苯氧基)苯甲醚(**3cm**)^[9b]: 无色液体, 产率 55%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.25~7.12 (m, 3H), 7.08 (t, $J=7.3$ Hz, 1H), 6.94 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.60 (dd,

$J=8.3$, 1.1 Hz, 1H), 6.48 (d, $J=8.1$ Hz, 2H), 3.78 (s, 3H), 2.24 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 160.8, 159.1, 154.1, 131.4, 130.04, 129.96, 127.1, 124.1, 120.0, 109.3, 107.7, 103.3, 55.2, 16.1.

3-(3-甲基苯氧基)苯甲醚(**3dm**)^[15b]: 无色液体, 产率 71%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.25~7.21 (m, 2H), 6.93 (d, $J=7.5$ Hz, 1H), 6.85~6.83 (m, 2H), 6.67~6.65 (m, 1H), 6.60~6.58 (m, 2H), 3.79 (s, 3H), 2.34 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 160.8, 158.5, 156.8, 139.8, 130.0, 129.3, 124.1, 119.7, 116.0, 110.8, 108.6, 104.7, 55.3, 21.3.

3-(4-甲基苯氧基)苯甲醚(**3em**)^[34]: 无色液体, 产率 76%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.24~7.18 (m, 1H), 7.15 (d, $J=8.2$ Hz, 2H), 6.94 (d, $J=8.2$ Hz, 2H), 6.66~6.61 (m, 1H), 6.58~6.54 (m, 2H), 3.78 (s, 3H), 2.35 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 160.8, 159.0, 154.30, 133.0, 130.1, 130.0, 119.2, 110.3, 108.3, 104.2, 55.2, 20.6.

3-(4-氯苯氧基)苯甲醚(**3fm**)^[16b]: 无色液体, 产率 55%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.31 (d, $J=8.5$ Hz, 2H), 7.28~7.23 (m, 1H), 6.98 (d, $J=8.5$ Hz, 2H), 6.69 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.61~6.56 (m, 2H), 3.80 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 160.9, 158.0, 155.6, 130.2, 129.6, 128.3, 120.2, 110.8, 109.1, 104.8, 55.3.

3-(3-氯苯氧基)苯甲醚(**3gm**)^[35]: 无色液体, 产率 57%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.27 (td, $J=7.9$, 3.4 Hz, 2H), 7.09 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.02 (s, 1H), 6.95~6.89 (m, 1H), 6.73~6.71 (m, 1H), 6.64~6.58 (m, 2H), 3.81 (s, 3H); ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 100 MHz) δ : 161.0, 158.00, 157.40, 134.90, 130.4, 130.2, 123.2, 118.9, 116.8, 111.3, 109.5, 105.3, 55.3.

3-(4-氟苯氧基)苯甲醚(**3hm**)^[4]: 无色液体, 产率 47%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.22 (t, $J=8.5$ Hz, 1H), 7.09~6.95 (m, 4H), 6.73~6.58 (m, 1H), 6.58~6.45 (m, 2H), 3.78 (s, 3H); ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 100 MHz) δ : 160.9, 160.0, 158.9, 157.6, 152.52, 152.50, 130.1, 120.7, 120.6, 116.3, 116.1, 110.2, 108.6, 104.2, 55.3.

1-(3-甲氧基苯氧基)萘(**3im**)^[36]: 无色液体, 产率 45%. 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 8.22 (d, $J=7.9$ Hz, 1H), 7.90 (d, $J=7.7$ Hz, 1H), 7.65 (d, $J=8.2$ Hz, 1H), 7.58~7.48 (m, 2H), 7.41 (t, $J=7.9$ Hz, 1H), 7.25 (t, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.03 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.73~6.62 (m, 3H), 3.79 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 160.9, 159.1, 152.6, 134.9, 130.1, 127.7, 126.8, 126.5, 125.9, 125.7, 123.5, 122.1, 113.8, 110.5, 108.7, 104.5, 55.3.

2-(3-甲氧基苯氧基)萘(**3jm**)^[37]: 无色液体, 产率

58%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.85~7.82 (m, 2H), 7.72 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.49~7.40 (m, 2H), 7.36 (s, 1H), 7.26 (t, $J=8.5$ Hz, 2H), 6.74~6.63 (m, 3H), 3.79 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 160.9, 158.3, 154.7, 134.2, 130.1, 129.8, 127.7, 127.1, 126.4, 124.7, 120.0, 114.3, 111.1, 109.1, 104.9, 55.3.

7-(3-甲氧基苯氧基)-2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃(**3km**): 无色液体, 产率 59%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.19 (t, $J=7.9$ Hz, 1H), 6.95 (d, $J=6.8$ Hz, 1H), 6.82~6.76 (m, 2H), 6.59 (dd, $J=10.6, 2.3$ Hz, 3H), 3.77 (s, 3H), 3.08 (s, 2H), 1.50 (s, 6H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 160.7, 158.6, 149.7, 139.8, 129.7, 129.6, 120.6, 120.4, 119.3, 109.7, 108.2, 103.7, 87.9, 55.2, 43.1, 28.1; HRMS (EI-TOF) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{O}_3$ 270.1256, found 270.1255.

7-(3-甲氧基苯氧基)-4-甲基香豆素(**3lm**): 无色液体, 产率 15%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.45 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.38 (d, $J=1.0$ Hz, 1H), 7.24~7.19 (m, 2H), 7.13 (d, $J=1.9$ Hz, 1H), 7.00 (dd, $J=8.4, 2.0$ Hz, 1H), 6.67~6.61 (m, 2H), 3.77 (s, 3H), 2.24 (d, $J=1.0$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (125 MHz, CDCl_3) δ : 159.9, 158.2, 153.4, 140.6, 129.1, 118.7, 114.5, 114.0, 110.1, 109.5, 108.0, 107.6, 104.0, 103.4, 101.9, 54.3, 6.9; HRMS (EI-TOF) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_3$ ($\text{M}^+ - \text{CO}$) 254.0943 found 254.0947.

5-(3-甲氧基苯氧基)-1,3-苯并二噁茂(**3mm**): 无色液体, 产率 32%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.20 (t, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.76 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 6.63~6.45 (m, 5H), 5.97 (s, 2H), 3.78 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 160.8, 159.4, 151.0, 148.2, 143.8, 130.0, 112.1, 109.8, 108.17, 108.15, 103.8, 102.2, 101.4, 55.2; HRMS (EI-TOF) calcd for $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_4$ 244.0736, found 244.0735.

2-(4-(4-氯苯氧基)苯氧基)丙酸(**Clotop**)^[25]: 白色固体, m.p. 120~121 $^\circ\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.99 (s, 1H), 7.23 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 6.91~6.82 (m, 6H), 4.67 (q, $J=6.3$ Hz, 1H), 1.57 (d, $J=6.5$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 177.6, 156.6, 153.4, 150.89, 129.5, 127.6, 120.5, 119.0, 116.7, 73.2, 18.3.

致谢 浙江科技学院 2012 届的徐辉和程厚安两位同学参与了本文化合物的部分表征工作, 在此一并表示感谢.

References

- [1] (a) Pitsinos, E. N.; Vidali, V. P.; Couladouros, E. A. *Eur. J. Org. Chem.* **2011**, 1207.
(b) Hodous, B. L.; Geuns-Meyer, S. D.; Hughes, P. E.; Albrecht, B.

- K.; Bellon, S.; Bready, J.; Caenepeel, S.; Cee, V. J.; Chaffee, S. C.; Coxon, A.; Emery, M.; Fretland, J.; Gallant, P.; Gu, Y.; Hoffman, D.; Johnson, R. E.; Kendall, R.; Kim, J. L.; Long, A. M.; Morrison, M.; Olivieri, P. R.; Patel, V. F.; Polverino, A.; Rose, P.; Tempest, P.; Wang, L.; Whittington, D. A.; Zhao, H. L. *J. Med. Chem.* **2007**, 50, 611.
(c) Liu, L. B.; Siegmund, A.; Xi, N.; Kaplan-Lefko, P.; Rex, K.; Cheti, A.; Lin, J.; Moriguchi, J.; Berry, L.; Huang, L.; Teffera, Y.; Yang, Y. I.; Zhang, Y. H.; Bellon, S. F.; Lee, M.; Shimanovich, R.; Bak, A.; Dominguez, C.; Norman, M. H.; Harmange, J. C.; Dussault, I.; Kim, T. S. *J. Med. Chem.* **2008**, 51, 3688.
(d) Theil, F. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1999**, 38, 2345.
(e) Nicolaou, K. C.; Boddy, C. N. C.; Bräse, S.; Winssinger, N. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1999**, 38, 2096.
(f) Rao, A. V. R.; Gurjar, M. K.; Reddy, K. L.; Rao, A. S. *Chem. Rev.* **1995**, 95, 2135.
(g) Boger, D. L.; Yohannes, D. J. *Org. Chem.* **1990**, 55, 6000.
(h) Janetka, J. W.; Rich, D. H. *J. Am. Chem. Soc.* **1997**, 119, 6488.
[2] (a) Aktiengesellschaft, B. *WO 2007071655*, **2007** [*Chem. Abstr.* **2007**, 147, 66072].
(b) Draper, W. M.; Casida, J. E. *J. Agric. Food Chem.* **1983**, 31, 227.
(c) Draper, W. M.; Casida, J. E. *J. Agric. Food Chem.* **1983**, 31, 1201.
(d) Scrano, L.; Bufo, S. A.; D'Auria, M.; Meallier, P.; Behechti, A.; Shramm, K. W. *J. Environ. Qual.* **2002**, 31, 268.
(e) Nezu, Y.; Miyazaki, M.; Sugiyama, K.; Kajiwara, I. *Pestic. Sci.* **1996**, 47, 103.
[3] (a) Kim, Y. J.; Seo, M.; Kim, S. Y. *J. Polym. Sci., Polym. Chem.* **2010**, 48, 1049.
(b) Labadie, J. W.; Hedrick, J. L.; Ueda, M. *Am. Chem. Soc. Symp. Ser.* **1996**, 624, 210.
(c) Laskoski, M.; Dominguez, D. D.; Keller, T. M. *J. Polym. Sci., Polym. Chem.* **2006**, 44, 4559.
(d) Liu, H. L.; Bernhardsen, M.; Fiksdahl, A. *Tetrahedron* **2006**, 62, 3564.
[4] Xue, F.; Huang, J.; Ji, H.; Fang, J.; Li, H.; Martasek, P.; Roman, L. J.; Poulos, T. L.; Silverman, R. B. *Bioorg. Med. Chem.* **2010**, 18, 6526.
[5] Chorell, E.; Pinkner, J. S.; Bengtsson, C.; Banchelin, T. S.; Edvinsson, S.; Linusson, A.; Hultgren, S. J.; Almqvist, F. *Bioorg. Med. Chem.* **2012**, 20, 3128.
[6] Sandanayaka, V.; Mamat, B.; Mishra, R. K.; Winger, J.; Krohn, M.; Zhou, L. M.; Keyvan, M.; Enache, L.; Sullins, D.; Onua, E.; Zhang, J.; Halldorsdottir, G.; Sigthorsdottir, H.; Thorlaksdottir, A.; Sigthorsson, G.; Thorsteinnsson, M.; Davies, D. R.; Stewart, L. J.; Zembower, D. E.; Andresson, T.; Kiselyov, A. S.; Singh, J.; Gurney, M. E. *J. Med. Chem.* **2010**, 53, 573.
[7] (a) Monnier, F.; Taillefer, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, 47, 3096.
(b) Evano, G.; Blanchard, N.; Toumi, M. *Chem. Rev.* **2008**, 108, 3054.
(c) Monnie, F.; Taillefer, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, 48, 6954.
(d) Sawyer, J. S. *Tetrahedron* **2000**, 56, 5045.
(e) Frlan, R.; Kikelj, D. *Synthesis* **2006**, 14, 2271.
[8] (a) Wang, Z.; Fu, H.; Jiang, Y. Y.; Zhao, Y. F. *Synlett* **2008**, 2540.
(b) Niu, J.; Zhou, H.; L. Z.; Xu, J.; Hu, S. *J. Org. Chem.* **2008**, 73, 7814.
(c) Ullmann, F. *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **1903**, 36, 2382.
(d) Ullmann, F. *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **1904**, 37, 853.
(e) Finet, J.-P.; Fedorov, A. Y.; Combesa, S.; Boyerc, G. *Curr. Org.*

- Chem.* **2002**, 6, 597.
 (f) Ullmann, F.; Meyer, G.; Loewenthal, O.; Gilli, E. *Justus Liebigs Ann. Chem.* **1904**, 332, 38.
- [9] (a) Palucki, M.; Wolfe, J. P.; Buchwald, S. L. *J. Am. Chem. Soc.* **1996**, 118, 10333.
 (b) Aranyos, A.; Old, D. W.; Kiyomori, A.; Wolfe, J. P.; Sadighi, J. P.; Buchwald, S. L. *J. Am. Chem. Soc.* **1999**, 121, 4369.
- [10] (a) Mann, G.; Hartwig, J. F. *J. Am. Chem. Soc.* **1996**, 118, 13109.
 (b) Mann, G.; Incarvito, C.; Rheingold, A. L.; Hartwig, J. F. *J. Am. Chem. Soc.* **1999**, 121, 3224.
 (c) Shelby, Q.; Kataoka, N.; Mann, G.; Hartwig, J. *J. Am. Chem. Soc.* **2000**, 122, 10718.
 (d) Kataoka, N.; Shelby, Q.; Stambuli, J. P.; Hartwig, J. F. *J. Org. Chem.* **2002**, 67, 5553.
- [11] (a) Cristau, H.-J.; Cellier, P. P.; Hamada, S.; Spindler, J.-F.; Taillefer, M. *Org. Lett.* **2004**, 6, 913.
 (b) Miao, T.; Wang, L. *Tetrahedron Lett.* **2007**, 48, 95.
- [12] (a) Taillefer, M.; Cristau, H.-J.; P. Cellier, P.; Spindler, J.-F. *FR 2840303*, **2002** [*Chem. Abstr.* **2003**, 140, 16744].
 (b) Buchwald, S. L.; Klapars, A.; Antilla, J. C.; Job, G. E.; Wolter, M.; Kwong, F. Y.; Nordmann, G.; Hennessy, E. J. *WO 2002085838*, **2002** [*Chem. Abstr.* **2002**, 137, 352492].
- [13] (a) Xu, H.-J.; Man, Q.-S.; Lin, Y.-C.; Li, Y.-Y.; Feng, Y.-S. *Chin. J. Org. Chem.* **2010**, 30, 9 (in Chinese).
 (许华建, 蔺秋石, 林义成, 李源源, 冯乙巳, 有机化学, **2010**, 30, 9.)
 (b) Deng, W.; Liu, L.; Guo, Q.-X. *Chin. J. Org. Chem.* **2004**, 24, 150 (in Chinese).
 (邓维, 刘磊, 郭庆祥, 有机化学, **2004**, 24, 150.)
- [14] (a) Ma, D.; Cai, Q. *Org. Lett.* **2003**, 5, 3799.
 (b) Liu, Y.-H.; Li, G.; Yang, L.-M. *Tetrahedron Lett.* **2009**, 50, 343.
 (c) Liu, Y. H.; Li, G.; Yang, L. M. *Chin. J. Chem.* **2009**, 27, 423.
 (d) Hao, C.; Zhang, Y.; Jiang, Y.; Ma, D. *Chin. J. Chem.* **2010**, 28, 1645.
- [15] (a) Xia, N.; Taillefer, M. *Chem. Eur. J.* **2008**, 14, 6037.
 (b) Yong, F.-F.; Teo, Y.-C.; Yan, Y.-K.; Chua, G.-L. *Synlett* **2012**, 23, 101.
 (c) Bistri, O.; Correa, A.; Bolm, C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, 47, 586.
 (d) Buck, E.; Song, Z. J.; Tschaen, D.; Dormer, P. G.; Volante, R. P.; Reider, P. J. *Org. Lett.* **2002**, 4, 1623.
 (e) Lv, X.; Bao, W. *J. Org. Chem.* **2007**, 72, 3863.
 (f) Naidu, A. B.; Jaseer, E. A.; Sekar, G. *J. Org. Chem.* **2009**, 74, 3675.
- [16] (a) Fagan, P. J.; Hauptman, E.; Shapiro, R.; Casalnuovo, A. *J. Am. Chem. Soc.* **2000**, 122, 5043.
 (b) Zhang, Q.; Wang, D. P.; Wang, X. Y.; Ding, K. *J. Org. Chem.* **2009**, 74, 7187.
 (c) Maiti, D.; Buchwald, S. L. *J. Org. Chem.* **2010**, 75, 1791.
 (d) Maiti, D.; Buchwald, S. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, 131, 17423.
 (e) Ma, D. W.; Cai, Q. A. *Acc. Chem. Res.* **2008**, 41, 1450.
 (f) Cheng, A.-Y.; Hsieh, J.-C. *Tetrahedron Lett.* **2012**, 53, 71.
- [17] (a) Arundhathi, R.; Damodara, D.; Likhar, P. R.; Kantam, M. L.; Saravanan, P.; Magdaleno, T.; Kwon, S. H. *Adv. Synth. Catal.* **2011**, 353, 1591.
 (b) Jammi, S.; Sakthivel, S.; Rout, L.; Mukherjee, T.; Mandal, S.; Mitra, R.; Saha, P.; Punniyamurthy, T. *J. Org. Chem.* **2009**, 74, 1971.
 (c) Swapna, K.; Murthy, S. N.; Jyothi, M. T.; Nageswar, Y. V. *Org. Biomol. Chem.* **2011**, 9, 5978.
 (d) Mulla, S. A. R.; Inamdar, S. M.; Pathan, M. Y.; Chavan, S. S. *Tetrahedron Lett.* **2012**, 53, 1826.
 (e) Verma, S.; Kumar, N.; Jain, S. L. *Tetrahedron Lett.* **2012**, 53, 4665.
- [18] (a) Ley, S. V.; Thomas, A. W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2003**, 42, 5400.
 (b) Shi, L.; Wang, M.; Fan, C.-A.; Zhang, F.-M.; Tu, Y.-Q. *Org. Lett.* **2003**, 5, 3515.
- [19] Vo, G. D.; Hartwig, J. F. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, 131, 11049.
- [20] Otto, N.; Opatz, T. *Beilstein J. Org. Chem.* **2012**, 8, 1105.
- [21] Kunz, K.; Scholz, U.; Ganzera, D. *Synlett* **2003**, 2428.
- [22] Altman, R. A.; Buchwald, S. L. *Nat. Protoc.* **2007**, 2, 2474.
- [23] (a) Setsukinai, K.-I.; Urano, Y.; Kikuchi, K.; Higuchi, T.; Nagano, T. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2* **2000**, 2453.
 (b) Liu, X. Y.; Zhang, S. L. *Synlett* **2011**, 2, 268.
- [24] Lafon, L.; Lafon, V. *DE 2543179*, **1976** [*Chem. Abstr.* **1976**, 85, 20843].
- [25] Aktiengesellschaft, H. *BE 873844*, **1979** [*Chem. Abstr.* **1979**, 91, 140579].
- [26] Imi;os, S. *EP 2246*, **1979** [*Chem. Abstr.* **1980**, 92, 6246].
- [27] Lipshutz, B. H.; Unger, J. B.; Taft, B. R. *Org. Lett.* **2007**, 9, 1089.
- [28] Burgos, C. H.; Barder, T. E.; Huang, X. H.; Buchwald, S. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2006**, 45, 4321.
- [29] Chen, Y.-J.; Chen, H.-H. *Org. Lett.* **2006**, 8, 5609.
- [30] Özdemir, I.; Akkoç, M.; Gürbüz, N.; Çetinkaya, E. *Synlett* **2008**, 12, 1781.
- [31] Bhadra, S.; Sreedhar, B.; Ranu, B. C. *Adv. Synth. Catal.* **2009**, 351, 2369.
- [32] Medda, A.; Pal, G.; Singha, R.; Hossain, T.; Saha, A.; Das, A. R. *Synth. Commun.* **2013**, 43, 169.
- [33] Baranano, D.; Hartwig, J. F. *J. Am. Chem. Soc.* **1995**, 117, 2937.
- [34] Islam, S. M.; Mondal, S.; Mondal, P.; Roy, A. S.; Tuhina, K.; Salam, N.; Mobarak, M. *J. Organomet. Chem.* **2012**, 696, 4264.
- [35] Shimochidosho, H. *JP 09071549*, **1997** [*Chem. Abstr.* **1997**, 127, 4919].
- [36] Schwarz, R.; Kuchen, W. *Chem. Ber.* **1953**, 86, 1144.
- [37] Yao, Z. Y.; Jiang, S. *CN 102060790*, **2011** [*Chem. Abstr.* **2011**, 154, 614815].

(Lu, Y.)