过渡金属催化的三级胺氧化反应的研究进展

李远明 马丽娜 李志平*

(中国人民大学化学系 北京 100872)

摘要 三级胺的氧化是自然界中最基本的反应之一。利用化学方法研究三级胺的氧化反应不仅可以提供合成含氮化合物的新方法和途径,也可以帮助我们了解生命体中三级胺氧化的反应过程和机理。近十年,过渡金属催化的三级胺氧化反应取得了一些重要的研究进展。主要总结了近年来以过渡金属为催化剂,在氧化剂的条件下,三级胺氧化反应研究领域中的重要研究结果,并展望了该研究领域未来研究的重点和挑战性问题。主要分为五个部分:(1)三级胺的氧化形成氧化胺;(2)三级胺的氧化 Mannich 反应;(3)三级胺的氧化去甲基化反应;(4)三级胺的氧化酰胺化反应;(5)三级胺取代基的氧化转化。

关键词 三级胺;氧化;过渡金属催化反应;去甲基化;酰胺

Progress in the Transition-Metal Catalyzed Oxidation of Tertiary Amines

Li, Yuanming Ma, Lina Li, Zhiping*

(Department of Chemistry, Renmin University of China, Beijing 100872)

Abstract The oxidation of tertiary amines is an important process in nature. In chemistry, organic chemists have made great efforts to study on the simulation of enzymatic function of oxidation with transition metal catalyst. It provides us new and efficient protocols for the synthesis of nitrogen compounds. The catalytic reactions also enhance our understanding of the mechanism of the oxidation of tertiary amines in living system. During this decade, significant progress has been made in the transition metal catalyzed oxidation of tertiary amines. This review is summarized by five types of oxidative transformation of tertiary amines: (1) synthesis of *N*-oxides of tertiary amines; (2) oxidative Mannich reaction of tertiary amines; (3) oxidative demethylation of tertiary amines; (4) oxidative amidation of tertiary amines; (5) oxidative transformation of the substituents of tertiary amines.

Keywords tertiary amine; oxidation; transition-metal catalysis; demethylation; amide

三级(叔)胺的氧化是自然界中最基本的反应之一,在生命过程中起着重要的作用。例如,细胞色素P450催化的 *N*-去甲基化反应可使化合物的功能激活或者失活,与生命体新陈代谢中某些生理和病理作用息息相关^[1]。因此,三级胺的氧化过程引起了生物化学家的极大兴趣。由于三级胺是含氮化合物的重要来源,三级胺的氧化反应同样受到了有机化学家的广泛关注。

近十年,过渡金属催化的三级胺氧化反应取得了一系列重要的进展^[2]。根据三级胺的氧化转化途径可以分为以下五种类型(Scheme 1): (1)三级胺中氮原子的氧化

(类型 I); (2)氧化 Mannich 反应(类型 II)^[3]; (3)三级胺的氧化去甲基化(类型 III)^[4]; (4)三级胺的氧化酰胺化反应(类型 IV)^[5]; (5)三级胺取代基的氧化转化(类型 V)^[6]。本文将按照以上的反应类型,对近年来三级胺氧化反应的重要研究进展进行概述。

1 三级胺的氧化形成氧化胺

自1892年氧化胺第一次被报道^[7]至今,氧化胺的化学已有百年的历史。氧化胺可以作为氧化剂用于各种氧化反应,例如,钨催化的烯烃的双羟基化^[8],钌催化的

* E-mail: zhipingli@ruc.edu.cn

Received January 25, 2013; revised March 19, 2013; published online March 22, 2013.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21072223, 21272267), the Fundamental Research Funds for the Central Universities, and the Research Funds of Renmin University of China (No. 10XNL017).

国家自然科学基金(Nos. 21072223, 21272267)、中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目成果(No. 10XNL017)资助项目。

Scheme 1

醇的氧化^[9], 以及卤代烃转化为醛^[10]等等. 氧化胺还是一种多功能弱阳离子表面活性剂, 具有极低的生理毒性, 广泛应用于餐洗、化妆品、纺织助剂及医药等领域^[11]. 氧化胺也可以作为前驱体, 通过 Cope 消除^[12]、重排等^[2b, 13]得到一些其它方法难于制备的化合物. 另外, 手性的氧化胺还能作为配体, 实现一些不对称反应^[14].

以双氧水为氧化剂, 通过三级胺的氧化反应是合成氧化胺最常用的方法^[12,15]。但是, 三级胺氧化反应的选择性和反应性一直是该研究领域具有挑战性的问题^[16]。研究者们发现过渡金属可以有效地提高三级胺氧化反应反应速率, 并控制氧化反应的选择性^[17]。2005 年, Punniyamurthy 课题组^[17a]将钒固载于硅胶制成可重复使用的催化剂, 与双氧水配合, 可以实现三级胺的绿色、高效、高选择性的生成氧化胺(Eq. 1)。

另外, 过酸^[18]、3-苯基-2-苯基磺酰基-1,2-氧氮杂环丙烷^[19]、过氧化酮^[20]等^[2b]也是三级胺氧化反应中的重要和高效的氧化剂. 氧气毫无疑问是最理想的氧化剂^[21]. 2002 年, Sain 课题组^[22]使用简单的 $\text{RuCl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}/\text{O}_2$ 体系, 以 1,2-二氯乙烷为溶剂, 可以高效的得到氧化胺产物. 该反应的机理一般被认为是, $\text{RuCl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 和 O_2 能形成高价钌的氧化物种^[23], 随后氧转移至氮上, 形成氧化胺 (Eq. 2).

2 三级胺的氧化 Mannich 反应

Mannich 反应是合成含氮天然产物和活性药物分子的重要反应之一. 在 Mannich 反应中, 胺与醛首先发生缩合反应形成亚胺或者亚胺正离子中间体, 进而与亲核

试剂反应得到 Mannich 产物. 形成亚胺或者亚胺正离子中间体是实现 Mannich 反应的关键步骤. 尽管利用 α -取代基的消除反应也可以得到亚胺正离子, 但是通过三级胺的氧化反应是最直接的一种方法(Scheme 2)^[24]. 研究者们成功发展了以钕、铜、铁、钼和钒等过渡金属为催化剂, 以氧气、过氧叔丁醚、过氧叔丁醇等为氧化剂的催化氧化体系来实现氧化 Mannich 反应. 该部分的研究进展将以亲核试剂的不同进行分类阐述.

Scheme 2

2.1 氰化物作为亲核试剂

2003 年, Murahashi 课题组^[25]也是利用 $\text{RuCl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}/\text{O}_2$ 体系, 但当这个体系中加入 NaCN 时, 并不能得到氧化胺产物, 而是直接实现了芳香三级胺氮邻位的氰基化 (Eq. 3). 亲核试剂的加入, 改变了反应的路径. 该体系实现了氰基负离子对亚胺正离子的捕捉, 得到 $\text{C}-\text{C}$ 键的直接偶联的 Mannich 产物. 不足的是, 由于该反应体系必须使用乙酸, 所以在这个体系中会原位产生剧毒的氢氰酸. 因此, 对氰基源的反应探索也是一个重要方面. 2009 年, Ofial 课题组^[26]使用 TMSCN 为氰基源^[27], 利用 $\text{FeCl}_2/\text{TBHP}$ 的氧化体系, 甲醇为溶剂, 既避免了氢氰酸的产生, 也实现了三级胺氮邻位的氰基化. 2012 年, Nageswar 课题组^[28]采用更加安全、便宜的氰基甲酸乙酯作为氰基源, 也能高效的得到三级胺氰基化的产物.

2.2 富电子芳环作为亲核试剂

李朝军课题组^[3]在氧化 Mannich 反应研究领域也做了一系列创新性的研究工作. 2005 年, 他们^[29]发现, 在 CuBr/TBHP 的体系下, 吡啶的 C(3)位能选择性地与四氢异喹啉底物发生 C—C 键氧化偶联反应, 以中等到优秀的收率得到 Mannich 产物(Eq. 4). 值得注意的是, 当吡啶 C3 位带有取代基时, 反应能选择性地得到吡啶 C(2)位的偶联产物. 此外, 吡啶苯环上的取代基对该反应的活性并没有明显的影响. 该反应的局限性在于活性较低的 *N,N*-二甲基苯胺类衍生物转化率较低^[30]. 支志明课题组^[31]使用钌卟啉配合物/TBHP 的催化氧化体系, 可以很好的解决这个问题. 在该课题组进一步的研究中发现, 与钌同一副族的铁与三联吡啶形成的配合物也能高效催化该类型的反应^[32].

2009 年, Itami 课题组^[33]使用 FeCl₂·4H₂O 为催化剂, 联吡啶为配体, 吡啶氮氧化物为氧化剂, 实现了富电子杂芳烃与含甲基三级胺的氧化偶联, 以中等收率得到了目标产物. 值得注意的是, 在该催化氧化体系下, 分子内氧化偶联反应也能顺利实现. 这在合成氮杂七元环骨架化合物中具有一定的合成价值和意义(Eq. 5). 但该反应条件苛刻, 底物范围窄. 2011 年, 张玉红课题组^[34]发展的 CuBr/O₂ 体系, 则在温和的条件下高效地实现了吡啶类、咪唑类和吡咯等杂环化合物与三级胺的氧化偶联.

2.3 炔和烯烃作为亲核试剂

炔丙胺是合成含氮化合物的重要中间体, 高效地实现炔丙胺的合成一直是具有挑战性的工作之一. 2004 年, 李朝军课题组^[35]首次在 CuBr/TBHP 体系下, 实现了三级胺和炔烃的交叉脱氢偶联, 得到炔丙胺类产物(Eq. 6). 该体系只对芳香三级胺和芳香炔烃有较好的适用性. 2008 年, 付华课题组^[36]利用 CuBr/NBS 体系, 解决了活性低的脂肪三级胺和炔的氧化偶联反应. 2009 年, 在 Vogel 课题组^[37]发现的 FeCl₂/(*t*-BuO)₂ 体系中, 脂肪炔可

以顺利地得到 C—C 键的交叉脱氢偶联产物, 并且实现对位阻小的氮邻位的选择性官能团化.

四氢异喹啉 C(1)手性碳的合成是天然产物分子以及药物分子合成中的一个重要反应. 基于 Eq. 6 的反应, 李朝军课题组报道了第一例不对称交叉脱氢偶联(CDC)反应(Eq. 7)^[38]. 当使用 *N*-芳基四氢异喹啉为反应底物, 三氟甲磺酸亚铜为催化剂, 采用具有 C(2)轴对称的手性噁唑啉为配体时, 以中等的对映选择性实现了具有 C(1)手性碳的四氢异喹啉衍生物的合成. 王锐课题组^[39]在以氧气为氧化剂的体系下, 使用三氟甲磺酸铜和有机小分子协同催化, 高对映选择性地实现了四氢异喹啉 C(1)位的不对称烯基化.

2010 年, Kumaraswamy 课题组^[40]在 FeCl₃·6H₂O/T-HYDRO 体系中, 首次实现了烯丙基与三级胺的氧化偶联反应. 当使用手性四氢吡咯做反应底物时, 可以高非对映选择性得到氧化偶联产物(Eq. 8).

2.4 烯醇硅醚及酮作为亲核试剂

含丁内酯骨架的天然产物广泛存在于自然界中, 丁内酯骨架是天然产物结构中的重要组成部分. 据统计,

在 10% 的已知天然产物中都含有丁内酯骨架. 2004 年, Doyle 课题组^[24]使用 $[\text{Rh}_2(\text{cap})_4]/\text{TBHP}$ 体系, 以芳香三级胺和硅烷氧基呋喃为底物, 甲醇为溶剂, 实现了含有三级胺的 γ -丁内酯衍生物的合成(Eq. 9). 当采用不对称三级胺为底物时, 反应选择性的反应在甲基上. 张玉红课题组^[41]和卿凤翎课题组^[42]分别使用三甲基硅基保护的酮, 在 CuBr/TBHP 体系下, 也能实现对芳香三级胺的氧化交叉偶联反应.

2009 年, 郭灿城课题组^[43]首次实现了未被保护的甲基酮与三级胺的氧化交叉偶联反应(Eq. 10). 该研究采用 CuI/O_2 体系, 乙酸和分子筛为添加剂. 研究发现, 氧化剂在该体系中具有显著影响. 当采用丙酮作为亲核试剂时, TBHP 和 O_2 分别为氧化剂时, 可以取得 63% 和 68% 的收率. 但当采用 2-丁酮作为亲核试剂时, 加入 TBHP 的反应体系并不能得到偶联产物. 作者认为可能的原因为: 在氧气的存在下, 体系中可能产生高活性的铜胺络合物. 2010 年, 黄志真课题组^[44]采用二级胺活化酮的策略, 在 CuBr/TBHP 体系下, 使三级胺的底物扩展至 N,N -二甲基苯胺的衍生物, 得到了较高收率的目标产物.

2.5 含活性氢化合物作为亲核试剂

2005 年, 李朝军课题组^[3c]实现了三级胺和硝基甲烷的交叉脱氢偶联反应(Eq. 11). 以 CuBr/TBHP 为催化体系, 在室温条件下, 四氢异喹啉和硝基甲烷偶联得到一系列 β -硝基胺衍生物. 这些产物可以方便的还原成 1,2-二胺, 这类物质在药物化学和不对称催化方面具有重要作用^[45]. 当使用 N,N -二甲基苯胺为底物时, 由于生成了去甲基化产物和一些未知的副产物, 产率只有 30%; 但是当使用对位取代的 N,N -二甲基苯胺时, 反应效率则大大提高. 其原因可能与三级胺的氧化活性有关. 2007 年, 李朝军课题组^[46]发现在 CuBr/O_2 的条件下,

以水为溶剂, 升高温度至 60 度, 四氢异喹啉与硝基甲烷反应也能得到优秀的收率. 并且在此条件下, 二烷基丙二酸酯也可以作为良好的亲核试剂与四氢异喹啉反应, 得到 C—C 偶联产物.

2.6 杂原子作为亲核试剂

早在 1988 年, Murahashi 小组^[47]就报道了在 $\text{RuCl}_2(\text{PPh}_3)_3/\text{TBHP}$ 体系下, 以苯作为溶剂, 芳香三级胺与 TBHP 反应高效地得到了过氧化物(Eq. 12). TBHP 在这个反应不仅是氧化剂, 也是亲核试剂.

2009 年, 李朝军课题组^[48]利用 CuBr/O_2 催化氧化体系, 成功实现了芳香三级胺氮邻位的磷酸化(Eq. 13). 该反应的不足之处在于反应底物仅局限于 N -芳基四氢异喹啉衍生物. 同年, Ofial 课题组^[49]利用 $\text{FeCl}_2/\text{TBHP}$ 催化氧化体系, 以甲醇为溶剂, 实现了 N,N -二甲基苯胺和亚磷酸二酯的 C—P 氧化交叉偶联反应.

2007 年, 付华和赵玉芬课题组^[50]使用酰胺作为亲核试剂, 实现了 C—N 键的氧化交叉偶联反应(Eq. 14). 研究发现, 在 CuBr/TBHP 的催化氧化体系下, 当 N -甲基- N -苄基苯胺作为底物时, 脱苄基产物为主要产物.

2.7 机理研究

氧化 Mannich 反应一般包含两个步骤^[51], 首先, 氧

化剂在催化剂的作用下,将三级胺氧化成亚胺正离子;随后亲核试剂进攻亚胺正离子得到偶联产物.基于这些研究结果,可能的反应机理大致可以归纳为以下通式(Scheme 3).

Scheme 3

对于反应中间体的捕捉是机理研究的关键.多个课题组通过对中间体的设想和捕捉推测出机理. Doyle 课题组^[24]推测在 $\text{Rh}_2(\text{cap})_4/\text{TBHP}$ 体系中,当以质子性溶剂甲醇作为溶剂时,可以检测到甲醇与亚胺正离子的加成物.推测在反应体系中,甲醇会与硅烷氧基呋喃一起竞争亚胺正离子(Scheme 4). 支志明课题组^[31]在 Ru/TBHP 催化的体系中,以非质子性溶剂甲苯为溶剂时,则检测到了过氧叔丁基与亚胺正离子的加成产物,并且在这个体系下,该加成产物能转化成产物(Scheme 4).但是,并没有动力学数据可以证明这个过氧化物是中间体.在 Klusmann 课题组^[52]的工作中,以 CuBr/TBHP 为催化体系,无溶剂反应,亦得到了过氧化物 **2**,经过对反应过程的检测,可以证明过氧化物 **2** 是产物的中间体(Scheme

4). 并且,过氧化物 **2** 可以看作亚胺正离子的“储存库”,在反应过程中缓慢释放出亚胺正离子,再与硝基甲烷反应得到最终产物.在李朝军课题组^[3c]以 CuBr/TBHP 为催化体系中的研究工作中,则提出假设铜与亚胺正离子络合形成中间体的假设(Scheme 4).

2013 年, Doyle 课题组^[51]对以过渡金属为催化剂, TBHP 为氧化剂的 N,N -二甲基苯胺的氧化 Mannich 反应机理做了详细的研究(Scheme 5). Doyle 认为过渡金属($\text{Rh}_2(\text{cap})_4$, RuCl_3 , CuBr , FeCl_3 等)首先将过氧叔丁醇转化为过氧叔丁基自由基. N,N -二甲基苯胺在过氧叔丁基的氧化下,经历了一个可逆的单电子转移的过程失去一个电子.生成的过氧叔丁醇负离子再将该自由基阳离子脱去一个质子,得到 α -氨基自由基.再经过一次的单电子转移得到亚胺正离子,随即被具有亲核性质的溶剂或者是 TBHP 捕捉.得到的中间体作为亚胺离子的“储存库”,来实现亲核试剂与三级胺的氧化偶联.作者通过一系列的动力学实验,证明了这个过程的合理性.

从以上的反应中,我们可以看到很多催化体系都能实现三级胺的氧化 Mannich 反应.在这些催化体系中,包含 Ru , Rh , Cu , Fe , Mo 等过渡金属催化剂;氧化剂则可以使用氧气、过氧叔丁醚、过氧叔丁醇等.当过氧叔丁醇作为氧化剂时,常常能以比较温和的条件得到较高

Scheme 4

Scheme 5

产率的目标产物. 使用这些催化体系, 成功的实现了氰化物、富电子芳环、炔和烯、酮、硝基甲烷、磷酸等亲核试剂与三级胺的交叉偶联. 其中, 铜盐和过氧叔丁醇的催化氧化体系适用于大部分亲核试剂与四氢异喹啉的交叉偶联. 但是当底物为活性较低的 *N,N*-二烷基苯胺衍生物时, 并没有一个比较通用的体系来实现它与大部分亲核试剂的交叉偶联. 因此, 寻找一些普适性好、活性高的催化氧化体系仍然是该研究领域未来发展的重要研究方向. 最近, 一些新型的普适性好的非金属催化的氧化体系^[53]已有报道.

3 三级胺的氧化去甲基化反应

N-甲基三级胺的去甲基化是指通过化学或生物化学反应从 *N*-甲基三级胺分子中移出甲基基团的过程. 三级胺的去甲基化反应的研究近年来受到人们广泛的关注^[54], 其原因在于这类反应与酶催化脱甲基化反应有关; 并且还可以作为细胞色素 P-450 氧化的模板反应来进行研究. *N,N*-二甲基苯胺的氧化去甲基反应可通过化学氧化, 电化学氧化^[55]和光反应^[56]来实现. 就生物方面来讲, 由于 DNA 甲基化状态的改变可导致基因结构和功能异常, 故去甲基化的研究有助于调整基因结构, 使失去某些生理机能的人恢复正常. 生命新陈代谢过程中的 *N*-甲基胺的去甲基化是高效和高选择性的. 但是, 在化学反应中, 实现高效、高选择性的 *N*-甲基胺的去甲基化并不容易. 一般要实现三级胺的 C—N 键的断裂有两种策略: (1)通过高价金属氧化物(M=O)的氧化^[57]; (2)通过低价过渡金属的催化氧化^[47,58].

1988 年, Murahashi 课题组^[47]在 $\text{RuCl}_2(\text{PPh}_3)_3/\text{TBHP}$ 的催化氧化体系下, 以苯作为溶剂, 三级胺首先与 TBHP 交叉偶联得到过氧化物. 然后, 将过氧化物投入到盐酸溶液中就能得到去甲基化产物. 该反应的收率较高. 当底物为不对称三级胺时, 选择性的氧化 *N*-CH₃ (Scheme 6). 1992 年, Murahashi 课题组^[58c]以甲醇作为溶剂时, 在 $\text{RuCl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2\text{O}_2$ 的体系下, 得到了甲醇与三级胺的交叉偶联产物. 同样的, 在酸性条件下, 该产物也能转化为二级胺.

Scheme 6

1989 年, Miura 课题组^[57e]发现在铁盐/ O_2 的条件下, 以乙腈为溶剂, *N,N*-二甲基苯胺能被 O_2 氧化为 *N*-甲基苯胺、*N*-甲基甲酰胺等(Scheme 7). 研究发现, 不同催化剂对各种反应产物的比例影响较大. 另外, 该课题组还发现在这个体系中加入 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)时, 当以 FeCl_3 为催化剂时, 对产率影响很小; 然而当采用 $[\text{Fe}(\text{salen})]\text{OAc}$ 为催化剂时, 反应则完全被抑制. 作者通过分子内的动力学同位素效应, 推测当使用 FeCl_3 为催化剂时, *N,N*-二甲基苯胺通过单电子转移得到自由基阳离子 **3**, 再失去一个质子, 得到 α -氨基自由基 **4**(路径 a 和 c). 而采用 $[\text{Fe}(\text{salen})]\text{OAc}$ 为催化剂时, *N,N*-二甲基苯胺直接通过氢原子的攫取得到 α -氨基自由基 **4**(路径 b). 该反应的缺点是不能得到单一的去甲基化产物. 2011 年, 支志明课题组^[57a]报道了使用铁和低聚吡啶配合物作为催化剂, 以过硫酸氢钾为氧化剂, 能高选择性的实现了脂肪和芳香三级胺的去甲基化.

2013 年, 付雪峰课题组^[4]利用铈卟啉和氧气的体系, 以水为溶剂, 不仅能实现芳香三级胺的去烷基化, 而且对脂肪三级胺也有很好的适用. 值得注意的是, 当三级胺为不对称三级胺时, C—N 键的断裂更倾向于大基团的离去(Scheme 8). 该反应的机理大致是三级胺被 (TSPP)Rh(III) 氧化, 形成了亚胺正离子的中间体, 催化剂自身被还原成 (TSPP)Rh(I). 亚胺正离子再经过水解得到二级胺. 最后, 氧气将 (TSPP)Rh(I) 氧化成 (TSPP)-Rh(III), 再生催化剂.

4 三级胺的氧化酰胺化反应

在天然产物、药物和精细化工品的合成过程中, 酰胺键的形成占有非常重要的地位. 最常见的酰胺的合成方法是通过活化试剂将羧酸和一级、二级胺缩合得到酰

Scheme 7

Scheme 8

胺. 三级胺作为底物来参与酰胺形成的反应目前还是很少报道. 含 *N*-甲基的三级胺广泛存在于天然产物之中, 通过 *N*-甲基的去甲基化/酰胺化反应是酰胺键合成中一个具有挑战性的研究课题. 1927 年, Polonovski 报道了生物碱的氮氧化物在乙酸酐或乙酰氯的条件下, 可以得到 C—N 键断裂, 并被乙酰基取代的产物. 随后几十年, 这个方法都作为三级胺去甲基化的最优方法. 本反应的缺点是需要先将三级胺氧化成 *N*-氧化物, 分离纯化后再进行去烷基化酰胺化反应.

1992 年, Miura 课题组^[59]报道了一步直接将三级胺转化为去甲基化乙酰化的产物的方法(Eq. 15). 在 5 mol% CoCl_2/O_2 的条件下, 以乙腈为溶剂, 4 位取代的 *N,N*-二甲基苯胺和乙酸酐反应, 可以生成去甲基酰胺化的产物和 *N*-烷基苯甲酰胺 **5**. 0.2 mol% 的 CoCl_2 也能很好的催化该反应. 并且 CuCl/O_2 体系也可以催化该反应发生. 值得注意的是, 虽然有报道 FeCl_3/O_2 体系^[57e]能将 *N,N*-二甲基苯胺去甲基化, 但是当采用 5 mol% FeCl_3/O_2 的体系, 却抑制了该反应的发生. 该反应的不足之处是 *N*-烷基苯甲酰胺 **5** 总是伴随产生, 氧化的化学选择性不好. 并且酸酐和三级胺的底物范围较窄. 作者通过同位素效应的实验, 推测反应的中间体也是亚胺正离子.

2008 年, Hudlicky 课题组^[60]报道了 $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ 催化的吗啡和莨菪烷类生物碱的去甲基化酰胺化反应(Eq. 16).

使用 20 mol% 的 $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ 为催化剂, 以酸酐和二氧六环为混合溶剂, 可以得到去甲基酰胺化的产物(直立键和平伏键两种异构体). 不足之处是位阻大的酸酐为底物时, 产物收率低. 托品酮衍生物在这个体系下, 也能以较好的产率得到去甲基酰胺化的产物.

作者提出可能的机理是三级胺被 $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ 氧化成亚胺正离子 **6**, 乙酸根亲核进攻 **6** 得到加成产物 **7**; **7** 再经过一系列的反应得到 **8**, 最终还原消除得到最终产物 (Scheme 9). 在随后的工作中^[61], 该课题组成功将该方法应用于强效镇痛药丁丙诺啡(Buprenorphine)的合成.

Scheme 9

2013 年, 李志平课题组^[5]在 $\text{FeCl}_2/\text{TBHP}$ 体系下, 首次实现了醛和三级胺的去甲基酰胺化反应(Eq. 17). 通过采用 *N,N*-二甲基苯胺和丁醛作为模板底物, 经过一系列的条件筛选, 发现在 10 mol% FeCl_2 的催化下, 以 3 equiv. 的 TBHP 为氧化剂, 5 equiv. 丁醛为捕捉剂, 乙腈为溶剂, 85 °C 反应 1 h 可以得到 90% 的去甲基丁酰化产物. 醛和三级胺的普适性较好, 三级胺可以是 *N,N*-二甲基苯胺的衍生物, 也可以是脂肪的三级胺; 脂肪醛和芳香醛作为底物, 也能高效的转化为产物.

当采用不对称三级胺为底物时, 氧化的选择性不佳. 但是, 反应更倾向于去甲基和去苄基(Eq. 18).

通过 ^1H NMR 对反应过程的检测和一系列的对照实验, 我们推测可能的反应机理(Scheme 10): 首先, 在 $\text{FeCl}_2/\text{TBHP}$ 的共同作用下, 形成 α -氨基自由基 **9**, **9** 和过氧叔丁基自由基可能由于稳态自由基效应(persistent radical effect)^[62]而结合成过氧化物 **10**. **10** 可以分离得到, 并且在反应过程的核磁检测中, 可以发现 **10** 在反应过程中都能保持一定的浓度. 因此我们得出 **10** 可能是反应过程的中间体. **10** 可以可逆的形成亚胺正离子和过氧叔丁基负离子, 亚胺正离子再被反应过程中生成的水捕捉而得到醛和二级胺(该三级胺的去烷基化反应也可以用于 *N*-芳基化反应^[63]). 生成的微量二级胺(在 ^1H NMR 中未被检测到)迅速与大大过量的醛形成化合物 **11**, 最后在铁的催化下被氧化成酰胺. 本反应的关键就是三级胺需要缓慢释放出二级胺. 因此, 当在标准条件下, 用 *N*-甲基苯胺与丁醛反应只能得到 26% 的产率; 而在相同条件下, 采用注射泵将 *N*-甲基苯胺在 1 h 内注入体系, 产率能提高至 71%.

5 三级胺取代基的氧化转化

2009 年, 李志平课题组^[6b]在 $\text{Fe}(\text{CO})_9/\text{TBHP}$ 的体系

下, 研究杂原子邻位 C—H 键氧化活化中发现, 1 equiv. 苯甲酰基乙酸乙酯和 10 equiv. *N,N*-二甲基苯胺作为底物, 可以得到 47% 的交叉偶联产物, 同时还有 37% 的亚甲基桥联的双 1,3-二羰基化合物 **12** (Eq. 19). 将 *N,N*-二甲基苯胺的量降到 1 equiv. 时, 反应体系只生成了桥联的产物. 研究发现, 芳香环上带有吸电子基团的 *N,N*-二甲基苯胺为底物时, 反应产率降低^[57d]. 含 *N*-甲基的脂肪三级胺为底物时, 也具有一定的收率.

可能的反应机理为(Scheme 11): **13** 和 **14** 在铁催化的氧化体系下先生成氧化偶联的 Mannich 产物 **15**; 然后, 二羰基化合物 **13** 对 **15** 亲核取代得到产物; 或者是 **15** 经过 Cope 消除得到中间体 **16**, 再发生 Michael 加成得到最终产物. 当然, 我们也不能排除二羰基化合物与 *N,N*-二甲基苯胺氧化产生的甲醛发生反应得到最终产物的可能.

在进一步研究其它三级胺的氧化反应中, 依然在 $\text{Fe}(\text{CO})_9/\text{TBHP}$ 的体系下. 李志平课题组发现, 当使用三乙胺和 β -羰基乙酸酯作为反应底物时, 反应得到了 β -取代的醛 **17** (Eq. 20)^[64].

Scheme 10

Scheme 11

为了探索反应机理,李志平课题组^[64]将苯甲酰乙酸乙酯、乙醛和二乙胺作为底物,在无氧化剂的条件下,反应体系中得到了 69% 的标准产物(Scheme 12).

结合之前的研究成果,作者推测在铁催化氧化体系下,三乙胺首先被氧化成亚胺正离子,亚胺正离子经过水解得到乙醛和二甲胺.接下来有两种途径(Scheme 13): (1)路径 a: 两分子乙醛通过羟醛缩合得到 **21**, 苯甲酰乙酸乙酯 **20** 进攻 **21** 得到 Michael 加成的产物. (2)路径 b: **22** 和 **23** 通过缩合,再发生 Michael 加成得到最终产物.

2012 年,李建新课题组在 CuCl_2/O_2 体系^[6a]下,也成功的使用脂肪的三级胺——四甲基乙二胺(TMEDA)作

为碳源,高效、区域选择性地合成了二吲哚甲烷 **25**, 3-甲酰基吲哚的衍生物 **26** (Scheme 14)和二苯基甲烷 **27** (Eq. 21). 该反应使用简单的碳酸钾就能控制不同产物的生成. 底物的电子效应在这个反应体系中起了很大作用,吸电子的基团明显降低了底物在此体系中的活性.

通过一系列的实验研究,作者提出了如下的反应机理(Scheme 15): 首先, CuCl_2 与 TMEDA 配位形成络合物 **28**; **28** 被氧化成亚胺正离子 **29**. 随即原位生成甲醛,在 CuCl_2 的催化下与两分子的吲哚反应生成 **25**. 当体系中有碱存在时,路径 b 被阻止,吲哚作为亲核试剂进攻亚胺正离子 **29**,再经过氧化得到最终产物 **26**. 成江课题组^[65]对吲哚和 TMEDA 反应生成 3-甲酰化吲哚的反应也提出了类似机理. 苏伟平课题组^[66]使用 $\text{RuCl}_3/\text{TBHP}$ 体系,吲哚和三级胺也能得到吲哚 3 位甲酰化的产物,该反应也可以使用二级胺作为反应底物.

Scheme 12

Scheme 13

Scheme 14

Scheme 15

6 总结与展望

本文总结了近年来过渡金属催化三级胺氧化反应的一些重要研究结果和进展。通过有机化学家们的不断努力,三级胺的氧化研究得到了迅猛发展,不仅反应的类型越来越丰富,而且对机理的研究也越来越深入。亚胺正离子作为一个关键的中间体,被催化体系控制着其随后反应的途径。在催化氧化体系的发展过程中,以钯、铜、铁等金属为催化剂,以过氧叔丁醇、过氧叔丁醚、氧气等为氧化剂的催化氧化体系得到长足的发展。但是,在三级胺的氧化研究中仍然存在一些挑战性的问题。首先,已有的大多数催化剂只能用于简单三级胺的氧化反应,应用范围较窄。因此,寻找普适性好、环境友好、活性高的催化剂仍然是该研究领域未来发展的重要研究内容和方向。其次,尽管氧气可以用于一些三级胺的氧化反应,但是,大多数反应的选择性不好,所以如何有效提高氧气作为氧化剂在反应中的选择性是一项更具挑战性的研究课题。另外,探索三级胺氧化反应的新途径以及反应机理也同样是该研究领域中有意义和有挑战性的研究内容。

References

- [1] (a) Meunier, B.; de Visser, S. P.; Shaik, S. *Chem. Rev.* **2004**, *104*, 3947.
(b) Ortiz de Montellano, P. R. *Cytochrome P-450, Structure, Mechanism, and Biochemistry*, 2nd ed., Plenum Press, New York, **1995**.
(c) Dawson, J. H.; Sono, M. *Chem. Rev.* **1987**, *87*, 1255.
- [2] (a) Scheuermann, C. J. *Chem. Asian J.* **2010**, *5*, 436.
(b) Bernier, D.; Wefelscheid, U. K.; Woodward, S. *Org. Prep. Proced. Int.* **2009**, *41*, 173.
(c) Murahashi, S.-I.; Zhang, D. *Chem. Soc. Rev.* **2008**, *37*, 1490.
(d) Murahashi, S.-I. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1995**, *34*, 2443.
(e) Li, C.-J.; Li, Z. *Pure Appl. Chem.* **2006**, *78*, 935.
- [3] (a) Guo, X. W.; Li, Z.; Li, C.-J. *Prog. Chem.* **2010**, *22*, 1434.
(b) Li, C.-J. *Acc. Chem. Res.* **2009**, *42*, 335.
(c) Li, Z.; Li, C.-J. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 3672.
- [4] Ling, Z.; Yun, L.; Liu, L.; Wu, B.; Fu, X. *Chem. Commun.* **2013**, DOI: 10.1039/c2cc37263k.
- [5] Li, Y.; Jia, F.; Li, Z. *Chem. Eur. J.* **2013**, *19*, 82.
- [6] (a) Zhang, L.; Peng, C.; Zhao, D.; Wang, Y.; Fu, H.-J.; Shen, Q.; Li, J.-X. *Chem. Commun.* **2012**, *48*, 5928.
(b) Li, H. J.; He, Z. H.; Guo, X. W.; Li, W. J.; Zhao, X. H.; Li, Z. *Org. Lett.* **2009**, *11*, 4176.
- [7] Pinner, A.; Wolfenstein, R. *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **1892**, *25*, 1428.
- [8] Schroeder, M. *Chem. Rev.* **1980**, *80*, 187.
- [9] Griffith, W. P.; Ley, S. V.; Whitcombe, G. P.; White, A. D. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1987**, 1625.
- [10] Godfrey, A. G.; Ganem, B. *Tetrahedron Lett.* **1990**, *31*, 4825.
- [11] Ping, L.; Li, L.; Ping, L. *Deterg. Cosmet.* **2005**, *28*, 19 (in Chinese). (李萍, 李丽, 杨旭, 日用化学品科学, **2005**, *28*, 19.)
- [12] Cope, A. C.; Ciganek, E. *Org. Synth.* **1963**, *4*, 612.
- [13] Albini, A. *Synthesis* **1993**, 263.
- [14] Malkov, A. V.; Kočovský, P. *Eur. J. Org. Chem.* **2007**, 29.
- [15] VanRheenen, V.; Cha, D. Y.; Hartley, W. M. *Org. Synth.* **1988**, *6*, 342.
- [16] Wenkert, D.; Angell, E. C.; Chen, T.-F.; Ramachandran, K. *Synth. Commun.* **1990**, *20*, 447.
- [17] (a) Rout, L.; Punniyamurthy, T. *Adv. Synth. Catal.* **2005**, *347*, 1958.
(b) Choudary, B. M.; Bharathi, B.; Reddy, C. V.; Kantam, M. L.; Raghavan, K. V. *Chem. Commun.* **2001**, 1736.
- [18] (a) Kluge, R.; Schulz, M.; Liebsch, S. *Tetrahedron* **1996**, *52*, 5773.
(b) Mosher, H. S.; Turner, L.; Carlsmith, A. *Org. Synth.* **1963**, *4*, 828.
- [19] Zajac, W. W.; Walters, T. R.; Darcy, M. G. *J. Org. Chem.* **1988**, *53*, 5856.
- [20] Ferrer, M.; Sánchez-Baeza, F.; Messeguer, A. *Tetrahedron* **1997**, *53*, 15877.
- [21] Jain, S. L.; Sain, B. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2003**, *42*, 1265.
- [22] Jain, S. L.; Sain, B. *Chem. Commun.* **2002**, 1040.
- [23] Naota, T.; Takaya, H.; Murahashi, S.-I. *Chem. Rev.* **1998**, *98*, 2599.
- [24] Catino, A. J.; Nichols, J. M.; Nettles, B. J.; Doyle, M. P. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 5648.
- [25] (a) Murahashi, S.-I.; Nakae, T.; Terai, H.; Komiya, N. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 11005.
(b) Murahashi, S.-I.; Komiya, N.; Terai, H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2005**, *44*, 6931.
(c) Murahashi, S.-I.; Komiya, N.; Terai, H.; Nakae, T. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, *125*, 15312.
- [26] Han, W.; Ofial, A. R. *Chem. Commun.* **2009**, 5024.
- [27] (a) Alagiri, K.; Prabhu, K. R. *Org. Biomol. Chem.* **2012**, *10*, 835.
(b) Zhang, Y.; Peng, H.; Zhang, M.; Cheng, Y.; Zhu, C. *Chem. Commun.* **2011**, *47*, 2354.
- [28] Reddy, K. H. V.; Satish, G.; Reddy, V. P.; Kumar, B. S. P. A.; Nageswar, Y. V. D. *RSC Adv.* **2012**, *2*, 11084.
- [29] Li, Z.; Li, C.-J. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 6968.
- [30] (a) Baslé, O.; Borduas, N.; Dubois, P.; Chapuzet, J. M.; Chan, T.-H.; Lessard, J.; Li, C.-J. *Chem. Eur. J.* **2010**, *16*, 8162.
(b) Dombrowski, G. W.; Dinnocenzo, J. P.; Zielinski, P. A.; Farid, S.; Wosinska, Z. M.; Gould, I. R. *J. Org. Chem.* **2005**, *70*, 3791.
- [31] Wang, M.-Z.; Zhou, C.-Y.; Wong, M.-K.; Che, C.-M. *Chem. Eur. J.* **2010**, *16*, 5723.
- [32] Liu, P.; Zhou, C.-Y.; Xiang, S.; Che, C.-M. *Chem. Commun.* **2010**, *46*, 2739.
- [33] Ohta, M.; Quick, M. P.; Yamaguchi, J.; Wunsch, B.; Itami, K. *Chem. Asian J.* **2009**, *4*, 1416.
- [34] Huang, L.; Niu, T.; Wu, J.; Zhang, Y. *J. Org. Chem.* **2011**, *76*, 1759.
- [35] Li, Z.; Li, C.-J. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, *126*, 11810.

- [36] Niu, M.; Yin, Z.; Fu, H.; Jiang, Y.; Zhao, Y. *J. Org. Chem.* **2008**, 73, 3961.
- [37] Volla, C. M. R.; Vogel, P. *Org. Lett.* **2009**, 11, 1701.
- [38] (a) Li, Z.; MacLeod, P. D.; Li, C.-J. *Tetrahedron: Asymmetry* **2006**, 17, 590.
(b) Li, Z.; Li, C.-J. *Org. Lett.* **2004**, 6, 4997.
- [39] (a) Zhang, G.; Ma, Y.; Wang, S.; Zhang, Y.; Wang, R. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, 134, 12334.
(b) Zhang, G.; Zhang, Y.; Wang, R. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, 50, 10429.
- [40] Kumaraswamy, G.; Murthy, A. N.; Pitchaiah, A. *J. Org. Chem.* **2010**, 75, 3916.
- [41] Huang, L.; Zhang, X.; Zhang, Y. *Org. Lett.* **2009**, 11, 3730.
- [42] Chu, L.; Zhang, X.; Qing, F.-L. *Org. Lett.* **2009**, 11, 2197.
- [43] Shen, Y.; Li, M.; Wang, S.; Zhan, T.; Tan, Z.; Guo, C.-C. *Chem. Commun.* **2009**, 953.
- [44] Yang, F.; Li, J.; Xie, J.; Huang, Z.-Z. *Org. Lett.* **2010**, 12, 5214.
- [45] Lucet, D.; Le Gall, T.; Mioskowski, C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1998**, 37, 2580.
- [46] Basle, O.; Li, C.-J. *Green Chem.* **2007**, 9, 1047.
- [47] Murahashi, S.; Naota, T.; Yonemura, K. *J. Am. Chem. Soc.* **1988**, 110, 8256.
- [48] Basle, O.; Li, C.-J. *Chem. Commun.* **2009**, 4124.
- [49] Han, W.; Ofial, A. R. *Chem. Commun.* **2009**, 6023.
- [50] Zhang, Y.; Fu, H.; Jiang, Y.; Zhao, Y. *Org. Lett.* **2007**, 9, 3813.
- [51] Ratnikov, M. O.; Doyle, M. P. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, 135, 1549.
- [52] (a) Boess, E.; Schmitz, C.; Klusmann, M. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, 134, 5317.
(b) Boess, E.; Sureshkumar, D.; Sud, A.; Wirtz, C.; Farès, C.; Klusmann, M. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, 133, 8106.
- [53] (a) Dhineshkumar, J.; Lamani, M.; Alagiri, K.; Prabhu, K. R. *Org. Lett.* **2013**, 15, 1092.
(b) Tanoue, A.; Yoo, W.-J.; Kobayashi, S. *Adv. Synth. Catal.* **2013**, 355, 269.
- [54] Zhang, W.; Yang, L.; Wu, L. M.; Liu, Y. C.; Liu, Z. L. *J. Lanzhou Univ. (Nat. Sci.)* **1998**, 34, 120 (in Chinese).
张炜, 杨立, 吴隆民, 刘有成, 刘中立, 兰州大学学报(自然科学版), **1998**, 34, 120.
- [55] Smith, P. J.; Mann, C. K. *J. Org. Chem.* **1969**, 34, 1821.
- [56] Cohen, S. G.; Parola, A.; Parsons, G. H. *Chem. Rev.* **1973**, 73, 141.
- [57] (a) Liu, P.; Liu, Y.; Wong, E. L.-M.; Xiang, S.; Che, C.-M. *Chem. Sci.* **2011**, 2, 2187.
(b) Chiavarino, B.; Cipollini, R.; Crestoni, M. E.; Fornarini, S.; Lanucara, F.; Lapi, A. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, 130, 3208.
(c) Dowers, T. S.; Rock, D. A.; Rock, D. A.; Jones, J. P. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, 126, 8868.
(d) Baciocchi, E.; Lanzalunga, O.; Lapi, A.; Manduchi, L. *J. Am. Chem. Soc.* **1998**, 120, 5783.
(e) Murata, S.; Miura, M.; Nomura, M. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1989**, 116.
(f) Karasevich, E. I.; Khenkin, A. M.; Shilov, A. E. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1987**, 0, 731.
(g) Smith, J. R. L.; Mortimer, D. N. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1985**, 64.
(h) Shannon, P.; Bruice, T. C. *J. Am. Chem. Soc.* **1981**, 103, 4580.
- [58] (a) Maiti, D.; Narducci Sarjeant, A. A.; Karlin, K. D. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, 129, 6720.
(b) Mahapatra, S.; Halfen, J. A.; Tolman, W. B. *J. Am. Chem. Soc.* **1996**, 118, 11575.
(c) Murahashi, S.; Naota, T.; Miyaguchi, N.; Nakato, T. *Tetrahedron Lett.* **1992**, 33, 6991.
(d) Murahashi, S.; Watanabe, T. *J. Am. Chem. Soc.* **1979**, 101, 7429.
- [59] Murata, S.; Suzuki, K.; Tamatani, A.; Miura, M.; Nomura, M. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1992**, 1387.
- [60] Carroll, R. J.; Leisch, H.; Scocchera, E.; Hudlicky, T.; Cox, D. P. *Adv. Synth. Catal.* **2008**, 350, 2984.
- [61] (a) Machara, A.; Werner, L.; Endoma-Arias, M. A.; Cox, D. P.; Hudlicky, T. *Adv. Synth. Catal.* **2012**, 354, 613.
(b) Machara, A.; Cox, D. P.; Hudlicky, T. *Adv. Synth. Catal.* **2012**, 354, 2713.
- [62] Studer, A. *Chem. Eur. J.* **2001**, 7, 1159.
- [63] (a) Xie, Y.; Qian, B.; Xie, P.; Huang, H. *Adv. Synth. Catal.* **2013**, DOI: 10.1002/adsc.201200944.
(b) Guo, S.; Qian, B.; Xie, Y.; Xia, C.; Huang, H. *Org. Lett.* **2010**, 13, 522.
- [64] Liu, W. P.; Liu, J. H.; Ogawa, D.; Nishihara, Y.; Guo, X. W.; Li, Z. *Org. Lett.* **2011**, 13, 6272.
- [65] Chen, J.; Liu, B.; Liu, D.; Liu, S.; Cheng, J. *Adv. Synth. Catal.* **2012**, 354, 2438.
- [66] Wu, W.; Su, W. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, 133, 11924.

(Cheng, F.)