无催化剂条件下的全氟烷基取代的 1*H*-苯并[*b*][1,4]二氮草-2(3*H*)-酮的
简易合成翟士燕^a 曹卫国^{*,a,b,c} 张 慧^{*,a}^a 上海大学化学系 上海 200444)^b 中国科学院上海有机化学研究所金属有机国家重点开放实验室 上海 200032)^c 中国科学院上海有机化学研究所氟化学重点开放实验室 上海 200032)

摘要 1,5-苯并二氮草-2-酮作为一个独特的骨架广泛存在于很多具有生理活性的化合物中, 而全氟烷基的引入影响到有机化合物的理化性质以及生理活性的改变. 因此将全氟代烷基引入 1,5-苯并二氮草-2-酮的方法的研究正变得日趋重要. 发展了一个制备全氟代烷基取代的 1,5-苯并二氮草-2-酮的简易方法. 采用全氟代炔酸甲酯为含氟砌块, 与邻芳基二胺, 以无水甲苯为溶剂, 在无催化剂存在条件下, 80 °C 反应 24 h, 以较好的收率顺利得到 4-全氟烷基-1,3-二氢-1,5-苯并二氮草-2-酮类化合物.

关键词 全氟烷基; 1,5-苯并二氮草-2-酮; 全氟烷基炔酸甲酯; 邻芳基二胺

Facile Synthesis of Perfluoroalkyl Substituted 1*H*-Benzo[*b*][1,4]-
diazepine-2(3*H*)-ones via a Catalyst-Free ProcessZhai, Shiyan^a Cao, Weiguo^{*,a,b,c} Zhang, Hui^{*,a}^a Department of Chemistry, Shanghai University, Shanghai 200444)^b State Key Laboratory of Organometallic Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry,
Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032)^c Key Laboratory of Organofluorine Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry,
Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032)

Abstract 1,5-Benzodiazepin-2-one is a privileged scaffold and compounds containing such substructures exhibit a range of biological activities. Perfluoroalkyl groups can favorably affect the physical and biological properties of organic compounds. Accordingly, the development of methods to introduce perfluoroalkyl groups into 1,5-benzodiazepin-2-ones has become increasingly important. Herein, an efficient and simple route for preparation of perfluoroalkylated 1,5-benzodiazepine-2-ones is described. The reaction of methyl 3-perfluoroalkyl-2-alkynoate as the fluorinated building block with *o*-arylenediamine proceeds smoothly in dry toluene at 80 °C for 24 h without any catalyst to afford the titled compounds in good yields.

Keywords perfluoroalkyl; 1,5-benzodiazepine-2-one; methyl 3-perfluoroalkyl-2-alkynoate; *o*-arylenediamine

1,5-苯并二氮草-2-酮类化合物通常具有重要的生理活性^[1]. 例如临床上抗焦虑的 Lofendazam (**1**)、抑酸剂 Telenzepine (**2**)以及大脑神经递质胆囊收缩素受体拮抗剂(CCK receptor antagonist) **3** 等都是 1,5-苯并二氮草-2-酮衍生物(图 1). 此外, 这类化合物还体现出对白细胞介素-1 β 转化酶与蛋白酶的抑制和抗心律失常等的生理活

性.

正是基于这类化合物具有的广泛的生理活性, 1,5-苯并二氮草-2-酮成为药物设计与合成中不可或缺的独特核心骨架^[2]. 构建 1,5-苯并二氮草-2-酮骨架最常用的方法主要是邻苯二胺与 α,β -不饱和羰基化合物或 β -羰基酯在高温或 Lewis 酸催化下的缩合反应^[3]. 催化剂的

* E-mail: yehao7171@shu.edu.cn; wgcao@staff.shu.edu.cn

Received October 19, 2012; revised November 18, 2012; published online November 23, 2012.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21072126, 21272152) and the Leading Academic Discipline Projects of Shanghai Municipal Education Commission (No. J50102).

国家自然科学基金(Nos. 21072126, 21272152)、上海市教育委员会重点学科建设项目(No. J50102)资助项目.

图1 具有医学用途的1,5-苯并二氮草-2-酮类化合物举例
Figure 1 Examples of medicinal 1,5-benzodiazepine-2-ones

使用常会导致一些副反应的发生,酸性反应条件中和及催化剂的回收则使反应后处理步骤变得烦琐,而且会对环境造成一定的污染;高温条件则使反应条件变得苛刻.因此发展无催化剂温和条件下构建1,5-苯并二氮草-2-酮骨架的方法是十分重要的^[4].含氟基团的引入现已证明可显著改变有机分子的生理、物理和化学性质^[5],因此三氟甲基和多氟代烷基已成为商业上许多农药、药物和材料的重要结构特征^[6].然而目前有关氟代烷基直接取代在杂环部位的1,5-苯并二氮草-2-酮类化合物的合成的报道却很少,主要是采用氟砌块策略,用三氟乙酰乙酸乙酯与邻苯二胺在近150 °C条件下缩合得到三氟甲基取代的1,5-苯并二氮草-2-酮^[7].2011年,本课题组报道了以含氟炔酸甲酯为含氟砌块,与邻苯二胺和芳醛一锅法合成了一系列多氟烷基取代的1,5-苯并二氮草衍生物^[8].这里,本文在前面工作的基础上,在没有催化剂存在条件下,使含氟炔酸甲酯与邻芳基二胺在无水甲苯中80 °C反应24 h,即得到4-多氟烷基-1,5-苯并二氮草-2-酮类化合物.反应条件温和,收率良好.

1 结果与讨论

我们以邻苯二胺**1A**和4,4,4-三氟-2-丁炔酸甲酯(**2a**)的反应作为模版,在封管中,首先从溶剂、反应时间和温度等方面对反应条件进行了优化(表1).比较邻苯二胺(**1A**)和4,4,4-三氟-2-丁炔酸甲酯(**2a**)在不同溶剂中的反应结果,我们发现以甲苯为溶剂时,反应在无任何催化剂存在条件下,在100 °C反应24 h即可得到62%的4-三氟甲基-1*H*-苯并[*b*][1,4]二氮草-2(3*H*)-酮(**3Aa**),其它溶剂如叔丁醇、*N,N*-二甲基甲酰胺(DMF)仅给出很低收率,而在吡啶、乙腈和四氢呋喃(THF)中得到的反应体系十分复杂,没有分离出所需产物(表1, Entries 1~7).通过升高反应温度以提高收率被证明是不可行的,由于副产物增加,反应产物收率有所下降(表1, Entry 8).无水条件可促进反应进行并得到较高收率(表1, Entry 7 vs 9),但将反应时间从24 h延长至36 h,反应收率没有得到进一步提高,说明该反应在24 h内应该已完成反应(由于氟代炔酸酯沸点低,只能在封管中进行反应,致

使较难用薄层层析跟踪反应进程).考虑到4,4,4-三氟-2-丁炔酸甲酯(**2a**)沸点低,在反应过程中易挥发出溶剂体系从而不能有效参加反应,我们尝试降低反应温度,发现此反应在80 °C无水甲苯中可有效进行,得到92%收率的环合产物**3Aa**,继续降低反应温度,反应收率急剧下降,在室温,则几乎没有产物生成(表1, Entries 11~13).

表1 多氟烷基取代的1,5-苯并二氮草-2-酮合成^a
Table 1 Synthesis of perfluoroalkylated 1,5-benzodiazepine-2-ones

Entry	Solvent	<i>T</i> /°C	Time/h	Yield ^b /%
1	<i>t</i> -BuOH	100	24	25
2	Pyridine	100	24	Complex System
3	1,4-Dioxane	100	24	Trace
4	Acetonitrile	100	24	Complex System
5	DMF	100	24	29
6	THF	100	24	Complex System
7	Toluene	100	24	62
8	Toluene	110	24	42
9	Toluene (dry)	100	24	83
10	Toluene (dry)	100	36	81
11	Toluene (dry)	80	24	92
12	Toluene (dry)	60	24	60
13	Toluene (dry)	r.t.	24	Trace

^aReaction conditions: *o*-phenylenediamine (**1Aa**) 1 mmol, methyl 4,4,4-trifluorobut-2-ynoate (**2a**) 1.0 equiv., solvent 5 mL. ^bIsolated yield.

随后利用所得到的最优化反应条件,我们对反应底物做了拓展(表2).炔酸酯随着多氟代烷基碳链的延长,与二胺反应所得产物收率逐渐下降(表2, Entries 2, 7, 10).邻芳基二胺4,5位对称取代时,得到单一产物,而且取代基无论是吸电子基还是供电子基,均能得到良好收率.非对称取代时,得到的是一对异构体,其中7位取代的异构体为主要产物(表2, Entries 4, 5).异构体的结构根据产物氢谱中特征氢的化学位移及其偶合常数*J*确定^[9].例如,7-甲基-4-三氟甲基-1*H*-苯并[*b*][1,4]二氮草-2(3*H*)-酮(**3Da**)中,与5位亚胺氮原子相邻的芳环上6位氢化学位移在较高场,为 δ 6.88,由于间位偶合常数很小,在谱图上近似为一个单峰;而与1位酰胺氮原子相邻的9位氢化学位移在较低场,为 δ 7.39,邻位氢和间位氢偶合得到多重峰.在8-甲基-4-三氟甲基-1*H*-苯并[*b*][1,4]二氮草-2(3*H*)-酮(**3Da'**)中,在较高场 δ 7.17~

表 2 多氟烷基取代的 1,5-苯并二氮草-2-酮合成^a

Table 2 Synthesis of perfluoroalkylated 1,5-benzodiazepine-2-ones

Entry	<i>o</i> -Arylenediamine (1)	Methyl 3-perfluoroalkynoate (2)	Product	Yield ^b /%
1	1A	2a	3Aa	94
2	1B	2a	3Ba	85
3	1C	2a	3Ca	83
4	1D	2a	3Da + 3Da'	62 ^{c, d}
5	1E	2a	3Ea	57 ^e
6	1A	2b	3Ab	90
7	1B	2b	3Bb	81
8	1C	2b	3Cb	78
9	1A	2c	3Ac	86
10	1B	2c	3Bc	77
11	1C	2c	3Cc	72

^a Reaction conditions: *o*-arylenediamine (**1**) 1 mmol, methyl 3-perfluoroalkynoate (**2**) 1.0 equiv., dry toluene 5 mL, 80 °C, 24 h; ^b Isolated yield; ^c **3Da** : **3Da'** = 3 : 1, determined by ¹H NMR of the mixture; ^d Total yield of **3Da** and **3Da'**; ^e 7-Benzoyl-4-(trifluoromethyl)-1*H*-benzo[*b*][1,4]diazepin-2(3*H*)-one (**3Ea**).

7.19 出现的是多重峰, 归属为与 5 位亚胺氮原子相邻的芳环上 6 位氢; 在较低场 δ 7.31 出现的近似单峰, 则是与 1 位酰胺氮原子相邻的 9 位氢。类似可确定 **3Ea** 为 7-位取代异构体。

在以往文献报道^[3,8,9]和我们自己工作的基础上, 推断反应机理如 Scheme 1。

Scheme 1

邻芳基二胺首先对氟代炔酸酯进行 Michael 加成得到中间产物 **I**, 后者可异构化得到 **II**。分子内亚胺氮上

氢转移得到 **III**, **III** 中的氨基随后对甲酯基进行亲核加成消除得到最终环合产物 **3**。当氟代烷基 R_f 中碳原子数增加时, 由于空间位阻, 使得 Michael 加成这一步受到一定影响, 致使产物收率有所下降。 R^1 , R^2 对反应的影响则取决于二者的电子效应。 R^1 为吸电子基, R^2 为氢时, 由于中间体 **II** 中亚胺氮上带有正电荷, R^1 的吸电子诱导效应, 使 **II** 不稳定, 另一方面基于 R^1 的对位吸电子共轭效应, 降低了氨基的亲核性, 这可以解释为何 **3Ea** 收率较低; 如果 R^2 为吸电子基, R^1 为氢时, 此时 R^2 的吸电子诱导不仅降低了间位氨基的亲核性, 其吸电子共轭效应对中间体 **II** 的稳定性影响比处在亚胺氮间位 R^1 的吸电子诱导效应更大, 因此解释了 7 位吸电子基如苯甲酰基取代的 **3Ea** 为何成为主要产物。对于甲基邻苯二胺与氟代炔酸酯的反应, 由于甲基仅具有弱的供电子超共轭效应, 在 4 位利于增强 1 位氨基亲核性, 在 5 位有助于 **II** 的稳定; R^1 为供电子基时, 还能通过给电子共轭效应使中间体 **IV** 易于生成, 因此 7 位甲基取代的 **3Da** 比 8 位取代的 **3Da'** 稍多。 R^1 , R^2 为相同取代基时, 如都为供电子活化基时, 不仅利于增强氨基亲核性, 还有助于 **II** 的稳定, 而当 R^1 , R^2 都为钝化基时, 作用正好相反, 因此 4,5-二甲基邻苯二胺(**1B**)反应产物收率要比 R^1 , R^2 都为弱钝化基的 4,5-二氯邻苯二胺(**1C**)要高。

2 结论

本文采用 3-全氟烷基-2-炔酸甲酯为氟砌块, 与邻芳基二胺在无催化剂条件下, 于无水甲苯中缩合, 得到 4-全氟烷基-1,3-二氢-1,5-苯并二氮草-2-酮。反应条件温和, 收率良好。针对实验事实, 提出的反应机理解释了取代基对反应的区域选择性和产率的影响, 说明 7-取代产物在异构体混合物中占有主要比例, 而且供电子基取代的邻芳基二胺应有利于反应的进行。全氟烷基大小对反应也有一定影响。

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

实验中所用试剂未经标明的, 均为直接购买的分析纯试剂, 使用前未做进一步纯化。含氟炔酸酯根据参考文献[10]合成。核磁共振氢谱与碳谱分别用 Bruker A VAVCE-DMX 500 MHz 测定, 以 TMS 为内标, CDCl_3 为溶剂。 ^{19}F NMR 以 C_6F_6 为内标。ESI 低分辨质谱由 LCMS-2010 EV 质谱仪测得, ESI 高分辨质谱则由 Bruker APE 7.0 Tesla 质谱仪测得。熔点在上海物理光学仪器公司生产的 WRS-1 数字熔点仪上测得, 未经校正。快速柱层析使用 200~300 目硅胶。TLC 用板为 GF₂₅₄ 高效薄层层析硅胶板。

3.2 4-全氟烷基-1H-苯并[b][1,4]二氮草-2(3H)-酮(3)合成的一般步骤

向装有磁搅拌子的反应管中分别加入邻芳基二胺 (1.0 mmol)、3-全氟烷基-2-炔酸甲酯 (1.0 mmol) 和 5 mL 无水甲苯。将反应管封好后, 放入预先加热到 80 °C 的硅油浴中, 搅拌反应 24 h。反应结束后, 用旋转蒸发仪将溶剂旋去, 剩余物经过快速柱层析纯化得到产物 3。

4-三氟甲基-1H-苯并[b][1,4]二氮草-2(3H)-酮(3Aa)^[8]: 白色固体。m.p. 169.8~171.1 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) δ : 3.36 (s, 2H), 7.11~7.13 (m, 1H), 7.30~7.33 (m, 1H), 7.36~7.40 (m, 1H), 7.50~7.52 (m, 1H), 8.74 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CD_3COCD_3) δ : 166.8, 149.5 (q, $^2J_{\text{C-F}}=34$ Hz), 137.5, 131.4, 129.7, 129.3, 125.6, 123.1, 120.4 (q, $^1J_{\text{C-F}}=275$ Hz), 38.1; ^{19}F NMR (CDCl_3 , 470 MHz) δ : -72.97 (s, CF_3); ESI-MS m/z : 229 ($\text{M}+\text{H}$)⁺. HRMS calcd for $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{F}_3\text{N}_2\text{ONa}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 251.0407, found 251.0408.

7,8-二甲基-4-三氟甲基-1H-苯并[b][1,4]二氮草-2(3H)-酮(3Ba): 白色固体。m.p. 205.9~206.4 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) δ : 2.29 (s, 3H), 2.31 (s, 3H), 3.31 (s, 2H), 6.85 (s, 1H), 7.27 (s, 1H), 8.38 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CD_3COCD_3) δ : 166.3, 148.4 (q, $^2J_{\text{C-F}}=35$ Hz),

139.1, 135.6, 134.4, 129.7, 129.1, 123.5, 120.6 (q, $^1J_{\text{C-F}}=274$ Hz), 38.1, 19.5, 19.0; ^{19}F NMR (CDCl_3 , 470 MHz) δ : -72.85 (s, CF_3); ESI-MS m/z : 257 ($\text{M}+\text{H}$)⁺. HRMS calcd for $\text{C}_{12}\text{H}_{11}\text{F}_3\text{N}_2\text{ONa}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 279.0720, found 279.0721.

7,8-二氯-4-三氟甲基-1H-苯并[b][1,4]二氮草-2(3H)-酮(3Ca): 淡黄色固体。m.p. 199.5~200.5 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) δ : 3.39 (s, 2H), 7.28 (s, 1H), 7.63 (s, 1H), 9.46 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CD_3COCD_3) δ : 166.2, 151.5 (q, $^2J_{\text{C-F}}=35$ Hz), 137.2, 132.4, 131.4, 130.4, 128.2, 124.5, 120.2 (q, $^1J_{\text{C-F}}=275$ Hz), 38.5; ^{19}F NMR (CDCl_3 , 470 MHz) δ : -73.11 (s, CF_3); ESI-MS m/z : 295 (M^+). HRMS calcd for $\text{C}_{10}\text{H}_5\text{Cl}_2\text{F}_3\text{N}_2\text{ONa}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 318.9628, found 318.9634.

7-甲基-4-三氟甲基-1H-苯并[b][1,4]二氮草-2(3H)-酮(3Da): 白色固体。 ^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) δ : 2.41 (s, 3H), 3.33 (s, 2H), 6.88 (s, 1H), 7.11~7.13 (m, 1H), 7.38~7.40 (m, 1H), 8.30 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CD_3COCD_3) δ : 166.5, 149.4 (q, $^2J_{\text{C-F}}=35$ Hz), 140.1, 135.4, 130.7, 129.3, 126.7, 123.0, 120.5 (q, $^1J_{\text{C-F}}=275$ Hz), 38.2, 21.1; ^{19}F NMR (CDCl_3 , 470 MHz) δ : -72.85 (s, CF_3); ESI-MS m/z : 243 ($\text{M}+\text{H}$)⁺. HRMS calcd for $\text{C}_{11}\text{H}_9\text{F}_3\text{N}_2\text{ONa}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 265.0565, found 265.0564.

8-甲基-4-三氟甲基-1H-苯并[b][1,4]二氮草-2(3H)-酮(3Da'): 白色固体。 ^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) δ : 2.39 (s, 3H), 3.34 (s, 2H), 6.98~6.99 (m, 1H), 7.17~7.19 (m, 1H), 7.31 (s, 1H), 8.31 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CD_3COCD_3) δ : 166.5, 148.6 (q, $^2J_{\text{C-F}}=35$ Hz), 137.4, 135.4, 131.3, 129.1, 126.7, 123.1, 120.5 (q, $^1J_{\text{C-F}}=275$ Hz), 38.1, 20.5; ^{19}F NMR (CDCl_3 , 470 MHz) δ : -72.98 (s, CF_3); ESI-MS m/z : 243 ($\text{M}+\text{H}$)⁺. HRMS calcd for $\text{C}_{11}\text{H}_9\text{F}_3\text{N}_2\text{ONa}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 265.0565, found 265.0564.

7-苯甲酰基-4-三氟甲基-1H-苯并[b][1,4]二氮草-2(3H)-酮(3Ea): 淡黄色固体。m.p. 203.6~204.5 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) δ : 3.43 (m, 2H), 7.25~7.26 (m, 1H), 7.51~7.54 (m, 2H), 7.62~7.65 (m, 1H), 7.80~7.82 (m, 2H), 7.88~7.94 (m, 2H), 9.05 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CD_3COCD_3) δ : 194.8, 166.3, 150.7 (q, $^2J_{\text{C-F}}=35$ Hz), 138.3, 136.8, 134.9, 134.6, 133.4, 133.1, 131.6, 130.6, 130.5, 129.4, 128.5, 123.4, 120.3 (q, $^1J_{\text{C-F}}=275$ Hz), 38.5; ^{19}F NMR (CDCl_3 , 470 MHz) δ : -73.04 (s, CF_3); ESI-MS m/z : 333 ($\text{M}+\text{H}$)⁺. HRMS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{11}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_2\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 355.0671, found 355.0653.

4-五氟乙基-1H-苯并[b][1,4]二氮草-2(3H)-酮(3Ab): 白色固体。m.p. 172.3~172.9 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) δ : 3.38 (s, 2H), 7.10~7.12 (m, 1H),

7.30~7.31 (m, 1H), 7.33~7.40 (m, 1H), 7.49~7.51 (m, 1H), 8.52 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CD_3COCD_3) δ : 166.8, 150.4 (t, $^2J_{\text{C-F}}=35$ Hz), 137.7, 131.3, 130.0, 129.4, 125.6, 123.2, 119.6 (m, CF_3), 111.0 (m, CF_2), 38.3; ^{19}F NMR (CDCl_3 , 470 MHz) δ : -81.43 (s, CF_3), -117.30 (s, CF_2); ESI-MS m/z : 279 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{11}\text{H}_7\text{F}_5\text{N}_2\text{ONa}$ ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$ 301.0377, found 301.03775.

7,8-二甲基-4-五氟乙基-1*H*-苯并[*b*][1,4]二氮草-2(3*H*)-酮(**3Bb**): 白色固体. m.p. 209.0~210.2 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) δ : 2.29 (s, 3H), 2.30 (s, 3H), 3.34 (s, 2H), 6.85 (s, 1H), 7.26 (s, 1H), 8.33 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CD_3COCD_3) δ : 166.3, 149.1 (t, $^2J_{\text{C-F}}=28$ Hz), 139.4, 135.7, 134.4, 129.8, 129.1, 123.55, 119.6 (m, CF_3), 111.0 (m, CF_2), 38.2, 19.6, 18.9; ^{19}F NMR (CDCl_3 , 470 MHz) δ : -81.46 (s, CF_3), -117.15 (s, CF_2); ESI-MS m/z : 307 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{F}_5\text{N}_2\text{ONa}$ ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$ 329.0690, found 329.0691.

7,8-二氯-4-五氟乙基-1*H*-苯并[*b*][1,4]二氮草-2(3*H*)-酮(**3Cb**): 淡黄色固体. m.p. 200.1~201.5 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) δ : 3.41 (s, 2H), 7.24 (s, 1H), 7.63 (s, 1H), 8.60 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CD_3COCD_3) δ : 166.2, 152.5 (t, $^2J_{\text{C-F}}=28$ Hz), 137.3, 132.6, 131.4, 130.5, 128.2, 124.6, 119.4 (m, CF_3), 110.8 (m, CF_2), 38.6; ^{19}F NMR (CDCl_3 , 470 MHz) δ : -81.34 (s, CF_3), -117.36 (s, CF_2); ESI-MS m/z : 345 (M^+). HRMS calcd for $\text{C}_{11}\text{H}_5\text{Cl}_2\text{F}_5\text{N}_2\text{ONa}$ ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$ 368.9597, found 368.9606.

4-七氟正丙基-1*H*-苯并[*b*][1,4]二氮草-2(3*H*)-酮(**3Ac**) $^{[1]}$: 淡黄色固体. m.p. 134.4~135.3 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) δ : 3.39 (s, 2H), 7.11~7.14 (m, 1H), 7.31~7.42 (m, 2H), 7.50~7.53 (m, 1H), 8.75 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CD_3COCD_3) δ : 167.3, 149.3 (t, $^2J_{\text{C-F}}=32$ Hz), 137.1, 129.5, 129.2, 125.6, 122.3, 116.0, 117.8 (m, CF_3), 111.3 (m, CF_2), 106.6 (m, CF_2), 37.8; ^{19}F NMR (CDCl_3 , 470 MHz) δ : -80.50 (s, CF_3), -115.92 (s, CF_2), -125.90 (s, CF_2); ESI-MS m/z : 329 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{12}\text{H}_7\text{F}_7\text{N}_2\text{ONa}$ ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$ 351.0344, found 351.0345.

7,8-二甲基-4-七氟正丙基-1*H*-苯并[*b*][1,4]二氮草-2(3*H*)-酮(**3Bc**): 淡黄色固体. m.p. 176.7~177.6 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) δ : 2.29 (s, 3H), 2.30 (s, 3H), 3.34 (s, 2H), 6.83 (s, 1H), 7.26 (s, 1H), 8.05 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CDCl_3) δ : 166.9, 148.1 (t, $^2J_{\text{C-F}}=32$ Hz), 139.1, 135.0, 134.6, 129.6, 127.1, 122.7, 117.8 (m, CF_3), 111.4 (m, CF_2), 109.0 (m, CF_2), 37.8, 19.6, 19.1; ^{19}F NMR (CDCl_3 , 470 MHz) δ : -80.52 (s, CF_3), -115.91

(s, CF_2), -125.97 (s, CF_2); ESI-MS m/z : 357 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$. HRMS calcd for $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{F}_7\text{N}_2\text{ONa}$ 357.0839 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$, found 357.0842.

7,8-二氯-4-七氟正丙基-1*H*-苯并[*b*][1,4]二氮草-2(3*H*)-酮(**3Cc**): 淡黄色固体. m.p. 159.9~160.3 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (CDCl_3 , 500 MHz) δ : 3.40 (s, 2H), 7.28 (s, 1H), 7.63 (s, 1H), 8.79 (s, 1H); ^{13}C NMR δ : (125 MHz, CDCl_3) 166.5, 150.9 (t, $^2J_{\text{C-F}}=27$ Hz), 136.1, 133.5, 130.3, 129.6, 128.6, 123.4, 117.1 (m, CF_3), 111.2 (m, CF_2), 108.9 (m, CF_2), 38.0; ^{19}F NMR (CDCl_3 , 470 MHz) δ : -79.81 (s, CF_3), -115.39 (s, CF_2), -125.19 (s, CF_2); ESI-MS m/z : 395 (M^+). HRMS calcd for $\text{C}_{12}\text{H}_5\text{Cl}_2\text{F}_7\text{N}_2\text{ONa}$ ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$ 418.9564, found 418.9567.

References

- [1] (a) Archer, G. A.; Sternbach, L. H. *Chem. Rev.* **1968**, *68*, 747.
(b) Sternbach, L. H. *Prog. Drug Res.* **1978**, *22*, 229.
(c) Muller, W. E.; Groh, B.; Bub, O. *Pharmacopsychiatry* **1986**, *10*, 314.
(d) Eltze, M.; Gonne, S.; Riedel, R.; Schlotke, B.; Schudt, C.; Simon, W. A. *Eur. J. Pharmacol.* **1985**, *112*, 211.
(e) Claremon, D. A.; Friedinger, R. M.; Liverton, N.; Selnick, H. G.; Smith, G. R. *WO 9640656*, **1996** [*Chem. Abstr.* **1997**, *126*, 144295].
(f) Buck, I. M.; Black, J. W.; Cooke, T.; Dunstone, D. J.; Gaffen, J. D.; Griffin, E. P.; Harper, E. A.; Hull, R. A. D.; Kalindjian, S. B.; Lilley, E. J.; Linney, I. D.; Low, C. M. R.; McDonald, I. M.; Pether, M. J.; Roberts, S. P.; Shankley, N. P.; Shaxted, M. E.; Steel, K. I. M.; Sykes, D. A.; Tozer, M. J.; Watt, G. F.; Walker, M. K.; Wright, L.; Wright, P. T. *J. Med. Chem.* **2005**, *48*, 6803.
(g) Wang, L.; Hua, Z.; Niu, W. *Chin. J. Org. Chem.* **2010**, *30*, 1664 (in Chinese).
(王兰芝, 花中霞, 牛文刚, *有机化学*, **2010**, *30*, 1664.)
- [2] (a) Evans, B. E.; Rittle, K. E.; Bock, M. G.; DiPardo, R. M.; Freidinger, R. M.; Whitter, W. L.; Lundell, G. F.; Veber, D. F.; Anderson, P. S.; Chang, R. S.; Lotti, V. J.; Cerino, D. J.; Chen, T. B.; Kling, P. J.; Kunkel, K. A.; Springer, J. P.; Hirshfield, J. J. *Med. Chem.* **1988**, *31*, 2235.
(b) Al-Tel, T. H.; Al-Qawasmeh, R. A.; Schmidt, M. F.; Al-Aboudi, A.; Rao, S. N.; Sabri, S. S.; Voelter, W. *J. Med. Chem.* **2009**, *52*, 6484.
(c) Elliott, R. L.; Cameron, K. O.; Chin, J. E.; Bartlett, J. A.; Beretta, E. E.; Chen, Y.; Jardine, P. D. S.; Dubins, J. S.; Gillasp, M. L.; Hargrove, D. M.; Kalgutka, A. S.; LaFlamme, J. A.; Lame, M. E.; Martin, K. A.; Maurer, T. S.; Nardone, N. A.; Oliver, R. M.; Scott, D. O.; Sun, D.; Swick, A. G.; Trebino, C. E.; Zhang, Y. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2010**, *20*, 6797.
(d) Hoyt, S. B.; London, C.; Wyvrat, M. J.; Fisher, M. H.; Cashen, D. E.; Felix, J. P.; Garcia, M. L.; Li, X.; Lyons, K. A.; MacIntyre, D. E.; Martin, W. J.; Priest, B. T.; Smith, M. M.; Warren, V. A.; Williams, B. S.; Kaczorowski, G. J.; Parsons, W. H. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2008**, *18*, 1963.
(e) García-López, M. T.; González-Muñiz, R.; Martín-Martínez, M.; Herranz, R. *Curr. Top. Med. Chem.* **2007**, *7*, 1180.
- [3] For one example and the other references therein: Goswami, P.; Das, B. *Synth. Commun.* **2010**, *40*, 1685.

- [4] Alizadeh, A.; Zohreh, N.; Zhu, L.-G. *Tetrahedron* **2009**, *65*, 2684.
- [5] Purser, S.; Moore, P. R.; Swallow, S.; Gouverneur, V. *Chem. Soc. Rev.* **2008**, *37*, 320.
- [6] Kirk, K. L. *Org. Process Res. Dev.* **2008**, *12*, 305.
- [7] Khudina, O. G.; Burgart, Ya. V.; Kravchenko, M. A.; Saloutin, V. I. *Pharm. Chem. J.* **2011**, *45*, 75.
- [8] Xu, J.; Wei, J.; Bian, L.; Zhang, J.; Chen, J.; Deng, H.; Wu, X.; Zhang, H.; Cao, W. *Chem. Commun.* **2011**, *47*, 3607.
- [9] Reddy, K. S.; Reddy, C. V.; Mahesh, M.; Reddy, K. R.; Raju, P. V. K.; Reddy, V. V. N. *Can. J. Chem.* **2007**, *85*, 184.
- [10] Hamper, B. C. *Org. Synth.* **1992**, *70*, 246.
- [11] Saloutin, V. I.; Fomin, A. N.; Pashkevich, K. I. *Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim.* **1985**, *1*, 144.

(Qin, X.)