镍催化环加成反应的研究进展

曾中一 杨定乔*

(华南师范大学化学与环境学院 广州 510006)

摘要 综述了近年来镍催化环加成反应的研究进展, 主要包括[3+2]和[2+2+2]环加成反应及部分关于[4+2], [3+2+2], [4+2+2], [2+2]等环加成反应的报道, 并对部分环加成反应可能的机理进行了讨论。

关键词 镍催化; 环加成反应; 研究进展

Progress in Nickel-Catalyzed Cycloaddition Reactions

Zeng, Zhongyi Yang, Dingqiao*

(School of Chemistry and Environment, South China Normal University, Guangzhou 510006)

Abstract The recent progress in nickel-catalyzed cycloaddition reactions is reviewed, mainly including [3+2] and [2+2+2] cycloaddition reactions. Besides, several nickel-catalyzed [4+2], [3+2+2], [4+2+2] and [2+2] cycloaddition reactions are introduced. Moreover, the possible mechanisms of some parts of cycloaddition reactions are also discussed.

Keywords nickel-catalyzed; cycloaddition reaction; research progress

环加成反应(Cycloaddition Reaction)是两个共轭体系结合成环状分子的一种双分子反应, 它是由两个或多个不饱和化合物(或同一化合物的不同部分)结合生成环状加合物, 并伴随有系统总键级数减少的化学反应。这类反应是合成单环及多环化合物的一种重要方法。有关环加成反应最早是德国化学家 Diels 与其学生 Alder 等^[1]在 1928 年通过环戊二烯与顺丁烯二酸酐发生[4+2]环加成实现的。常见的环加成反应类型除[4+2]外, 还包括[3+2], [2+2+2], [3+2+2], [4+2+2]等。环加成反应的主要特点是可以将不饱和和链状化合物直接转变成环状化合物, 包括三元、四元到九元、十元环等, 且原子利用率高。在天然产物的全合成、药物化学等领域有着广泛的应用。例如: 通过 1,3-偶极环加成得到了作为 β -内酰胺酶抑制剂的他唑巴坦^[2]和具有杀菌活性的异噻唑啉化合物^[3]; 徐显秀等^[4]采用[2+2]环加成反应合成得到的加巴喷丁(Gabapentin)是一种主要用于治疗癫痫及多种神经性疼痛的药物; Heller 等^[5]成功将[2+2+2]环加成应用于 Vitamin B₆ 的全合成, 环加成反应的产率可达 86%; 最近余志祥等^[6]发现新型的[3+2+1]环加成, 并以此反应作为关键的一步, 完成了沉香呋喃类天

然产物(±)- α -Agarofuran 的全合成。

近几十年来, 过渡金属以其特有的催化活性吸引了大批研究者的关注。将过渡金属催化剂应用于环加成反应是有机金属化学研究的热点之一, 许多需要加热、光照等特殊条件才能发生的环加成反应, 加入金属催化剂后在温和条件下即可实现, 并且可以获得较高的产率和较好的选择性。目前对镍催化环加成反应的研究主要集中在[3+2], [2+2+2], [4+2]等, 还有少量[3+2+2], [4+2+2], [2+2], [2+2+1], [2+2+2+2], [4+3+2]等环加成反应方面的报道。使用镍配合物催化环加成反应具有催化剂廉价易得、对映选择性高、转化率高等优点, 这对于手性药物及天然产物的全合成具有一定的科学意义和应用前景。

1 [3+2]环加成

过渡金属催化 1,3-偶极体与碳碳重键的环加成反应, 即 1,3-偶极环加成反应, 是合成天然产物和药物中常见的五元杂环结构的重要方法^[7]。此外, 还报道过用(杂)环丙烷作三原子单元, 在镍催化作用下与碳碳重键进行的[3+2]环加成。

* E-mail: yangdq@scnu.edu.cn

Received January 28, 2013; revised April 27, 2013; published online May 8, 2013.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21172081, 21372090) and the Natural Science Foundation of Guangdong Province (No. 8251063101000002).

国家自然科学基金(Nos. 21172081, 21372090)和广东省自然科学基金(No. 8251063101000002)资助项目。

1.1 甲亚胺叶立德参与的[3+2]环加成

甲亚胺叶立德(以亚胺酯作为前体)与活性烯烃的环加成反应可以合成具有多个手性中心的吡咯烷骨架结构。2005年, Grigg等^[8]尝试用手性双膦配体 **1**, **2** 与 NiCl_2 组成催化体系催化甲亚胺叶立德 **3a** 与烯丙酸甲酯进行 [3+2] 环加成反应(Eq. 1), 产率虽高达 92%, 但产物为外消旋体。这表明手性双膦配体先从催化体系中解离出来, 剩下游离的 Ni(II) 催化反应。

2008年, 中国科学院上海有机化学研究所施敏等^[9]改用轴手性联萘二亚胺(BINIM)型化合物 **5** 作为手性配体, 研究了 *N*-芳基马来酰亚胺 **6** 与甲亚胺叶立德 **3** 的成环反应, 得到 *endo* 构型产物 **7** (Eq. 2)。值得一提的是, **3** 和 **6** 苯环上带有不同的吸电子或供电子基团时, 反应结果均令人比较满意, 并且取代基的位置对环加成产物的影响也不明显(表1)。值得注意的是, 吡啶环和亚胺上的氮原子对催化体系的催化活性不可或缺。

基于上述研究结果, 施敏等认为甲亚胺叶立德 **3** 先与催化剂结合得到六配位络合物 **8**, 然后 *N*-苯基马来酰亚胺从背面进攻形成过渡态 **9**, 因而得到 *endo* 构型产物 (Eq. 3)。

表1 底物 **3** 和 **6** 中不同取代基对环加成反应的影响Table 1 Effect of different substituents of substrates **3** and **6** on cycloaddition reactions

Entry	Ar	Ar ¹	Yield/%	ee/%
1	<i>p</i> -CH ₃ C ₆ H ₄	Ph	84	84
2	<i>o</i> -BrC ₆ H ₄	Ph	82	85
3	<i>m</i> -BrC ₆ H ₄	Ph	80	82
4	<i>p</i> -BrC ₆ H ₄	Ph	86	89
5	1-Naphthyl	<i>p</i> -CH ₃ OC ₆ H ₄	82	90
6	1-Naphthyl	<i>p</i> -FC ₆ H ₄	83	86

2010年, Arai等^[10]探讨了镍催化反式硝基烯烃与甲亚胺叶立德 **3** 的环加成反应, 利用固相催化/CD-HTS(圆二色谱-高效筛选)系统筛选出最有效的配体 **10**, 主要得到 *exo'* 构型产物 **11** (Eq. 4)。值得一提的是, 偶极体 **3** 芳环上带有吸电子或供电子基团, 对反应的选择性(包括非对映选择性和对映选择性)影响不明显。此外脂肪族硝基烯烃亦可转化成相应的环状产物, 且对映选择性仍较高, 只是产率和非对映选择性稍有降低。

基于主要产物为 *exo* 构型, Arai 等提出了可能的反应机理(Scheme 1): 首先亚胺叶立德与 Ni(II) 催化剂配位得到 **12**, **12** 作为亲核试剂进攻硝基烯烃的 2-C 发生反式 Michael 加成形成环状中间体 **13**, 然后开环得到 **14**, 旋转 **14** 中 C—N 键以得到更加稳定的过渡态 **15**, 随后发生分子内 Mannich 反应, 一方面得到较稳定的 *exo* 构型异构体 **11**, 另一方面释放出 Ni(II) 催化剂, 整个催化反应得以循环进行。

1.2 硝酮参与的[3+2]环加成

硝酮与碳碳双键的 1,3-偶极环加成是构建异噁唑环骨架非常有效的方法。2005 年, Suga 等^[11]报道了以 (*R*)-BINIM-DCOH (**16**) 作手性配体, 镍催化硝酮 **17** 与噻唑烷硫酮 **18** 发生环加成反应(Eq. 5), 得到 *exo* 构型产物, 产率 35%~98%, 非对映选择性和对映选择性均比较理想, 最高分别可达 99:1 和 95% *ee*。

Suga 研究小组发现, 当硝酮中 *C*-和 *N*-苯环上带有吸电子或供电子基团时, 反应结果均令人比较满意。值得一提的是, *C*-苯基-*N*-烷基和 *C,N*-二烷基硝酮也可进行成环反应, 且对映选择性和非对映选择性仍较高, 只是产率有所降低。

2011 年, 四川大学冯小明等^[12]尝试以 *N,N'*-二氧化合物 **20** 为手性配体, 探讨硝酮 **17** 与亚烷基丙二酸酯 **21** 的环加成反应(Eq. 6)。研究发现: 镍盐中对应的阴离子对催化剂的催化活性影响极大, 其中 Ni(ClO₄)₂ 的催化活性最高。值得一提的是, **17** 碳上取代基 R¹ 为连有拉电子或供电子基团的芳环时, 对反应结果影响不大; 但 **17** 氮上的取代基 R² 为烷基时, 产物的产率明显降低。同时, **21** 亚烷基上的取代基 R³ 为连有拉电子或供电子芳环时, 对环加成产物的影响也不明显(表 2)。

Scheme 1

表2 底物 17 和 21 中不同取代基对环加成反应的影响

Table 2 Effect of different substituents of substrates 17 and 21 on cycloaddition reactions

Entry	R ¹	R ²	R ³	Yield/%	dr	ee/%
1	Ph	Ph	Ph	94	93 : 7	99
2	<i>p</i> -BrC ₆ H ₄	Ph	Ph	83	95 : 5	98
3	<i>p</i> -CH ₃ OC ₆ H ₄	Ph	Ph	80	99 : 1	97
4	Ph	Me	Ph	54	99 : 1	94
5	Ph	Ph	<i>p</i> -BrC ₆ H ₄	91	98 : 2	97
6	Ph	Ph	<i>p</i> -CH ₃ OC ₆ H ₄	86	96 : 4	97

基于上述研究结果, 冯小明等提出了一种可能的反应过渡态 23, 由于硝酮 17a 碳上苯环与 23 中叔丁基的空间排斥, 有利于 17a 从背面进攻过渡态 23 得到 *exo* 构型产物 22a (Scheme 2).

Scheme 2

1.3 氧化脒参与的[3+2]环加成

氧化脒(以相应的氯化脒作前体)与碳碳双键的成环反应是合成异噁唑啉环骨架结构的常用方法. 2004 年, Sibi 等^[13]研究了镍催化氧化脒 24 与吡唑烷酮 25a 的环加成反应(Eq. 7). 以双噁唑啉化合物 26 作手性配体, 环加成产物的产率和对映选择性分别达 74%和 92% *ee*.

2009 年, Suga 等^[14]改用(*R*)-BINIM-2QN (27a)替代双噁唑啉配体 26 (Scheme 3), 探讨了氧化脒 24 与活泼烯烃 25 的环加成反应(Eq. 7). 研究发现: 与氧化脒进行环加成反应, 吡唑烷酮得到的对映选择性和区域选择性普遍比噁唑烷酮高. 并且芳香族氧化脒和脂肪族氧化脒均可与噁唑烷酮和吡唑烷酮发生成环反应, 实验结果比较令人满意(表 3).

表3 底物 24 和 25 中不同取代基对环加成反应的影响

Table 3 Effect of different substituents of substrates 24 and 25 on cycloaddition reactions

Entry	R ¹	25	Yield/%	dr	ee/%
1	Ph	25a	94	99 : 1	95
2	<i>p</i> -MeOC ₆ H ₄	25a	97	99 : 1	92
3	<i>i</i> -Bu	25a	99	99 : 1	87
4	Ph	25b	74	96 : 4	89
5	<i>p</i> -MeOC ₆ H ₄	25b	84	88 : 12	83
6	<i>i</i> -Bu	25b	82	93 : 7	72

27a: (*R*)-BINIM-2QN (X = H)
 27b: (*R*)-BINIM-4Me-2QN (X = Me)
 27c: (*R*)-BINIM-4Ph-2QN (X = Ph)

Scheme 3

1.4 其他 1,3-偶极体参与的[3+2]环加成

此外, 有关镍催化其他 1,3-偶极环加成反应也有少量报道. Suga 等^[15]在 2007 年报道了(*R*)-BINIM-4Me-

2QN (**27b**)-Ni(II)配合物催化甲亚胺 **30** 与噁唑烷酮 **25c** 发生偶极-HOMO/亲偶极-LUMO 控制的环加成反应, 得到 *trans* 构型吡唑烷骨架结构 **31** (Eq. 8). 作者认为 C=O 对 C=C 的共轭拉电子效应, 致使环加成反应以偶极-HOMO/亲偶极-LUMO 控制方式进行.

同年, Suga 等^[16]又报道了 **27b**-Ni(II)配合物催化羰基叶立德 **33** 与乙烯基醚发生反电子需求的偶极体-LUMO/亲偶极体-HOMO 控制的环加成反应, 得到 *endo* 构型产物 **34** (Scheme 4). 作者认为可能是由于乙烯基醚中的氧原子与 C=C 键发生 p- π 共轭, 增加 C=C 键的电子云密度, 致使成环反应以偶极-HOMO/亲偶极-LUMO 控制方式进行. 最近, 该研究小组^[17]报道了 (*R*)-BINIM-4Ph-2QN (**27c**)-Ni(II)配合物催化重氮酯 **35** 与吡唑烷酮 **25d** 发生环加成反应, 得到吡唑啉环结构 (**36**) (Eq. 9).

Scheme 4

1.5 (杂)环丙烷参与的[3+2]环加成

早在 1985 年, Binger 等^[18]就报道了 Ni(COD)₂-单膦配体 TOPP 配合物催化三甲基硅烷基炔烃 **37a** 与亚甲基环丙烷 **38** 发生[3+2]环加成反应, 得到环戊烯衍生物 **39a~39c** (Eq. 10). 2011 年, Ogoshi 等^[19]报道了镍催化环丙基酮 **40** 与中间炔烃 **37** 的成环反应 (Eq. 11). 研究发现, 添加剂 (CH₃)₂AlCl 对此环加成反应不可或缺. 值得注意的是, 含酯基、醚基和羰基等活性基团的炔烃不能发生环加成反应, 可能是由于 (CH₃)₂AlCl 与此类活性炔烃中的氧配位而使其活性降低.

COD = 1,5-cyclooctadiene, TOPP = triarylphosphite

同年, 浙江大学张玉红等^[20]实现了镍催化亚甲基环丙烷-炔烃化合物 **42** 的分子内[3+2]环加成, 反应通过邻位 C—C 键的断裂生成环戊[a]茚衍生物 **43** (Eq. 12).

最近, 华东师范大学张俊良等^[21]跟踪了氮杂环丙烷 **44** 与芳香醛 **45** 在镍催化作用下通过 C—C 键断裂发生[3+2]环加成反应, 得到多取代 1,3-噁唑烷衍生物 **46** (Eq. 13). 之后, 张俊良等^[22]又报道了镍催化环氧乙烷基二酮/二酸酯 **47** 与吡啶 **48** 发生分子间[3+2]成环反应, 合成呋喃[3,4-*b*]吡啶衍生物 **49** (Eq. 14).

2 [2+2+2]环加成

过渡金属催化烯、炔等不饱和基团的[2+2+2]环加成是合成六元环状化合物最直接、原子利用率最高的方法, 此类反应已成为当前研究的热点. 关于过渡金属催化乙炔进行[2+2+2]环加成反应的最早是 Reppe 等^[23]在 1948 年用镍配合物作催化剂实现的. 之后, Volihardt 等^[24]首次把钌催化[2+2+2]环加成成功应用于合成天然产物苯并环丁烯.

2.1 单炔-异氰酸酯的分子间[2+2+2]环加成

2005 年, Louie 等^[25]在研究镍催化炔烃与异氰酸酯进行[2+2+2]环加成反应时, 发现底物浓度和配体体积对环加成产物的影响很大. 实验结果表明: 当用大体积配体 IPr 时, 一分子炔烃与两分子异氰酸酯反应得到 1:2 组合产物 **51**; 当用小体积配体 PEt₃ 替换 IPr 时, 两分子炔烃与一分子异氰酸酯反应得到 2:1 组合产物 **52** (Scheme 5).

Scheme 5

2.2 苯炔-单烯-单炔的分子间[2+2+2]环加成

2009 年, 香港中文大学谢作伟等^[26]跟踪了镍/钯催化苯炔(前体 **53**)、活泼单烯 **54** 和单炔 **37** 进行[2+2+2]环加成反应(Eq. 15). 实验发现: Ni(COD)₂ 能有效催化芳炔-烯烃-炔烃三组分环加成得到二氢化萘骨架 **55**. 但令人不解的是, 钯配合物如 PdCl₂(PPh₃)₂ 和 Pd(PPh₃)₄ 均不能有效催化三组分[2+2+2]环加成, 不过在产物中检测到二组分苯炔-烯-苯炔环加成产物 **56** 和交叉偶联产物 **57**.

反应机理如 Scheme 6 所示, 首先苯炔、烯丙酸与 Ni(0)配合物氧化偶联形成五元镍环中间体 **58**, 活泼烯烃中氧的孤对电子与镍的空 d 轨道配位有助于该中间体的稳定; 随后极化炔烃插入 Ni—C_{aryl} 键得到七元镍环中间体 **59**; 再通过还原消除得到最终产物二氢化萘衍生物 **55a**.

2.3 碳硼烷-单炔-单炔(烯)三组分[2+2+2]环加成

(邻)碳硼烷 **60** 于 1963 年首次被 Heying 等^[27]发现. 10 年后, Saylor 等^[28]合成了首个金属-碳硼烷配合物 [η^2 -C₂B₁₀H₁₀Ni(PPh₃)₂] (**61**). 2006 年, 谢作伟等^[29]首次利用此配合物与两分子中间炔烃进行[2+2+2]环加成反应, 得到 1,2-苯并邻碳硼烷衍生物 **62** (Scheme 7). 由于碳硼烷空间位阻大, 不对称炔烃可以实现高区域选择性

环加成, 且空间位阻小的炔烃得到的产率更高。值得注意的是, 末端炔烃易使镍-碳硼炔配合物 **61** 质子化而难以发生此类反应, 且含酯基的炔烃在 Ni(0) 作用下更倾向于自身三聚^[30]。2010 年, 谢祚伟等^[31]又以 1-碘-2-锂碳硼烷作为碳硼炔前体, 在相同条件下与炔烃反应亦得到产物 **62**。

Scheme 7

最近, 谢作伟等^[32]尝试用两种不同炔烃与 **61** 反应. 但由于金属对两种不同炔烃缺乏选择性, 反应得到混合物. 加入 $\text{Cp}_2\text{Zr}(\mu\text{-Cl})(\mu\text{-C}_2\text{B}_{10}\text{H}_{10})\text{Li}(\text{OEt})_2$ (**63**) 作辅助剂, 成功实现了镍催化碳硼炔与两种不同炔烃的[2+2+2]成环反应.

根据研究结果, 谢作伟等提出了可能的反应机理 (Scheme 8): 其中最关键的一步是五元锆环 **64** 的生成, 随后发生过渡金属化转化成五元镍环中间体 **65**, 另一种炔烃插入形成七元镍环中间体 **66**, 最后还原消除得到 1,2-苯并邻碳硼烷衍生物 **67**.

Scheme 8

2008 年, 谢作伟等^[33]报道了 $\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2$ 催化碳硼炔与一般烯烃进行反应, 实验中检测到 C—C 偶联产物 **68** 或 **69** 的生成. 将一般烯烃改成活泼烯烃, 则得到烷基碳硼烷衍生物 **70** (Scheme 9). 他们认为活泼烯烃较易插入 **61** 形成五元镍环中间体 **71**, 这是由于活泼烯烃中杂原子(氮或氧)上的孤对电子可与镍的空 d 轨道配位而有利于中间体 **71** 的稳定. 另一分子烯烃不能再插入此五元镍环中间体进行反应, 不过研究发现炔烃却能顺利插入得到七元镍环中间体 **72**, 再经历还原消除最终得到二氢苯并碳硼烷衍生物 **73** (Scheme 10)^[34].

Scheme 9

Scheme 10

2.4 二炔与 CO₂ 的分子间[2+2+2]环加成

早在 1988 年, Tsuda 等^[35]就报道用 $\text{Ni}(\text{COD})_2$ -单膦配体 PR_3 (R 为烷基)催化末端二烷基取代二炔与 CO_2 进行 $[2+2+2]$ 环加成得到中等产率的双环 α -吡喃酮。近年来, 新型大位阻、富电子烷基氮杂环卡宾(NHC)配体的出现及其在不对称催化反应中的应用引起研究者的极大兴趣^[36]。2002 年, Louie 等^[37]用 NHC 配体 IPr 替换 PR_3 , 与 $\text{Ni}(\text{COD})_2$ 组成的催化体系催化对称二炔与 CO_2 进行 $[2+2+2]$ 环加成反应(Eq. 16), 产率高达 97%。接下来 Louie 等^[38]尝试了不对称二炔与 CO_2 的成环反应, 主要得到产物 **77** (Eq. 17)。

2.5 二炔与脒的分子间[2+2+2]环加成

2005 年, Louie 等^[39]改用脒替换 CO₂, 以 NHC 配体 SIPr 作手性配体, 镍催化作用下与二炔进行[2+2+2]环加成反应, 可以合成天然产物和药物中常见的吡啶环骨架结构 **80**. 值得一提的是, 位阻大的脒、芳香脒也可与含杂原子的二炔进行此类反应, 且产率较理想. 不过 NHC 配体对空气敏感, 给实际操作过程带来不便. 为此 Louie 等^[40]用对空气较稳定的 NHC 配体盐酸盐作前体, 在强碱 *n*-BuLi 作用下转化成实际起催化作用的 Ni(0)/NHC 配体催化体系(Scheme 11), 获得了较好的实验结果. 但将 NHC 配体盐酸盐应用于二炔与 CO₂、醛或异氰酸酯的[2+2+2]环加成反应时, 实验结果都不太理想.

Scheme 11

2.6 二炔与醛的分子间[2+2+2]环加成

早在 1988 年, Tsuda 等^[41]报道过 Ni(COD)₂-PR₃ (R 为烷基或苯基)催化二炔与醛进行[2+2+2]环加成反应

得到 α -吡喃环, 同时在产物中也检测到二烯酮衍生物 (即 α -吡喃环的开环产物), 有时甚至是主要产物. 这一实验结果启发我们用过渡金属催化二炔与醛进行成环反应可以合成二烯酮衍生物. 2005 年, Louie 等^[42]改用 SIPr 替换 PR₃, 与 Ni(COD)₂ 形成催化体系催化对称二炔与醛进行环加成反应, 主要获得二烯酮衍生物 **82** (Scheme 12). 实验结果表明: 连有供电子基团的苯甲醛得到的产率较连有吸电子基团的苯甲醛高, 且脂肪醛也可以转化成相应的产物(表 4).

Scheme 12

表 4 醛取代基对环加成反应的影响

Table 4 Effect of substituents of aldehydes on cycloaddition reactions

Entry	R ²	Yield/%
1	Ph	78
2	<i>p</i> -MeOC ₆ H ₄	91
3	<i>p</i> -CF ₃ C ₆ H ₄	65
4	<i>n</i> -Pr	58
5	<i>i</i> -Pr	72

2.7 二炔与烯酮的分子间[2+2+2]环加成

2011 年, Louie 等^[43]报道了 Ni(COD)₂-双膦配体 DPPB 配合物催化二炔与烯酮进行[2+2+2]环加成反应 (Eq. 18). 尽管烯酮有两个反应部位, 但实验结果中并未检测到羰基反应的成环产物, 仅生成环己二烯酮环产物 **83**. 研究结果表明: 底物烯酮芳基对位上连有拉电子基团有利于产物的形成, 连有供电子取代基则不利.

3 [4+2]环加成

3.1 1,3-氮杂二烯-乙烯醚的[4+2]环加成

2007 年, Carretero 等^[44]用由 Ni(ClO₄)₂ 和 DBFOX-Ph

制得的手性镍配合物高对映选择性地催化氮杂 1,3-二烯 **84** 与乙烯基醚进行反电子需求的 Diels-Alder 反应, 得到 *endo* 构型产物 **85** (Eq. 19). 作者认为, 亚胺氮上磺酰基的强拉电子效应和乙烯基醚中烷氧基的强供电子作用, 致使反应以反电子需求 Diels-Alder 加成方式进行.

3.2 1,3-二烯-腈的[4+2]环加成

过渡金属催化两分子炔烃与一分子腈的[2+2+2]环加成反应是合成吡啶环骨架非常直接、有效的方法^[45], 但这种途径区域选择性差, 在吡啶环化合物的合成中受到一定的限制. 最近, Ogoshi 等^[46]用 $\text{Ni}(\text{COD})_2\text{-PCy}_3$ 催化 1,3-二烯 **86** 与腈经过[4+2]脱氢环加成反应, 得到单一的 5 位未取代的吡啶单环化合物 **87** (Eq. 20), 该反应具有高度的区域选择性. 值得一提的是, 利用此方法可以合成二个甚至三个吡啶单环结构的化合物, 且产率均在 65%以上.

反应机理如 Scheme 13 所示, 腈、二烯与 $\text{Ni}(0)$ 配合物氧化环化形成 η^3 -氮烯丙基镍环中间体 **88**, 异构化得到较稳定的中间体 **89**, **89** 能可逆地与腈结合形成 **90**, 亦能依次经历还原消除、脱氢最终得到吡啶衍生物 **87a**.

3.3 酰胺-炔的[4+2]环加成

Nokao 等^[47]用 $\text{Ni}/\text{Al}(\text{CH}_3)_3$ 联合催化活化甲酰胺 **91** 中的两个 C—H 键, 与中间炔烃进行[4+2]成环反应, 得到二氢吡啶酮环产物 **92** (Eq. 21). 反应对不对称炔烃有较好的区域选择性, 炔烃上较小取代基连在羰基 α -位即为主要产物.

Scheme 13

4 [4+2+2]环加成

4.1 环丁酮-二炔的[4+2+2]环加成反应

2006 年, Murakami 等^[48]发现镍配合物可有效催化环丁酮 **94** 通过 C—C 键断裂与二炔进行[4+2+2]成环反应, 得到环辛二烯酮衍生物 **95** (Eq. 22). Murakami 等^[49]在 2008 年再一次报道了镍催化环丁酮与二炔的成环反应, 所得结果与 2006 年报道的结果一致.

4.2 氮杂环丁酮-二炔的[4+2+2]环加成反应

最近, Louie 等^[50]报道了 $\text{Ni}(\text{COD})_2\text{-IPr}$ 高区域选择性地催化氮杂环丁酮 **96** 与二炔发生[4+2+2]环加成反应得到氮杂环辛二烯酮化合物 **97** (Eq. 23). 值得一提的是, 含各种官能团(甚至包括磺酰基、氰基)的二炔均可以发生此类反应, 且产率高达 91%.

5 [3+2+2]环加成

2004年, Saito等^[51]用 $\text{Ni}(\text{COD})_2\text{-PPh}_3$ 催化亚环丙基乙酸乙酯(**98**)与两分子末端炔烃进行[3+2+2]成环反应, 主要得到 *E* 型环庚二烯衍生物 **99**。随后以 $\text{Ni}(\text{COD})_2\text{-PR}_3$ 作催化剂, 用二炔替换炔烃反应通常得到 *E/Z* 构型混合的双环化合物 **100** (Scheme 14)^[52]。

Scheme 14

2009年, Saito等^[53]研究了 $\text{Ni}(\text{COD})_2\text{-PPh}_3$ 催化**98**、1,3-二炔与末端单炔的成环情况。研究发现: 当加入 3 equiv. 1,3-二炔与**98**反应, 得到 2:1 联合环化产物**101**; 当加入等量(1.5 equiv.)的 1,3-二炔和末端单炔与**98**反应, 得到 1:1:1 联合环化产物**102** (Scheme 15)。这表明在末端炔烃较 1,3-二炔活泼。

Scheme 15

6 其他类型的环加成反应

近年来关于镍催化环加成反应还有少量其他反应类型。Moretó等^[54]在 2005 年报道了镍催化炔烃、烯丙基卤化物**103**与 CO 发生 Pauson-Khand 型反应得到产率较高的环戊烯酮衍生物**104** (Eq. 24)。Wender等^[55]在 2009 年报道了 $(\text{DME})\text{NiBr}_2$ 催化 1,6-二炔通过自身[2+2+2]环加成合成六/八取代环辛四烯衍生物**105** (Eq. 25)。Saito等^[56]在 2010 年报道了 $\text{Ni}(\text{PPh}_3)_2$ 催化**98**与二炔**106**进行[4+3+2]环加成得到九元环化合物**107**和**108** (Eq. 26)。最近 Ogoshi等^[57]报道了镍配合物高区域选择性催化 α,β -不饱和烯炔**109**与共轭烯炔**110**发生分子间[2+2]环加成(Eq. 27), 反应经过重要中间体**111**, 再通过还原消除得到环丁烯衍生物**112a** (Scheme 17)。

Scheme 17

7 结论与展望

环加成反应是合成单环及多环化合物一类非常直接、有效的方法, 过渡金属催化剂应用于环加成反应是有机化学研究的热点之一。镍催化[3+2], [2+2+2], [4+2], [4+2+2], [3+2+2]等环加成反应的研究为有机合成提供了更多的方法和手段, 实现了许多由直链化合物向环状化合物的转化, 并且使得此类反应可在较温和的条件下进行。特别是在[3+2]和[2+2+2]环加成反应中, 镍催化显示出较好的催化活性和良好的选择性。但相比于其他过渡金属催化的环加成反应, 镍催化应用的范围还是较小, 催化剂的用量也相对较多。因此, 发展高催化活性、高对映选择性的镍配合物催化体系及其在其他类型的环加成反应中的应用仍然是将来需要研究的重点课题之一。

References

- [1] Diels, O.; Alder, K. *Justus Liebigs Ann. Chem.* **1928**, 460, 98.
- [2] Bai, G.-Y.; Chen, L.-G.; Li, Y.; Cao, L.; Song, C.-J.; Wang, F.-L. *J. Tianjin Univ.* **2002**, 35, 332 (in Chinese).
(白国义, 陈立功, 李阳, 曹琳, 宋传君, 王丰雷, 天津大学学报, **2002**, 35, 332.)
- [3] Chen, C.-S.; Li, Z.-N.; Su, J.-Y.; Li, T.; Zhang, B.-Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2005**, 25, 1392 (in Chinese).
(程春生, 李志念, 苏金燕, 李涛, 张宝砚, 有机化学, **2005**, 25, 1392.)
- [4] Xu, X.-X.; Wei, Z.-L.; Bai, X. *Chin. J. Org. Chem.* **2006**, 26, 354 (in Chinese).
(徐显秀, 魏忠林, 柏旭, 有机化学, **2006**, 26, 354.)
- [5] Gutnov, A.; Abaev, V.; Redkin, D.; Fischer, C.; Bonrath, W.; Heller, B. *Synlett* **2005**, 1188.
- [6] Jiao, L.; Lin, M.; Zhuo, L.-G.; Yu, Z.-X. *Org. Lett.* **2010**, 12, 2528.
- [7] (a) Kumar, K. R. R.; Mallesha, H.; Rangappa, K. S. *Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem.* **2003**, 336, 159.
(b) Kunz, R. K.; MacMillan, D. W. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, 127, 3240.
(c) Kumar, R. S.; Perumal, S.; Shetty, K. A.; Yogeewari, P.; Sriram, D. *Eur. J. Med. Chem.* **2010**, 45, 124.
(d) Loh, B.; Vozzolo, L.; Mok, B. J.; Lee, C. C.; Fitzmaurice J.; Caddick, S.; Fassati, A. *Chem. Biol. Drug Des.* **2010**, 75, 461.
- [8] Grigg, R.; Copper D. M.; Holloway, S.; McDonald, S.; Millington, E.; Sarker, M. A. B. *Tetrahedron* **2005**, 61, 8685.
- [9] Shi, J.-W.; Zhao, M.-X.; Lei, Z.-Y.; Shi, M. *J. Org. Chem.* **2008**, 73, 305.
- [10] Aria, T.; Yokoyama, N.; Mishiro, A.; Sato, H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, 49, 7895.
- [11] Suga, H.; Nakajima, T.; Itoh, K.; Kakehi, A. *Org. Lett.* **2005**, 7, 1431.
- [12] Chen, D.-H.; Wang, Z.; Li, J.-T.; Yang, Z.-G.; Lin, L.-L.; Liu, X.-H.; Feng, X.-M. *Chem. Eur. J.* **2011**, 17, 5226.
- [13] Sibi, M. P.; Itoh, K.; Jasperse, C. P. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, 126, 5366.
- [14] Suga, H.; Adachi, Y.; Fujimoto, K.; Furihata, Y.; Tsuchida, T.; Kakehi, A.; Baba, T. *J. Org. Chem.* **2009**, 74, 1099.
- [15] Suga, H.; Funyu, A.; Kakehi, A. *Org. Lett.* **2007**, 9, 97.
- [16] Suga, H.; Ishimoto, D.; Higuchi, S.; Ohtsuka, M.; Arikawa, T.; Tsuchida, T.; Kakehi, A.; Baba, T. *Org. Lett.* **2007**, 9, 4362.
- [17] Suga, H.; Furihata, H.; Sakamoto, A.; Itoh, K.; Okumura, Y.; Tsuchida, T.; Kakehi, A.; Baba, T. *J. Org. Chem.* **2011**, 76, 7377.
- [18] Binger, P.; Lü, Q.-H.; Wedemann, P. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1985**, 24, 316.
- [19] Tamaki, T.; Ohashi, M.; Ogoshi, S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, 50, 12067.
- [20] Yao, B.-B.; Li, Y.; Liang, Z.-J.; Zhang, Y.-H. *Org. Lett.* **2011**, 13, 640.
- [21] Wu, X.-X.; Li, L.; Zhang, J.-L. *Chem. Commun.* **2011**, 47, 7824.
- [22] Zhang, J.-M.; Chen, Z.-L.; Wu, H.-H.; Zhang, J.-L. *Chem. Commun.* **2012**, 48, 1817.
- [23] Reppe, W.; Schichting, O.; Klager, K.; Toepel, T. *Justus Liebigs Ann. Chem.* **1948**, 560, 1.
- [24] (a) Aalbersberg, W. G. L.; Barkovich, A. J.; Funk, R. L.; Hillard, R. L.; Vollhardt, K. P. C. *J. Am. Chem. Soc.* **1975**, 97, 5600.
(b) Vollhardt, K. P. C. *Acc. Chem. Res.* **1977**, 10, 1.
(c) Vollhardt, K. P. C. *Angew. Chem.* **1984**, 96, 525.
- [25] (a) Duong, H. A.; Louie, J. J. *Organomet. Chem.* **2005**, 690, 5098.
(b) Duong, H. A.; Louie, J. *Tetrahedron* **2006**, 62, 7552.
- [26] Qiu, Z.-Z.; Xie, Z.-W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, 48, 5729.
- [27] Heying, T. L.; Ager, J. W.; Clark, S. L.; Mangold, D. J.; Goldstein, H. L.; Hillman, M.; Polak, R. J.; Szymanski, J. W. *Inorg. Chem.* **1963**, 2, 1089.
- [28] Sayler, A. A.; Beall, H.; Sieckhaus, J. F. *J. Am. Chem. Soc.* **1973**, 95, 5790.
- [29] Deng, L.; Chan, H.-S.; Xie, Z.-W. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, 128, 7728.
- [30] Qiu, Z.-Z.; Ren, S.-K.; Xie, Z.-W. *Acc. Chem. Res.* **2011**, 44, 299.
- [31] Qiu, Z.-Z.; Wang, S.-R.; Xie, Z.-W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, 49, 4649.
- [32] Ren, S.-K.; Qiu, Z.-Z.; Xie, Z.-W. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, 134, 3242.
- [33] Qiu, Z.-Z.; Xie, Z.-W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, 47, 6572.
- [34] Qiu, Z.-Z.; Xie, Z.-W. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, 131, 2084.
- [35] Tsuda, T.; Morikawa, S.; Sumiya, R.; Saegusa, T. *J. Org. Chem.* **1988**, 53, 3140.
- [36] (a) Powell, M. T.; Hou, D.; Perry, M. C.; Cui, X.; Burgess, K. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, 123, 8878.
(b) Perry, M. C.; Cui, X.; Powell, M. T.; Hou, D.-R.; Reibenspies, J. H.; Burgess, K. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, 125, 113.
(c) Chen, T.; Jiang, J.-J.; Xu, Q.; Shi, M. *Org. Lett.* **2007**, 9, 865.
(d) Song, H.; Gu, L.-N.; Zi, G. J. *Organomet. Chem.* **2009**, 694, 1493.
- [37] Louie, J.; Gibby, J. E.; Farnworth, M. V.; Tekavec, T. N. *J. Am. Chem. Soc.* **2002**, 124, 15188.
- [38] Tekavec, T. N.; Arif, A. M.; Louie, J. *Tetrahedron* **2004**, 60, 7431.
- [39] McCormick, M. M.; Duong, H. A.; Zuo, G.; Louie, J. *J. Am. Chem.*

- Soc.* **2005**, *127*, 5030.
- [40] Tekavec, T. N.; Zuo, G.; Simon, K.; Louie, J. *J. Org. Chem.* **2006**, *71*, 5834.
- [41] Tsuda, T.; Kiyoi, T.; Miyane, T.; Saegusa, T. *J. Am. Chem. Soc.* **1988**, *110*, 8511.
- [42] Tekevac, T. N.; Louie, J. *Org. Lett.* **2005**, *7*, 4037.
- [43] Kumar, P.; Troast, D. M.; Cella, R.; Louie, J. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 7719.
- [44] Esquivias, J.; Arrayás, R. G.; Carretero, J. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 1480.
- [45] (a) Hill, M. D. *Chem. Eur. J.* **2010**, *16*, 12052.
(b) Heller, B.; Hapke, M. *Chem. Soc. Rev.* **2007**, *36*, 1085.
- [46] Ohashi, M.; Takeda, I.; Ikawa, M.; Ogoshi, S. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 18018.
- [47] Nakao, Y.; Morita, E.; Idei, M.; Hiyama, T. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 3264.
- [48] Murakami, M.; Ashida, S.; Matsuda, T. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 2166.
- [49] Ashida, S.; Murakami, M. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **2008**, *81*, 885.
- [50] Kumar, P.; Zhang, K.; Louie, J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 8602.
- [51] Saito, S.; Masuda, M.; Komagawa, S. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, *126*, 10540.
- [52] Maeda, K.; Saito, S. *Tetrahedron Lett.* **2007**, *48*, 3173.
- [53] Yamasaki, R.; Sotome, I.; Komagawa, S.; Azumaya, I.; Masu, H.; Saito, S. *Tetrahedron Lett.* **2009**, *50*, 1143.
- [54] Nadal, M. L.; Bosch, J.; Vila, J. M.; Klein, G.; Ricart, S.; Moretó, J. M. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 10476.
- [55] Wender, P. A.; Christy, J. P.; Lesser, A. B.; Gieseler, M. T. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 7687.
- [56] Saito, S.; Maeda, K.; Yamasaki, R.; Kitamura, T.; Nakagawa, M.; Kato, K.; Azumaya, I.; Masu, H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, *49*, 1830.
- [57] Nishimura, A.; Ohashi, M.; Ogoshi, S. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 15692.

(Zhao, C.)