含氟 β -氨基酸和 β -内酰胺的合成研究进展

林岱宗 王江 柳红*

(中国科学院上海药物研究所 新药研究国家重点实验室 上海 201203)

摘要 含氟 β -氨基酸和含氟 β -内酰胺广泛应用于有机化学、药物发现和蛋白质生物学的研究中。因而含氟 β -氨基酸和含氟 β -内酰胺的合成工作深受广大研究者重视, 目前已开发出该类化合物的合成和拆分方法。依据含氟 β -氨基酸种类 (α -氟取代 β -氨基酸、 α -三氟甲基取代 β -氨基酸和 β -三氟甲基- β -氨基酸), 重点介绍近年来该领域的代表性工作。

关键词 含氟 β -氨基酸; 含氟 β -内酰胺; 合成

Recent Developments in the Synthesis of Fluorine-Containing β -Amino Acids and β -Lactams

Lin, Daizong Wang, Jiang Liu, Hong*

(State Key Laboratory of Drug Research, Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201203)

Abstract Fluorine-containing β -amino acids and β -lactams have attracted appreciable attention due to their wide application in organic chemistry, drug discovery, and protein biology. Accordingly, the development of efficient synthetic methods is of considerable interest in academia and industry. The synthesis and resolution are achieved. This review briefly summarizes the recent development in the methodologies for the synthesis of fluorine-containing β -amino acids and β -lactams with classification by the species of the fluorine-containing β -amino acids (α -fluorinated β -amino acids, α -trifluoromethyl β -amino acids, and β -trifluoromethyl β -amino acids).

Keywords fluorine-containing β -amino acid; fluorine-containing β -lactam; synthesis

β -氨基酸在天然产物、有机合成研究和生物医药等领域具有广泛应用。氟原子以其独特的理化性质及其在药物研发中的应用吸引着研究者的目光^[1]。近些年, 含氟小分子在药物化学研究中的比重持续增加^[2,3], 将氟原子引入 β -氨基酸结构中而得到的含氟 β -氨基酸已成为小分子药物合成中的重要结构片段, 深受研究人员重视^[4~7]。如图 1 所示, 以 β -内酰胺环为核心的胆固醇吸收酶抑制剂依泽替米贝(Ezetimibe, **1**), 于 2002 年获美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市, 在其苯环引入氟原子, 大大增强了其代谢稳定性^[8,9]。含氟 β -氨基酸也被引入到肽类药物中, 研究表明, 以含氟 β -氨基酸为合成砌块的肽类小分子具有一定的药理活性。如将大环内酯类抗真菌化合物 **2** 中的 β -氨基酸用含氟 β -氨基酸替代, 不仅抗菌活性增强, 其毒性也大大降低^[10,11]。此外, 由默克公司研发用于治疗 II 型糖尿病的药物西他列汀

(Sitagliptin, **3**), 于 2006 年获得美国 FDA 批准, 成为第一个获得 FDA 批准上市的二肽基肽酶 IV (Dipeptidyl peptidase IV, DPP IV) 抑制剂^[12,13], 其中氟苯取代片段有效地提高了西他列汀的 DPP IV 抑制活性, 改善了其药代动力学性质。著名的抗癌药紫杉醇(Taxol)的 13 位侧链 α -羟基- β -苯基- β -氨基酸为药理活性的必需片段, 而将其衍生物多西紫杉醇(Docetaxel)的 β 位苯基以三氟甲基替换, 所得衍生物 **4** 与多西紫杉醇相比, 抗肿瘤活性提高 1 倍^[14]。由于在药物设计中广泛应用含氟 β -氨基酸片段, 提高药理活性和改善药代动力学特性, 因此, 其制备方法受到药物化学家和有机化学家们越来越多的关注。

研究人员经过多年的努力, 相继开发出含氟 β -氨基酸及其衍生物的合成方法。最直接的方式是采用氟化试剂对氨基酸进行氟取代, 其它合成法包括: 利用氨基对

* E-mail: hliu@mail.shnc.ac.cn

Received March 15, 2013; revised April 23, 2013; published online May 9, 2013.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 81025017).

国家杰出青年科学基金(No. 81025017)资助项目。

含氟丙烯酸进行 Michael 加成、羧酸衍生物对含氟亚胺的 Mannich 反应等. 此外, 通过引入手性辅基或采用手性催化剂进行催化不对称反应, 可以立体选择性地制备光学纯的含氟 β -氨基酸. 本文依据含氟氨基酸的种类 (α -氟取代 β -氨基酸、 α -三氟甲基取代 β -氨基酸和 β -三氟甲基- β -氨基酸), 对其合成方法进行综述.

图 1 具有含氟 β -氨基酸和 β -内酰胺结构的药物

Figure 1 Fluorine-containing β -amino acids and β -lactams in the drugs

1 α -氟取代 β -氨基酸和 β -内酰胺的合成

目前报道的制备 α -氟取代 β -氨基酸的合成途径如图 2 所示. 最初的合成方法学研究非常受限, 主要通过形成新的碳氟键合成 α -单氟取代 β -氨基酸, 无法有效地控制其立体选择性. 但近年来, 随着含氟 β -氨基酸在生物领域研究的深入, 研究人员开发了多种针对此类氨基酸的不对称合成方法: 含氟试剂的 Mannich 反应(A), Michael 加成氟化反应(B), 不对称氟化或双氟化反应(C), 以二氟乙酸乙酯衍生物为原料, 通过 Reformatsky 反应合成 α,α' -二氟- β -氨基酸(D)以及利用 Mitsunobu 反应将 β -羟基转换为氨基得到单氟或二氟取代的氨基酸合

成法(E).

图 2 α -氟取代的 β -氨基酸合成路径

Figure 2 Synthetic routes of α -fluorinated β -amino acids

1.1 α -单氟- β -氨基酸的合成

Pan 等^[15]利用手性胺催化亚胺 **5** 与含氟乙酰乙酰胺类化合物 **6** 进行不对称 Mannich 反应, 以高立体选择性定量地得到产物 α -氟取代- α -乙酰基- β -氨基酰胺 (**7**) ($dr=99:1$, 98% ee), 但是在水解脱去乙酰基时, 得到的 α -氟- β -氨基酸 **8** 发生消旋化, 其 dr 值为 $4:1$, ee 值为 95% (Scheme 1).

Scheme 1

2004 年, Andrews 等^[16]研发了以手性胺对 α,β -不饱和羧酸和羧酸的加成、氟化反应, 通过“一锅法”合成 α -氟取代- β -氨基酸. 首先利用手性氨基锂 **9** 对 α,β -不饱和羧酸 **10** 进行 Michael 加成反应, 低温下, 对 Michael 加成产物烯醇盐 **11** 进行氟化反应, 得到单氟 β -氨基酸酯 **12**, 水解得到 α -氟- β -苯丙氨酸 (**13a**) ($dr>82:18$). 在此基础上, 2010 年, Duggan 等^[17]拓展了底物适用范围, 合成了一系列 α -氟- β -氨基酸 **13**, 其中最优底物的立体选择性达到 $dr>99:1$ (Scheme 2). 其同时报道了对 α -氟- β -氨基酸继续氟化, 得到相应的双氟化产物.

Scheme 2

Hook 等^[18]报道了氟化 α -羟基- β -氨基酸的合成方法. 以 *L*-丙氨酸为原料, 制备(2*S*,3*S*)- α -羟基- β -氨基酸 **14**, 继而分子内脱水形成环丙胺季铵盐中间体 **15**, 利用分子自身的结构控制氟化反应的立体选择性, F⁻从位阻较小一侧进攻开环, 得到构型保持的氟化产物(2*S*,3*S*)- α -氟- β -氨基酸(*S*)-**16**. 以 *L*-苏氨酸为原料, 脱水形成的中间体与 **15** 构型相反, 开环后得到(2*R*,3*S*)- α -氟- β -氨基酸(*R*)-**16** (Scheme 3). 但并非所有的氨基保护基都可以生成环状季铵盐, 因而导致 F⁻开环反应没有立体选择性, 无法得到高光学纯的产物, 此方法适用范围有限.

Scheme 3

Davis 和 Peddie 等^[19,20]研究人员用天然氨基酸通过 Arndt-Eistert 反应制备了一系列 β -取代- β -氨基酸 **17a**~**17d** (Scheme 4). 利用氨基酸 β 位取代基的空间位阻效应, 控制氟化的立体构型, 得到反式的氟化氨基酸 **18a**~**18d**. 当氨基酸 β 位为苄基取代、氨基由叔丁氧羰基(Boc)保护时, 立体选择性最好(90% *de*). 此方法立体选择性受 β -氨基酸 β -位取代基和氨基保护基的影响较大, 因而其适用范围受到限制.

Scheme 4

1.2 α,α' -二氟取代 β -氨基酸和 β -内酰胺的合成

由于 α,α' -二氟- β -氨基酸对于 α 位的反应无需控制立体构型, 因此该类氨基酸的合成方法开发较早. 通过直接对 α -酮酸酯的氟化反应即可得到 α,α' -二氟氨基酸. Ohba 等^[21]首先对此方法进行了报道, 但收率并不理想(31%). Seebach 课题组^[18,22,23]将此方法进行改进提高了收率(Scheme 5). α -羟基- β -氨基酸经氧化得到 α -酮酸酯 **19**, 再进一步经过二乙胺基三氟化硫(DAST)氟化得到 α,α' -二氟取代 β -氨基酸 **20**, 两步总收率达到 81%.

Scheme 5

早期的 α,α' -二氟- β -氨基酸合成方法是通过 Reformatsky 反应制备 α,α' -二氟- β -羟基酸, 再通过分子内^[24,25]或分子间^[26]的 Mitsunobu 反应将羟基转化为氨基而得到. 例如 Nakayama 等^[10]将 α,α' -二氟- β -羟基酰胺 **21**. 通过分子内 Mitsunobu 反应合成 α,α' -二氟- β -内酰胺 **22**, 再水解酰胺得到相应的氨基酸 **23**, 并应用于抗真菌药物 **2** 的研究中(Scheme 6).

Scheme 6

研究人员报道了一系列以二氟溴乙酸乙酯为原料, 通过 Reformatsky/Mitsunobu 反应制备 α,α' -二氟- β -氨基

酸和 α,α' -二氟- β -内酰胺的合成方法. 主要合成路线如图 3 所示, 将二氟溴乙酸酯制成烷基锌试剂, 与亚胺进行 Reformatsky 反应得到相应的氨基酸或内酰胺; 或与醛进行 Reformatsky 反应, 得到相应的 β -羟基酸, 再通过分子间的 Mitsunobu 反应将羟基转化为氨基得到 β -氨基酸, 或分子内的 Mitsunobu 反应得到 β -内酰胺.

图 3 Reformatsky/Mitsunobu 反应制备 α,α' -二氟- β -氨基酸和 β -内酰胺

Figure 3 Synthesis of α,α' -difluorinated β -amino acids and β -lactams via Reformatsky/Mitsunobu reactions

Soloshonok 和 Staas 等^[27~29]研究人员同时报道了以手性亚磺酰胺为辅基的 Reformatsky 反应, 用于合成手性 α,α' -二氟- β -取代- β -氨基酸. 其手性亚磺酰基团有效地控制了产物的立体选择性(*dr* 99:1). 其中 Soloshonok 等以手性亚磺酰亚胺 **24** 和二氟溴乙酸酯 **25** 在金属锌的作用下进行 Reformatsky 反应, 反应产物对甲苯亚磺酰胺类化合物 **26** 结构稳定且易分离纯化, 手性亚磺酰基在酸性条件下易于脱离, 并得到对应的手性氨基酸 **27** (Scheme 7).

Scheme 7

以烷基氨为手性源的 Reformatsky 反应合成 β -氨基酸的产率较低, 同时得到内酰胺类化合物, 主要原因是采用了相对不活泼的金属锌作为反应试剂. Fujii 课题组将 Honda 等合成无氟氨基酸的方法^[30]进行改进, 改用乙基锌试剂和 Wilkinson 催化剂($\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3$), 成功地避免了内酰胺的生成^[31,32]. 采用(*S*)-2-甲氧基苯乙胺 **28**、烷

基醛 **29** 和二氟溴乙酸酯 **25** 通过“一锅法”制备得到单一构型的手性氨基酸 **30** (Eq. 1).

Boyer 等^[33,34]选择 *L*-苯甘氨酸作为立体控制基团, 以较高的收率(50%~67%)和立体选择性(*de* > 98%)得到 α,α' -二氟- β -氨基酸 **32a**~**32b** 和 α,α' -二氟- β -内酰胺 **33c**~**33e** (62%~71%收率, 85%~95% *de*) (Eq. 2). 将 *L*-苯甘氨酸的醇羟基甲基化或去掉其立体控制能力, 收率均下降, 原因是 *L*-苯甘氨酸通过分子内互变形成了反应活性更强的亚胺等当体噁唑烷 **31**. 同时研究人员发现, 通过选取不同的反应条件和亚胺取代基可以高选择性地得到目标氨基酸或内酰胺, 其中方法 C 借鉴了 Fujii 的条件, 此反应高立体选择性地得到手性 β -氨基酸.

Sato 等^[35]报道了非手性 α,α' -二氟- β -芳基- β -氨基酸和 β -内酰胺的合成. 研究人员发现反应中存在少量的水可以抑制内酰胺的形成, 因此采用与 Boyer 等报道的类似的 Reformatsky 反应, 通过加入七水合硫酸镁, 得到 α,α' -二氟- β -芳基- β -氨基酸(**34**). 当反应在无水条件下进行, 即得到 α,α' -二氟- β -芳基- β -内酰胺 **35** (Scheme 8).

Tarui 等^[36]在二氟溴乙酸酯引入立体控制基团, 报道了手性 α,α' -二氟- β -内酰胺的合成方法. 其采用手性二氟溴乙酸酯(**36**)为手性源, 与非手性亚胺 **37** 进行 Reformatsky 反应(Eq. 3), 以较高的收率(71%)和立体选

Scheme 8

择性(92% *ee*)地合成了 α,α' -二氟- β -内酰胺 **38**, 在反应体系中没有检测到二氟氨基酸的产物.

2 α -三氟甲基取代 β -氨基酸和 α -三氟甲基取代 β -内酰胺的合成

α -三氟甲基取代 β -氨基酸的合成途径如图 4 所示, 主要是通过叠氮加成还原反应(A、B)、采用 Reformatsky 反应(C)或亲核加成反应(E)在三氟甲基羧酸片段上引入氨基以及由 1,3-偶极环加成(D)或 Baylis-Hillman 烷基化反应(F)引入三氟甲基来实现. α -三氟甲基取代 β -氨基酸衍生物可用于合成大量的含三氟甲基小分子化合物.

图 4 α -三氟甲基取代 β -氨基酸合成路径Figure 4 Synthetic routes of α -trifluoromethyl β -amino acids

Avenoza 等^[37]发展了一种光学纯 α -三氟甲基- β -氨基酸的合成方法. 最初设计的 2-三氟甲基丙烯 Weinreb 酰胺 **39** 经 Sharpless 不对称双羟化尚未达到预期效果. 因而对其进行 Sharpless 不对称双羟化, 以较高立体选择性(90% *ee*)得到双羟化产物 **40**. 化合物 **40** 通过与 Burgess 试剂进行反应, 制备环状硫酸酰胺 **41**, 水解后

即得到 α -三氟甲基- α -羟基- β -氨基酸(**42**). 此方法收率较低, 两步总收率 46%. 因此, 研究人员开发了另一条合成路线, 通过与磺酰氯反应将双羟化产物 **40** 转化成环状硫酸酯 **43**, 再通过叠氮开环和还原叠氮得到相应的氨基酸 **42**, 此路线三步总收率达到 77% (Scheme 9).

Scheme 9

叠氮化合物对 α,β -不饱和羧酸的 Michael 加成反应广泛地应用于 β -氨基酸的合成. Pang 等研究人员采用此方法合成 α -三氟甲基- β -氨基酸^[38]. 首先, 用 α -三氟甲基重氮乙酸甲酯(**45**)制备了 α,β -不饱和羧酸酯 **46**, 随后采用叠氮化钠对其进行 Michael 加成再还原, 得到消旋的 α -三氟甲基- β -氨基酸 **47** (Scheme 10). 此方法是合成非手性 α -三氟甲基- β -氨基酸的基本方法.

Scheme 10

Fustero 等^[39]报道了以 β -氨基酸为砌块合成多肽的方法. 其中 α -三氟甲基- β -氨基酸片段是通过苄胺对 α,β -不饱和羧酸酯 **48** 的 Michael 加成和氢化脱苄获得. 以手性 α -氨基酸片段控制不对称 Michael 加成反应的立体选择性, 以两步 95% 的收率, 较好的对映选择性(*dr* 8 : 1)得到 α -三氟甲基- β -氨基酸片段 **49** (Eq. 4). 此方法操作简易, 是合成手性 α -三氟甲基- β -氨基酸片段有效方法.

Shimada 等^[40]报道了光学纯的 α -三氟甲基- β -氨基酸前体的合成方法. 使用手性 Evans 噁唑烷酮辅基控制立体选择性, 将 α -溴- α -三氟甲基乙酰胺(**50**)与非手性亚胺 **51** 进行 Reformatsky 反应, 以高收率(92%)和高立体选择性($dr > 99:1$)得到 α -三氟甲基- β -氨基酸前体 **52** (Eq. 5), 但是该产物水解仅得到酰胺片段, 无法得到相应的氨基酸, 因而限制了此方法的应用.

Jakowiecki 等^[41]采用 1,3-偶极环加成的方法. 以 N -甲基- α -芳基硝酮(**53**)和多氟烯烃 **54** 为原料合成多氟噁唑烷中间体 **55**, 通过酸性条件下催化氢化裂解 N—O 键, 得到消旋的 α -氟- α -三氟甲基- β -氨基酸(**56**), 而在中性条件进行催化氢化反应, 以较高收率得到 α -三氟甲基- β -内酰胺 **57** (Scheme 11).

Scheme 11

Mohar 等^[42]报道了 α -三氟甲基烷基取代的 β -氨基酸的合成方法. 以三氟乙酰乙酸乙酯(**58**)为原料, 通过与苯甲酰基氨基甲基氯(**59**)烷基化反应引入氨基, 得到消旋的 α -三氟乙酰基- β -丙氨酸衍生物 **60**, 继而以钌催化不对称还原和动力学拆分, 得到苯甲酰基保护的高光学纯 β -氨基酸 **61** (99% *ee*, 99% *de*). 脱保护基后即可得到相应的氨基酸 **62**. 经过分子内环合得到 α -三氟甲基取代 β -内酰胺 **63** (Scheme 12), 并将此化合物进一步用于抗生素类药物的合成研究中.

我们课题组^[43]开发了一类新型的 Ni 配合物氨基酸等当体 **64**, 用于 β -氨基酸的合成研究. 通过 3-氨基丙烯酸 Ni 配合物等当体 **64** 和三氟碘丁烷 **65** 进行 Baylis-Hillman 烷基化反应得到 2-三氟甲基烷基取代 3-氨基丙烯酸 Ni 配合物等当体 **66**, 继而将其氢化还原, 得到 α -三氟甲基烷基取代的 β -氨基酸等当体 **67**. 酸性条件下水解即可得到相应的氨基酸 **68** (Scheme 13), 并且可以回收配体再次用于制备 Ni 配合物等当体 **64**. 为后续

Scheme 12

立体选择性合成具有光学活性的 α -三氟甲基烷基取代的 β -氨基酸做出铺垫. 由等当体方法合成 β -氨基酸具有结构定制、合成产物丰富、直观等特点, 是 β -氨基酸的合成领域中不可或缺的方法.

Scheme 13

3 β -三氟甲基- β -氨基酸和 β -三氟甲基- β -内酰胺的合成

β -三氟甲基- β -氨基酸作为重要的合成砌块, 在含氟多肽、内酰胺和氨基醇的合成研究中具有广泛的应

用^[44,45]. 其合成方法是以三氟乙酰羧酸或三氟甲基亚胺及其衍生物引入含氟基团, 通过环化还原(A), 1,3-氢迁移(B), Reformatsky 反应(C), Baylis-Hillman 反应(D)和[2+2]-环加成反应(E)合成相应的 β -三氟甲基- β -氨基酸以及 β -三氟甲基- β -内酰胺, 如图 5 所示.

图 5 β -三氟甲基取代的 β -氨基酸合成路径

Figure 5 Synthetic routes of β -trifluoromethyl β -amino acids

3.1 以三氟乙酰羧酸为原料合成 β -三氟甲基- β -氨基酸

Ishida 等^[46]采用三氟乙酰乙酸甲酯(**69**)和 *L*-苯甘氨酸(**70**)反应成内酯 **71**, 利用 *L*-苯甘氨酸苯环的空间位阻效应控制 β 位三氟甲基的立体构型, 还原 α,β -不饱和羧酸双键, 以较高的收率(74%)和高立体选择性(*dr* 97 : 3)得到环状氨基酸等当物 **72**, 再通过氢化脱苄水解得到 β -三氟甲基- β -丙氨酸[(*S*)-**73**] (Scheme 14).

Scheme 14

Soloshonok 等^[47,48]报道了含氟氨基化合物的仿生合成方法, 通过 1,3-氢迁移, 将酮转化为氨基. 含氟烷基酮衍生物与手性氮形成亚胺, 该亚胺在碱的作用下通过 1,3-氢迁移, 成功实现手性中心的转移, 水解后即得到较高立体选择性的含氟氨基化合物(Scheme 15).

Scheme 15

Michaut 等^[45]采用与此类似的合成方法. 首先以三氟乙酰乙酸乙酯(**58**)和苄胺(**74**)合成 β -三氟甲基- β -氨基丙烯酸酯(**75**), 再通过以金鸡纳碱催化该丙烯酸酯 **75**, 经过两次 1,3-氢迁移, 得到手性席夫碱 **76**. 原料苄胺对于反应的收率和立体选择性影响很大, 采用苄胺时没有得到目标产物, 而在苄胺苯环上引入硝基, 则以高收率和较高的立体选择性得到相应的手性席夫碱(90%收率, 71% *ee*) (Scheme 16). 因此, 该反应在底物适用性上受到一定限制.

Scheme 16

Soloshonok 等^[49]将自己研发的方法用于氨基酸的不对称合成中. 首先采用三氟乙酰乙酸异丙酯(**77**)和 (*R*)- α -苯乙胺(**78**)形成手性丙烯酸酯衍生物 **79**, 继而采用 1,8-二氮杂二环[5.4.0]十一碳-7-烯(DBU)为碱, 促进 1,3-氢迁移. 研究发现减少碱的用量可以提高其立体选择性(95% *ee*), 但是 1,3-氢迁移产物的收率降低. 为了提高收率, 增加了 DBU 的用量, 当采用 2.5 equiv. DBU 反应时, 其 *ee* 值为 84%, 1,3-氢迁移产物收率达到 93%. 继而用环氧丙烷对此化合物 **80** 进行解离, 成功得到 (*S*)- β -三氟甲基- β -氨基酸[(*S*)-**73**], 氨基酸通过甲醇重结晶, 得到光学纯度更高的单体(95% *ee*) (Scheme 17). 但此方法的缺点是无法大量制备该类氨基酸, 并非因其结构稳定性差, 而是因为 1,3-氢迁移产物的席夫碱不宜分离与纯化.

因此针对以上问题, Soloshonok 等^[50]开发了新的合成路径: 采用三氟乙酰乙酸乙酯(**58**)为原料, 先与等量的 (*R*)- α -苯乙胺(**78**)进行氨酯交换得到三氟乙酰乙酰胺, 再按照上述条件制备丙烯酸酯衍生物 **81**, 随后通过 1,3-氢迁移和水解反应得到 (*S*)- β -三氟甲基- β -氨基乙酰胺 **82**, 仅通过乙酸乙酯萃取即得到纯品, 用环氧丙烷处理得到高立体选择性的氨基酸(*S*)-**73**, 未经重结晶其 *ee* 值

Scheme 17

即可达到93% (Scheme 18). 此方法合成步骤简单, 易于分离纯化, 并且可用于大量制备(*S*)- β -三氟甲基- β -氨基酸.

Scheme 18

3.2 以三氟甲基亚胺为原料合成 β -三氟甲基- β -氨基酸

2-三氟甲基噁唑烷衍生物作为三氟甲基亚胺的等当体用于多种三氟甲基氨基化合物的合成^[51]. Huguenot等^[52]开发了2-三氟甲基噁唑烷衍生物的 Reformatsky 反应和 Mannich 反应用于制备手性(*R*)-3- β -三氟甲基- β -丙氨酸. 以溴乙酸乙酯为底物, 与手性2-三氟甲基噁唑烷衍生物 **83** 进行 Reformatsky 反应, 仅以42%的收率得到 β -三氟甲基- β -内酰胺 **84**, 立体选择性较差(*dr* 74 : 26). 在酸性乙醇中对内酰胺开环即得到 β -三氟甲基- β -丙氨酸衍生物 **85**. 而以烯醇硅醚 **86** 为底物进行的 Mannich 反应在收率和立体选择性上均有改进, 一步合成 β -三氟甲基- β -丙氨酸衍生物 **85**, 收率和 *dr* 值分别提高至73%和84 : 16. 对化合物 **85** 脱手性辅基并水解即可得到相应的氨基酸(*R*)-**73** (Scheme 19).

Santos等^[53]报道了与之类似的反应, 其将手性控制基团改为(*S*)-2-甲氧基苯乙胺, 以溴乙酸乙酯对三氟甲基手性亚胺 **87** 进行不对称 Reformatsky 反应, 得到 β -三氟甲基- β -丙氨酸衍生物 **88**. 脱保护水解得到 β -三氟甲基- β -丙氨酸[(*R*)-**73**] (Scheme 20), 较之前述方法, 其在化学合成收率和产物立体选择性上均有提高(收率80%, *ee* 值达到81%).

Scheme 19

Scheme 20

Fustero等^[54]开发了以 *L*-脯氨酸催化的 Mannich 反应不对称合成 α -烷基- β -三氟甲基- β -丙氨酸的方法. 使用丙醛(**89**)在 *L*-脯氨酸催化下对三氟甲基亚胺 **90** 进行不对称 Mannich 反应, 得到相应的三氟甲基丙氨酸 **91**. 将丙氨酸 **91** 采用次氯酸钠氧化即得到相应的氨基酸 **92** (Scheme 21). 此方法虽然产率中等(47%), 但立体选择性高(*dr* 97 : 3, 98% *ee*).

Scheme 21

Sergeeva等^[55,56]开发了通过 Baylis-Hillman 反应合成 α -烷基取代 β -三氟甲基- β -丙氨酸的方法. 首先, 以1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷(DABCO)和钙氢(CaH₂)为碱, 使用丙烯酸酯(**93**)对双三氟甲基亚胺 **94** 进行 Baylis-Hillman 反应, 以中等收率得到 Baylis-Hillman 反应产物 **95**, 通过对其还原或使用烷基铜锂进行 Michael 加成即得到 α -烷基- β , β' -双三氟甲基- β -丙氨酸(**96**).

(Scheme 22).

Scheme 22

研究人员将[2+2]环加成反应应用于合成 β -氨基酸和 β -内酰胺, 采用乙烯酮衍生物和亚胺进行[2+2]环加成反应得到相应的 β -内酰胺, 再水解即可制备 β -氨基酸. Kuznetsova 等^[57]报道了含氟 β -氨基酸和 β -内酰胺的合成方法. 苄氧基乙酰氯(97)在碱性条件下形成乙烯酮衍生物, 与三氟甲基亚胺进行[2+2]环加成反应, 由于三氟甲基降低亚胺反应活性, 因此反应需要在加热的条件下进行, 得到消旋的 β -内酰胺 98. 再将 α -羟基保护基替换为乙酰基得到 rac-99, 使用酯酶(PS-Amano lipase)进行拆分, 得到光学纯的 α -乙酰氧基- β -三氟甲基- β -内酰胺 (+)-99 (99% ee). 继而对该内酰胺更换保护基, 水解得到保护的 α -羟基- β -三氟甲基- β -丙氨酸 100 (Scheme 23), 并将该结构片段应用于紫杉醇衍生物的合成.

Scheme 23

此外, 研究人员开发了通过 Shapless 双羟化, 含氟环丙胺开环等反应, 用以合成光学纯的 β -三氟甲基- β -氨基酸和 β -内酰胺^[58~61].

4 总结与展望

含氟氨基酸和含氟类肽小分子在生物医药研究领域的应用是近年来的研究热点之一, 其中针对含氟 β -氨基酸和含氟 β -内酰胺化合物的高效合成具有重要的研

究意义. 本文总结了近些年来关于含氟 β -氨基酸和含氟 β -内酰胺的合成工作, 其中大部分为不对称合成方法研究, 期望对含氟 β -氨基酸和 β -内酰胺的合成及应用提供借鉴.

References

- [1] Wang, J.; Liu, H. *Chin. J. Org. Chem.* **2011**, *31*, 1785.
- [2] Purser, S.; Moore, P. R.; Swallow, S.; Gouverneur, V. *Chem. Soc. Rev.* **2008**, *37*, 320.
- [3] Hagmann, W. K. *J. Med. Chem.* **2008**, *51*, 4359.
- [4] Sutherland, A.; Willis, C. L. *Nat. Prod. Rep.* **2000**, *17*, 621.
- [5] Qiu, X. L.; Meng, W. D.; Qing, F. L. *Tetrahedron* **2004**, *60*, 6711.
- [6] Qiu, X. L.; Qing, F. L. *Eur. J. Org. Chem.* **2011**, 3261.
- [7] March, T. L.; Johnston, M. R.; Duggan, P. J.; Gardiner, J. *Chem. Biodiversity* **2012**, *9*, 2410.
- [8] Clader, J. W. *J. Med. Chem.* **2004**, *47*, 1.
- [9] Rosenblum, S. B.; Huynh, T.; Afonso, A.; Davis, H. R.; Yumibe, N.; Clader, J. W.; Burnett, D. A. *J. Med. Chem.* **1998**, *41*, 973.
- [10] Nakayama, K.; Kawato, H. C.; Inagaki, H.; Nakajima, R.; Kitamura, A.; Someya, K.; Ohta, T. *Org. Lett.* **2000**, *2*, 977.
- [11] Kawato, H. C.; Nakayama, K.; Inagaki, H.; Nakajima, R.; Kitamura, A.; Someya, K.; Ohta, T. *Org. Lett.* **2000**, *2*, 973.
- [12] Thornberry, N. A.; Weber, A. E. *Curr. Top. Med. Chem.* **2007**, *7*, 557.
- [13] Biftu, T.; Feng, D.; Qian, X. X.; Liang, G. B.; Kieczkowski, G.; Eiermann, G.; Huaibing, H. B.; Letting, B.; Lyons, K.; Petrov, A.; Sinha-Roy, R.; Zhang, B.; Scapin, G.; Patel, S.; Gao, Y. D.; Singh, S.; Wu, J.; Zhang, X. P.; Thornberry, N. A.; Weber, A. E. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2007**, *17*, 49.
- [14] Ojima, I.; Lin, S. N.; Slater, J. C.; Wang, T.; Pera, P.; Bernacki, R. J.; Ferlini, C.; Scambia, G. *Bioorg. Med. Chem.* **2000**, *8*, 1619.
- [15] Pan, Y. H.; Zhao, Y. J.; Ma, T.; Yang, Y. Y.; Liu, H. J.; Jiang, Z. Y.; Tan, C. H. *Chem.-Eur. J.* **2010**, *16*, 779.
- [16] Andrews, P. C.; Bhaskar, V.; Bromfield, K. M.; Dodd, A. M.; Duggan, P. J.; Duggan, S. A. M.; McCarthy, T. D. *Synlett* **2004**, 791.
- [17] Duggan, P. J.; Johnston, M.; March, T. L. *J. Org. Chem.* **2010**, *75*, 7365.
- [18] Hook, D. F.; Gessier, F.; Noti, C.; Kast, P.; Seebach, D. *ChemBioChem* **2004**, *5*, 691.
- [19] Davis, F. A.; Reddy, R. E. *Tetrahedron: Asymmetry* **1994**, *5*, 955.
- [20] Peddie, V.; Pietsch, M.; Bromfield, K. M.; Pike, R. N.; Duggan, P. J.; Abell, A. D. *Synthesis-Stuttgart* **2010**, 1845.
- [21] Ohba, T.; Ikeda, E.; Takei, H. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **1996**, *6*, 1875.
- [22] Gessier, F.; Noti, C.; Rueping, M.; Seebach, D. *Helv. Chim. Acta* **2003**, *86*, 1862.
- [23] Yoshinari, T.; Gessier, F.; Noti, C.; Beck, A. K.; Seebach, D. *Helv. Chim. Acta* **2011**, *94*, 1908.
- [24] Thaisrivongs, S.; Schostarez, H. J.; Pals, D. T.; Turner, S. R. *J. Med. Chem.* **1987**, *30*, 1837.
- [25] Uoto, K.; Ohsuki, S.; Takenoshita, H.; Ishiyama, T.; Iimura, S.; Hirota, Y.; Mitsui, I.; Terasawa, H.; Soga, T. *Chem. Pharm. Bull.* **1997**, *45*, 1793.
- [26] Fokina, N. A.; Kornilov, A. M.; Kukhar, V. P. *J. Fluorine Chem.* **2001**, *111*, 69.
- [27] Soloshonok, V. A.; Ohkura, H.; Sorochinsky, A.; Voloshin, N.; Markovsky, A.; Belik, M.; Yamazaki, T. *Tetrahedron Lett.* **2002**, *43*, 5445.
- [28] Sorochinsky, A.; Voloshin, N.; Markovsky, A.; Belik, M.; Yasuda,

- N.; Uekusa, H.; Ono, T.; Berbasov, D. O.; Soloshonok, V. A. *J. Org. Chem.* **2003**, *68*, 7448.
- [29] Staas, D. D.; Savage, K. L.; Homnick, C. F.; Tsou, N. N.; Ball, R. G. *J. Org. Chem.* **2002**, *67*, 8276.
- [30] Honda, T.; Wakabayashi, H.; Kanai, K. *Chem. Pharm. Bull.* **2002**, *50*, 307.
- [31] Otaka, A.; Watanabe, J.; Yukimasa, A.; Sasaki, Y.; Watanabe, H.; Kinoshita, T.; Oishi, S.; Tamamura, H.; Fujii, N. *J. Org. Chem.* **2004**, *69*, 1634.
- [32] Niida, A.; Tomita, K.; Mizumoto, M.; Tanigaki, H.; Terada, T.; Oishi, S.; Otaka, A.; Inui, K.; Fujii, N. *Org. Lett.* **2006**, *8*, 613.
- [33] Boyer, N.; Gloanec, P.; De Nanteuil, G.; Jubault, P.; Quirion, J. C. *Eur. J. Org. Chem.* **2008**, 4277.
- [34] Boyer, N.; Gloanec, P.; De Nanteuil, G.; Jubault, P.; Quirion, J. C. *Tetrahedron* **2007**, *63*, 12352.
- [35] Sato, K.; Tarui, A.; Matsuda, S.; Omote, M.; Ando, A.; Kumadaki, I. *Tetrahedron Lett.* **2005**, *46*, 7679.
- [36] Tarui, A.; Ozaki, D.; Nakajima, N.; Yokota, Y.; Sokeirik, Y. S.; Sato, K.; Orriote, M.; Kumadaki, I.; Ando, A. *Tetrahedron Lett.* **2008**, *49*, 3839.
- [37] Avenoza, A.; Busto, J. H.; Jimenez-Oses, G.; Peregrina, J. M. *J. Org. Chem.* **2005**, *70*, 5721.
- [38] Pang, W.; Zhu, S. F.; Jiang, H. F.; Zhu, S. Z. *Tetrahedron* **2006**, *62*, 11760.
- [39] Fustero, S.; Chiva, G.; Piera, J.; Sanz-Cervera, J. F.; Volonterio, A.; Zanda, M.; de Arellano, C. R. *J. Org. Chem.* **2009**, *74*, 3122.
- [40] Shimada, T.; Yoshioka, M.; Konno, T.; Ishihara, T. *Chem. Commun.* **2006**, 3628.
- [41] Jakowiecki, J.; Loska, R.; Makosza, M. *J. Org. Chem.* **2008**, *73*, 5436.
- [42] Mohar, B.; Stephan, M.; Urleb, U. *Tetrahedron* **2010**, *66*, 4144.
- [43] Lin, D. Z.; Lv, L.; Wang, J.; Ding, X.; Jiang, H. L.; Liu, H. *J. Org. Chem.* **2011**, *76*, 6649.
- [44] Jiang, J. L.; Shah, H.; DeVita, R. J. *Org. Lett.* **2003**, *5*, 4101.
- [45] Michaut, V.; Metz, F.; Paris, J. M.; Plaquevent, J. C. *J. Fluorine Chem.* **2007**, *128*, 889.
- [46] Ishida, Y.; Iwahashi, N.; Nishizono, N.; Saigo, K. *Tetrahedron Lett.* **2009**, *50*, 1889.
- [47] Soloshonok, V. A.; Ono, T. *J. Org. Chem.* **1997**, *62*, 3030.
- [48] Ono, T.; Kukhar, V. P.; Soloshonok, V. A. *J. Org. Chem.* **1996**, *61*, 6563.
- [49] Soloshonok, V. A.; Ohkura, H.; Yasumoto, M. *J. Fluorine Chem.* **2006**, *127*, 924.
- [50] Soloshonok, V. A.; Ohkura, H.; Yasumoto, M. *J. Fluorine Chem.* **2006**, *127*, 930.
- [51] Begue, J. P.; Bonnet-Delpon, D.; Crousse, B.; Legros, J. *Chem. Soc. Rev.* **2005**, *34*, 562.
- [52] Huguenot, F.; Brigaud, T. *J. Org. Chem.* **2006**, *71*, 2159.
- [53] Dos Santos, M.; Crousse, B.; Bonnet-Delpon, D. *Synlett* **2008**, 399.
- [54] Fustero, S.; Jimenez, D.; Sanz-Cervera, J. F.; Sanchez-Rosello, M.; Esteban, E.; Simon-Fuentes, A. *Org. Lett.* **2005**, *7*, 3433.
- [55] Sergeeva, N. N.; Golubev, A. S.; Hennig, L.; Findeisen, M.; Paetzold, E.; Oehme, G.; Burger, K. *J. Fluorine Chem.* **2001**, *111*, 41.
- [56] Sergeeva, N. N.; Golubev, A. S.; Burger, K. *Synthesis-Stuttgart* **2001**, 281.
- [57] Kuznetsova, L.; Ungureanu, I. M.; Pepe, A.; Zanardi, I.; Wu, X. Y.; Ojima, I. *J. Fluorine Chem.* **2004**, *125*, 487.
- [58] Jiang, Z. X.; Qing, F. L. *J. Org. Chem.* **2004**, *69*, 5486.
- [59] Rinaudo, G.; Narizuka, S.; Askari, N.; Crousse, B.; Bonnet-Delpon, D. *Tetrahedron Lett.* **2006**, *47*, 2065.
- [60] Fustero, S.; del Pozo, C.; Catalan, S.; Aleman, J.; Parra, A.; Marcos, V.; Ruano, J. L. G. *Org. Lett.* **2009**, *11*, 641.
- [61] Ruano, J. L. G.; Aleman, J.; Catalan, S.; Marcos, V.; Monteagudo, S.; Parra, A.; del Pozo, C.; Fustero, S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 7941.

(Li, L.)