达菲合成最新进展

张田财 鲁慧 张辅民* 程军 刘天阳

(兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室 兰州大学化学化工学院 兰州 730000)

摘要 作为预防和治疗各种流感的首选药物, 达菲的合成受到化学合成工作者的广泛关注. 4年来, 涌现出了多条极具特色的合成路线, 将对这些合成路线做一综述.

关键词 达菲; 药物; 全合成

Recent Progress in the Synthesis of Tamiflu

Zhang, Tiancai Lu, Hui Zhang, Fu-Min* Cheng, Jun Liu, Tianyang

(State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry & College of Chemistry and Chemical Engineering, Lanzhou University, Lanzhou 730000)

Abstract Tamiflu, one of the most common orally drugs for the treatment and prevention of influenza, has attracted extensive interests of synthetic chemists all over the world. Concise, efficient, and scalable synthetic approaches toward this molecule have been a very active field in recent years, and many diverse synthetic routes have been developed to date. In this review, representative synthetic routes employing chiral starting material or catalytic asymmetric reactions are briefly summarized.

Keywords tamiflu; drug; total synthesis

流感一直严重威胁着人类的健康. 20世纪3次全球蔓延的流感夺去了成千上万人的性命, 同时流感的预防和治疗也给社会、家庭和个人造成沉重的经济负担, 每年全球用于治疗流感的费用惊人^[1]. 虽然人类一直在寻找能有效地预防和治疗流感的药物, 但至今仍无法有效控制这一全球性的流行性疾病. 特别是近年来禽流感的爆发, 使得对抗流感病毒药物的需求更为迫切.

目前市场上使用的流感药物主要有两类(Scheme 1). 一类是上市于二十世纪六七十年代的金刚烷胺类, 包括金刚胺(Amantadine)和金刚乙胺(Rimantadine), 这类药物是 M2 离子通道抑制剂, 能干扰病毒在细胞中的脱壳过程, 但只对 A 型流感病毒有效, 且已产生严重的耐药性; 另一类是唾液酸酶抑制剂, 包括奥司他韦(Osetamivir)和扎那米韦(Zanamivir), 这类药物则对 A 型和 B 型流感病毒均有很强抑制作用.

达菲(Tamiflu), 化学名为“(3*R*,4*R*,5*S*)-4-乙酰胺-5-氨基-3-(1-乙基丙氧基)-1-环己烯-1-羧酸乙酯磷酸盐”.

Scheme 1

该化合物是由 Gilead 公司科学家在流感病毒神经氨酸苷酶晶体结构完全确定后, 在分子模拟和合理设计的基础上发现并优化的高效抗流感药物, 1999 年经美国食品与药品监督管理局(FDA)批准上市. 由于该药物的高效性和广谱性, 从 1997 年 Gilead 公司^[2]报道第一条合成路

* E-mail: zhangfm@lzu.edu.cn

Received March 27, 2013; revised May 9, 2013; published online May 13, 2013.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 20972059, 21290180), the Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University (No. IRT1138) and the Fundamental Research Funds for the Central Universities (No. lzujbky-2013-ct02).

国家自然科学基金委(Nos. 20972059, 21290180)、教育部长江学者创新团队(No. IRT1138)和中央高校基本科研费(No. lzujbky-2013-ct02)资助项目.

线起,至今已报道了三十多条合成路线.除了利用莽草酸、奎尼酸、*L*-丝氨酸、木糖、*D*-甘露糖、*L*-甲硫氨酸、酒石酸二乙酯等手性原料外,还有许多催化不对称合成路线问世,为达菲的合成提供了诸多可选的途径.虽然已有综述文章对其合成进行归纳^[3],但近4年来达菲的合成又涌现出了新的策略和路线,本文对2010年以来合成达菲的新策略和新路线作一总结.

1 通过手性原料合成达菲

由于自然界中存在大量的手性源化合物,具有很高的光学纯度.若用作起始原料,则可很好地诱导新形成的手性中心,因此,从廉价的手性原料出发合成达菲仍不失为极佳的选择.

1.1 莽草酸为原料

尽管之前报道了以莽草酸作为原料来合成达菲的多条路线,但由于莽草酸已含有达菲分子的基本骨架,且有3个连续的羟基官能团可进一步转化,所以仍然有合成化学工作者致力于研发以莽草酸为原料合成达菲更高效、更经济的新路线.

2012年,施小新小组^[4]在他们之前大量系统研究的基础上,报道了一条更高效的以莽草酸为原料合成达菲的路线(Scheme 2)^[5].

Scheme 2

从莽草酸出发,他们用该小组发展的方法得到化合物 **3** 后用 Ms 保护剩余的一个羟基,接着用叠氮化钠选择性进攻环亚硫酸酯,并以良好的区域选择性从烯丙位开环得到化合物 **5**. PPh_3 还原叠氮,生成的中间体对新形成的环氧化合物开环、进一步水解即可实现氮杂环丙烷 **6** 的合成.该化合物在水中有良好的溶解性,所以借助这一特性将其和三苯氧磷进行分离,从而解决了达菲合成中分离纯化三苯氧磷的困难.安装乙酰基后在 Lewis 酸催化下,用 3-戊醇选择性再次从烯丙位开环得到化合物 **8**,用 Ms 活化羟基后在碱性条件下发生分子内亲核取代得到氮杂环丙烷 **9**,用叠氮化钠区域选择性开环可得化合物 **10**,按照作者已经报道的方法即可合成目标产物.该路线最终以 11 步转化,55% 的总产率实现了达菲的合成.

1.2 酒石酸二乙酯为原料

2010年,鲁桂小组^[6]报道了一条利用酒石酸二乙酯为原料合成达菲的路线(Scheme 3).

从 *D*-酒石酸二乙酯出发,用 3,3-二甲氧基戊烷保护邻二醇后在 $\text{LiAlH}_4/\text{AlCl}_3$ 条件下切断缩酮保护即可顺利引入 3-戊醚,接着用 NaIO_4 对邻二醇氧化切断得到醛 **14**,化合物 **14** 和 (*S*)-叔丁基亚磺酰胺发生反应得到手性亚胺 **15**.值得一提的是,从化合物 **12** 到 **15** 的转化不需要柱层析,而且底物的量可以放大到 25 g. 在手性亚磺酰胺的诱导下,不对称 aza-Henry 反应以很好的非对映选择性引入了目标分子中的两个氮源.脱除手性辅基后安装乙酰基,再用 IBX 将羟基氧化成醛,至此,他们得到了关键反应的前体 **17**.化合物 **17** 与 **18** 在 DBU/ LiCl 条件下发生串联 Michael/Horner-Wadsworth-Emmons 反应,以中等的非对映选择性得到化合物 **19**.用对甲苯磺酰对化合物 **19** 中的 α,β -不饱和酯进行 Michael 加成,然后用 Zn 粉将硝基还原为氨基,紧接着在体系内通入氨气,形成 Zn(II)-NH_3 混合物,再加入碳酸钾后发生消除反应得到达菲的游离碱——奥司他韦(三步产率为 82%).至此,他们用廉价易得的酒石酸二乙酯作原料,通过 11 步转化,以 21% 的总产率合成了目标产物的游离碱,且避免使用有潜在危险的 NaN_3 作为氮源.

1.3 糖类作为手性原料

糖类是自然界存在的一类含量丰富、品种繁多的手性源.因此,许多合成工作者以糖类化合物为起始原料,高效地实现了达菲的合成.

1.3.1 *D*-甘露醇为原料

2010年 Ko 小组^[7]报道了一条以非常廉价易得的 *D*-甘露醇为原料合成达菲的路线(Scheme 4).

Scheme 3

Scheme 4

该小组从 *D*-甘露醇出发, 首先用 3,3-二甲氧基戊烷保护末端两个羟基、 KIO_4 氧化切断邻二醇、乙烯基溴化镁加成得到烯丙醇 **23**。化合物 **23** 在 $\text{CH}_3\text{C}(\text{OEt})_3/\text{EtCO}_2\text{H}$ 条件下发生酯化并原位发生 Claisen 重排得到化合物 **24**。酯 **24** 发生串联的 Sharpless 不对称双羟化/内酯化反应, 得到单一的产物 γ -内酯 **25**。然后用 NaN_3 取代活化的羟基进而在还原条件下选择切断缩酮保护、Swern 氧化后得到醛 **26**。由于打开内酯环就不可避免地要对生成的羟基进行保护, 因此作者用底物 **26** 尝试本

路线的关键步骤——分子内 aldol 环化反应。欣喜的是, 正是由于内酯环的存在, 使得这一关键步骤得以顺利实现, 得到化合物 **27** 后在 LiBr/DBU 条件下打开桥环内酯实现了达菲的基本骨架化合物 **28** 的合成, 还原叠氮、安装乙酰基、进而在 $\text{DBU}/\text{LiClO}_4$ 条件下消除 TBDMSiOH 后得到化合物 **29**。最后用 Ms 活化羟基、 NaN_3 亲核取代、还原叠氮就得到了奥司他韦。该路线以 16 步反应, 7.1% 的总产率合成了达菲的游离碱——奥司他韦。

1.3.2 *D*-核糖为原料

1.3.2.1 Chen 小组和 Chai 小组

2010年, Chen 小组和 Chai 小组^[8]报道了一条以更加廉价的原料 *D*-核糖(当时售价仅 30 美元/kg)合成达菲的路线(Scheme 5).

从 *D*-核糖出发, 首先用 3-戊酮保护处于顺式的邻二醇, 然后对一级羟基进行碘代得到化合物 **31**, 碘代物 **31** 与溴代丙烯酸乙酯 **32** 发生 Bernet-Vasella 串联反应得到化合物 **33** 及其异构体(*dr*=5.2:1), 为避免生成的羟基发生内酯化反应, 作者采用混合溶剂 THF/H₂O 中的水及时淬灭生成的氧负离子的方法.

得到关键反应前体 **33** 之后, 通过条件筛选, 在第二代 Grubbs-Hoveyda 催化剂作用下, 以 99% 的产率得到了达菲的基本骨架 **34**, 他们^[9]试图用 Ms 保护羟基, 然后用文献报道的 Et₃SiH/TiCl₃ 条件选择性切断缩酮保护基, 但主要得到的不是预期的产物. 考虑到 Ms 的位阻阻碍了还原切断的位点, 所以用 AlCl₃/Et₃SiH 对羟基未保护的底物 **34** 进行直接切断, 以 6:1 的选择性得到了预期的产物, 为了选择性地引入氮源, 他们用三氟甲磺酰基和甲磺酰基分别保护两个羟基得到化合物 **35**, 然后在丙酮/水(*V*:*V*=9:1)的混合溶剂中与叠氮化钠反应以非常好的选择性得到化合物 **36**, 还原叠氮成氨基后发生分子内 S_N2 反应得到氮杂环丙烷 **37**. 按照已报道的方法就可通过三步转化合成目标产物. 最终作者以 9 步, 28% 总产率完成了 **37** 的合成, 从而实现了达菲的形式合成.

1.3.2.2 Kongkathip 小组

2010年, Kongkathip 小组^[10]报道了一条以 *D*-核糖为

原料合成达菲的路线(Scheme 6). 该路线和 Chen 小组以及 Chai 小组报道的路线有很大的相似之处.

从 *D*-核糖出发, 按照和文献类似的方法合成双烯化合物 **33**, 选用第二代 Grubbs 催化剂顺利完成关环烯烃复分解(RCM)反应从而得到达菲的骨架化合物 **38**. 用 TEMPO/TCCA 氧化羟基成酮, 再与羟胺发生缩合反应形成肟, 接着用 NaBH₄/MoO₃ 将肟还原为氨基得到化合物 **39**. Et₃SiH/TiCl₄ 选择性切断缩酮安装 3-戊醚, 在该步转化中, 作者用氨基保护的底物(保护基为 Ts, Ac, Bn 和 Boc 等)尝试对缩酮的区域选择性开环, 发现效果较差, 而未保护的底物 **39** 却以非常高的区域选择性得到了预期的产物, 接着用 Boc 保护氨基得到化合物 **40**. 随后用三氟甲磺酰基活化羟基, 用叠氮化钠进攻得到化合物 **41**, 该化合物在 AcSH/2,6-lutidine 条件下将叠氮官能团直接转化成乙酰氨基, 然后脱除 Boc 保护基, 用磷酸处理即可得到目标产物. 最终作者经 14 步转化, 以 5% 的总产率实现了达菲的合成.

1.3.3 *D*-葡萄糖为原料

2010年, Chen 和 Liu 小组^[11]报道了一条以 *D*-葡萄糖为原料合成达菲的路线(Scheme 7).

从 *D*-葡萄糖出发, 按照文献的方法得到化合物 **43**, 首先对 C-4 和 C-6 的羟基进行保护形成缩醛, 然后用 TBS 保护 C-3 的羟基, DIBAL-H 对缩醛选择性切断得到一级醇 **44**. 用 DMP 将一级羟基氧化成醛, 然后和甲基磷叶立德发生 Wittig 反应得到化合物 **45**. 得到关键前体 **45** 后, 在二苯基醚/210 °C 条件下发生 Claisen 重排得到单一构型的化合物 **46**, 从而高效地实现了达菲所含六元碳环的构建.

Scheme 5

Scheme 6

Scheme 7

接下来, 将醛 **46** 氧化成酸后乙酯化得到化合物 **47**, 脱除 PMB 保护基后将生成的羟基转化成氨基甲酸酯 **48** 后在 (CuOTf)₂·toluene 作用下发生氮杂环丙烷化, 再用 TMSN₃ 亲核进攻生成的中间体, 进一步用 AcCl/NaH 安装乙酰基, 然后在 DBU/MeCN 条件下发生消除反应得到化合物 **49**. 用三步转化(水解、氧化、还原)以 50% 收率实现了羟基构型的翻转, 采用 Ms 活化羟基后氨基分子内亲核进攻得到氮杂环丙烷, 3-戊醚的安装则通过文献报道的方法来实现——在 Lewis 酸的催化下, 用 3-戊醇进攻氮杂环丙烷后得到化合物 **10**, 还原叠氮, 再用磷酸处理就得到了达菲.

1.3.4 D-甘露糖为原料

2012 年, Kongkathip 小组^[12]报道了一条 D-甘露糖为原料合成达菲的路线(Scheme 8).

从 D-甘露糖(**51**)出发, 用 3-戊酮对羟基进行缩酮保护后用苄基保护缩醛上的羟基得到化合物 **52**, 接着用 HCl/MeOH 将缩酮选择性脱除, 再用 NaIO₄ 对邻二醇氧化切断生成醛 **53**. 该化合物与磷酸酯发生缩合反应得到化合物 **54**, 催化氢化同时还还原共轭双键并脱除苄基, 然后在 NaH/THF 中发生分子内 Horner-Wadsworth-Emmons 反应得到达菲的基本骨架化合物 **55**. 将羟基氧化成酮, 接着和羟氨作用生成肟 **56**. 用 NaBH₄/MoO₃ 还

的关键中间体 **64**^[14].

2 通过不对称催化反应合成达菲

虽然利用手性源实现了达菲的多条合成路线, 但不对称催化因其能高效地实现手性的增殖而倍受合成化学家的青睐^[15]. 因此许多合成工作者运用金属催化、生物催化和有机催化等方法也实现了达菲的高效合成.

2.1 Cu 催化的三组分反应合成达菲关键中间体

最近, Shibasaki 小组^[13]发展了一条铜催化的炔、醛、二级胺三组分反应以及 Dieckmann 缩合作为关键步骤的合成达菲的路线(Scheme 10).

Scheme 8

Scheme 9

该小组以丙炔酸乙酯、醛以及二级胺为原料,在催化剂及手性配体 **68** 作用下,以中等的对映选择性(76% *ee*)和较好的收率(84%)得到了手性炔丙胺 **69**,选择性还原炔酯成顺式不饱和酯 **70**,通过与 Scheme 9 类似的方法得到关键中间体 **64**.

2.2 有机催化的串联反应

2010 年中国科学院上海有机化学研究所的马大为小组^[16]报道了一条串联 Michael/Horner-Wadsworth-Emmons 反应为关键步骤合成达菲的更简捷路线(Scheme 11). 这条路线的亮点不仅在于充分利用串联反应和一锅法操作,而且他们^[17]还证实了乙酰基保护的 2-硝基乙烯胺可以和醛发生有机小分子催化的 Michael 反应,从而合成具有重要生理价值和广泛应用于手性配体的邻二胺类化合物.

首先从 2-硝基乙烯胺出发,用乙酰基保护氨基后在手性催化剂 **73** 作用下发生 Michael 加成构筑两个立体中心. 一般情况下,由于中间体强烈的分子内氢键作用使

乙酰基保护的氨基处于硝基的顺式位置,所以在大多数条件下得到的主要加成产物为非预期的产物. 为了抵消氢键作用,作者通过增加取代基的位阻,并且加入 4 Å 分子筛、添加剂醋酸有效地实现了预期的加成产物 **74** 的合成. 化合物 **74** 不经过分离,在 Cs₂CO₃ 作用下与 **18** 发生串联反应 Michael/Horner-Wadsworth-Emmons 反应得到达菲基本骨架 **75**. 该化合物也不需分离直接与对甲基苯硫酚反应得到化合物 **76**. 用 Zn 将硝基还原成氨基,最后在 K₂CO₃/EtOH 中消除对甲基苯硫酚得到达菲的游离碱(奥司他韦). 这条路线非常高效和实用,已经可以以 10 mmol 的量级合成. 目前,马大为小组正在尝试将该路线运用于工业生产.

2.3 失对称化反应

2.3.1 Hayashi 小组

2011 年, Hayashi 小组^[18]报道了一条以环氧化合物为原料合成达菲的路线(Scheme 12).

Scheme 10

Scheme 11

Scheme 12

从对称的环氧化合物 **77** 出发, 先发生失对称的 Kharasch-Sosnovsky 烯丙位氧化, 引入第一个手性中心得到化合物 **79**, 但由于产物 **79** 的 *ee* 值不高, 所以通过调整酯基并利用重结晶的方法以 99% *ee* 得到化合物 **80**, 然后转换保护基合成化合物 **81**. 叠氮选择性打开环氧后活化生成的羟基实现了 **82** 的合成, 接着用 PPh₃ 还原叠氮成氨基即可发生分子内关环得到氮杂环丙烷, 再次用 NaN₃ 区域选择性进攻形成的氮杂环丙烷, 进而将生成的氨基乙酰化. 用 HCl/MeOH 脱除 MOM 保护基, 还原叠氮, 保护生成的氨基, 进一步氧化得到化合物 **84**. 至此, 他们以 23% 的总产率完成了从原料 **77** 到化合物 **84** 的转化, 然后用已报道的方法就可以顺利得到达菲.

2.3.2 Kang 小组

2012 年, Kang 小组^[19]报道了以二羟甲基氮杂环丙烷衍生物合成达菲的路线(Scheme 13).

从原料 **85** 出发, 通过羟基、氨基保护基调整合成化合物 **86**, 在脂肪酶作用下发生失对称的乙酯化反应得到乙酰基单保护产物 **87**, 用 TBS 保护另一个羟基, 再脱除乙酰基便得到了一级醇 **88**. 用 DMP 将羟基氧化成醛, 然后和溴代丙烯酸乙酯 **32** 发生 Reformatsky 反应以 *d.r.* = 3 : 1 实现预期加成产物 **89** 的合成. 进一步用 Ms 保护羟基, 脱除硅醚保护基后用 DMP 将生成的羟基氧化成醛, 然后和甲基磷叶立德发生 Wittig 反应得到

Scheme 13

RCM 反应前体——双烯化合物 **90**。在 Grubbs II 催化剂作用下顺利发生反应合成达菲的骨架化合物 **91**。为了安装分子中的官能团,起初他们尝试用 TFA 脱去 Boc 保护基,然后用乙酰基保护氮杂环丙烷上的氨基,但是由于氮杂环丙烷化合物的不稳定性,底物在该条件下发生了分解,所以先用 3-戊醇进攻氮杂环丙烷,再脱除 Boc 保护基,而后乙酰化得到化合物 **92**。接下来用 NaN_3 进攻 Ms 活化的羟基,还原叠氮,最后用磷酸处理得到达菲。

3 结语

虽然达菲的合成受到如此之多化学合成工作者的关注,并发展了多条合成路线,但真正可工业化生产的路线仍很少。除了经济成本外,从实验室到工业化生产也有一段较长的路要走,所以我们期待更多、更高效、更利于工业化生产的合成路线问世,以解决达菲生产原料紧缺等问题,这需要有机合成化学家们不懈的努力。

References

- [1] World-Health-Organization *Swine Influenza Questions and Answers*, April 26, **2009**.
- [2] Kim, C. U.; Lew, W.; Williams, M. A.; Liu, H. T.; Zhang, L. J.; Swaminathan, S.; Bischofberger, N.; Chen, M. S.; Mendel, D. B.; Tai, C. Y.; Laver, W. G.; Stevens, R. C. *J. Am. Chem. Soc.* **1997**, *119*, 681.
- [3] (a) Shibasaki, M.; Kanai, M. *Eur. J. Org. Chem.* **2008**, 1839.
(b) Magano, J. *Chem. Rev.* **2009**, *109*, 4398.
(c) Sun, H.; Liu, Y. J.; Wu, Y. L.; Wu, Y. K. *Chin. J. Org. Chem.* **2009**, *32*, 1869 (in Chinese).
(孙海, 林英杰, 吴毓林, 伍贻康, 有机化学, **2009**, *32*, 1869.)
(d) Jing, Y.; Lin, J. R.; Jin, R. H. *Appl. Chem. Ind.* **2010**, *39*, 751 (in Chinese).
(景羽, 林静容, 金荣华, 应用化工, **2010**, *39*, 751.)
- (e) Magano, J. *Tetrahedron* **2011**, *67*, 7875.
- [4] (a) Nie, D. L.; Shi, X. X. *Tetrahedron: Asymmetry* **2009**, *20*, 124.
(b) Nie, D. L.; Shi, X. X.; Ko, K. H.; Lu, W. D. *J. Org. Chem.* **2009**, *74*, 3970.
(c) Nie, D. L.; Shi, X. X.; Quan, N.; Wang, F. F.; Lu, X. *Tetrahedron: Asymmetry* **2011**, *22*, 1692.
- [5] Nie, D. L.; Ding, W.; Shi, X. X.; Quan, N.; Lu, X. *Tetrahedron: Asymmetry* **2012**, *23*, 742.
- [6] Weng, J.; Li, Y. B.; Wang, R.-B.; Li, F. Q.; Liu, C.; Chan, A. S. C.; Lu, G. *J. Org. Chem.* **2010**, *75*, 3125.
- [7] Ko, J. S.; Keum, J. E.; Ko, S. Y. *J. Org. Chem.* **2010**, *75*, 7006.
- [8] Osato, H.; Jones, I. L.; Chen, A.; Chai, C. L. *L. Org. Lett.* **2010**, *12*, 60.
- [9] Federspiel, M.; Fisher, R.; Henning, M.; Mair, H. J.; Oberhauser, T.; Rimmler, G.; Albiez, T.; Bruhin, J.; Estermann, H.; Gandert, C.; Gockel, V.; Gotzo, S.; Hoffmann, U.; Huber, G.; Janatsch, G.; Lauper, S.; Rockel-Stabler, O.; Trussardi, R.; Zwahlen, A. *G. Org. Process Res. Dev.* **1999**, *3*, 266.
- [10] Wichienkul, P.; Akkarasamiyo, S.; Kongkathip, N.; Kongkathip, B. *Tetrahedron Lett.* **2010**, *51*, 3208.
- [11] Ma, J.; Zhao, Y.; Ng, S.; Zhang, J.; Zeng, J.; Than, A.; Chen, P.; Liu, X.-W. *Chem. Eur. J.* **2010**, *16*, 4533.
- [12] Chuanopparat, N.; Kongkathip, N.; Kongkathip, B. *Tetrahedron* **2012**, *68*, 6803.
- [13] Alagri, K.; Furutachi, M.; Yamatsugu, K.; Kumagai, N.; Watanabe, T.; Shibasaki, M. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 4019.
- [14] Yeung, Y.-Y.; Hong, S.; Corey, E. J. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 6310.
- [15] Lin, G. Q.; Chen, Y. Q.; Li, Y. M.; Chen, X. Z. *Asymmetric Synthesis: Asymmetric Reactions and Application*, Science Press, Beijing, **2007** (in Chinese).
(林国强, 陈耀全, 李月明, 陈新滋, 手性合成: 不对称反应及其应用, 科学出版社, 北京, **2007**.)
- [16] Zhu, S.; Yu, S.; Wang, Y.; Ma, D. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, *49*, 4656.
- [17] Zhu, S.; Yu, S.; Ma, D. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 545.
- [18] Tanaka, T.; Tan, Q. T.; Kawakubo, H.; Hayashi, M. *J. Org. Chem.* **2011**, *76*, 5477.
- [19] Oh, H.-S.; Kang, H.-Y. *J. Org. Chem.* **2012**, *77*, 8792.

(Qin, X.)