由猪去氧胆酸合成异熊去氧胆酸的新方法

刘 双 汪钢强 刘张坤 汪秋安*

(湖南大学化学化工学院 长沙 410082)

摘要 研究了异熊去氧胆酸的合成新方法. 以猪去氧胆酸为原料, 通过 9 步反应(总产率为 25%), 高效地合成了异熊去氧胆酸. 合成路线中的关键中间体 **4** 是由化合物 **3** 经改进的烯丙位氧化以较高产率获得. 合成反应的关键步骤分别是化合物 **5** 在 Mitsunobu 反应条件下的构型转化和 α,β -不饱和羰基化合物 **6** 发生的立体选择性 Luche 还原. 所有合成化合物的结构已通过 ^1H NMR, ^{13}C NMR, MS 和 IR 等波谱方法进行了确认. 该合成途径原料易得、总产率较高、后处理操作简便, 具有较高的应用价值.

关键词 异熊去氧胆酸; 猪去氧胆酸; Mitsunobu 构型反转; Luche 还原; 合成

A Novel Synthetic Approach of Alloursodeoxycholic Acid from Hydoxycholic Acid

Liu, Shuang Wang, Gangqiang Liu, Zhangkun Wang, Qiu'an*

(College of Chemistry and Chemical Engineering, Hunan University, Changsha 410082)

Abstract A novel and highly efficient synthetic approach of alloursodeoxycholic acid, starting from hydoxycholic acid in 9 steps with overall yield 25%, was reported. The key intermediate **4** was prepared in good yield by improved allylic oxidation of **3**. The critical steps to stereoselectively inverse the configuration of **5** and α,β -unsaturated carbonyl reduction of **6** were realized under Mitsunobu conditions and Luche reduction respectively. The structures of all synthetic compounds were confirmed by ^1H NMR, ^{13}C NMR, MS and IR spectra. The synthetic approach has the advantages of easy availability of starting materials, highly stereoselective, easily work-up and good overall yield, so it has considerable practical value.

Keywords alloursodeoxycholic acid; hydoxycholic acid; Mitsunobu configuration inversion; Luche reduction; synthesis

异熊去氧胆酸(Alloursodeoxycholic acid), 又名 $3\alpha,7\beta$ -二羟基- 5α -胆烷酸, 是熊去氧胆酸(Ursodeoxycholic acid, 又名 $3\alpha,7\beta$ -二羟基- 5β -胆烷酸)的差向异构体^[1]. 熊去氧胆酸系珍贵药物熊胆的有效成分, 具有清热、平肝、明目等功效. 临床上用于治疗各种胆道疾病、急慢性肝炎、肝硬化及心血管疾病, 尤其对胆固醇型胆结石有独特疗效^[2]. 异熊去氧胆酸以及它的系列衍生物是存在于哺乳动物包括人体胆囊中的微量成分, 作为人体胆固醇代谢为胆酸过程中的一个重要中间体^[3], 具有重要的生理功能. 生化分析在检测人体胆固醇代谢指标时, 需采用高纯度异熊去氧胆酸作为标准物质, 同时异熊去氧胆酸的药学价值也尚待研发. 因此有必要对异熊去氧胆酸的合成新方法进行研究.

自 20 世纪 50 年代起, 人们在试图用人工方法合成熊去氧胆酸, 也曾对异熊去氧胆酸的合成进行了研究. Goto 和 Iida 等^[4,11]分别提出了从 3α -乙酰氧基-6-溴-7,12-二酮- 5β -胆烷酸甲酯和 4β -溴- 7α -乙酰氧基-3-酮- 5β -胆烷酸合成异熊去氧胆酸的路线, 他们采用的合成方法原料难得, 反应步骤多, 且反应中采用碱金属钠在醇中还原, 反应十分剧烈, 或使用过氧化钾等危险品, 因此反应操作十分不便. 猪去氧胆酸(Hydoxycholic acid)是从猪胆汁中提出来的天然甾体化合物, 其来源丰富, 价廉易得. 以含量较高且来源丰富的猪去氧胆酸为原料半合成异熊去氧胆酸, 具有原料易得、合成步骤少、生产成本低和环境友好等优点, 对药物和生化产品开发具有重要意义.

* E-mail: wangqa@hnu.edu.cn

Received April 20, 2013; revised June 25, 2013; published online July 3, 2013.

Project supported by the Personal Training Funds in National Basic Science of China (No. J1210040/J0104) and the Hunan Provincial Innovation Foundation for Postgraduate (No. CX2012B160).

国家基础科学人才培养基金(No. J1210040/J0104)和湖南省研究生科研创新(No. CX2012B160)资助项目.

我们以来源丰富的猪去氧胆酸为原料, 经过酯化、消除反应、烯丙位氧化、Mistunobu 构型转化、Luche 还原、催化氢化和酯水解等反应步骤, 完成了异熊去氧胆酸的合成, 对每一步反应的反应条件进行了优化, 对产物用核磁共振(NMR)、质谱(MS)和红外光谱(IR)等波谱方法进行了结构确证. 合成路线见 Scheme 1.

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

熔点在 XRC-1 型显微熔点仪上测定, 温度未加校正; NMR 用 Bruker Am-400 型核磁共振仪测定(溶剂 CDCl₃ 或 DMSO-*d*₆, TMS 为内标); 质谱用 Agilent 1100 液-质联用仪或 ZAB-HS 型仪测定记录; 红外光谱用 FD-5DX 仪(KBr 压片)测定; 柱层析用硅胶(青岛海洋化工厂产品); 所用试剂和溶剂为化学纯或分析纯; 要求无水的溶剂均经除水和重蒸处理.

猪去氧胆酸甲酯(1), 3 α ,6 α -双对甲苯磺酰氧基胆烷酸甲酯(2), 3 β -乙酰氧基- Δ^5 -胆烷酸甲酯(3)按文献合成^[5,6].

1.2 3 β -乙酰氧基-7-酮基- Δ^5 -胆烷酸甲酯(4)的合成

0.5 g (5 mmol) 的 CrO₃ (经过 P₂O₅ 干燥过) 溶解于 3 mL 吡啶的 30 mL CH₂Cl₂ 中, 搅拌 10 min 后, 加入 3 0.5

g (1.2 mmol) 的 10 mL CH₂Cl₂ 溶液, 再加入 0.5 mL 70% 过氧叔丁醇(TBHP), 室温搅拌 12 h, 滤去固体, 滤液用乙酸乙酯萃取(15 mL $\times$ 3)有机相用 10% 的 HCl 溶液, 饱和 NaHCO₃ 溶液洗涤, 无水 Na₂SO₄ 干燥, 浓缩得粗品. 快速硅胶柱层析[洗脱剂: *V*(石油醚): *V*(乙酸乙酯)=9:1]得白色固体 4 0.26 g, 产率为 80%. m.p. 168~169 °C(文献值^[6]: m.p. 167~169 °C); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 0.68 (s, 3H, 18-CH₃), 0.95 (d, *J*=6.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 1.05~2.60 (m, 23H), 1.22 (s, 3H, 19-CH₃), 2.13 (s, 3H, 3 β -OCOCH₃), 3.69 (s, 3H, COOCH₃), 4.71 (brm, 1H, 3 α -H), 5.70 (brs, 1H, 6-H); IR $\nu_{\max}$: 1665, 1740 (C=O) cm⁻¹; HR-MS (EI) calcd for C₂₇H₄₀O₅: 444.2876, found 444.2871.

1.3 3 β -羟基-7-酮基- Δ^5 -胆烷酸甲酯(5)的合成

化合物 4 0.444 g (1 mmol) 溶解于 2 mL 的甲醇中, 再加入 5 mL KHCO₃/K₂CO₃ (KHCO₃ 和 K₂CO₃ 都为 0.5 mol/L) 溶液, 室温反应 3 h, 乙酸乙酯萃取(15 mL $\times$ 3), 有机相用饱和 NaCl 溶液洗涤, 无水 Na₂SO₄ 干燥, 浓缩得粗品. 快速硅胶柱层析[洗脱剂: *V*(石油醚): *V*(乙酸乙酯)=8:2]得白色固体 5 0.39 g, 产率为 97%. m.p. 140~141 °C(文献值^[7]: m.p. 141~142 °C); ¹H NMR (400

Scheme 1

MHz, CDCl_3) δ : 0.69 (s, 3H, 18- CH_3), 0.94 (d, $J=6.2$ Hz, 3H, 21- CH_3), 1.05~2.57 (m, 23H), 1.22 (s, 3H, 19- CH_3), 3.60~3.63 (brm, 1H, 3 α -H), 3.67 (s, 3H, COOCH_3), 5.67 (brs, 1H, 6-H); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 201.4 (C-7), 174.2 (C-24), 167.1 (C-5), 125.2 (C-6), 69.5 (C-14), 55.7 (C-3), 54.3 (C-17), 52.7 (C-25), 51.6 (C-9), 20.3 (C-10), 19.6 (C-21), 12.2 (C-19, C-18); IR ν_{max} : 1672, 1720 (C=O), 3475 (O—H) cm^{-1} . HRMS (EI) calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{38}\text{O}_4$: 402.2760, found 402.2768.

1.4 3 α -对硝基苯甲酰基-7-酮基- Δ^5 -胆烷酸甲酯(6)的合成

在 250 mL 的圆底烧瓶中加入用 75 mL 无水 THF 溶解的化合物 **5** (28.7 mmol)、三苯基膦(57.4 mmol)和对硝基苯甲酸(57.4 mmol), 用恒压滴液漏斗慢慢滴加经甲苯稀释的偶氮二甲酸二异丙酯(DIAD) (57.4 mmol) [$V(\text{DIAD}) : V(\text{甲苯}) = 2 : 5$], 在 N_2 条件下室温搅拌 24 h. 向反应中加入到 94.8 mL NaOH (1 mol/L)溶液室温搅拌 1 h, 减压除去大部分的有机溶剂, 再向体系中加入 50 mL 水, 乙酸乙酯萃取(50 mL $\times$ 3), 有机相用饱和 NaCl 溶液洗涤, 无水 Na_2SO_4 干燥, 浓缩得粗品. 快速硅胶柱层析[洗脱剂: $V(\text{石油醚}) : V(\text{乙酸乙酯}) = 9 : 1$]得白色固体 **6** 13.6 g, 产率为 86%. m.p. 157~160 $^\circ\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.64 (s, 3H, 18- CH_3), 0.90 (d, $J=6.2$ Hz, 3H, 21- CH_3), 0.91~2.70 (m, 23H), 1.22 (s, 3H, 19- CH_3), 3.60 (s, 3H, COOCH_3), 5.42 (brs, 1H, 3-H), 5.72 (brs, 1H, 6-H), 8.12 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, ArH), 8.28 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, ArH); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 201.2 (C-7), 173.1 (C-24), 166.5 (PhC=O), 153.2 (Ph), 136.5 (Ph), 131.1 (Ph, 2C), 124.3 (Ph, 2C), 144.7 (C-5), 126.8 (C-7), 74.1 (C-3), 54.1 (C-17), 51.1 (C-25), 48.2 (C-9), 21.1 (C-10), 19.3 (C-21), 13.3 (C-19, C-18); HRMS (EI) calcd for $\text{C}_{32}\text{H}_{41}\text{O}_7\text{N}$: 551.2883, found 551.2878.

1.5 3 α -对硝基苯甲酰基-7 β -羟基- Δ^5 -胆烷酸甲酯(7)的合成

在 25 mL 的圆底瓶中加入化合物 **6** (1 mmol), NaBH_4 (1.2 mmol), CeCl_3 (1.2 mmol)和 10 mL 甲醇, 室温条件下搅拌, TLC 跟踪反应, 反应完全时, 减压除去大部分的有机溶剂, 再向体系中加入 50 mL 水, 乙酸乙酯萃取(25 mL $\times$ 3), 有机相用饱和 NaCl 溶液洗涤, 无水 Na_2SO_4 干燥, 浓缩得粗品. 快速硅胶柱层析[洗脱剂: $V(\text{石油醚}) : V(\text{乙酸乙酯}) = 8 : 2$]得白色固体 **7** 0.38 g, 产率为 68%. m.p. 174~177 $^\circ\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.69 (s, 3H, 18- CH_3), 0.93 (d, $J=6.2$ Hz, 3H, 21- CH_3), 0.97~2.63 (m, 23H), 1.16 (s, 3H, 19- CH_3), 3.60

(s, 3H, COOCH_3), 3.93 (brs, 1H, 7-H), 4.64~4.66 (brm, 1H, 3-H), 5.82 (brs, 1H, 6-H), 8.12 (d, $J=7.9$ Hz, 2H, ArH), 8.27 (d, $J=7.9$ Hz, 2H, ArH); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 173.1 (C-24), 165.9 (PhC=O), 152.7 (Ph), 136.3 (Ph), 131.5 (Ph, 2C), 124.3 (Ph, 2C), 145.1 (C-5), 73.7 (C-3), 65.4 (C-7), 54.9 (C-17), 50.1 (C-25), 48.2 (C-9), 21.5 (C-10), 19.0 (C-21), 13.1 (C-19, C-18); HRMS (EI) calcd for $\text{C}_{32}\text{H}_{43}\text{O}_7\text{N}$: 553.3039, found 553.3042.

1.6 3 α -对硝基苯甲酰基-7 β -羟基-胆烷酸甲酯(8)的合成

化合物 **7** (1 mmol)溶解于 15 mL 甲醇中, 再加入催化剂量的 5% Pd/C, 用带有 H_2 气球的三通活塞, 在减压的条件下, 来回置换反应体系中的空气 3 次, 使反应体系尽量在 H_2 氛围中, 室温条件下剧烈搅拌, TLC 跟踪反应, 反应完全时, 过滤, 滤饼用甲醇洗 3 次, 滤液减压除去大部分甲醇, 再加入 30 mL 水, 乙酸乙酯萃取(25 mL $\times$ 3)有机相用饱和 NaCl 溶液洗涤, 无水 Na_2SO_4 干燥, 浓缩得粗品. 快速硅胶柱层析[洗脱剂: $V(\text{石油醚}) : V(\text{乙酸乙酯}) = 8 : 2$]得固体 **8** 0.47 g, 产率为 85%. m.p. 183~187 $^\circ\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 0.69 (s, 3H, 18- CH_3), 0.93 (d, $J=6.2$ Hz, 3H, 21- CH_3), 1.01~2.60 (m, 26H), 1.16 (s, 3H, 19- CH_3), 3.60 (s, 3H, COOCH_3), 3.90~3.92 (m, 1H, 7 α -H), 5.25 (brs, 1H, H-6), 5.34 (brs, 1H, 3-H), 8.12 (d, $J=7.9$ Hz, 2H, ArH), 8.27 (d, $J=7.9$ Hz, 2H, ArH); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 174.0 (C-24), 165.4 (PhC=O), 137.1 (Ph), 132.3 (Ph, 2C), 125.5 (Ph, 2C), 74.2 (C-3), 56.9 (C-17), 51.1 (C-25), 49.2 (C-9), 22.3 (C-10), 20.1 (C-21), 13.5 (C-19, C-18); HRMS (EI) calcd for $\text{C}_{32}\text{H}_{45}\text{O}_7\text{N}$: 555.3196, found 555.3192.

1.7 异熊去氧胆酸(9)的合成

化合物 **8** 1 g (1.8 mmol)溶于 10 mL 甲醇中, 再加入 10 mL 4% NaOH (0.1 mol/L)溶液, 室温反应 20 min 后, 加入 5% HCl (0.13 mol/L)溶液调到 pH 3, 减压除去甲醇后, 乙酸乙酯萃取(25 mL $\times$ 3)有机相用饱和 NaCl 溶液洗涤, 无水 Na_2SO_4 干燥, 浓缩得粗品. 快速硅胶柱层析[洗脱剂: $V(\text{石油醚}) : V(\text{乙酸乙酯}) = 6 : 4$]得到无色针状固体 **9** 0.66 g, 产率为 93%. m.p. 243~245 $^\circ\text{C}$ (文献值^[1]: m.p. 243.5~245 $^\circ\text{C}$); ^1H NMR (400 MHz, 80% CDCl_3 + 20% $\text{DMSO}-d_6$) δ : 0.68 (s, 3H, 18- CH_3), 0.79 (s, 3H, 19- CH_3), 0.93 (d, $J=5.6$ Hz, 3H, H-21), 0.97~2.51 (m, 26H), 3.47~3.49 (brm, 1H, H-7), 3.97~3.99 (m, 1H, H-3); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 175.3 (COOH), 70.2 (C-3), 69.8 (C-7), 56.3 (C-17), 51.1 (C-9), 18.7 (C-21), 12.5 (C-18, C-19); IR (KBr) ν_{max} : 3410 (O—H),

1776 (C=O), 1034 (C–O) cm^{-1} ; HRMS (EI) calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{40}\text{O}_4$: 392.2927, found 392.2929.

2 结果与讨论

猪去氧胆酸含量占猪胆汁酸的40%,是我国丰富的甾体资源.从猪去氧胆酸合成异熊去氧胆酸的关键步骤是使A/B环顺式变为反式耦合,同时使6 α -羟基移位成7 β -羟基.我们通过9步反应,以总收率25%完成了目标产物的合成,对每一步反应条件进行了优化.首先猪去氧胆酸经甲酯化得到**1**,**1**在室温条件下与对甲苯磺酰氯反应生成二磺酰化的产物**2**,**2**在 $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{K-KOH}$ 的DMF- H_2O 体系中回流后,再经乙酰化得到乙酰化的产物**3**.**3**经烯丙位氧化生成 α,β -不饱和酮类化合物**4**,传统的烯丙位直接氧化生成 α,β -不饱和醛酮的方法中,最常用的试剂有 CrO_3 -3,5-二甲基吡唑,PCC,PDC,重铬酸钠、重铬酸钠-冰乙酸等,这些方法中,铬试剂用量都很大,有时甚至达到120倍摩尔量,因而使其后处理十分麻烦,不仅铬试剂对产物的吸附较大,而且高价铬的毒性,对环境造成严重的污染^[8].我们对 CrO_3 -吡啶络合物氧化体系进行了改进,在反应体系中引入过氧叔丁醇(TBHP)进行辅助氧化,可大大减少三氧化铬的使用量,减少了对环境的不利影响.

化合物**4**在 $\text{K}_2\text{CO}_3/\text{KHCO}_3$ 的弱碱性水溶液中水解脱去乙酰基生成醇**5**,**5**在偶氮二羧酸二乙酯(DIAD)和三苯基磷存在下经过 Mitsunobu 构型反转反应得到化合物**6**,该步反应条件温和,产率高并发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 构型翻转^[9,10].对 Mitsunobu 反应来说,投料顺序和反应温度控制很重要,首先应当将对硝基苯甲酸、底物醇、三苯基磷溶解于适当溶剂如四氢呋喃或乙醚中,冰水浴冷至0 $^\circ\text{C}$,将DIAD缓慢滴入,然后在室温条件下搅拌反应24 h,在这种反应条件下,反应的收率较高.若直接将DIAD与其他底物一起投入或滴加DIAD在室温下进行,反应的副产物会增加,收率明显下降. α,β -不饱和酮**6**在Luche条件下采用 $\text{CeCl}_3/\text{NaBH}_4$ 还原体系^[11]经立体选择性还原为相应的烯丙醇**7**,产物经 ^1H NMR分析并与文献^[12]对比证明其7位羟基为 β 构型 $[\delta 3.90 (7\alpha\text{-H})]$ 是多重峰, $\delta 5.25 (6\text{-H})$ 是宽单峰,含量 $\geq 90\%$.化合物**7**用5% Pd/C催化氢化,我们曾试图获得5 β 构型的化合物,它可

进一步水解得熊去氧胆酸,但只得到5 α 构型的化合物**8**^[7],**8**经4%NaOH溶液水解得到异熊去氧胆酸**9**.所有合成化合物的结构已通过 ^1H NMR, ^{13}C NMR,MS和IR等波谱方法进行了确认.

3 结论

从猪去氧胆酸出发经9步合成异熊去氧胆酸(总产率为25%),类似方法未见文献报道.该合成方法有如下优点:(1)合成路线新颖,猪去氧胆酸来源丰富,原料易得.(2)立体选择性好,二步关键步骤中,Mitsunobu构型转化可达100%的构型翻转,Luche还原得到3 β -羟基化物含量90%以上.(3)反应条件温和,所采用的合成路线不需要高温高压反应条件或低温操作,易于实现规模化合成,因而具有较高的应用价值.

References

- [1] Iida, T.; Momose, T.; Nambara, T.; Chang, F. C. *Chem. Pharm. Bull.* **1986**, *34*, 1929.
- [2] Alvarez, M.; Jover, A.; Carrazana, J.; Meijide, F.; Soto, V. H.; Tato, J. V. *Steroids* **2007**, *72*, 535.
- [3] Tohma, M.; Mahara, R.; Takeshita, H.; Kurosawa, T. *Steroids* **1986**, *48*(5~6), 331.
- [4] Goto, T. *Proc. Jpn. Acad.* **1955**, *31*, 466.
- [5] Shen, J. M.; Zhou, X. D.; Zhou, W. S. *Acta Chim. Sinica* **2006**, *64*, 1513 (in Chinese).
(沈季铭, 周向东, 周维善, 化学学报, **2006**, *64*, 1513.)
- [6] Iida, T.; Kakiyama, G.; Hibiya, Y.; Miyata, S.; Inoue, T.; Ohno, K.; Goto, T.; Mano, N.; Goto, J.; Nambara, T.; Hofmann, A. F. *Steroids* **2006**, *71*, 18.
- [7] Wang, Z. Q.; Que, H. Q.; Jiang, L. Z.; Zhou, W. S. *Chin. J. Org. Chem.* **1989**, *9*, 83 (in Chinese).
(王鍾麒, 阙浩泉, 姜立中, 周维善, 有机化学, **1989**, *9*, 83.)
- [8] Ge, Y. C.; Yang, Q. X. *J. Guizhou Normal Univ. (Nat. Sci.)* **2009**, *27*, 119 (in Chinese).
(葛永昌, 杨庆雄, 贵州师范大学学报(自然科学版), **2009**, *27*, 119.)
- [9] Xu, X. L.; Cheng, G. H.; Li, X. J. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, *32*, 1024 (in Chinese).
(许孝良, 程国华, 李小军, 有机化学, **2012**, *32*, 1024.)
- [10] Wang, Q. A.; Luo, J. X.; Liao, T. G. *Chem. J. Chin. Univ.* **2004**, *25*, 1069 (in Chinese).
(汪秋安, 罗俊霞, 廖头根, 高等学校化学学报, **2004**, *25*, 1069.)
- [11] Gimed, A. L.; Luche, J. L. *J. Am. Chem. Soc.* **1981**, *103*, 5454
- [12] Zheng, D.; Guan, Y. Y.; Chen, X. Z.; Xu, Y. P.; Chen, X. G.; Lei, P. S. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2011**, *21*, 3257.

(Lu, Y.)