焦磷酸酯合成的研究进展

侯淑华* 曲忠国 汤立军

(渤海大学化学化工学院 辽宁省功能化合物的合成与应用重点实验室 锦州 121013)

摘要 综述了焦磷酸酯类化合物的合成方法研究进展, 分别按照不同的活化方法进行了阐述, 包括二环己基碳二亚胺(DCC), *N,N'*-羰基二咪唑(CDI), DCC/吗啉/ $\text{MnCl}_2/\text{MgSO}_4$, DCC/吗啉/*1H*-四唑, $\text{PPh}_3/(\text{PyS})_2/N$ -甲基咪唑, 磷酰氯二苯酯(DPCP), 三氟乙酸酐(TFAA)/*N*-甲基咪唑, 并对部分反应机理进行了讨论。

关键词 焦磷酸酯; 合成; 进展

Advances in the Synthesis of Organic Pyrophosphate

Hou, Shuhua* Qu, Zhongguo Tang, Lijun

(Department of Chemistry, Liaoning Key Laboratory for the Synthesis and Application of Functional Compounds, Bohai University, Jinzhou 121013)

Abstract The recent advances in the synthesis of organic pyrophosphate are reviewed, based on the coupling methods including dicyclohexylcarbodiimide (DCC), *N,N'*-carbonyldiimidazole (CDI), DCC/morpholine/ $\text{MnCl}_2/\text{MgSO}_4$, DCC/morpholine/*1H*-tetrazole, $\text{PPh}_3/(\text{PyS})_2/N$ -methylimidazole, diphenyl phosphorochloridate (DPCP), trifluoroacetic anhydride/*N*-methylimidazole. Mechanism of some reactions is also discussed.

Keywords organic pyrophosphate; synthesis; advances

焦磷酸酯普遍存在于生物界中, 是生命活动的重要参与者。如烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(nicotinamide adenine dinucleotide, NAD^+ , Scheme 1), 它在生物体中起到传递氢和电子的作用, 以保持细胞内氧化还原平衡, 同时参与能量传递, 物质代谢和信号传导等过程^[1]。糖焦磷酸核苷酯(Sugar-nucleotide, Scheme 1)是碳水化合物代谢、蛋白质和油脂等天然分子糖基化的重要中间体^[2], 如UDP- β -L-rhamnose (Scheme 2)是植物细胞中胶质及细胞壁的合成的重要参与者^[3]; UDP-*D*-galactose 等 8 种糖焦磷酸核苷酯(Scheme 2)可以合成真核生物中几乎所有糖蛋白和糖脂^[4]。这些分子具有一个共性, 都含有焦磷酸键。要探索这些分子在生物体内的作用, 常通过设计合成其类似物来研究其性质。目前, 焦磷酸酯的化学合成主要存在以下困难: 对称型焦磷酸酯副产物的生成、在有机溶剂中溶解度极低、高极性和带电荷基团存在于分子结构中导致活化困难、涉及保护脱保护过程导致合成步骤长、焦磷酸键及糖苷键容易水解断裂。

近十年有较多关于焦磷酸酯合成的文献报道, 也有文章对糖焦磷酸核苷酯进行综述, 主要包括酶法^[5]和化

Scheme 1

学合成法^[6], 设计合成类似物的片段可能并不被生物体中合成焦磷酸酯的酶所识别, 因此酶法不一定适合所有的焦磷酸酯的合成, 本文主要对合成焦磷酸酯的化学方法进行概括。合成焦磷酸酯可以选择不同的合成路线, 其逆合成分析如 Scheme 3。

* E-mail: shyspa0812@163.com

Received July 3, 2013; revised August 11, 2013; published online September 25, 2013.

Scheme 2

Scheme 3

对 3 种反合成路线分析, Route 1 和 Route 2 需要先合成焦磷酸键, 焦磷酸键的合成需要活化试剂的参与, 而下一步焦磷酸与羟基的偶联同样需要活化试剂的参与, 增加反应难度; Route 3 通过两种磷酸单酯合成, 只需要一步活化, 降低合成难度, 且文献报道合成磷酸单酯的方法比较多, 最具有可行性. Route 3 首先需要活化一分子的磷酸单酯, 然后与另外一分子磷酸单酯反应 (Scheme 4). 活化反应的反应温度不能太高, 否则易造成糖苷键断裂; 活化过程中要避免对称的焦磷酸酯生

成. 目前常用的活化磷酸单酯的试剂有: 二环己基碳二亚胺 (*N,N'*-dicyclohexylcarbodiimide, DCC), *N,N'*-羰基二咪唑 (*N,N'*-carbonyldiimidazole, CDI), DCC/吗啉/ $\text{MnCl}_2/\text{MgSO}_4$, DCC/吗啉/*1H*-四唑, 三苯基膦 (triphenylphosphine, PPh_3)/2,2-二硫二吡啶 (PyS)₂/*N*-甲基咪唑, 磷酸氯二苯酯 (diphenyl phosphorochloridate, DPCP), 三氟乙酸酐 (Trifluoroacetic anhydride, TFAA)/*N*-甲基咪唑.

1 DCC

Todd 等^[7]于 1957 年首次合成了 NAD, 在 75%吡啶水溶液中用 DCC 将烟酰胺单核苷酸(NMN)和腺嘌呤单核苷酸(AMP)偶联(Scheme 5). NMN 分子中含有一个正电荷, 分子内形成内盐, 反应活性较低可以采用 DCC 获得产物, 但是磷酸单酯与 DCC 形成的中间体在反应条件下, 很容易水解回到原料, 再与中间体反应, 生成对称焦磷酸副产物, 且如果含有 NH_2 , OH , CO_2H 等活性基团易发生副反应, 在焦磷酸酯的合成中需要复杂的保护与脱保护过程.

2 CDI

N,N -羰基二咪唑是咪唑的衍生物, 具有较强的化学反应活性, 能与酸、氨、羟基等官能团反应, 合成活泼的活性中间体. 如活化磷酸单酯, 然后与另一分子磷酸

单酯反应获得焦磷酸酯. 反应机理如 Scheme 6.

Dowden 等^[8]利用 CDI 活化 NMN 合成了 NADP (Scheme 7), 我们课题组^[9]利用 CDI 活化 NMN 合成 NAD 类似物(Scheme 8). CDI 具有较高的化学反应活性, 可以活化含有内盐的磷酸单酯, 然后再进行下一步反应.

CDI 除了用来合成焦磷酸型核酸及其类似物^[10], 也用来合成糖焦磷酸核苷酯^[11], Kurosu 等^[11a]以 CDI 为活化试剂活化糖磷酸单酯, 然后与核苷酸反应合成 UDP-MurNAc 来筛选膜转运蛋白(MraY)抑制剂(Scheme 9); Ko 等^[11b]用 CDI 活化核苷酸然后再与未进行保护的糖磷酸单酯反应制得 5'-焦磷酸尿嘧啶葡萄糖酯(Uridine 5'-diphosphoglucose)类似物(Eq. 1), 产率在 7%~63%之间, 这些类似物被用以作为人 P2Y_{14} 抑制剂. 以 CDI 为活化试剂, 反应中间产物无需分离直接进行下一步反

Scheme 7

Scheme 8

Scheme 9

应,但是后续反应时间较长,一般需要 2~3 d^[10b,12].

3 DCC/吗啉

Khorana 等^[13]首先用活性中间体磷酰胺作为亲电试剂,与另外一分子磷酸单酯反应制备糖焦磷酸酯,成功制备了 UDP- α -D-glucose, 高达 59% 分离产率. 后来 Khorana 课题组^[14]对磷酰胺中间体进行了改进,发展了具有更高反应活性的磷酰吗啉(phosphoromorpholidate)中间体.

DCC 具有很高的反应活性,只用 DCC 活化磷酸单酯会形成对称的焦磷酸酯产物,因此加入吗啉形成磷酰吗啉中间体,然后与另一分子磷酸单酯反应生成焦磷酸酯,反应机理如 Scheme 10.

Scheme 10

磷酰吗啉中间体与另一分子的磷酸单酯反应时间较长,一般需要几天到几个星期,为了缩短反应时间,

Scheme 11

通常加入催化剂催化反应,常用的催化剂有 $\text{MnCl}_2/\text{MgSO}_4$ 和 1*H*-四唑,这两种催化剂被用来合成天然的及非天然的活性分子.

3.1 $\text{MnCl}_2/\text{MgSO}_4$

糖焦磷酸核苷酯可以采用 $\text{MnCl}_2/\text{MgSO}_4$ 催化的方法获得, Wagner 等^[15]采用路易斯酸催化的方法合成 8-phenyl GDP-Mannose (Eq. 2), 首先合成中间体磷酰吗啉,然后与一分子的甘露糖 1-磷酸反应,获得产物,产率 44%. 催化反应的机理是锰离子与磷酰胺中的氮络合,使离去基团吗啉易于离去.

Lee 等^[16]首先采用路易斯酸催化合成 NAD (Scheme 11), 此后这种方法被普遍应用到 NAD 类似物上(表 1), 此种方法具有反应时间较短(1~2 d)、收率较高、操作简单,价格便宜的优点.

表1 路易斯酸MnCl₂/MgSO₄催化合成NAD⁺类似物Table 1 Lewis acid MnCl₂/MgSO₄ catalysis for NAD⁺ analogs synthesis

NAD ⁺ analog	Reaction time	Yield/%	Reference
Disubstituted NAD ⁺ analog	24 h	19	Kennedy <i>et al.</i> ^[17]
NAD ⁺ analog	2 d	26.8	Zhou <i>et al.</i> ^[18]
8-Br-NHD ⁺	3 d	59	Wagner <i>et al.</i> ^[19]
8-Chloro-NHD ⁺	Overnight	46	Potter <i>et al.</i> ^[10c]
8-Iodo-NHD ⁺	Overnight	62	Potter <i>et al.</i> ^[10c]
8-Ph-NAD ⁺	48 h	66	Potter <i>et al.</i> ^[20]
8-2'-deoxy-NAD ⁺	48 h	60	Potter <i>et al.</i> ^[10]
NAD ⁺ analog	17 h	12.9	Hou <i>et al.</i> ^[9]

3.2 1H-四唑

1H-四唑在焦磷酸键的合成中具有广泛应用。1H-四唑是一种布朗斯特酸(Brønsted acid, $pK_a=4.9$), 具有一定的酸性, 可以活化磷酸吗啉; 同时 1H-四唑分子中含有氮, 可以作为亲核试剂进攻磷酸吗啉中间体形成活性更高的中间体, 然后再与另外一分子磷酸单酯反应, 获得焦磷酸产物。

Wong 等^[21]以 1H-四唑为催化剂催化磷酸吗啉与磷酸单酯的反应, 制备了 GDP-fucose, GDP-Mannose, UDP-Galactose (Scheme 12), 收率达 76%~91%。并通过 ³¹P NMR 和质谱动态跟踪反应确定 1H-四唑催化反应机理(Scheme 13), 1H-四唑具有酸性和亲核性双重催化特性, 会生成更加活泼的中间体, 加快反应进行。

Zhao 等^[22]以 1H-四唑为催化剂合成了氟修饰糖的糖焦磷酸核苷酯, 产率在 45%~54%之间(Scheme 14)。这些糖焦磷酸核苷酯被用以研究糖生物合成过程中酶参与的反应机理。

Kosma 等^[23]发现从乙酰化糖磷酸单酯合成糖焦磷酸核苷的产率要高于从羟基糖磷酸单酯。从乙酰化糖磷酸单酯偶联然后再脱乙酰基得到最终产物产率为 90%, 而羟基糖磷酸单酯直接偶联产率仅为 15% (Scheme 15)。William 等^[24]也发现了类似的现象, 乙酰化糖磷酸单酯为反应底物时, 最终产物的收率会有较大的提高。可能是乙酰化的糖磷酸单酯在吡啶中的溶解度要大于羟基糖磷酸单酯, 利于反应的发生, 提高了反应收率。

Scheme 12

我们课题组^[9]利用 1H-四唑合成了 NAD⁺类似物, 产率 5.5% (Eq. 3)。产率低的原因可能是烟酰胺单核苷酸是一种内盐, 在吡啶中的溶解度不好, 导致产率低。

1H-四唑催化反应具有高的反应活性, 能够获得较高产率的焦磷酸酯^[25], 但是 1H-四唑易爆炸, 对操作条件要求苛刻, 限制了其应用。

4 PPh₃/(PyS)₂/N-甲基咪唑

PPh₃/(PyS)₂ 具有很高的活性, PPh₃/(PyS)₂ 氧化还原离子对最早由 Mukaiyama 提出^[26], 并用于活化羧酸、磷酸以形成多肽及磷酸二酯, 常用来合成多肽和 DNA, Abramova 等^[27]将其用于核苷酸三磷酸的合成, 取得了较好的收率, 我们^[9,28]将这种氧化还原离子对应用于 NAD⁺类似物的合成(Scheme 16)。

在此反应过程中, PPh₃/(PyS)₂ 首先在 N-甲基咪唑存在情况下活化磷酸单酯形成 P—N⁺中间体, P—N⁺中间体具有很高的反应活性, P—N⁺键容易断裂, 可以与另外一分子磷酸单酯快速反应生成焦磷酸酯。使用此种方法合成 NAD⁺类似物活性中间体无需纯化分离, 活化时

Scheme 13

Scheme 14

Scheme 15

Scheme 16

间 15 min, 反应时间 20, 35 min 就可以完成反应, 可以快速合成大量 NAD^+ 类似物, 反应更加高效. 采用 $\text{PPh}_3/(\text{PyS})_2$ 活化, 在磷酸单酯存在条件下, 对羟基、氨基等官能团无需经过保护和脱保护过程, 可以应用于糖焦磷酸核苷酯的合成.

5 DPCP 活化

磷酰氯二苯酯具有较好的反应活性,可以用来活化磷酸单酯形成焦磷酸酯型活性中间体,然后再与另外一分子磷酸单酯反应获得焦磷酸酯产物^[29]。Potter 等^[30]利用磷酰氯二苯酯活化NMN,然后与AMP类似物反应合成NAD类似物(Scheme 17); Denu 等^[31]利用磷酰氯二苯酯合成*O*-乙酰化-ADP-核糖和*N*-乙酰化类似物,产率在5%~20%之间(Scheme 18)。

6 TFAA/N-甲基咪唑

Jakeman 等^[32]以三氟乙酸酐活化核酸, 然后与 *N*-甲基咪唑反应生成 P-N⁺活性中间体, 与糖焦磷酸反应, *N*-甲基咪唑作为离去基团离去, 生成糖焦磷酸核苷酯。合成 UDP- α -D-glucose 等 7 种糖焦磷酸核苷酯, 产率在 32%~48% (Scheme 19)。

此种方法采用三氟乙酸酐活化,核糖中的羟基也参与反应,在后续反应中需要脱保护,增加合成步骤.

7 其它方法

近年来发展了新的方法用以合成糖焦磷酸核苷酯,以 P(III)活化醇羟基,利用 P(III)高反应活性与另外一分子单磷酸酯反应,后经过氧化脱保护获得焦磷酸产物.

Scheme 17

Scheme 18

Scheme 19

7.1 亚磷酸胺

Gold 等^[33]采用 2-氰乙基-*N,N*-二异丙基氯代亚磷酸胺与 2,3-二乙酰基尿苷反应获得 2',3'-二乙酰基尿苷-5'-(2-氰乙基-*N,N*-二异丙基)亚磷酸胺, 然后与硅保护的糖磷酸单酯反应, 磷酸-亚磷酸中间体经过 *t*-BuOOH 氧化, 经过一系列脱保护过程获得尿苷糖焦磷酸酯, 产率在 63%~76% 之间(Eq. 4).

此种方法能够获得较高的收率, 但由于亚磷酸胺的高反应活性, 需要对活化核苷中核糖 2,3 位羟基进行保护, 同时活性中间体尿苷亚磷酸胺可以与羟基进行反应, 所以糖磷酸单酯中的羟基在反应之前需要进行保护, 后经过脱保护完成产物的合成. 此种方法合成步骤长, 涉及多步保护及脱保护过程, 且原料 2-氰乙基-*N,N*-二异丙基氯代亚磷酸胺价格较高, 限制其应用.

7.2 6-硝基-2-氯-1,3,2-苯并二氧磷杂环己烷(5-nitro-cycloSal phosphochloridite)

Meier 课题组^[34]首先采用三氯化磷合成 5-nitro-cycloSal phosphochloridite, 然后与一分子的 2'-脱氧-3'-

乙酰基-胸苷反应, 氧化生成 5-nitro-cycloSal deoxythymidine 后, 最后与糖基-1-磷酸盐反应经脱保护得到最终产物, 产率 46%~60% (Scheme 20). 此种方法也需要对反应分子中的羟基经过一系列保护和脱保护过程.

8 结论与展望

近年来, 随着人们对生命活动的探索, 焦磷酸酯化物的合成研究迅速, 其合成方法正不断得到改进和创新, 但其合成仍然存在很多问题及困难, 如糖苷键容易断裂; 磷酸根的存在降低了原料在有机溶剂中的溶解度, 而偶联反应一般需要无水条件, 加大了反应的难度; 活化过程中易生成对称型焦磷酸酯产物; 糖中含有羟基等活性官能团易于发生一系列副反应, 涉及到官能团的选择性保护和脱保护, 增加反应步骤. 而寻求温和反应条件、探索降低副产物的合成方法及设计快速合成多样化的产物结构将是未来主要关注方向.

Scheme 20

References

- [1] (a) Lin, S. J.; Guarente, L. *Curr. Opin. Cell Biol.* **2003**, *15*, 241.
(b) Pollak, N.; Dolle, C.; Ziegler, M. *Biochem. J.* **2007**, *402*, 205.
(c) van der Donk, W. A.; Zhao, H. *Curr. Opin. Biotechnol.* **2003**, *14*, 421.
(d) Sauve, A. A.; Deng, H. T.; Angeletti, R. H.; Schramm, V. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2000**, *122*, 7855.
(e) Xia, W. L.; Wang, Z.; Wang, Q.; Han, J.; Zhao, C. P.; Hong, Y. Y.; Zeng, L. L.; Tang, L.; Ying, W. H. *Curr. Pharm. Des.* **2009**, *15*, 12.
- [2] (a) Leloir, L. F. *Science* **1971**, *172*, 1299.
(b) Kochetkov, N. K.; Shibaev, V. N. *Adv. Carbohydr. Chem. Biochem.* **1973**, *28*, 307.
- [3] Mohnen, D. *Curr. Opin. Plant Biol.* **2008**, *11*, 266.
- [4] Freeze, H. In *Essentials of Glycobiology*, Eds.: Varki, A.; Cummings, R.; Esko, J.; Freeze, H.; Hart, G.; Marth, J., Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, **1999**, p. 66.
- [5] (a) Thibodeaux, C. J.; Melançon, C. E.; Liu, H. W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 9814.
(b) Bourgeaux, V.; Piller, F.; Piller, V. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2005**, *15*, 5459.
- [6] Wagner, G. K.; Pesnot, T.; Field, R. A. *Nat. Prod. Rep.* **2009**, *26*, 1172.
- [7] Hughes, N. H.; Kenner, G. W.; Todd, A. C. *J. Chem. Soc.* **1957**, 3733.
- [8] Dowden, J.; Moreau, C.; Brown, R. S.; Berridge, G.; Galione, A.; Potter, B. V. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2004**, *43*, 4637.
- [9] Hou, S. H.; Liu, W. J.; Zhao, Z. B. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, *32*, 349 (in Chinese).
(侯淑华, 刘武军, 赵宗保, 有机化学 **2012**, *32*, 349.)
- [10] (a) Koh, D. W.; Coyle, D. L.; Mehta, N.; Ramsinghani, S.; Kim, H.; Slama, J. T.; Jacobson, M. K. *J. Med. Chem.* **2003**, *46*, 4322.
(b) Franchetti, P.; Cappellacci, L.; Pasqualini, M.; Petrelli, R.; Jayaprakasan, V.; Jayaram, H. N.; Boyd, D. B.; Jain, M. D.; Grifantini, M. *Bioorg. Med. Chem.* **2005**, *13*, 2045.
(c) Moreau, C.; Wagner, G. K.; Weber, K.; Guse, A. H.; Potter, B. V. *J. Med. Chem.* **2006**, *49*, 5162.
(d) Das, A.; Ko, H.; Burianek, L.; Barrett, M.; Harden, T.; Jacobson, K. *J. Med. Chem.* **2010**, *53*, 471.
- [11] (a) Kurosu, M.; Mahapatra, S.; Narayanasamy, P.; Crick, D. C. *Tetrahedron Lett.* **2007**, *48*, 799.
(b) Takaku, H.; Sato, J.; Ishida, H.-K.; Inazu, T.; Ishida, H.; Kiso, M. *Glycoconjugate J.* **2006**, *23*, 565.
(c) Ishimizu, T.; Uchida, T.; Sano, K.; Hase, S. *Tetrahedron: Asymmetry* **2005**, *16*, 309.
(d) Pesnot, T.; Wagner, G. K. *Org. Biomol. Chem.* **2008**, *6*, 2884.
(e) Ko, H.; Fricks, I.; Ivanov, A. A.; Harden, T. K.; Jacobson, K. A. *J. Med. Chem.* **2007**, *50*, 2030.
- [12] Wahler, D.; Reymond, J.-L. *Can. J. Chem.* **2002**, *80*, 665.
- [13] Moffatt, J. G.; Khorana, H. G. *J. Am. Chem. Soc.* **1958**, *80*, 3756.
- [14] (a) Roseman, S.; Distler, J. J.; Moffatt, J. G.; Khorana, H. G. *J. Am. Chem. Soc.* **1961**, *83*, 659.
(b) Moffatt, J. G.; Khorana, H. G. *J. Am. Chem. Soc.* **1961**, *83*, 649.
- [15] Collier, A.; Wagner, G. K. *Chem. Commun.* **2008**, 178.
- [16] Lee, J.; Churchil, H.; Choi, W. B.; Lynch, J. E.; Roberts, F. E.; Volante, R. P.; Reider, P. J. *Chem. Commun.* **1999**, 729.
- [17] Kennedy, K. J.; Bressi, J. C.; Gelb, M. H. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2001**, *11*, 95.
- [18] Zhou, G.-C.; Parikh, S. L.; Tyler, P. C.; Evans, G. B.; Furneaux, R. H.; Zubkova, O. V.; Benjes, P. A.; Schramm, V. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, *126*, 5690.
- [19] Wagner, G. K.; Guse, A. H.; Potter, B. V. *J. Org. Chem.* **2005**, *70*, 4810.
- [20] Zhang, B.; Wagner, G.; Weber, K.; Garnham, C.; Morgan, A.; Galione, A.; Guse, A.; Potter, B. *J. Med. Chem.* **2008**, *51*, 1623.
- [21] Wittmann, V.; Wong, C. H. *J. Org. Chem.* **1997**, *62*, 2144.
- [22] (a) Zhao, Z.; Liu, H.-W. *J. Org. Chem.* **2001**, *66*, 6810.
(b) Chen, H.; Zhao, Z.; Hallis, T. M.; Guo, Z.; Liu, H. W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2001**, *113*, 627.
(c) Hallis, T. M.; Zhao, Z.; Liu, H.-W. *J. Am. Chem. Soc.* **2000**, *122*, 10493.
- [23] Zamyatina, A.; Gronow, S.; Oertelt, C.; Puchberger, M.; Brade, H.; Kosma, P. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2000**, *39*, 4150.
- [24] (a) Dinev, Z.; Wardak, A. Z.; Brownlee, R. T.; Williams, S. J. *Carbohydr. Res.* **2006**, *341*, 1743.
(b) Fairweather, J. K.; Him, J. L. K.; Heux, L.; Driguez, H.; Bulone, V. *Glycobiology* **2004**, *14*, 775.
- [25] (a) Dulcey, A. E.; Qasba, P. K.; Lamb, J.; Griffiths, G. L. *Tetrahedron* **2011**, *67*, 2013.
(b) Ravalico, F.; Messina, I.; Berberian, M.; James, S.; Migaud, M.; Vyle, J. *Org. Biomol. Chem.* **2011**, *9*, 6496.
(c) Tsukamoto, H.; Kahne, D. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2011**, *21*, 5050.
(d) Wu, M.; Meng, Q.; Ge, M.; Bai, L.; Zhou, H. *Tetrahedron Lett.* **2011**, *52*, 5799.
(e) Tedaldi, L.; Pierce, M.; Wagner, G. *Carbohydr. Res.* **2012**, *364*, 22.
- [26] Mukaiyama, T. *Phosphorus Sulfur* **1976**, *1*, 371.
- [27] Abramova, T. V.; Vasileva, S. V.; Serpukrylova, I. Y.; Kless, H.; Silnikov, V. N. *Bioorg. Med. Chem.* **2007**, *15*, 6549.
- [28] (a) Hou, S.; Liu, W.; Ji, D.; Wang, Q.; Zhao, Z. K. *Tetrahedron Lett.* **2011**, *52*, 5855.
(b) Ji, D.; Wang, L.; Hou, S.; Liu, W.; Wang, J.; Wang, Q.; Zhao, Z. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 20857.
(c) Ji, D.; Wang, L.; Liu, W.; Hou, S.; Zhao, Z. *Sci. China Chem.* **2013**, *56*, 296.
- [29] (a) Michelson, A. *Biochim. Biophys. Acta* **1964**, *91*, 1.
(b) Ma, Q.-F.; Reynolds, M. A.; Kenyon, G. L. *Bioorg. Chem.* **1989**, *17*, 194.
- [30] Mort, C. J. W.; Migaud, M. E.; Galione, A.; Potter, B. V. L. *Bioorg. Med. Chem.* **2004**, *12*, 475.
- [31] Comstock, L. R.; Denu, J. M. *Org. Biomol. Chem.* **2007**, *5*, 3087.
- [32] (a) Timmons, S. C.; Jakeman, D. L. *Carbohydr. Res.* **2008**, *343*, 865.
(b) Mohamady, S.; Taylor, S. J. *Org. Chem.*, **2011**, *76*, 6344.
- [33] Gold, H.; van Delft, P.; Meeuwenoord, N.; Codée, J. D.; Filippov, D. V.; Eggink, G.; Overkleeft, H. S.; van der Marel, G. A. *J. Org. Chem.* **2008**, *73*, 9458.
- [34] (a) Wolf, S.; Berrio, R. M.; Meier, C. *Eur. J. Org. Chem.* **2011**, *2011*, 6304.
(b) Wendicke, S.; Warnecke, S.; Meier, C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 1500.

(Qin, X.)