O-烷基 α -(取代苯氧乙酰氧基)烷基膦酸盐的合成与生物活性

王涛 邹鹏 彭浩 贺红武*

(华中师范大学化学学院 教育部农药与化学生物学重点实验室 武汉 430079)

摘要 为了研究 O-烷基 α -(取代苯氧乙酰氧基)烷基膦酸衍生物的结构活性关系,以取代苯氧乙酸为起始原料,经氯化亚砷氯化后得中间体 **2**,然后与不同取代的 α -羟基烷基膦酸酯(**1**)反应制备关键中间体 **3**,再与碘化钠或溴化锂反应,合成了 14 个未见文献报道的 O-烷基 α -(取代苯氧乙酰氧基)烷基膦酸盐 **4**.通过 ^1H NMR, IR, MS 和元素分析对所合成的化合物进行了结构表征.初步的生物活性测试结果表明:大多数目标化合物具有较好的除草活性或杀菌活性.化合物 **4a** 在 1.5 kg/ha 剂量下对所测单、双子叶植物的抑制率均达到了 100%;在 50 $\mu\text{g/g}$ 的剂量下,化合物 **4h**~**4m** 对油菜菌核菌和黄瓜灰霉菌的抑制率达到 90%以上.

关键词 合成; 膦酸盐; 除草活性; 杀菌活性

Synthesis and Biological Activity of O-Alkyl α -(Substituted phenoxyacetoxy)alkylphosphonate

Wang, Tao Zou, Peng Peng, Hao He, Hongwu*

(Key Laboratory of Pesticide & Chemical Biology of Ministry of Education, College of Chemistry Central China Normal University, Wuhan 430079)

Abstract For the purpose of studying the structure-activity relationship of O-alkyl α -(substituted phenoxyacetoxy)alkylphosphonic derivatives, fourteen novel O-alkyl α -(substituted phenoxyacetoxy)alkylphosphonates were synthesized by the reactions of key intermediate **3** with NaI or LiBr. The intermediate **3** was prepared by the treatment of α -hydroxyalkylphosphonates **1** with substituted phenoxyacetyl chlorides **2** which could be easily obtained by the reaction of substituted phenoxyacetic acids with excess thionyl chloride. The structures of compounds **4** have been confirmed by ^1H NMR, IR, MS and elemental analyses. The results of preliminary bioassay indicated that most of title compounds possess significant herbicidal and fungicidal activities. Compound **4a** showed 100% inhibitory activity against all the tested species in the rate of 1.5 kg/ha. Compounds **4h**~**4m** exhibited more than 90% inhibitory activity against *Sclerotinia sclerotiorum* and *Botrytis cinerea* in the rate of 50 $\mu\text{g/g}$.

Keywords synthesis; phosphonate; herbicidal activity; fungicidal activity

目前人们已证明植物体内的重要代谢酶——丙酮酸脱氢酶可作为农药分子作用的靶标,并且已发现某些 α -取代烷基膦酸酯及其衍生物作为丙酮酸脱氢酶抑制剂,表现出多种引人注目的生物活性^[1~4].我们课题组^[5~9]曾报道了一系列 1-(取代苯氧乙酰氧基)烷基膦酸酯及其衍生物具有良好的除草活性和杀菌活性,并且发现膦酸盐类化合物因其与丙酮酸具有更高的相似性而表现出更优的活性.为了发现更多具有潜在生物活性的烷基膦酸酯衍生物,以及分析该类化合物的结构-活性

关系,需要合成取代基多样化的化合物.因此本文在前期研究工作的基础上,保留活性基团 2,4- Cl_2 和 3- CF_3 为 Y_n 取代基,合成了 14 个未见文献报道的 α -(取代苯氧乙酰氧基)烷基膦酸盐类化合物,通过 ^1H NMR, IR, MS 和元素分析对其结构进行表征.初步的生物活性测试结果表明,当取代基 Y_n 为 2,4- Cl_2 时,化合物 **4a**~**4c** 表现出较高的除草活性,而当 Y_n 为 3- CF_3 取代时,化合物 **4f**~**4n** 则表现出较高的杀菌活性.其合成路线如 Scheme 1.

* E-mail: he1208@mail.ccnu.edu.cn

Received August 12, 2013; revised September 6, 2013; published online September 25, 2013.

Project supported by the National Basic Research Program of China (973 Program, No. 2010CB126100), the National Natural Science Foundation of China (No. 21172090) and the Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University (PCSIRT, No. IRT0953).

国家重点基础研究发展规划(973 计划, No.2010CB126100)、国家自然科学基金(No. 21172090)、教育部创新团队(No. IRT0953)资助项目.

Scheme 1

1 结果与讨论

1.1 合成

在无溶剂条件下,以三乙胺为催化剂,亚磷酸二甲酯和不同取代的醛反应得到 α -羟基膦基磷酸酯 **1**。采用过量二氯亚砷既作溶剂又作反应物,与取代苯氧乙酸在 50~70 °C 条件下反应 4~6 h,制备取代苯氧乙酰氯 **2**。该反应温度不宜过高,若反应温度超过 80 °C,反应液颜色明显加深,反应收率随之下降。过量的氯化亚砷可以通过水泵减压蒸馏除去,酰氯 **2** 还可以通过油泵减压蒸馏进一步纯化^[14]。酰氯较为活泼,易吸水变质,不宜久置,宜现制现用。化合物 **3** 由酰氯 **2** 与 α -羟基膦基磷酸酯

酸酯 **1** 在缚酸剂三乙胺的作用下反应制得,该反应剧烈且放出大量的热,因此酰氯 **2** 宜在冰水浴条件下逐滴加入。在避光和氮气保护下,目标化合物 **4** 由化合物 **3** 与碘化钠或溴化锂反应制得,碘化钠或溴化锂使用前需烘干处理。大部分目标化合物为白色固体,能在二氯甲烷和石油醚中重结晶提纯。

1.2 结构表征

目标化合物经 IR, ¹H NMR, MS 和元素分析表征,在 ¹H NMR 中,ArH 的化学位移主要集中在 δ 6.8~7.8 之间,峰形较为复杂。磷原子 α -碳上的质子(PCH)由于受磁性核磷的影响,裂分为双重峰。从 IR 谱图数据可看出所有特征基团均有明显的吸收峰:苯环上的 C—H 伸缩振动吸收带在 3100~3000 cm⁻¹ 范围之内。羰基(C=O)在 1750 cm⁻¹ 附近表现出了强吸收峰,P=O 的伸缩振动在 1260 cm⁻¹ 左右出现强吸收峰。MS 数据中可以看出所有的化合物均有明显的分子离子峰。

1.3 生物活性

1.3.1 除草活性

目标化合物 **4a**~**4n** 的除草活性数据见表 1。除草活性测试结果表明:在 1.5 kg/ha 的剂量下,目标化合物对供试单、双子叶杂草显示出一定的抑制活性。化合物 **4a**, **4b**, **4d**, **4e** ($Y_n=2,4\text{-Cl}_2$) 表现出相对更高的抑制效果,尤其是化合物 **4a** 苗前处理时,对所有五种供试杂草的抑制率均达到 100%。化合物 **4a** 苗后处理时,对双子叶杂草莧菜和苜蓿的抑制率也大于 95%,优于对单子叶杂草稗草和马唐的抑制效果。当 R¹, Y_n, M 取代基相同时,化合物 **4c** (R²=Thien-2-yl) 的除草活性明显低于化合物 **4a**

表 1 目标化合物的除草活性抑制百分率^a
Table 1 The herbicidal inhibition of compounds

化合物	R ¹	R ²	Y _n	M	油菜		苋菜		苜蓿		稗草		马唐	
					pre	post	pre	post	pre	post	pre	post	pre	post
4a	CH ₃	CCl ₃	2,4-Cl ₂	Na	100	79	100	96	100	100	100	14	100	8
4b	CH ₃	4-NO ₂ C ₆ H ₄	2,4-Cl ₂	Na	92	57	73	100	92	47	85	28	96	49
4c	CH ₃	Thien-2-yl	2,4-Cl ₂	Na	17	5	1	33	0	32	23	22	18	16
4d	C ₂ H ₅	Pyrid-2-yl	2,4-Cl ₂	Na	98	72	85	54	98	62	81	37	98	24
4e	C ₂ H ₅	4-FC ₆ H ₄	2,4-Cl ₂	Li	94	100	100	100	87	85	72	0	93	31
4f	CH ₃	CH ₃	3-CF ₃	Na	29	42	47	45	17	74	12	11	0	37
4g	CH ₃	C ₂ H ₅	3-CF ₃	Na	47	14	30	31	0	65	14	21	17	36
4h	CH ₃	2-ClC ₆ H ₄	3-CF ₃	Na	25	16	38	48	0	16	10	0	28	21
4i	CH ₃	4-ClC ₆ H ₄	3-CF ₃	Na	68	75	62	100	38	66	39	23	72	15
4j	CH ₃	3,4-OCH ₂ OC ₆ H ₃	3-CF ₃	Na	42	61	66	100	33	67	22	30	40	21
4k	CH ₃	4-CH ₃ C ₆ H ₄	3-CF ₃	Na	25	54	51	49	44	66	17	8	37	30
4l	CH ₃	3-NO ₂ C ₆ H ₄	3-CF ₃	Na	33	59	76	49	81	65	35	15	84	36
4m	CH ₃	4-NO ₂ C ₆ H ₄	3-CF ₃	Na	33	9	59	37	36	38	30	20	32	0
4n	CH ₃	Pyrid-2-yl	3-CF ₃	Na	33	52	66	34	22	48	27	0	45	14

^a pre: pre-emergence; post: post-emergence.

($R^2 = \text{CCl}_3$)和化合物 **4b** ($R^2 = 4\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4$), 说明 R^2 取代基为杂环噻吩基不利于增强化合物的除草活性. 化合物 **4m** ($Y_n = 3\text{-CF}_3$)的除草活性明显低于化合物 **4b** ($Y_n = 2,4\text{-Cl}_2$), 由此可见 Y_n 为 3-CF_3 对化合物的除草活性不利, 但化合物 **4i** 和 **4j** 对菟丝苗后处理的抑制率达到 100%, 优于苗前处理的抑制效果.

1.3.2 杀菌活性的测试

目标化合物 **4a~4n** 的杀菌活性数据见表 2, 其中化合物 **4a~4e** 由于几乎没有杀菌活性, 数据从略. 杀菌活性测试结果表明: 在 $50 \mu\text{g/g}$ 的剂量下, 目标化合物 **4f~4n** 对供试靶标显示出一定的杀菌活性, 尤其对油菜菌核菌、黄瓜灰霉菌和稻瘟病菌表现出较高的抑制活性. 但化合物 **4a~4e** 几乎没有杀菌活性, 结合除草活性数据可以看出, 当 Y_n 为 3-CF_3 时, 化合物表现出相对更高的杀菌活性; 当 Y_n 为 $2,4\text{-Cl}_2$ 时, 化合物表现出相对更高的除草活性. 化合物 **4f~4n** 对油菜菌核菌的抑制率均高于 90%, 其中 **4j** 的抑制率达 100%, **4h, 4i, 4k** 和 **4l** 的抑制率也到达 99%; 化合物 **4h, 4i** 和 **4j** 对黄瓜灰霉菌的抑制率达 99%; 所测大部分化合物稻瘟病菌的抑制率在 80%以上; 但化合物 **4f~4n** 对棉枯萎霉菌、小麦赤霉菌和甜菜褐斑的抑制活性相对较弱, 说明该类化合物具有一定的选择性杀菌活性. 总体来说, 化合物 **4h~4m** 的杀菌活性稍高于化合物 **4f~4g**, 推测当 R^2 取代基为芳烃类取代基对杀菌活性有利, 而脂肪烃类取代基对杀菌活性不利.

2 结论

本文以取代苯氧乙酸为起始原料, 经氯化亚砷氯化后与不同取代的 α -羟基烷基磷酸酯反应制备关键中间体 **3**, 再与碘化钠或溴化锂反应, 合成了 14 个未见文献报道的 O -烷基 α -(取代苯氧乙酰氧基)烷基磷酸盐(**4**). 通过 $^1\text{H NMR}$, IR, MS 和元素分析对所合成的化合物进行

了结构表征. 初步的生物活性测试结果表明: 大多数目标化合物具有较好的除草活性或杀菌活性. 化合物 **4a** 在 1.5 kg/ha 剂量下对所测单、双子叶植物的抑制作用均达到了 100%; 在 $50 \mu\text{g/g}$ 的剂量下, 化合物 **4h~4m** 对油菜菌核菌和黄瓜灰霉菌的抑制率达到 90%以上.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

红外光谱用 AVATAR360 型傅立叶红外光谱仪 (KBr 压片); $^1\text{H NMR}$ 用 Varian XL-300 型核磁共振仪 (以 TMS 为内标, 氘代 DMSO 为溶剂); 质谱用 Finnigan TRACE 型质谱仪; LC-MS 采用 API2000 型液质联用仪; 元素分析采用 Vario EL111 CHNSO 元素分析仪; 熔点采用上海精密科学仪器有限公司生产的 WRS-IB 型熔点仪测定 (温度未经校正). 所用试剂均为分析纯或化学纯, 三乙胺和氯化亚砷使用前经新蒸处理.

3.2 实验方法

3.2.1 α -羟基烷基磷酸酯(**1**)的合成

中间体 **1** 的制备参照文献[10]方法.

3.2.2 取代苯氧乙酰氯(**2**)的合成

中间体 **2** 的制备参照文献[11]方法.

3.2.3 O,O -二烷基 α -(取代苯氧乙酰氧基)烷基磷酸酯(**3**)的合成

在冰盐浴冷却 ($0\sim 5^\circ\text{C}$) 条件下, 向装有 α -羟基烷基磷酸酯 (0.01 mol) 和三乙胺 (0.012 mol) 的二氯甲烷 (30 mL) 溶液的三角烧瓶中, 缓慢滴加溶于二氯甲烷 (10 mL) 的取代苯氧乙酰氯 **2** (0.011 mol) 溶液. 滴毕, 撤去冰浴, 室温反应 $2\sim 4 \text{ h}$, 然后依次用稀盐酸、饱和碳酸氢钠溶液和饱和氯化钠水溶液洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 脱溶. 经柱层析 [$V(\text{丙酮}) : V(\text{石油醚}) = 1 : 6$] 提纯, 得 O,O -二烷基 α -(取代苯氧乙酰氧基)烷基磷酸酯(**3**).

表 2 目标化合物杀菌活性抑制百分率
Table 2 The fungicidal inhibition of compounds

化合物	R^1	R^2	Y_n	M	棉枯萎 霉菌	稻瘟病 霉菌	黄瓜灰 霉菌	小麦赤 霉菌	油菜菌核菌	甜菜褐斑
4f	CH_3	CH_3	3-CF_3	Na	39	80	84	31	97	45
4g	CH_3	C_2H_5	3-CF_3	Na	32	50	78	25	95	38
4h	CH_3	$2\text{-ClC}_6\text{H}_4$	3-CF_3	Na	50	90	99	59	99	59
4i	CH_3	$4\text{-ClC}_6\text{H}_4$	3-CF_3	Na	46	80	99	38	99	45
4j	CH_3	$3,4\text{-OCH}_2\text{OC}_6\text{H}_3$	3-CF_3	Na	46	60	99	41	100	69
4k	CH_3	$4\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4$	3-CF_3	Na	32	70	96	38	99	48
4l	CH_3	$3\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4$	3-CF_3	Na	39	80	98	44	99	52
4m	CH_3	$4\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4$	3-CF_3	Na	46	80	90	22	97	45
4n	CH_3	Pyrid-2-yl	3-CF_3	Na	46	80	80	28	90	59

3.2.4 *O*-烷基 α -(取代苯氧乙酰氧基)烷基膦酸盐(**4**)的合成

在避光和氮气保护条件下,向 *O,O*-二烷基 α -(取代苯氧乙酰氧基)烷基膦酸酯(0.005 mol)的丙酮溶液中加入碘化钠(0.005 mol),加热回流 1~4 h 后,产物从溶液中析出,过滤,干燥,用甲醇重结晶得白色晶体。

O-甲基 α -(2,4-二氯苯氧乙酰氧基)- α -(三氯甲基)甲基膦酸钠(**4a**): 无色固体,产率 65%. m.p. 121~123 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 3.30 (d, $J=9.8$ Hz, 3H, OCH₃), 3.98 (d, $J=12.2$ Hz, 2H, OCH₂P), 4.85 (s, 2H, OCH₂CO), 6.99~7.49 (m, 3H, C₆H₃); IR (KBr) ν : 3086, 2947, 2840, 1742, 1646, 1587, 1483, 1252, 1079, 1054, 946, 749 cm⁻¹; MS m/z (%): 466 (M⁺, 1.2). Anal. calcd for C₁₁H₉Cl₃NaO₆P: C 28.21, H 1.94; found C 27.83, H 2.08.

O-甲基 α -(2,4-二氯苯氧乙酰氧基)- α -(4-硝基苯基)甲基膦酸钠(**4b**): 浅黄色固体,产率 78%. m.p. 242~243 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 3.34 (d, $J=9.8$ Hz, 3H, OCH₃), 5.00, 5.11 (q, $J=16.4$ Hz, AB system, 2H, OCH₂CO), 5.88 (d, $J=12.2$ Hz, 1H, OCHP), 7.06~8.10 (m, 7H, C₆H₄, C₆H₃); IR (KBr) ν : 3042, 2953, 2846, 1757, 1637, 1508, 1479, 1251, 1089, 1044, 938, 767 cm⁻¹; MS m/z (%): 471 (M⁺, 2.4). Anal. calcd for C₁₆H₁₃Cl₂NNaO₆P: C 40.70, H 2.78, N 2.97; found C 40.35, H 2.86, N 2.82.

O-甲基 α -(2,4-二氯苯氧乙酰氧基)- α -(噻吩-2-基)甲基膦酸钠(**4c**): 白色固体,产率 74%. m.p. 216 °C (dec.); ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 3.35 (d, $J=9.8$ Hz, 3H, OCH₃), 5.89 (d, $J=12.2$ Hz, 1H, OCHP), 6.39~7.57 (m, 3H, C₄H₃S), 7.04~7.59 (m, 3H, C₆H₃); IR (KBr) ν : 3012, 2952, 2847, 1737, 1616, 1505, 1487, 1241, 1080, 1036, 934, 760 cm⁻¹; MS m/z (%): 432 (M⁺, 0.68). Anal. calcd for C₁₄H₁₂Cl₂NaO₆PS: C 38.82, H 2.79; found C 38.61, H 2.83.

O-乙基 α -(2,4-二氯苯氧乙酰氧基)- α -(吡啶-2-基)甲基膦酸钠(**4d**): 白色固体,产率 79%. m.p. >230 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 1.15 (t, $J=7.1$ Hz, 3H, OCH₂CH₃), 3.82~3.91 (m, 2H, OCH₂CH₃), 5.00 (s, 2H, OCH₂CO), 6.08 (d, $J=12.4$ Hz, 1H, OCHP), 6.87~7.31 (m, 3H, C₆H₃), 7.27~8.47 (m, 4H, C₅H₄N); IR (KBr) ν : 3070, 2980, 2930, 1748, 1594, 1571, 1483, 1235, 1079, 1056, 946, 748 cm⁻¹; MS m/z (%): 441 (M⁺, 0.2). Anal. calcd for C₁₆H₁₄Cl₂NNaO₆P: C 43.46, H 3.42, N 3.17; found C 43.61, H 3.22, N 3.12.

O-乙基 α -(2,4-二氯苯氧乙酰氧基)- α -(4-氟苯基)甲基膦酸钠(**4e**): 白色固体,产率 72%. m.p. 164~166 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 1.02 (t, $J=7.1$ Hz, 3H,

OCH₂CH₃), 3.64~3.73 (m, 2H, OCH₂CH₃), 4.94, 5.06 (q, $J=16.4$ Hz, AB system, 2H, OCH₂CO), 5.80 (d, $J=12.2$ Hz, 1H, OCHP), 7.04~7.59 (m, 8H, C₆H₄, C₆H₄); IR (KBr) ν : 3120, 2978, 2938, 1748, 1632, 1512, 1479, 1223, 1104, 1041, 952, 715 cm⁻¹; MS m/z (%): 442 (M⁺, 0.44). Anal. calcd for C₁₇H₁₅Cl₂FLiO₆P: C 46.08, H 3.41; found C 46.41, H 3.36.

α -甲基 α -(3-三氟甲基苯氧乙酰氧基)乙基膦酸钠(**4f**): 白色固体,产率 56%. m.p. 128.7~129 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 1.25~1.32 (m, 3H, CH₃), 3.41 (d, $J=10.2$ Hz, 3H, OCH₃), 4.74 (s, 2H, OCH₂CO), 4.91 (d, $J=8.2$ Hz, 1H, OCHP), 7.20~7.58 (m, 4H, C₆H₄); IR (KBr) ν : 3041, 2952, 2837, 1750, 1606, 1485, 1458, 1235, 1068, 1052, 934, 779 cm⁻¹; MS m/z (%): 364 (M⁺, 23). Anal. calcd for C₁₂H₁₃F₃NaO₆P: C 39.58, H 3.60; found C 39.86, H 3.10.

O-甲基 α -(3-三氟甲基苯氧乙酰氧基)丙基膦酸钠(**4g**): 白色固体,产率 48%. m.p. 69.8~70.7 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 0.83 (t, $J=7.3$ Hz, 3H, CH₂CH₃), 1.64~1.79 (m, 2H, CH₂CH₃), 3.38 (d, $J=10.0$ Hz, 3H, OCH₃), 4.89 (s, 2H, OCH₂CO), 4.99 (d, $J=10.2$ Hz, 1H, OCHP), 7.20~7.58 (m, 4H, C₆H₄); IR (KBr) ν : 3098, 2944, 2835, 1740, 1592, 1483, 1434, 1244, 1083, 1052, 932, 751 cm⁻¹; MS m/z (%): 378 (M⁺, 18). Anal. calcd for C₁₃H₁₅F₃NaO₆P: C 41.28, H 4.00; found C 41.43, H 3.92.

O-甲基 α -(3-三氟甲基苯氧乙酰氧基)- α -(2-氯苯基)甲基膦酸钠(**4h**): 白色固体,产率 68%. m.p. 68~69 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 3.33 (d, $J=9.9$ Hz, 3H, OCH₃), 4.94, 5.01 (q, $J=16.6$ Hz, AB system, 2H, OCH₂CO), 6.18 (d, $J=12.1$ Hz, 1H, OCHP), 7.16~7.59 (m, 8H, 2C₆H₄); IR (KBr) ν : 3046, 2959, 2857, 1750, 1602, 1495, 1458, 1215, 1066, 1052, 924, 799 cm⁻¹; MS m/z (%): 460 (M⁺, 23). Anal. calcd for C₁₇H₁₄ClF₃NaO₆P: C 44.32, H 3.06; found C 44.22, H 2.98.

O-甲基 α -(3-三氟甲基苯氧乙酰氧基)- α -(4-氯苯基)甲基膦酸钠(**4i**): 白色固体,产率 62%. m.p. 138~140 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 3.34 (d, $J=9.9$ Hz, 3H, OCH₃), 5.79 (d, $J=12.1$ Hz, 1H, OCHP), 7.20~7.56 (m, 8H, 2C₆H₄); IR (KBr) ν : 3038, 2946, 2846, 1750, 1618, 1495, 1458, 1215, 1066, 1052, 931, 799 cm⁻¹; MS m/z (%): 460 (M⁺, 21). Anal. calcd for C₁₇H₁₄ClF₃NaO₆P: C 44.32, H 3.06; found C 44.43, H 2.92.

O-甲基 α -(3-三氟甲基苯氧乙酰氧基)- α -(3,4-亚甲二氧基苯基)甲基膦酸钠(**4j**): 白色固体,产率 67%. m.p. 119~121 °C; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 3.32 (d,

$J=9.8$ Hz, 3H, OCH₃), 4.94 (q, $J=16.6$ Hz, AB system, 2H, OCH₂CO), 5.70 (d, $J=12.0$ Hz, 1H, OCHP), 5.93 (s, 2H, OCH₂OPh), 6.76~7.53 (m, 7H, C₆H₄, C₆H₃); IR (KBr) ν : 3018, 2948, 2834, 1765, 1604, 1493, 1455, 1247, 1083, 1050, 929, 759 cm⁻¹; MS m/z (%): 470 (M⁺, 7). Anal. calcd for C₁₈H₁₅F₃NaO₈P: C 45.97, H 3.22; found C 45.59, H 3.74.

O-甲基 α -(3-三氟甲基苯氧乙酰氧基)- α -(4-甲基苯基)甲基膦酸钠(**4k**): 白色固体, 产率 63%. m.p. 69~70 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ : 2.26 (s, 3H, CH₃Ph), 3.28 (d, $J=9.8$ Hz, 3H, OCH₃), 4.94 (q, $J=16.6$ Hz, AB system, 2H, OCH₂CO), 5.72 (d, $J=12.2$ Hz, 1H, OCHP), 7.02~7.53 (m, 8H, 2C₆H₄); IR (KBr) ν : 3023, 2947, 2840, 1737, 1655, 1596, 1461, 1226, 1068, 1052, 928, 783 cm⁻¹; MS m/z (%): 440 (M⁺, 6). Anal. calcd for C₁₈H₁₇F₃NaO₈P: C 49.10, H 3.89; found C 48.82, H 3.55.

O-甲基 α -(3-三氟甲基苯氧乙酰氧基)- α -(3-硝基苯基)甲基膦酸钠(**4l**): 白色固体, 产率 60%. m.p. 124~125 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ : 3.39 (d, $J=9.9$ Hz, 3H, OCH₃), 5.01 (q, $J=16.6$ Hz, AB system, 2H, OCH₂CO), 5.92 (d, $J=12.7$ Hz, 1H, OCHP), 7.03~8.16 (m, 8H, C₆H₄, C₆H₃); IR (KBr) ν : 3031, 2919, 2846, 1752, 1620, 1538, 1459, 1215, 1064, 1047, 918, 797 cm⁻¹; MS m/z : 471 (M⁺, 1.5). Anal. calcd for C₁₇H₁₄F₃NNaO₈P: C 43.33, H 2.99, N 2.97; found C 43.61, H 3.22, N 3.12.

O-甲基 α -(3-三氟甲基苯氧乙酰氧基)- α -(4-硝基苯基)甲基膦酸钠(**4m**): 白色固体, 产率 62%. m.p. 206~208 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ : 3.36 (d, $J=9.9$ Hz, 3H, OCH₃), 5.89 (d, $J=12.7$ Hz, 1H, OCHP), 7.22~8.32 (m, 8H, 2C₆H₄); IR (KBr) ν : 3062, 2954, 2852, 1722, 1616, 1524, 1458, 1231, 1085, 1038, 930, 795 cm⁻¹; MS m/z (%): 471 (M⁺, 6). Anal. calcd for C₁₇H₁₄F₃N- NaO₈P: C 43.33, H 2.99, N 2.97; found C 43.41, H 3.17, N 3.11.

O-甲基 α -(3-三氟甲基苯氧乙酰氧基)- α -(吡啶-2-基)甲基膦酸钠(**4n**): 白色固体, 产率 84%. m.p. >223 °C; ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 300 MHz) δ : 3.30 (d, $J=10.2$ Hz, 3H, OCH₃), 4.99 (q, $J=16.6$ Hz, AB system, 2H, OCH₂CO), 5.79 (d, $J=12.9$ Hz, 1H, OCHP), 7.18~7.54

(m, 4H, C₆H₄), 7.44~8.44 (m, 4H, C₅H₄N); IR (KBr) ν : 3070, 2944, 2835, 1740, 1629, 1592, 1483, 1244, 1083, 1052, 928, 751 cm⁻¹; MS m/z (%): 427 (M⁺, 11). Anal. calcd for C₁₆H₁₄F₃NNaO₆P: C 44.98, H 3.30, N 3.28; found C 45.41, H 3.17, N 3.19.

3.2.5 生物活性测定方法

以油菜、莧菜、苜蓿、稗草和马唐为靶标, 采用盆栽法在 1.5 kg/ha 的浓度下, 对目标化合物 **4a**~**4n** 进行除草活性测试, 除草活性测试方法参见文献[11].

以棉枯萎霉菌、稻瘟病霉菌、黄瓜灰霉菌、小麦赤霉菌、油菜菌核菌和甜菜褐斑为靶标, 采用平皿法在 50 μg/g 浓度下, 对目标化合物 **4a**~**4n** 进行杀菌活性测试, 杀菌活性测试方法参见文献[12, 13].

References

- [1] Baillie, A. C.; Wright, K.; Wright, B. J.; Earnshaw, C. G. *Pestic. Biochem. Physiol.* **1988**, *30*, 103.
- [2] Kluger, R.; Pike, D. C. *J. Am. Chem. Soc.* **1977**, *99*, 4504.
- [3] Kluger, R.; Gish, G.; Kauffman, G. *J. Biol. Chem.* **1984**, *259*, 8960.
- [4] He, H. W.; Yuan, J. L.; Peng, H.; Chen, T.; Shen, P.; Wan, S. Q.; Li, Y. J.; Tan, H. L.; He, Y. H.; He, J. B.; Li, Y. *J. Agric. Food Chem.* **2011**, *59*, 4801.
- [5] Wang, T.; He, H. W.; Miao, F. M. *Chin. J. Org. Chem.* **2009**, *29*, 1152 (in Chinese). (贺红武, 刘建超, 缪方明, 有机化学, **2009**, *29*, 1152.)
- [6] He, H. W.; Wang, T.; Yuan, J. L. *J. Organomet. Chem.* **2005**, *690*, 2608.
- [7] Peng, H.; Wang, T.; Xie, P.; Chen, T.; He, H. W.; Wang, J. *J. Agric. Food Chem.* **2007**, *55*, 1871.
- [8] Wang, T.; He, H. W. *Synth. Commun.* **2004**, *34*, 1415.
- [9] He, H. W.; Peng, H.; Wang, T.; Wang, C. B.; Yuan, J. L.; Chen, T.; He, J. B.; Tan, X. S. *J. Agric. Food Chem.* **2013**, *61*, 2479.
- [10] Texier-Boullet, F.; Foucaud, A. *Synthesis* **1982**, 916.
- [11] Peng, H.; He, H. W. *Chin. J. Org. Chem.* **2007**, *27*, 502 (in Chinese). (彭浩, 贺红武, 有机化学, **2007**, *27*, 502.)
- [12] Liu, J. C.; Cui, Z. P.; He, H. W. *Chin. J. Org. Chem.* **2011**, *31*, 2082 (in Chinese). (刘建超, 崔泽平, 贺红武, 有机化学, **2011**, *31*, 2082.)
- [13] Lei, J. P.; Han, J. T.; X, Z. H.; Dong, H. B.; Wang, M. A. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, *32*, 1993 (in Chinese). (雷建平, 韩金涛, 徐志红, 董宏波, 王明安, 有机化学, **2012**, *32*, 1993.)

(Qin, X.)