1,3-二羟基咕吨酮类化合物的简洁合成及清除亚硝酸根作用研究

毛双双^a 郑欢欢^a 罗翠婷^a 陈河如^{*,a,b,c}^a 暨南大学药学院中药及天然药物研究所 广州 510632)^b 中国科学院上海药物研究所新药研究国家重点实验室 上海 201203)^c 广东省中药药效物质基础及创新药物研究重点实验室 广州 510632)

摘要 以间苯三酚为起始原料, 在伊顿试剂的催化作用下, 与不同取代水杨酸反应合成 1,3-二羟基咕吨酮类化合物 **3a**~**3l** 12 个, 收率 63%~87%, 并探讨了反应机理及结构-反应活性关系. 利用紫外分光光度法测定了所合成化合物对亚硝酸盐的清除作用, 结果表明, 在 37 °C、pH 3 及反应时间为 30 min 条件下, 1,3-咕吨酮类化合物对亚硝酸根均有较好的清除作用, 其中化合物 **3f** 和 **3b** 的清除作用最强, 清除率达 34%. 同时对 1,3-二羟基咕吨酮类化合物清除亚硝酸盐的作用机制及构效关系进行了探讨.

关键词 咕吨酮; 有机合成; 亚硝酸盐; 癌症防治; 伊顿试剂

Concise Syntheses of 1,3-Dihydroxylxanthenes and Their Clearance Effects against Nitrite

Mao, Shuangshuang^a Zheng, Huanhuan^a Luo, Cuiting^a Chen, Heru^{*,a,b,c}^a Institute of Traditional Chinese Medicine and Natural Products, College of Pharmacy, Jinan University, Guangzhou 510632)^b State Key Laboratory of Drug Research, Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201203)^c Guangdong Province Key Laboratory of Pharmacodynamic Constituents of TCM and New Drugs Research, Jinan University, Guangzhou 510632)

Abstract Twelve 1,3-dihydroxylxanthenes (**3a**~**3l**) were synthesized under the catalysis of Eaton's reagent applying phloroglucinol and substituted salicylic acids as starting materials. The yields were from 63% to 87%. The reaction mechanism and their structure-reaction activity relationship have been discussed. The clearance effects of all the prepared xanthenes against nitrite have been investigated by UV spectrophotometry. It is disclosed that all the tested xanthenes have obvious clearance effects against nitrite at the conditions of pH 3, room temperature, and 30 min treatment. **3b** and **3f** are identified as the most active compounds with clearance rate up to 34.0%. The clearance mechanism of xanthenes against nitrite and their structure-activity relationships were also included here.

Keywords xanthenes; organic synthesis; nitrite; cancer prevention; Eaton's reagent

亚硝酸盐在食品安全中所引起的问题早已受到关注. 亚硝酸盐广泛存在于土壤、水体中, 在食品加工及储存过程中也有亚硝酸盐的产生. 亚硝酸盐被人体吸收后, 可与人体中含氨基的功能分子包括蛋白质、DNA 及信号分子反应生成 *N*-亚硝基化合物(nitrosodimethylamin, 简称 NDMA), 该化合物是目前所知的最强的化

学致癌物质之一, 能引起人和动物的胃、肝脏等多种器官的恶性慢性肿瘤^[1]. 亚硝酸盐无论在实验室和自然条件下还是在人和动物体内均能反应生成 NDMA, 尤其在人和动物的胃中更适于生成 NDMA^[2]. 从亚硝胺生成的动力学来看, 其生成速度与亚硝酸根(NO_2^-)的平方成正比^[3]. 因此, 阻断 NDMA 的合成或清除亚硝胺的

* E-mail: thrchen@jnu.edu.cn

Received October 11, 2013; revised November 10, 2013; published online November 21, 2013.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 81172982), the Guangdong Provincial Project of Science and Technology (No. 2010A030100006) and the State Key Laboratory of Drug Research (No. SIMM1302KF-12).

国家自然科学基金(No. 81172982)、广东省科技计划社会发展重点(No. 2010A030100006)、新药研究国家重点实验室开放基金(No. SIMM1302KF-12)资助项目.

前体化合物——亚硝酸根是预防癌症的有效途径之一。

薛长晖^[2]曾报道特色藏药藏茵陈的乙醇提取液对亚硝酸盐具有良好的清除作用。作为藏茵陈的主要药效成分之一，咕吨酮类化合物是否具有清除亚硝酸盐的作用？这是本文所关注的科学问题，此方面的工作未见文献报道。众所周知，咕吨酮(xanthones)是以二苯骈- γ -吡喃酮为母核的一类化合物，主要存在于龙胆科^[4]和藤黄科^[5]植物中，同时也存在于一些真菌和苔藓家族中^[6]，是近代天然产物中的一类重要活性成分^[7]。由于咕吨酮类化合物的独特结构使得它们能够与不同的药物靶标作用^[8]，已经报道该类化合物具有抗氧化^[9,10]、抗过敏^[11]、抗菌^[12]、抗炎^[13]、抗 HIV-1 病毒^[14]、降血糖^[15,16]、抗肿瘤^[17,18]、抗疟疾^[19]和延缓神经退行性疾病进程^[14,15,19]等作用。基于对咕吨酮类化合物在新药开发上的潜在价值，其合成引起了科学家的广泛兴趣。近年来，已有多篇文献报道了基于咕吨酮的新药设计合成及其药理活性研究^[17,18,20~22]。

从咕吨酮的结构上看，它包含有多酚结构，理论上应当具有清除亚硝酸根的作用。因此，本文拟采用简洁、经济的方法合成系列咕吨酮类化合物，并研究它们对亚硝酸根的清除作用及其构效关系，为研发具有预防和治疗癌症新药奠定科学基础。目标化合物的合成路线见 Eq. 1。

1 结果与讨论

1.1 咕吨酮的合成

咕吨酮类化合物的合成有多种方法，胡利红等^[23]已经作了很好的综述。本实验以伊顿试剂(Eaton's reagent 是重量比 1 : 10 的 P_2O_5/CH_3SO_3H)^[24]为催化剂兼溶剂，以间苯三酚为起始原料，与不同取代的水杨酸类化合物直接缩合环化，以 63%~87%的收率合成系列咕吨酮类化合物(表 1)。其中，水杨酸自身与间苯三酚的反应收率最高，达 87% (**3d**)。通常，当水杨酸类化合物芳环上有 +I 或 +C 效应的基团时，收率将降低，尤其当这些基团处于羧基的邻、对位时，效应更显著，如 **3b** 和 **3a**，其反应收率只有 63% 和 75%；当水杨酸类化合物羟基的邻、对位有 -I 或 -C 效应的基团时，同样会使反应收率下降，如 **3g** 和 **3h**，反应收率分别为 74% 和 78%。水杨酸类化合物的芳环上不能有游离的氨基，氨基必需保护才能顺利发生缩合环化反应(如 **3l**)。实验中发现，当间苯三酚投入量由 1 equiv. 提高到 1.5 equiv. 时，产率明显提高。可见，过量的间苯三酚有助于促进反应的进行。

本实验条件下，间苯三酚与水杨酸类化合物的缩合环化机理可能有 3 种(图 1)。其一是水杨酸类化合物在伊顿试剂的催化作用下与间苯三酚发生 Friedel-Craft 酰化

表 1 咕吨酮类化合物的合成产率
Table 1 Synthetic yields of xanthones

Compd.	Yield/%	Compd.	Yield/%
3a	75	3g	74
3b	63	3h	78
3c	80	3i	82
3d	87	3j	84
3e	85	3k	81
3f	84	3l	78

反应得芳酮，然后再发生分子内亲核反应成醚键(机理 I)；其二是水杨酸类化合物先与间苯三酚反应成酯，再经 Fries 重排得芳酮，最后成醚键环化(机理 II)；第三条路线与第二条路线相似，先反应生成酯，再经 Smiles 重排得芳酮，最后经 Friedel-Craft 酰化反应成环(机理 III)。三种机理都有相应的成功实例^[25~27]。不难看出，表 1 所体现出来的结构-反应活性关系与任何一种反应机理的推论一致。

本实验还尝试了分别以 1,2,4-苯三酚、对苯二酚、间苯二酚、苯酚替代间苯三酚与水杨酸类化合物反应合成咕吨酮类化合物的可能性。结果发现，不管是在相同条件下，或是提高反应温度、延长反应时间，均不能得到咕吨酮类化合物。可见，该反应成功的关键是亲核受体(如间苯三酚)要有足够大的活性。从结构上看，间苯三酚有三个强的致活羟基，而且活化方向一致，所以不管是图 1 中的任何一种机理，它都是活泼的反应底物，能很好地发生缩合环化反应；相比而言，1,2,4-苯三酚虽然也有三个强的致活羟基，但其活化的方向不完全一

图1 伊顿试剂催化下合成咕吨酮的三种可能机理

Figure 1 Three possible mechanisms of the syntheses of xanthenes catalyzed by Eaton's reagent

致, 其每个反应位点都没有间苯三酚活泼, 所以无法发生反应; 其它酚类化合物显然更加不活泼。

以伊顿试剂为催化剂合成咕吨酮类化合物已有文献报道^[28]。在酚羟基不保护的条件下, 图1所示的三种反应机理都有可能。本实验曾分离得到对苯二酚分别与**2a**和**2j**反应的中间体化合物**w-1**和**w-2**, 为机理II和III提供有力的证据。但机理I的中间体化合物较难获得, 因为若能形成芳酮, 则成环得咕吨酮的速度很快, 无法停留在芳酮阶段。

理论上, 伊顿试剂与多聚磷酸(PPA)作用相似。但PPA非常粘稠, 在低于60~90℃温度下很难实现有效搅拌, 而且大部分的有机化合物在PPA中溶解度很小。相比之下, 伊顿试剂克服了PPA的所有缺点, 可以作为催化剂兼溶剂使用, 而且价格低廉, 后处理方便, 污染小, 毒性低, 在本实验中是一种高效低毒、经济实用的缩合环化剂。

1.2 NO₂⁻清除作用

本实验利用紫外分光光度法测定了在37℃、pH值分别为3和7两种条件下咕吨酮类化合物**3a**~**3l**对NO₂⁻的清除作用。结果见表2。显然, 化合物**3a**~**3l**对NO₂⁻均有一定的清除作用。在pH3介质中的清除作用

比在pH7介质中的清除作用要强。其中, 在pH3时, 化合物**3b**和**3f**对亚硝酸根的清除率最高, 达34.0%。其它化合物如**3b**, **3g**, **3h**, **3e**和**3j**也有较高的清除率, 均达30%左右。对比咕吨酮类化合物的结构, 它们在1,3位上都有酚羟基。若5,6,7位被+I或-C效应的基团如甲基、卤原子(Cl, Br)取代时, 清除作用增强; 若7,8位被+I或+C效应的基团取代, 如**3c**, **3i**, **3l**, 其清除作用减弱。若只在6-位有羟基, 如**3a**, 则清除作用并没有得到增强; 若在6,8-位上同时有羟基的存在, 如**3b**, 则其对NO₂⁻的清除作用大大增强。

表2 咕吨酮类化合物对NO₂⁻的清除作用Table 2 Clearance effects of xanthenes against NO₂⁻

Compd.	亚硝酸根清除率/%	
	pH 3	pH 7
3a	11.5	4.9
3b	34.0	12.2
3c	9.6	3.0
3d	18.0	— ^a
3e	28.1	9.2
3f	34.0	19.7
3g	32.9	23.8
3h	29.4	9.2
3i	12.0	— ^a
3j	26.0	15.6
3k	19.3	12.8
3l	16.6	0.2

^a “—”表示没有数据。

我们推测, 咕吨酮类化合物清除NO₂⁻的作用来自于它们之间能发生亲电取代反应(图2)。在酸性环境中, 亚硝酸根容易产生活泼的NO⁺, 更容易与咕吨酮类化合物发生亚硝化反应。所以, 咕吨酮类化合物在pH3的介质中具有更好的清除作用; 而在pH7介质中, 不利于NO⁺的产生, 其清除作用相对较弱。

本实验中, pH3介质模拟的是人胃液的生理环境,

图2 咕吨酮类化合物清除 NO_2^- 的可能机理

Figure 2 Putative mechanism of the nitrite clearance of xanthenes

pH 7 介质模拟的是肠液的生理环境。据报道^[2], 亚硝酸盐在人和动物的胃中更适于生成强致癌物质 NDMA。显然, 若能在胃中有效清除 NDMA, 那么其预防癌症的效果将较佳; 而上述的数据显示, 咕吨酮类化合物在模拟胃液的环境中对 NO_2^- 的清除作用更为突出, 所以作者认为咕吨酮类化合物有可能作为预防癌症的候选化合物。

2 结论

本实验利用伊顿试剂作催化剂兼溶剂, 成功合成了 12 个 1,3-二羟基咕吨酮类化合物, 收率 63%~87%, 并探讨了反应机理及结构-反应活性关系, 同时研究了所合成化合物对亚硝酸根的清除作用。实验结果表明, 1,3-二羟基咕吨酮类化合物在 pH 3 介质中对 NO_2^- 有较好的清除作用, 以化合物 **3b** 和 **3f** 对 NO_2^- 的清除率最高, 达 34.0%; 在 pH 7 介质中的清除作用相对较弱, 其作用强度的差异与其机制有关。即在酸性环境, 亚硝酸根更容易产生活泼的 NO^+ 与 1,3-二羟基咕吨酮类化合物发生反应。取代基随其电子效应及所在位置的不同, 对清除能力产生不同的影响。当 +I 或 -C 效应的基团如甲基、卤原子(Cl, Br)位于 5~7 位取代时, 清除作用增强; 当 +I 或 +C 效应的基团处于 7, 8 位时, 其清除作用减弱。

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

Bruker-AV300MHz 型核磁共振仪(瑞士 Bruker 公司); DHG-9140A 型恒温干燥箱(上海浦东荣丰科学仪器有限公司); CLJBQ-3 型恒温磁力搅拌器(郑州长城科工贸有限公司); EYELA 型旋转蒸发仪(东京理化器械独资工厂); LGJ-12 冷冻干燥机(巩义市英峪予华仪器有限公司); FA2104 型电子天平(上海恒平科学仪器有限公司); TU-1810S 紫外分光光度计(北京普析通仪器有限公司); LC-UV100 液相色谱仪(上海伍丰科学仪器有限公司); DZF-150 型小型真空干燥箱(郑州长城科工贸有限公司); KQ3200E 型超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司)。

五氧化二磷(AR, 天津百世试剂); 无水硫酸镁(AR,

天津百世试剂); 硅胶(200~300 目, 烟台化学工业研究所); 醋酸酐(AR, 广州化学试剂厂); 甲醇(GR, 安徽时联特种溶剂有限公司); 甲磺酸、间苯三酚、水杨酸、盐酸萘乙二胺、对甲基苯磺酸、亚硝酸钠、柠檬酸、磷酸氢二钠等均为 aladdin 试剂(上海晶纯科技有限公司)。

3.2 实验方法

3.2.1 化合物的合成

5-乙酰氨基-2-羟基苯甲酸(**2l**)的合成: 称取 5-氨基水杨酸 765 mg (5.0 mol) 于 50 mL 圆底烧瓶中, 用注射器量取 0.5 mL (约 5.0 mol) 乙酸酐加入到反应瓶中, 用适量重蒸过的甲醇做溶剂, 于 65 °C 回流 8 h。室温下旋转蒸除溶剂, 残留物用乙酸乙酯萃取四次, 每次 20 mL, 合并有机相, 饱和 NaCl 洗涤(20 mL×3), 无水 Na_2SO_4 干燥, 旋蒸除去溶剂。残留物用 RP-HPLC 分离纯化(27%的甲醇水为洗脱剂), 得浅黄色固体 781 mg, 收率 80%。 ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 9.89 (s, 1H, OH), 8.09 (d, $J=2.5$ Hz, 1H, H-6), 7.64 (dd, $J=8.9, 2.6$ Hz, 1H, H-4), 6.90 (d, $J=8.9$ Hz, 1H, H-3), 2.01 (s, 3H, COCH_3); MS-ESI m/z : 196.1 $[\text{M}+\text{H}]^+$ 。

咕吨酮类化合物 **3a**~**3k** 的合成通法: 根据文献[24]制备 Eaton's Reagent。将 6 g 重蒸过的甲磺酸加入到 25 mL 圆底烧瓶中, 再加入 0.6 g 的 P_2O_5 , 80 °C 条件下搅拌 1 h, 得到淡黄色的溶剂备用。参照文献[28]合成咕吨酮类化合物 **3a**~**3k**。将间苯三酚 97 mg (0.6 mmol) 和取代水杨酸类化合物(0.5 mol)加入到 25 mL 圆底烧瓶中, 随后在搅拌下缓慢滴加新制备的 Eaton's Reagent, 升温至 80 °C 反应 1 h。反应结束后, 将反应混合物冷却至室温, 倒入冰水中剧烈搅拌 2 h, 有黄色粉末析出, 过滤, 固体用蒸馏水清洗数次直至滤液的 pH 值接近 6, 收集滤饼, 用 RP-HPLC 分离纯化(洗脱剂为 65%的甲醇水加 0.1%的甲酸), 旋蒸去除甲醇, 冷冻干燥得黄色粉末。

1,3,6-三羟基咕吨酮(**3a**): 黄色粉末, 产率 78.0%。 ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 13.05 (s, 1H, OH-1), 11.03 (s, 1H, OH-6), 10.95 (s, 1H, OH-3), 7.95 (d, $J=9.0$ Hz, 1H, H-8), 6.88 (dd, $J=2.3, 8.9$ Hz, 1H, H-7), 6.80 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, H-5), 6.33 (d, $J=3.0$ Hz, 1H, H-2), 6.16 (d, $J=3.0$ Hz, 1H, H-4); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 75 MHz) δ : 179.5 (C-9), 165.6 (C-3), 164.7 (C-6), 163.3 (C-1), 157.9 (C-4a), 157.8 (C-4b), 127.6 (C-8), 114.4 (C-8a), 112.8 (C-7), 102.5 (C-8b), 102.1 (C-5), 98.4 (C-2), 94.4 (C-4); MS-ESI m/z : 245.3 $[\text{M}+\text{H}]^+$ 。表征数据和理化性质与文献[28, 29]一致。

1,3,6,8-四羟基咕吨酮(**3b**): 淡红色粉末, 产率 63%。UV-Vis (CH_3COCH_3) λ_{max} : 330, 368 nm; ^1H NMR (CD_3OD , 300 MHz) δ : 6.23 (d, $J=2.3$ Hz, 2H, H-4, H-5),

6.12 (d, $J=3.0$ Hz, 2H, H-2, H-7); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 184.2 (C-9), 167.1 (2C, C-3/C-6), 164.0 (2C, C-4a/C-4b), 159.1 (2C, C-1/C-8), 102.1 (2C, C-8a/C-8b), 99.3 (2C, C-2/C-7), 95.2 (2C, C-4/C-5); IR (KBr) ν : 3377, 1657, 1617, 1586, 1487, 1320, 1161, 820 cm^{-1} ; MS-ESI m/z : 261.3 $[\text{M}+\text{H}]^+$; HRMS calcd for $\text{C}_{13}\text{H}_8\text{O}_6$ 260.0314, found 260.0321.

1,3-二羟基-7-甲氧基咕吨酮(**3c**): 黄色粉末, 产率 80%. ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 12.81 (s, 1H, OH-1), 11.21 (s, 1H, OH-3), 7.50 (d, $J=8.7$ Hz, 1H, H-5), 7.43 (s, 1H, H-8), 7.38 (d, $J=9.0$ Hz, 1H, H-6), 6.36 (s, 1H, H-4), 6.19 (s, 1H, H-2), 3.84 (s, 3H, OCH_3); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 75 MHz) δ : 179.9 (C-9), 166.3 (C-3), 163.2 (C-1), 157.8 (C-4a), 156.1 (C-7), 150.4 (C-4b), 124.8 (C-6), 120.6 (C-8a), 119.6 (C-5), 105.7 (C-8), 102.4 (C-8b), 98.5 (C-2), 94.3 (C-4), 56.2 (OCH_3); MS-ESI m/z : 259.2 $[\text{M}+\text{H}]^+$. 表征数据和理化性质与参考文献[30]一致.

1,3-二羟基咕吨酮(**3d**): 黄色粉末, 产率 87%. ^1H NMR (CD_3OD , 300 MHz) δ : 8.18 (dd, $J=1.4, 7.9$ Hz, 1H, H-8), 7.89~7.69 (m, 1H, H-6), 7.48 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, H-5), 7.44~7.37 (m, 1H, H-7), 6.36 (d, $J=1.9$ Hz, 1H, H-2), 6.20 (d, $J=1.9$ Hz, 1H, H-4); ^{13}C NMR (CD_3OD , 300 MHz) δ : 180.4 (C-9), 166.0 (C-3), 163.4 (C-1), 158.0 (C-4a), 156.0 (C-4b), 134.9 (C-6), 125.1 (C-8), 123.8 (C-8a), 120.2 (C-7), 117.3 (C-5), 102.5 (C-8b), 97.8 (C-4), 93.7 (C-2); MS-ESI m/z : 229.2 $[\text{M}+\text{H}]^+$. 表征数据和理化性质与参考文献[31]一致.

1,3-二羟基-5-甲基咕吨酮(**3e**): 黄色粉末, 产率 85%. ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 12.84 (s, 1H, OH-1), 11.06 (s, 1H, OH-3), 7.93 (d, $J=7.2$ Hz, 1H, H-8), 7.68 (d, $J=7.2$ Hz, 1H, H-6), 7.33 (dd, $J=7.2, 7.2$ Hz, 1H, H-7), 6.40 (d, $J=1.8, 1\text{H}$, H-4), 6.20 (d, $J=1.8$ Hz, 1H, H-2), 2.46 (s, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 180.0 (C-9), 165.8 (C-3), 162.8 (C-1), 157.2 (C-4a), 153.6 (C-4b), 136.2 (C-6), 126.6 (C-8), 122.8 (C-8a), 119.6 (C-5), 102.0 (C-8b), 98.1 (C-4), 94.1 (C-2); MS-ESI m/z : 243.3 $[\text{M}+\text{H}]^+$. 表征数据和理化性质与参考文献[32]一致.

1,3-二羟基-6-甲基咕吨酮(**3f**): 黄色粉末, 产率 84%. ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 12.87 (s, 1H, OH-1), 11.05 (s, 1H, OH-3), 7.98 (d, $J=8.1$ Hz, 1H, H-8), 7.37 (s, 1H, H-5), 7.26 (d, $J=8.1$ Hz, 1H, H-7), 6.36 (d, $J=2.1$ Hz, 1H, H-4), 6.19 (d, $J=2.1$ Hz, 1H, H-3), 2.45 (s, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 75 MHz) δ : 180.1 (C-9),

166.2 (C-3), 163.3 (C-1), 157.8 (C-4a), 155.9 (C-4b), 147.4 (C-6), 126.2 (C-8), 125.5 (C-8a), 118.0 (C-7), 117.8 (C-5), 102.5 (C-8b), 98.5 (C-4), 94.5 (C-2), 21.9 (CH_3); MS-ESI m/z : 243.4 $[\text{M}+\text{H}]^+$. 表征数据和理化性质与参考文献[32]一致.

1,3-二羟基-7-氯咕吨酮(**3g**): 黄色粉末, 产率 74%. ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 12.55 (s, 1H, OH-1), 11.21 (s, 1H, OH-3), 8.00 (d, $J=2.6$ Hz, 1H, H-8), 7.86 (dd, $J=8.9, 2.6$ Hz, 1H, H-6), 7.62 (d, $J=8.9$ Hz, 1H, H-5), 6.38 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, H-4), 6.22 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, H-2); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 75 MHz) δ : 179.0 (C-9), 166.7 (C-3), 163.2 (C-1), 157.7 (C-4a), 154.4 (C-4b), 135.7 (C-6), 129.1 (C-8), 124.6 (C-8a), 121.5 (C-7), 120.7 (C-5), 102.6 (C-8b), 98.8 (C-4), 94.7 (C-2); MS-ESI m/z : 263.3 $[\text{M}+\text{H}]^+$. 表征数据和理化性质与参考文献[33]一致.

1,3-二羟基-7-溴咕吨酮(**3h**): 黄色粉末, 产率 78%. ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 12.55 (s, 1H, OH-1), 11.22 (s, 1H, OH-3), 8.13 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, H-8), 7.97 (dd, $J=8.9, 2.6$ Hz, 1H, H-6), 7.55 (d, $J=8.9$ Hz, 1H, H-5), 6.38 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, H-4), 6.22 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, H-2); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 75 MHz) δ : 178.9 (C-9), 166.7 (C-3), 163.2 (C-1), 157.7 (C-4a), 154.8 (C-4b), 138.4 (C-6), 127.6 (C-8), 121.9 (C-8a), 120.8 (C-7), 116.8 (C-5), 102.6 (C-8b), 98.8 (C-4), 94.7 (C-2); MS-ESI m/z : 309.1 $[\text{M}+\text{H}]^+$. 表征数据和理化性质与参考文献[32]一致.

1,3-二羟基-8-甲氧基咕吨酮(**3i**): 黄色粉末, 产率 82%. ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 13.33 (s, 1H, OH-1), 7.70 (t, $J=8.4$ Hz, 1H, H-6), 7.06 (d, $J=8.3$ Hz, 1H, H-7), 6.96 (d, $J=8.3$ Hz, 1H, H-5), 6.27 (d, $J=1.8$ Hz, 1H, H-4), 6.12 (d, $J=1.9$ Hz, 1H, H-2), 3.89 (s, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 75 MHz) δ : 180.5 (C-9), 166.2 (C-8), 163.5 (C-3), 160.6 (C-1), 157.6 (C-4a), 156.8 (C-4b), 136.3 (C-6), 110.4 (C-8a), 109.7 (C-5), 107.0 (C-7), 102.8 (C-8b), 98.6 (C-4), 93.8 (C-2), 56.7 (OCH_3); MS-ESI m/z : 259.2 $[\text{M}+\text{H}]^+$. 表征数据和理化性质与参考文献[34]一致.

1,3-二羟基-[6,7]-苯并咕吨酮(**3j**): 亮黄色粉末, 产率 84%. ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 12.90 (s, 1H, OH-1), 11.22 (s, 1H, OH-3), 8.83 (s, 1H, C-8), 8.23 (d, $J=8.3$ Hz, 1H, H-5), 8.04 (d, $J=7.1$ Hz, 2H, H-5, H-8), 7.70 (t, $J=7.1$ Hz, 1H, H-6), 7.57 (t, $J=7.5$ Hz, 1H, H-7), 6.41 (d, $J=2.1$ Hz, 1H, H-4), 6.21 (d, $J=2.1$ Hz, 1H, H-2); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 180.8 (C-9), 167.0 (C-3),

163.8 (C-1), 158.3 (C-4a), 151.7 (C-4b), 136.8 (C-6), 130.1 (C-8), 129.9 (C-7), 129.6 (C-8), 127.6 (C-6), 127.6 (C-5), 126.3 (C-8a), 120.2 (C-7), 113.6 (C-5), 102.2 (C-8b), 98.2 (C-4), 94.8 (C-2); MS-ESI m/z : 279.3 $[M+H]^+$. 表征数据和理化性质与参考文献[35]一致.

1,3-二羟基-[5,6]-苯并咕吨酮(**3k**): 暗黄色粉末, 产率 81%. ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 12.84 (s, 1H, OH-1), 8.57 (d, $J=7.4$ Hz, 1H, H-5), 8.06 (d, $J=7.4$ Hz, 1H, H-8), 8.00 (d, $J=8.6$ Hz, 1H, H-8), 7.85 (d, $J=9.0$ Hz, 1H, H-7), 7.80~7.73 (m, 2H, 1H, H-6), 6.61 (s, 1H, H-4), 6.25 (s, 1H, H-2); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 179.9 (C-9), 166.4 (C-3), 162.9 (C-1), 157.5 (C-4a), 153.3 (C-4b), 136.5 (C-6), 130.5 (C-7), 129.1 (C-12), 128.7 (C-5), 127.9 (C-11), 127.6 (C-13), 123.3 (C-8), 122.9 (C-10), 120.2 (C-7), 115.9 (C-8a), 103.0 (C-8b), 99.1 (C-4), 94.9 (C-2); MS (ESI) m/z : 279.3 $[M+H]^+$. 表征数据和理化性质与参考文献[35]一致.

1,3-二羟基-7-乙酰氨基咕吨酮(**3l**): 黄色粉末, 产率 78%. UV-Vis (CH₃COCH₃) λ_{max} : 336 nm; ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz) δ : 12.85 (s, 1H, OH-1), 11.10 (s, 1H, NH), 10.27 (s, 1H, OH-3), 8.41 (s, 1H, H-8), 7.95 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, H-6), 7.55 (d, $J=8.9$ Hz, 1H, H-5), 6.38 (s, 1H, H-4), 6.21 (s, 1H, H-2), 2.09 (s, 3H, CH₃); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 75 MHz) δ : 180.2 (C-9), 167.0 (NHCO), 166.3 (C-3), 163.3 (C-1), 157.8 (C-4a), 151.6 (C-4b), 136.3 (C-7), 127.4 (C-8a), 120.2 (C-6), 118.6 (C-8), 114.0 (C-5), 102.5 (C-8b), 98.5 (C-4), 94.4 (C-2), 24.4 (CH₃); IR (KBr) ν : 3467, 1639, 1615, 1523, 1320, 1184, 832 cm^{-1} ; MS-ESI m/z : 286.2 $[M+H]^+$; HRMS calcd for C₁₅H₁₂NO₅ $[M+H]^+$ 286.0716, found 286.0715.

3.2.2 清除 NO₂⁻ 作用实验

3.2.2.1 溶液的配制

0.4%对氨基苯磺酸溶液的配制: 称取 0.4 g 对氨基苯磺酸溶于 100 mL 20% 盐酸中, 混合均匀, 避光保存.

0.2% *N*-1-萘乙二胺盐酸盐溶液的配制: 称取 0.2 g 盐酸 *N*-1-萘乙二胺溶于 100 mL 的蒸馏水混匀, 避光保存.

亚硝酸钠标准溶液的配制: 准确称取在硅胶干燥器中干燥了 24 h 的亚硝酸钠 0.1000 g, 加水溶解, 定容至 250 mL (浓度为 400 $\mu\text{g/mL}$), 作为储备液. 取储备液 1.25 mL 稀释至 100 mL (浓度为 5 $\mu\text{g/mL}$), 待用.

3.2.2.2 实验方法

原 NO₂⁻ 溶液的吸光度^[2,36]: 取 5 $\mu\text{g/mL}$ 的 NaNO₂ 标准溶液 3 mL, 用磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲溶液调节 pH 值等于 3 或 7, 室温下反应 20 min 后, 立即加入 2 mL

0.4% 对氨基苯磺酸溶液, 混匀, 静置 3~5 min 后, 加入 1 mL 0.2% 盐酸 *N*-1-萘乙二胺溶液, 加水至刻度, 混匀, 静置 15 min, 以 5 mL 蒸馏水为空白, 在 544 nm 处测吸光度. 测得标准液的吸光度为 A_2 .

加入待测样品后 NO₂⁻ 溶液的吸光度: 取 3 mg/mL 的咕吨酮类化合物 1 mL 于 25 mL 容量瓶, 加入 5 $\mu\text{g/mL}$ 的 NaNO₂ 标准溶液 3 mL, 用磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲溶液调节 pH 值等于 3 或 7, 室温下反应 30 min 后, 立即加入 2 mL 0.4% 对氨基苯磺酸溶液, 混匀, 静置 3~5 min 后, 加入 1 mL 0.2% 盐酸 *N*-1-萘乙二胺溶液, 加水至刻度, 混匀, 静置 15 min, 以 5 mL 蒸馏水为空白, 在 544 nm 处测吸光度. 测定数据为 A_1 .

亚硝酸根清除率的计算公式如下:

$$\text{亚酸根的清除率} = \frac{A_2 - A_1}{A_2} \times 100\%$$

式中 A_2 是原 NO₂⁻ 溶液的吸光度, A_1 是加入待测样品后 NO₂⁻ 溶液的吸光度.

References

- [1] Zhang, H.; Xu, G.; Yuan, J.-Y. *J. Zhengzhou Grain College* **2000**, 21, 50 (in Chinese). (张虹, 徐刚, 袁建耀, 郑州粮食学院学报, **2000**, 21, 50.)
- [2] Zhao, C.-H. *Food Ind.* **2010**, 5, 4 (in Chinese). (薛长晖, 食品工业, **2010**, 5, 4.)
- [3] Zhu, Y.-X.; Feng, H.-J.; Sun, Y. *Cancer* **1994**, 13, 470 (in Chinese). (褚衍信, 冯华进, 孙燕, 癌症, **1994**, 13, 470.)
- [4] Xiao, H.; Yang, L.; Zenai, C.; Guangming, L.; Jinfu, Q. *J. Chin. Pharm. Sci.* **2001**, 10, 172.
- [5] Ee, G. C. L.; Lim, C. K.; Lee, H. L. *J. Asian Nat. Prod. Res.* **2006**, 8, 567.
- [6] Wen, L.; Lin, Y.-C.; She, Z.-G.; Du, D.-S.; Chan, W.-L.; Zheng, Z. H. *J. Asian Nat. Prod. Res.* **2008**, 10, 133.
- [7] Nicole, P.; Panagiotis, M. *Anti-Cancer Agents Med. Chem.* **2009**, 9, 77.
- [8] Lesch, B.; Braese, S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2004**, 43, 115.
- [9] Sellés, A. J. N.; Castro, H. T. V.; Agüero, J.; González, J.; Nadeo, F.; De Simone, F.; Rastrelli, L. *J. Agric. Food Chem.* **2002**, 50, 762.
- [10] Luo, C.-T.; Mao, S.-S.; Liu, F.-L.; Yang, M.-X.; Chen, H.; Kurihara, H.; Li, Y. *Fitoterapia* **2013**, 91, 140.
- [11] Dube, M.; Zunker, K.; Neidhart, S.; Carle, R.; Steinhart, H.; Paschke, A. *J. Agric. Food Chem.* **2004**, 52, 3938.
- [12] Rukachaisirikul, V.; Kamkaew, M.; Sukavisit, D.; Taylor, W. C. *J. Nat. Prod.* **2003**, 66, 1531.
- [13] Park, H. H.; Park, Y.-D.; Han, J.-M.; Im, K.-R.; Lee, B. W.; Jeong, I. Y.; Jeong, T.-S.; Lee, W. S. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2006**, 16, 5580.
- [14] Zhou, T.; Ohkoshi, E.; Bastow, K. F.; Lee, K.-H. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2012**, 22, 3219.
- [15] Masand, V. H.; Mahajan, D. T.; Patil, K. N.; Chinchkhede, K. D.; Jawarkar, R. D.; Hadda, T. B.; Alafeefy, A. A.; Shibi, I. G. *Med Chem. Res.* **2012**, 21, 4523.
- [16] Ichikib, H.; Okadab, M.; Ishidac, T.; Tanigawaa, K. *Phytomedicine* **2001**, 8, 85.
- [17] Zhang, X.-J.; Li, X.; Sun, H.-P.; Wang, X.-J.; Zhao, L.; Gao, Y.; Liu, X.-R.; Zhang, S.-L.; Wang, Y.-Y.; Yang, Y.-R.; Zeng, S.; Guo,

- Q.-L.; You, Q.-D. *J. Med. Chem.* **2013**, *56*, 276.
- [18] Azevedo, C. M. G.; Afonso, C. M. M.; Sousa, D.; Lima, R. T.; Vasconcelos, M. H.; Pedro, M.; Barbosa, J.; Corrêa, A. G.; Reis, S.; Pinto, M. M. M. *Bioorg. Med. Chem.* **2013**, *21*, 2941.
- [19] Peres, V.; Nagem, T. J.; De Oliveira, F. F. *Phytochemistry* **2000**, *55*, 683.
- [20] Zou, H.; Koh, J.-J.; Li, J.-G.; Qiu, S.-X.; Aung, T. T.; Lin, H.-F.; Lakshminarayanan, R.; Dai, X.-P.; Tang, C.; Lim, F. H.; Zhou, L.; Tan, A. L.; Verma, C.; Tan, D. T. H.; Chan, H. S. O.; Saraswathi, P.; Cao, P.; Liu, S.-P.; Beuerman, R. W. *J. Med. Chem.* **2013**, *56*, 2359.
- [21] Akrawi, O. A.; Mohammed, H. H.; Patonay, T.; Villinger, A.; Langer, P. *Tetrahedron* **2012**, *68*, 6298.
- [22] Zou, Y.; Zhao, Q.-J.; Hu, H.-G.; Yu, S.-C.; Xu, M.-J.; Wu, Q.-Y. *Arch. Pharm. Res.* **2012**, *35*, 2093.
- [23] Hu, L.-H.; Qin, Z.-L. *Chin. J. Synth. Chem.* **2002**, *10*, 285 (in Chinese).
(胡利红, 覃章兰, 合成化学, **2002**, *10*, 285.)
- [24] Eaton, P. E.; Carlson, G. R.; Lee, J. T. *J. Org. Chem.* **1973**, *38*, 4071.
- [25] Mehta, G.; Shah, S. R.; Venkataswarlu, Y. *Tetrahedron* **1994**, *50*, 11729.
- [26] Horne, S.; Rodrigo, R. *J. Org. Chem.* **1990**, *55*, 4520.
- [27] Alix, J.; Jiang, H. Wardlaq, J. H. *Aust. J. Chem.* **1990**, *43*, 1745.
- [28] Yen, C.-T.; Nakagawa-Goto, K.; Hwang, T.-L.; Morris-Natschke, S. L.; Bastow, K. F.; Wu, Y.-C.; Lee, K.-H. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2012**, *22*, 4018.
- [29] Lin, C.-N.; Chung, M.-I.; Liou, S.-J.; Lee, T.-H.; Wang, J.-P. *J. Pharm. Pharmacol.* **1996**, *48*, 532.
- [30] Ando, H.; Hirai, H.; Fujii, M.; Hori, Y.; Fukumura, M.; Niiho, Y.; Nakajima, Y.; Shibata, T.; Toriizuka, K.; Ida, Y. *J. Nat. Med.* **2007**, *61*, 269.
- [31] Das, A.; Shaikh, M. M.; Jana, S. *Med. Chem. Res.* **2013**, *1*.
- [32] Zhou, T.; Shi, Q.; Chen, C.-H.; Huang, L.; Ho, P.; Morris-Natschke, L. S.; Lee, K.-H. *Eur. J. Med. Chem.* **2012**, *47*, 86.
- [33] Pillai, R. K. M.; Naiksatam, P.; Johnson, F.; Rajagopalan, R.; Watts, P. C.; Cricchio, R.; Borras, S. *J. Org. Chem.* **1986**, *51*, 717.
- [34] Markham, K. R. *Tetrahedron* **1965**, *21*, 1449.
- [35] Cho, H.-J.; Jung, M.-J.; Woo, S.; Kim, J.; Lee, E.-S.; Na, Y. *Bioorg. Med. Chem.* **2010**, *18*, 1010.
- [36] Song, R.; Wei, R.-B. *Food Res. Dev.* **2007**, *28*, 25 (in Chinese).
(宋茹, 韦荣编, 食品研究与开发, **2007**, *28*, 25.)

(Li, L.; Fan, Y.)