海南染木树叶中的蒽醌成分研究

王 燕 陈文豪 陈光英* 宋小平 张大帅
傅 波 陈 怡

(海南师范大学化学与化工学院 热带药用植物化学教育部重点实验室 海口 571158)

摘要 从海南染木树叶乙醇提取物的乙酸乙酯萃取部位分离得到 9 个蒽醌类化合物, 采用高分辨质谱、一维和二维核磁共振等现代波谱技术, 鉴定上述化合物的结构分别为: 7-羟基-1,2-二甲氧基-6-甲基-9,10-蒽醌(1), 1-羟基-3,6-二甲氧基-9,10-蒽醌(2), 10,10'-二蒽酮(3), 9,10-蒽醌(4), 甲基异茜草素(5), 虎刺醇(6), 2-羟基-3-甲基-9,10-蒽醌(7), 3-羟基-1,2-二甲氧基-9,10-蒽醌(8)和 3-羟基-1-甲氧基-2-甲酯基-9,10-蒽醌(9)。其中化合物 1 和 2 为新天然产物, 且化合物 1 的波谱数据迄今未见任何报道。除化合物 9 外, 其余化合物均为首次从该属植物中分离得到。抗菌活性测试显示, 化合物 2 和 9 对多种菌株具有很好的抑制作用, 尤其是金黄色葡萄球菌, 最小抑菌浓度(MIC)值均达到 0.078 $\mu\text{g/mL}$; 化合物 1 和 6 对枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌显示出与阳性对照环丙沙星相当或者更强的抑制活性。

关键词 海南染木树; 化学成分; 蒽醌类化合物; 抗菌活性

Anthraquinones from the Leaves of *Saprosma hainanense*

Wang, Yan Chen, Wenhao Chen, Guangying* Song, Xiaoping
Zhang, Dashuai Fu, Bo Chen, Yi

(Key Laboratory of Tropical Medicinal Plant Chemistry of Ministry of Education, College of Chemistry and Chemical Engineering, Hainan Normal University, Haikou 571158)

Abstract Nine anthraquinones were isolated from the leaves of *Saprosma hainanense*. On the basis of spectroscopic data analyses (HRESIMS, 1D- and 2D-NMR) and that reported in the literature, The structures were established as 7-hydroxy-1,2-dimethoxy-6-methylanthraquinone (1), 1-hydroxy-3,6-dimethoxyanthraquinone (2), 10,10'-bianthrone (3), 9,10-anthraquinone (4), rubiadin (5), ramnacanthol (6), 2-hydroxy-3-methyl-9,10-anthraquinone (7), 3-hydroxy-1,2-dimethoxyanthraquinone (8) and 3-hydroxy-1-methoxy-2-carbomethoxy-9,10-anthraquinone (9). Among them, compounds 1 and 2 were new natural products, and 1 has no spectroscopic data reported until now. All compounds except 9 were isolated from this genus for the first time. Compounds 2 and 9 showed stronger inhibitory activities to the most of the bacteria, especially to the *Staphylococcus aureus*, with the minimum inhibitory concentration (MIC) values of 0.087 $\mu\text{g/mL}$. Compounds 1 and 6 exhibited the higher inhibitory activities against *Bacillus subtilis* and *Staphylococcus aureus* than positive control ciprofloxacin.

Keywords *Saprosma hainanense*; chemical constituents; anthraquinones; antibacterial activity

茜草科(Rubiaceae)染木树属(*Saprosma*)植物, 全世界共有 50 多种, 主要分布在亚洲地区。中国有五种, 主要产在海南和云南两省。海南染木树(*S. hainanense*)为我国特有种, 仅产海南。在马来西亚, 染木树属植物作为传统药物用于退热消炎, 而由染木树等 6 种植物为主要成分的抗癌药物安克素胶囊, 对多种肿瘤细胞具有直接杀灭作用, 同时具有镇痛、健胃、消炎和止血的功效^[1,2]。但有关本属植物的化学成分研究报道较少, 近年来仅 Ling^[3,4], Singh^[5]等分别从 *S. scortechinii*, *S. fragrans* 中得到环烯醚萜苷类和具有抗真菌活性的蒽醌类化合物。本课题组^[6]从海南染木树茎中首次分离得到 7 个具有一定抗肿瘤活性的生物碱。为了进一步探索海南染木树不同植株部位成分间差异, 我们从其叶乙醇提取物的乙酸乙酯萃取部位分离得到 9 个蒽醌类化合物, 鉴定结

效^[1,2]。但有关本属植物的化学成分研究报道较少, 近年来仅 Ling^[3,4], Singh^[5]等分别从 *S. scortechinii*, *S. fragrans* 中得到环烯醚萜苷类和具有抗真菌活性的蒽醌类化合物。本课题组^[6]从海南染木树茎中首次分离得到 7 个具有一定抗肿瘤活性的生物碱。为了进一步探索海南染木树不同植株部位成分间差异, 我们从其叶乙醇提取物的乙酸乙酯萃取部位分离得到 9 个蒽醌类化合物, 鉴定结

* E-mail: chgying123@163.com

Received October 14, 2013; revised November 13, 2013; published online November 21, 2013.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21162009, 31360069), the 973 Research Program of the Ministry of Science and Technology of China (No. 2011CB512010), and the National Undergraduate Innovation Training Programs (No. 201311658019).

国家自然科学基金(Nos. 21162009, 31360069)、973 计划前期研究专项课题(No. 2011CB512010)、国家级大学生创新训练(No. 201311658019)资助项目。

构为 7-羟基-1,2-二甲氧基-6-甲基-9,10-蒽醌(**1**), 1-羟基-3,6-二甲氧基-9,10-蒽醌(**2**), 10,10'-二蒽醌(**3**), 9,10-蒽醌(**4**), 甲基异茜草素(**5**), 虎刺醇(**6**), 2-羟基-3-甲基-9,10-蒽醌(**7**), 3-羟基-1,2-二甲氧基-9,10-蒽醌(**8**)和 3-羟基-1-甲氧基-2-甲酯基-9,10-蒽醌(**9**). 其中化合物 **1**, **2** 为新的天然产物, 且化合物 **1** 迄今未见任何波谱数据报道. 除化合物 **9** 外, 其余化合物均为首次从该属植物中分离得到. 抗菌实验显示, 化合物 **2** 和 **9** 对多种菌株具有很好的抑制作用, 尤其是金黄色葡萄球菌, 最小抑菌浓度 (MIC) 值均达到 0.078 $\mu\text{g/mL}$; 化合物 **1** 和 **6** 对枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌显示出与阳性对照环丙沙星相当或者更强的抑制活性.

图 1 化合物 1~9 的结构
Figure 1 Structures of compounds 1~9

1 结果与讨论

化合物 **1** 为黄色无定形粉末, 微溶于甲醇, 易溶于 DMSO, 其 HR-ESIMS 显示该化合物分子式为 $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}_5$ (m/z 299.0915 $[\text{M}+\text{H}]^+$, calcd for 299.0914), 显示有 11 个不饱和度. IR 显示分子中存在 3424, 1649, 1600 和 1559 (苯环) cm^{-1} . ^1H NMR 谱高场区显示 1 个芳香甲基 [δ_{H} 2.27 (s, 3H)]; 2 个甲氧基 [δ_{H} 3.81 (s, 3H) 和 3.94 (s, 3H)] 质子信号, 在低场区给出 1 个活泼氢 [δ_{H} 10.99 (s, OH)], 另外还有 4 个芳香氢 [δ_{H} 7.89 (s, H-5), 7.48 (s, H-8), 7.52 (s, $J=8.4$ Hz, H-3) 和 7.99 (s, $J=8.4$ Hz, H-4)]. ^{13}C NMR 谱显示化合物 **1** 中含有 17 个碳信号,

结合 DEPT 谱分析, 其中包括 2 个酮羰基碳 (δ_{C} 180.5, 182.2), 3 个连氧碳 [δ_{C} 148.6 (C-1), 158.3 (C-2) 和 161.1 (C-7)], 2 个甲氧基碳 [δ_{C} 56.3 (C-11), 60.5 (C-12)], 1 个甲基碳 [δ_{C} 16.4 (C-6)]. 根据 ^1H 和 ^{13}C NMR 谱数据 (表 1), 推测化合物 **1** 为蒽醌类化合物, 且连有 4 个取代基 (1 个甲基、1 个羟基和 2 个甲氧基). 结合 HMBC 谱 (图 2) 可知: H_3 -12 与 C-1 相关, H_3 -11 与 C-2 相关, 确定两个甲氧基分别连接在 C-1, C-2 上; H_3 -13 与 C-5, C-7 相关, 确定甲基连在 C-6 上; H-5 与 C-13, C-7, C-8a, C-10 相关; H-8 与 C-6, C-7, C-10a, C-8a, C-9 相关; H-3 与 C-1, C-4a 相关; H-4 与 C-2, C-10, C-4a 相关. 可以推断该化合物 **1** 为 7-羟基-1,2-二甲氧基-6-甲基蒽醌. 美国化学文摘 SciFinder 检索发现该化合物仅在 1925 年由 Jacobson 等^[7]进行过全合成, 但迄今未见该化合物的任何波谱数据方面的报道. 利用现代 2D 核磁共振技术, 我们完成该化合物谱图数据的归属.

图 2 化合物 **1** 的 ^1H - ^1H COSY (——) 相关和主要的 HMBC (→) 相关

Figure 2 ^1H - ^1H COSY (——) and key HMBC (→) correlations for compound **1**

化合物 **2** 为黄色无定形粉末, 易溶于 DMSO, 由 HR-ESIMS 推断其分子式为 $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{O}_5$ (m/z : 285.0755 $[\text{M}+\text{H}]^+$, calcd 285.0758), 不饱和度为 11. IR 显示分子中存在羟基 (3430 cm^{-1}) 和羰基 (1649 cm^{-1}). ^1H NMR 谱显示 5 个芳香质子氢 [δ_{H} 7.33 (d, $J=8.6$ Hz, 1H), 8.06 (d, $J=8.6$ Hz, 1H), 6.82 (brs, 1H), 7.21 (brs, 1H), 7.52 (brs, 1H)], 1 个缔合氢 δ_{H} 11.05 (s, 1H), 2 个甲氧基 [δ_{H} 3.89 (s, 3H), 3.94 (s, 3H)], 文献[8]检索发现, 化合物 **2** 的 ^1H NMR 谱与 1987 年 Masatomo 首次全合成得到的化合物 1-羟基-3,6-二甲氧基-9,10-蒽醌报道数据一致, 但作为合成产物, 至今未见该化合物的碳谱数据报道. 结合 ^1H - ^1H COSY, HMQC 和 HMBC 相关谱数据 (图 3), 我们对化合物 **2** 的碳谱进行了归属 (表 1), 进一步确定该化合物为 1-羟基-3,6-二甲氧基-9,10-蒽醌.

化合物 **3**~**9** 为已知化合物, 经波谱分析及文献对照, 分别鉴定为 10,10'-二蒽醌(**3**)^[9], 9,10-蒽醌(**4**)^[10], 甲基异茜草素(**5**)^[11], 虎刺醇(**6**)^[12], 2-羟基-3-甲基-9,10-蒽醌(**7**)^[11], 3-羟基-1,2-二甲氧基-9,10-蒽醌(**8**)^[13] 和 3-羟基-1-甲氧基-2-甲酯基-9,10-蒽醌(**9**)^[14].

采用微量稀释法对化合物进行 7 种供试细菌的抑制活性测试, 结果显示: 化合物 **2**, **9** 对多种细菌具有较好

图3 化合物2的 ^1H - ^1H COSY(——)相关和主要的 HMBC (---)相关

Figure 3 ^1H - ^1H COSY(——) and key HMBC (---) correlations for compound 2

表1 化合物1和2的NMR数据(DMSO- d_6)
Table 1 NMR data of compounds 1 and 2 (DMSO- d_6)

Position	1		2	
	δ_{H} (J in Hz)	δ_{C}	δ_{H} (J in Hz)	δ_{C}
1	—	148.6 s	—	164.2 s
2	—	158.3 s	6.82 (brs)	104.6 d
3	7.52 (d, 8.4)	116.9 d	—	162.8 s
4	7.99 (d, 8.4)	119.9 d	7.21 (brs)	106.2 d
4a	—	126.4 s	—	137.0 s
5	7.89 (s)	129.2 d	7.52 (brs)	110.2 d
6	—	131.3 s	—	163.7 s
7	—	161.1 s	7.33 (d, 8.6)	119.3 d
8	7.48 (s)	111.2 d	8.06 (d, 8.6)	128.9 d
8a	—	134.8 s	—	125.3 s
9	—	182.2 s	—	181.5 s
9a	—	126.8 s	—	113.8 s
10	—	180.5 s	—	179.1 s
10a	—	124.3 s	—	136.9 s
OH	10.99 (s)	—	11.05 (s)	—
11	3.94 (s)	56.3 q	3.89 (s)	56.2 q
12	3.81 (s)	60.5 q	3.94 (s)	55.9 q
13	2.27 (s)	16.4 q	—	—

的生长抑制作用,尤其是金黄色葡萄球菌, MIC 值均达到 0.078 $\mu\text{g/mL}$; 化合物 1, 6 对枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌显示出与阳性对照环丙沙星相当或者更强的抑制活性(表2)。

2 实验部分

2.1 仪器、材料与试剂

Bruker AV-400 MHz 型核磁共振仪; Thermo Nicolet

表2 化合物抑菌活性测试结果

Table 2 The antibacterial activity test results of compounds

化合物	最小抑菌浓度 MIC/($\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)						
	<i>S. aureus</i>	<i>B. subtilis</i>	<i>E. coli</i>	<i>M. luteus</i>	<i>M. tetragenus</i>	<i>S. albus</i>	<i>B. cereus</i>
1	0.156	0.625	>10	>10	>10	>10	>10
2	0.078	5	>10	2.5	>10	10	0.625
9	0.078	0.313	5	0.313	>10	1.25	0.313
6	0.078	0.313	>10	>10	>10	>10	>10
CPFX ^a	0.156	0.625	0.313	0.156	0.313	0.625	0.313

^a 阳性对照: 环丙沙星。

6700(美国 Nicolet 公司); 葡聚糖凝胶 Sephadex LH-20[安法玛西亚技术(上海)有限公司]; 柱层析硅胶和薄层层析硅胶板(青岛海洋化工厂); 色谱试剂均为分析纯。

供试细菌: 蜡状芽孢杆菌(*Bacillus cereus*)、枯草芽孢杆菌(*Bacillus subtilis*)、大肠杆菌(*Escherichia coli*)、藤黄八叠球菌(*Micrococcus luteus*)、四联球菌(*Micrococcus tetragenus*)、白色葡萄球菌(*Staphylococcus albus*)和金黄色葡萄球菌(*Staphylococcus aureus*)。

海南染木树(*S. hainanense*)叶 2012 年 5 月采自海南昌江县霸王岭自然保护区, 经海南师范大学生命科学学院钟琼芯副教授鉴定, 标本现存于海南师范大学教育部热带药用植物化学重点实验室。

2.2 提取与分离

海南染木树干燥叶 5.0 kg, 粉碎, 85%的乙醇室温浸泡 3 次, 分别为 3, 5, 7 d。浓缩回收乙醇得到总浸膏 0.9 kg。该浸膏用水悬浮, 依次用石油醚、乙酸乙酯萃取, 得到 83.5 g 乙酸乙酯提取物。乙酸乙酯提取物经硅胶柱层析, 用 $V(\text{石油醚}): V(\text{乙酸乙酯})=100:0\sim0:100$ 进行梯度洗脱, 得到 10 个组分(Y1~Y10)。Y3 (6.4 g)用石油醚-乙酸乙酯($V:V=5:1$)过硅胶柱分离得到 7 个亚组分(Y3-1~Y3-7); Y3-2 经硅胶柱层析, 以石油醚-氯仿 $V:V=5:1$ 洗脱得到 Y3-2-1~Y3-2-4; Y3-2-1 进行制备薄层层析, 展开剂为石油醚-乙酸乙酯($V:V=5:1$)得到化合物 2 (4.5 mg)和 5 (6.5 mg); Y3-3 经反复硅胶柱层析及凝胶柱色谱[Sephadex LH-20, CHCl_3 -MeOH $V:V=1:1$]纯化得到化合物 7 (4.7 mg), 8 (5.5 mg)和 9 (5.2 mg)。Y4 (4.2 g)用石油醚-乙酸乙酯($V:V=3:1$)过硅胶柱分离得到 5 个亚组分(Y4-1~Y4-5); Y4-2 经硅胶柱层析, 以石油醚-氯仿($V:V=3:1$)洗脱得到 Y4-2-1~Y4-2-5。Y4-2-3 制备薄层层析, 展开剂为石油醚-氯仿($V:V=3:1$)得到化合物 1 (5.8 mg)和 4 (5.4 mg) Y4-2-4 经反复硅胶柱层析及凝胶柱色谱[Sephadex LH-20, CHCl_3 -MeOH ($V:V=1:1$)]纯化得到化合物 3 (5.7 mg)和 6 (4.5 mg)。

2.3 活性测试

采用微量稀释法,测定微生物的最小抑菌浓度(MIC).应用营养肉汤培养,先将样品用DMSO配制成1mg/mL,放置在灭菌的小离心管中.将液体培养的细菌菌种用培养液进行稀释,稀释度为1:1000.用无菌的移液器将稀释的液体菌种198 μ L加入到2 μ L各种样品溶液中,每个样品设两个平行孔,震荡混合后37 $^{\circ}$ C培养24 h,用酶标仪630 nm测吸光度进行粗筛.将粗筛效果好的样品溶液在96孔微量稀释板^[3]作二倍递减浓度稀释,分装于微量稀释板孔内或用微量加液器直接在稀释板孔内作二倍稀释,然后接种稀释菌液,其中留一列孔作为药液对照,另一孔仅加培养基和菌液作为菌对照,试验完毕后,用微量搅拌器震荡混匀后,置37 $^{\circ}$ C温培养24 h,用酶标仪630 nm测吸光度.能抑制试验菌生长的最低浓度,即为该微生物的最小抑菌浓度.

辅助材料(Supporting Information) 新天然产物化合物1和2的图谱.这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] Wang, Q.; Lin, H. W.; Shen, Y.; Jin, C. Y.; Guo, C. *Lishizhen Med. Mater. Med. Res.* **2000**, 9, 793 (in Chinese).
(王青, 林厚文, 沈阳, 金翠英, 郭澄, 时珍国医国药, **2000**, 9, 793.)
- [2] Wang, Q.; Jin, C. Y.; Lin, H. W.; Shen, Y. *Chin. Med. Mater.* **2000**, 23, 634 (in Chinese).
(王青, 金翠英, 林厚文, 沈阳, 中药材, **2000**, 23, 634.)
- [3] Ling, S. K.; Komorita, A.; Tanaka, T.; Fujioka, T.; Mihashi, K.; Kouno, I. *J. Nat. Prod.* **2002**, 65, 656.
- [4] Ling, S. K.; Komorita, A.; Tanaka, T.; Mihashi, K.; Kouno, I. *Chem. Pharm. Bull.* **2002**, 50, 1035.
- [5] Singh, D. N.; Verma, N.; Raghuwanshi, S.; Shukla, P. K.; Kulshreshtha, D. K. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2006**, 16, 4512.
- [6] Wang, L.; Chen, G. Y.; Han, R.; Yuan, Y.; Yang, B.; Zhang, Y.; Wang, J.; Zhong, X. Q.; Huang, X. *Chem. Pharm. Bull.* **2011**, 47(3), 338.
- [7] Jacobson, R. A.; Roger, A. *Opianic Acid Phenols* **1925**, 47, 2011.
- [8] Iwao, M.; Kuraishin, T. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **1987**, 60, 4051.
- [9] Huang, N. Z.; Lakshmikantham, M. V.; Cava, M. P. *J. Org. Chem.* **1987**, 52(2), 169.
- [10] Mohanlall, V.; Odhav, B. *J. Med. Plants Res.* **2013**, 7(14), 877.
- [11] Zhao, F.; Wang, S. J.; Wu, X. L.; Yu, Y.; Yue, Z. G.; Liu, B.; Lin, S.; Zhu, C. G.; Yang, Y. C.; Shi, J. G. *China J. Chin. Mater. Med.* **2011**, 36(21), 2980 (in Chinese).
(赵峰, 王素娟, 吴秀丽, 于洋, 岳正刚, 刘波, 林生, 朱承根, 杨永春, 石建功, 中国中药杂志, **2011**, 36(21), 2980.)
- [12] Kamiya, K.; Hamabe, W.; Tokuyama, S.; Hirano, K.; Satake, T.; Yonezawa, Y. K.; Yoshida, H.; Mizushima, Y. *Food Chem.* **2010**, 118, 725.
- [13] Zhang, H. L.; Zhang, Q. W.; Zhang, X. Q.; Ye, W. C.; Wang, Y. T. *Chin. J. Nat. Med.* **2010**, 8(3), 1 (in Chinese).
(张海龙, 张庆文, 张晓琦, 叶文才, 王一涛, 中国天然药物, **2010**, 8(3), 1.)
- [14] Ling, S. K.; Akiko, K.; Takashi, T.; Fujioka, T.; Mihashi, K.; Kouno, I. *Chem. Pharm. Bull.* **2002**, 50(8), 1035.
- (Li, L.; Fan, Y.)