三芳基甲烷类化合物合成方法的研究进展

李中贤^{*a} 王俊伟^a 赵俊宏^b 赵灿方^c 刘小培^a 余学军^a^(a) 河南省科学院高新技术研究中心 郑州 450002)^(b) 河南省科学院化学研究所 郑州 450002)^(c) 郑州铁路疾病预防控制中心 郑州 450015)

摘要 三芳基甲烷类化合物在材料、药物、染料、基团保护等领域有着重要的用途, 三芳基甲烷类化合物的合成方法是近年来有机化学中研究的热点之一. 结合作者和国内外学者对这方面的相关研究, 综述了三芳基甲烷类化合物的合成方法研究, 并对三芳基甲烷类化合物合成方法的发展进行探讨.

关键词 三芳基甲烷; 傅克反应; 偶联反应; 缩合反应

Advanced in the Synthesis of Triarylmethanes

Li, Zhongxian^{*a} Wang, Junwei^a Zhao, Junhong^b Zhao, Canfang^c
Liu, Xiaopei^a Yu, Xuejun^a^(a) High & New Technology Research Center, Henan Academy of Sciences, Zhengzhou 450002)^(b) Institute of Chemistry, Henan Academy of Sciences, Zhengzhou 450002)^(c) Zhengzhou Railway Center for Disease Control and Prevention, Zhengzhou 450015)

Abstract Triarylmethanes (TRAMs) constitute an important class of compounds that are ubiquitous in material, medicals, and dyes. Numerous methods have been developed for the synthesis of TRAMs. This minireview critically presents the synthesis of TRAMs to encourage further research activities in this promising area of the TRAMs.

Keywords triarylmethane; Friedel-Crafts reaction; coupling reactions; condensation reaction

三芳基甲烷是一种非常有应用价值的基本骨架, 已经广泛应用于光学试剂^[1]、染料^[2]、材料^[3]、基团保护^[4]以及构建树枝状和非线性光学化合物^[5]等. 另外三芳基甲烷也是许多具有生物活性化合物及药物的组成部分, 例如一些三芳基甲烷类化合物已经被报道具有抗氧化、抗病毒、抗肿瘤等活性^[6].

随着三芳基甲烷类化合物多种用途的不断发现及应用范围的不断拓展, 其合成方法已经引起了国内外有机合成研究人员的高度重视. 本文结合作者和国内外学者对这方面的相关研究, 对三芳基甲烷类化合物的合成方法进行综述, 主要分以下几种合成方法: (1)通过Friedel-Crafts 烷基化反应合成三芳基甲烷类化合物; (2)通过偶联反应获得三芳基甲烷类化合物; (3)经还原反应合成三芳基甲烷类化合物; (4)其他方法.

1 Friedel-Crafts 烷基化法

Friedel-Crafts 烷基化法是合成三芳基甲烷类化合物的一种常用方法, 近年来这方面的报道也非常多, 特别是催化剂的选择已经非常广泛, 形式也多种多样.

一般的Friedel-Crafts 烷基化法通过二苯基甲醇(酯、醚、亚胺等等)直接与芳烃发生反应合成三芳基甲烷, 报道用到的催化剂包括 Bi^[7], Pd^[8], Au^[9], Mo^[10], Pt^[11]等贵金属的金属盐和便宜的三氯化铁^[12], 以及碘^[13]和一些 Brønsted 酸^[14]等. 反应简单是这种方法的优点, 但是需要首先获得二苯基甲醇(酯、醚、亚胺等等)原料 (Scheme 1).

例如, 早在 1964 年, Werbel 等^[15]报道了一种便捷的方法来合成三芳基甲烷化合物, 该方法先通过二芳基酮的催化氢化获得二芳基甲醇, 再将加入芳胺用盐酸处理

* E-mail: lxnew337@126.com

Received October 22, 2013; revised December 3; published online December 6, 2013.

Project supported by the China Postdoctoral Science Foundation (No. 2013M541979).

中国博士后基金(No. 2013M541979)资助项目.

Scheme 1

制得(Scheme 2). 显然这种方法对底物的适用范围不大.

Scheme 2

Katritzky 研究小组^[2]通过用格式试剂与苯甲醛反应合成了二芳基甲醇, 然后加入富电子芳烃在盐酸条件下制备三芳基甲烷类化合物(Scheme 3).

Scheme 3

同时他们还报道了用苯并三唑作为离去基团使二苯基甲烷正离子与富电子芳烃发生 Friedel-Crafts 烷基化反应(Scheme 4)^[16], 随后他们又报道了氯化锌存在下带氨基甲酸酯的苯并三唑衍生物和富电子芳环反应合成三芳基甲烷类化合物(Scheme 5)^[17].

Panda 研究小组^[18]近期报道了一种有效的通过芳香族亲核体与杂芳烃甲醇的 Friedel-Crafts 型反应来合成不对称的三芳基甲烷的方法(Scheme 6). 反应也需要用到格式试剂以及大量的酸和金属盐.

此外, Ballaster 等^[19]报道了利用一种简单的、直接

Scheme 4

Scheme 5

Scheme 6

的、高产率的 Friedel-Crafts 型反应, 来合成高度氯化的单芳基、二芳基与三芳基甲烷(Eq. 1). 该方法研究了在 70~150 °C 范围内, 使用三氯化铝的条件下, 氯仿与氯代苯之间的缩合反应. 并且在实验过程中观察到使

用不同用量的氯代苯, 产物的产率有所不同.

在酸催化作用下, 高氟代化合物流体中二芳基甲醇先与苯并三唑反应, 随后再与硝基苯作用. 二芳基甲基苯并三唑在强碱作用下是高度活性的亲核体, 因此能有效的与缺电子芳烃反应(Scheme 7)^[20]. 这也是很少的缺电子芳烃直接参与反应的例子之一. 这种化合物因硝基基团的易还原为氨基, 所以具有广泛的实用性, 从而得到广泛的关注.

Scheme 7

Shi 等^[21]报道了三氯化铁催化经二芳基醚的 C—O 活化的 Friedel-Craft 反应也可以制备三芳基甲烷类化合物, 但首先要获得二芳基甲醚(Eq. 2).

以上几种合成三芳基甲烷化合物的方法在合成一些特殊结构的化合物时有一定的优势, 但是由于有着一些很重要的缺点比如副产物金属盐过多, 使用大量的酸碱等对环境非常不利.

近年来发展了用亚胺类化合物直接与富电子芳烃的 Friedel-Crafts 反应, 例如: Esquivias 等^[22]报道的在 $\text{Cu}(\text{OTf})_2/\text{binap}$ 催化体系作用下, 有效的合成三芳基甲烷的合成方法. 该方法需要先把芳醛制成 *N*-(2-吡啶基)磺酰基亚胺, 然后与芳烃发生 Friedel-Crafts 反应. 这样不但可以制备对称的三芳基甲烷衍生物, 还可以制备不对称的三芳基甲烷. 但是相对来说比较复杂而且需要非常强的富电子芳香体系才可以发生反应(Scheme 8). 2008 年, Tian 等^[23]发现用 $\text{Bi}_2(\text{SO}_4)_3/\text{TMSCl}$ 体系也可以催化这类反应, 他们只获得了对称的三芳基甲烷衍生物. Wu 课题组^[24]也报道了类似的三氯化铁催化亚胺与富电子芳烃反应合成三芳基甲烷类化合物, 特别的是发

Scheme 8

现了芳基取代的环己胺也可以在三氯化铁催化下与富电子芳烃发生反应, 提供了一种 β -芳基胺的简单合成方法. 2010 年, Kim 课题组^[25]也报道了水合三氯化铁催化合成对称及不对称的三芳基甲烷类化合物, 反应底物类似, 并推测了反应的机理(Scheme 9).

2009 年, 游书力课题组^[26]也报道了一种 Brønsted acids 催化的不对称三芳基甲烷类化合物的合成方法, 主要是 *N*-磺酰基亚胺与吡啶或 *N*-甲基吡啶的反应. 随后他们又通过手性 Brønsted acids 催化, 完成了手性三芳基甲烷类化合物的合成研究(Eq. 3).

2013 年 Paresh 等^[27]报道了 Ir-Sn 配合物催化的 Friedel-Crafts 反应(Scheme 10), 通过 *N*-磺酰基取代的亚胺与富电子芳烃反应高产率的合成了三芳基甲烷. 不对称的三芳基甲烷同样可以通过二芳基甲胺与芳烃的反应在此催化剂催化下获得.

这些方法反应条件相对比较温和, 而且金属催化剂用量很小对环境污染不大, 缺点就是用的催化剂都比较昂贵.

通过催化缩合反应获得三芳基甲烷类化合物是近些年研究较多的方法, 也可归属于 Friedel-Crafts 反应. 其中最著名的合成三芳基甲烷的方法是 Baeyer 缩合反应, 该方法就用芳香醛直接与 *N,N*-二甲基苯胺发生缩合反应获得三芳基甲烷. 其中有代表性的是: (1) Khosropour 研究小组^[28]报道的在无溶剂条件下, 由微波辐射辅助, 对甲苯磺酸催化的快速与便捷的 Baeyer 缩合反应(Eq. 14 Condition 1). (2) Paul 研究小组^[29]报道的在三氯化铝离子液体中的 Baeyer 缩合反应(Eq. 4, Condition 2). 最近, Pasha 报道的一种简单高效的 Baeyer 缩合反应是通过超声波条件下取代醛和 *N,N*-二甲基苯胺在 THF 中雾化状的钠存在下实现的, 反应时间只需要 2~5 min, 获得较高的收率(Eq. 4, Condition 3). 这种方法的优势是非常明显的, 不需要苛刻的条件, 但是最大的缺点就是必须使用非常强的富电子芳环(*N,N*-二甲基苯胺)作为底物, 大大的减小了反应的使用范围.

在 Baeyer 缩合反应优点的基础上, Kotsuki 等^[30]报道了苯酚与芳香醛在高压条件下, 由 TfOH 催化缩合高产率的得到三芳基甲烷衍生物. 虽然扩大了底物范围但是需要高压下才能进行.

Scheme 9

Scheme 10

Condition: *p*-TsOH, M. W.; Condition 2: nBPC-AlCl₃;
Condition 3: atomized Na/THF

2006年 Butin 等^[31]报道了2-硝基苯甲醛与取代芳烃在三氯化铝存在下合成三芳基甲烷的反应, 获得的三芳基甲烷类化合物经过还原、异硫氰化、环化可以获得在记忆材料和摄影、激光技术上应用非常广泛的 4*H*-3,1-

苯并噻嗪衍生物(Scheme 11).

Scheme 11

近期报道的有关三芳基及三杂芳基甲烷的合成方法在底物的范围和需要的反应条件方面都有了进步. 其中 Nair 研究小组^[32]报道的在催化量的 AuCl₃/AgOTf 作用下, 用相对供电子能力稍弱的甲氧基取代芳烃与芳醛在温和条件下缩合, 生成了三芳基甲烷类化合物(Eq. 5, Condition 1), 2006 年对该催化剂的反应底物进行了拓展, 对吡啶类化合物与芳醛的反应进行研究, 也得到了非常好的产率^[33]. Roy 研究小组^[34]也报道了类似反应的一种温和而简易的 [Ir(COD)Cl]₂/4SnCl₄ 催化体系, 得到了选择性单一的三芳基甲烷产物(Eq. 5, Condition 2).

苯并氧喹金属酚盐与芳香醛在原料酚盐的间位的选择性缩合反应可以用来合成一种三芳基甲烷衍物——2,2'-二羟基三苯基甲烷(Eq. 6)^[35]. 反应本身比较简单但是大量的金属盐副产物还是让后处理变得困难.

2007 年陆熙炎课题组^[8]报道了钨离子配合物催化

Condition 1: 1 mol% ($\text{AuCl}_3/3\text{AgOTf}$), MeCN, argon, 50 °C, 85%

Condition 2: $[\text{Ir}(\text{COD})\text{Cl}]_2/4\text{SnCl}_4$ (1 mol%); 90 °C, 1.5 h

的一锅煮法芳基硼酸、芳醛和富电子芳烃的加成反应, 获得了较高的收率, 此法可以合成不对称的三芳基甲烷类化合物(Scheme 12).

Scheme 12

在这方面我们也曾经做过研究, 通过在反应体系中加入醋酸酐, 用较为便宜的三氯化铁作为催化剂就可以获得很高的收率, 底物的适用范围更大, 卤素取代的芳烃或芳醛均可参与反应, 获得卤素取代的三芳基甲烷衍生物, 而且可以合成三分子不对称的三芳基甲烷以及杂环取代的三芳基甲烷, 为对三芳基甲烷类化合物进行结构改造打下基础(Scheme 13)^[36].

2008 年, Kodomari 等^[37]报道了硅胶负载的溴化锌

Scheme 13

作为催化剂在乙酰溴存在下芳醛与芳烃的烷基化反应, 方便的合成了三芳基甲烷类化合物以及 9,10-二芳基蒽. 反应过程中首先醛和乙酰溴生成 α -溴代芳基乙酸酯, 然后和芳烃反应获得三芳基甲烷(Scheme 14).

2009 年, Olah 等^[38]发现了水合三氯化硼是催化芳醛和芳烃反应合成三芳基甲烷类化合物的高效催化剂, 反应可以扩展到二取代醛, 获得的二芳基甲基苯甲醛可以用来合成各种有机化合物(Scheme 15). 例如, 其肼的衍生物 **A** 作为电荷转移材料广泛应用于传真机的感光器, 显示较好的特性及耐受性; 化合物 **B** 是黑素皮质素受体的兴奋剂, 对疾病的治疗、控制或抑制显示了高的生物活性. 另外, 该法可以通过一步转化从邻苯二甲醛成功合成了各种各样的蒽的衍生物, 并提出了酸催化醛与芳烃反应以及合成蒽的机理.

2009 年, 刘元红课题组^[39]也报道了三氯化铁催化的供电子芳烃和 2-芳氧基苯甲醛合成多取代氧杂蒽的反应, 这个方法条件温和、选择性高并且原料易得. 经过对机理的研究发现了在反应过程中三芳基甲烷中间体的 C—C 键断裂(Scheme 16).

同年, Jaratjaroonphong 等^[40]报道了分子碘催化的醛与富电子芳烃的缩合反应, 可以合成三芳基甲烷类化合物以及二芳基取代的烷烃, 但是要求芳烃上富电子基团的供电子能力较强才行, 例如羟基或者甲氧基取代的芳

Scheme 14

Scheme 15

Scheme 16

环。随后陆续报道了三(五氟苯基)硼^[41]、二氧化硅负载的硫酸氢钠^[42]、 $\text{H}_3\text{PW}_{12}\text{O}_{40}$ ^[43]、邻苯二磺酰亚胺^[44]等作为催化剂催化类似的反应合成三芳基甲烷类化合物, 其中在反应底物上也有所扩大(Eq. 7).

Cat. I_2 , 三(五氟苯基)硼, $\text{NaHSO}_4/\text{SiO}_2$,
 $\text{H}_3\text{PW}_{12}\text{O}_{40}$, 邻苯二磺酰亚胺

另外, 三(五氟苯基)硼还可以催化活化的芳烃杂芳烃和 α -氨基酮的 Friedel-Crafts 反应合成不对称的三芳

基甲烷类化合物(Scheme 16)^[45]. 这个反应的优点在于催化剂量低, 反应条件温和, 底物应用范围较广以及较高的选择性和收率.

Scheme 16

Reissig 课题组^[46]刚刚发表了三氟甲磺酸催化的 1,2,4-三甲氧基苯和芳醛的 Friedel-Crafts 烷基化反应, 获得较高收率, 但仅仅使用强富电子基的芳烃 1,2,4-三甲氧基苯作为底物(Eq. 8).

(8)

2 偶联反应法

通过偶联反应制备三芳基甲烷类化合物是近年来发展的新方法, 包括格氏试剂参与的偶联反应, 以及催化偶联反应, 选择性好, 实用性强.

Katritzky 研究小组^[47]报道了格氏试剂和二芳基甲基苯并三唑衍生物的偶联反应(Eq. 9), 获得了较高的收率, 并可以制备不对称的三芳基甲烷, 而且选择性较强.

Oshima 等^[48]2007年报道了钯催化的 sp^3 C—H 键的直接芳基化反应, 通过二芳基甲烷与卤代芳烃的偶联反应合成了氮杂芳烃取代的三芳基甲烷类化合物(Eq. 10). 获得的三芳基甲烷类化合物以及他们的次甲基去质子化的阴离子都是潜在的构建超分子结构的前体.

2008 年, Kuwano 等^[49]报道了钯催化的芳基硼酸与羰基二芳基甲酯的 Suzuki-Miyaura 偶联反应制备三芳基甲烷类化合物, 用 1,5-二(二苯基膦)戊烷作为配体(Eq. 11). 该体系可以合成大多数取代基的三芳基甲烷类化合物, 收率较高, 只是反应时间较长, 需要 24 h 以上.

近期发表的论文报道了钯催化的二芳基甲烷的 $C(sp^3)$ —H 芳基化合成三芳基甲烷, 反应中使用了 4,6-二(二苯基膦)吩嗪作为配体, 在室温下反应, 取得了较好的结果, 最高收率达到 99% (Eq. 12)^[50].

Jarvo 等^[51]报道了通过立体定向的交叉偶联反应合成选择性对映体的三芳基甲烷类化合物, 该方法通过 $Ni(cod)_2$ 催化, $dpph$ 作为配体获得了较高的收率及 ee 值. 用该方法他们合成了一种外消旋的三芳基甲烷类化合物, 是药物他莫昔芬的类似物, 被报道具有较高的抗乳腺癌活性(Scheme 17). 随后他们又发现, 通过选择不同的手性配体可以控制反应过程中亲电子碳的手性反转或保持, 并把该方法的范围扩大到苄基三甲基乙酸盐与各种功能基化的苯基硼酸反应^[52].

Scheme 17

最近 Watson 课题组^[53]报道了一种三甲基乙酸钠酯和芳基硼试剂的偶联反应制备手性三芳基甲烷, 该反应应用 $Ni(cod)_2$ 作为催化剂, 甲醇钠作为碱获得了较高的收率和 ee 值(Eq. 13).

北京大学王剑波课题组^[54]也报道了一种新的钯催化偶联反应合成三芳基甲烷, 该方法用 N -tosylhydrazones 作为偶联试剂, 收率高达 95% (Eq. 14).

3 还原法

还原法是较为传统的合成方法, 主要通过三芳基甲醇经还原反应脱去羟基转化成为相应三芳基甲烷类化合物(Scheme 18).

Scheme 18

例如, 通过偏磷酸与碘之间反应生成活性还原剂碘化氢, 在醋酸条件下使三芳基甲醇还原生成三芳基甲烷化合物也是一种合成方法(Eq. 15)^[55], 很显然, 这种方法合成三芳基甲烷类化合物必须先获得相应的三芳基甲醇, 比较复杂.

4 其他方法

2005年 Cannella 等^[56]报道, 对苯甲醛与苯胺混合物进行的烷基自由基加成反应也能形成三芳基甲烷化合物, 但是反应条件比较苛刻, 而且产率不高(Eq. 16).

2009年 Langer 等^[57]报道了三氯化铁催化的苯基化及四氯化钛体系中[3+3]的环化缩合的方法合成功能基化的三芳基甲烷类化合物, 各种各样的功能基化以及较大位阻的三芳基甲烷类化合物被合成, 但是反应需要较低的温度, 而大部分只达到中等偏低的收率(Scheme 19).

最近, Lopez 等^[58]报道了一种锌催化的烯炔酮和醇或唑类化合物反应合成功能化的呋喃和三芳基甲烷(Eq.

Scheme 19

17). 并通过计算方法讨论了反应中锌活化 O—H/N—H 键的机理.

5 结论与展望

综上所述, 三芳基甲烷类化合物的合成方法多种多样, 取得了重大的进展和突破. 偶联反应法选择性好, 应用范围较广, 有很大的应用前景, 而对于手性三芳基甲烷类化合物的合成研究虽有报道, 但是这方面上催化剂及手性配体研究仍需要深入研究; Friedel-Crafts 烷基化反应法近年来发展较快, 底物的适用范围也在逐步扩大, 然而选择性较低; 通过其他的环化等反应合成三芳基甲烷类化合物的方法也在逐渐增多, 但收率都不是太高. 因此通过寻找新的催化剂或者借助先进的合成手段提高三芳基甲烷类化合物合成反应的选择性, 扩大应用范围, 还需进一步的研究.

References

- [1] Irie, M. *J. Am. Chem. Soc.* **1983**, *105*, 2078.
- [2] Muthyala, R.; Katritzky, A. R.; Lan, X. *Dyes Pigm.* **1994**, *25*, 303.
- [3] Hirohiko, H.; Shunpei, T.; Issei, O.; Kazunari, M.; Hidetake, S.; Isao, Y.; Yasushi, M.; Koji, A. *Chem. Eur. J.* **2011**, *17*, 1122.

- [4] Kociński, P. J. *Protecting Groups*, 3rd ed., Georg Thieme, Stuttgart, **2003**.
- [5] (a) Sanguinet, L.; Twieg, R. J.; Wiggers, G.; Mao, G.; Singer, K. D.; Petschek, R. G. *Tetrahedron Lett.* **2005**, *46*, 5121.
(b) Shagufu, S. K. D.; Panda, G. *Tetrahedron Lett.* **2005**, *46*, 3097.
- [6] (a) Poupelin, J. P.; Saint-Ruf, G.; Foussard-Blanpin, O.; Narcisse, G.; Uchida-Ernouf, G.; Lacroix, R. *Eur. J. Med. Chem.* **1978**, *13*, 67.
(b) Yamato, M.; Hashigaki, K.; Yasumoto, Y.; Sakai, J.; Luduena, R. E.; Banerjee, A.; Tsukagoshi, S.; Tashiro, T.; Tsuruo, T. *J. Med. Chem.* **1987**, *30*, 1897.
(c) Sato, T.; Kise, H. *Yukagaku* **1988**, *37*, 166.
(d) Asakura, K.; Matsumura, S.; Yoshikawa, S. *Yukagaku* **1988**, *37*, 265.
(e) Patel, V. F.; Hardin, J. N.; Starling, J. J.; Mastro, J. M. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **1995**, *5*, 507.
(f) Mibu, N.; Sumoto, K. *Chem. Pharm. Bull.* **2000**, *48*, 1810.
(g) McNaughton-Smith, G. A.; Rigdon, G. C.; Stocker, J. *WO 2000050026*, **2000** [*Chem. Abstr.* **2000**, *133*, 187954].
(h) Santhosh, K. C.; Paul, G. C.; De Clercq, E.; Pannecouque, C.; Witvrouw, M.; Loftus, T. L.; Turpin, J. A.; Buckheit, R. W., Jr.; Cushman, M. *J. Med. Chem.* **2001**, *44*, 703.
(i) Sumoto, K.; Mibu, N.; Yokomizo, K.; Uyeda, M. *Chem. Pharm. Bull.* **2002**, *50*, 298.
(j) Finer, J. T.; Chabala, J. C.; Lewis, E. *WO 2002056880*, **2002**, [*Chem. Abstr.* **2002**, *137*, 124985].
(k) Mibu, N.; Yokomizo, K.; Uyeda, M.; Sumoto, K. *Chem. Pharm. Bull.* **2003**, *51*, 1325.
- [7] Rueping, M.; Nachtsheim, B. J.; Ieawsuwan, W. *Adv. Synth. Catal.* **2006**, *348*, 1033.
- [8] Lin, S.; Lu, X. *J. Org. Chem.* **2007**, *72*, 9757.
- [9] Mertins, K.; Iovel, I.; Kischel, J.; Zapf, A.; Beller, M. *Adv. Synth. Catal.* **2006**, *348*, 691.
- [10] Wang, F.; Ueda, W. *Chem. Commun.* **2008**, 3196.
- [11] Mertins, K.; Iovel, I.; Kischel, J.; Zapf, A.; Beller, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2005**, *44*, 238.
- [12] Iovel, I.; Mertins, K.; Kischel, J.; Zapf, A.; Beller, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2005**, *44*, 3913.
- [13] Srihari, P.; Bhunia, D. C.; Sreedhar, P.; Yadav, J. S. *Synlett* **2008**, 1045.
- [14] Shirakawa, S.; Kobayashi, S. *Org. Lett.* **2007**, *9*, 311.
- [15] Werbel, L. M.; Elslager, E. F.; Pearlman, W. M. *J. Org. Chem.* **1964**, *29*, 967.
- [16] Katritzky, A. R.; Gupta, V.; Garot, C.; Stevens, C. V.; Gordeev, M. F. *Heterocycles* **1994**, *38*, 345.
- [17] Katritzky, A. R.; Xie, L.; Fan, W. Q. *J. Org. Chem.* **1993**, *58*, 4376.
- [18] Das, S. K.; Shagufu, Panda, G. *Tetrahedron Lett.* **2005**, *46*, 3097.
- [19] Ballester, M.; Riera, J.; Castaner, J.; Rovira, C.; Annet, O. *Synthesis*, **1986**, 64.
- [20] Katritzky, A. R.; Toader, D. *J. Org. Chem.* **1997**, *62*, 4137.
- [21] Wang, B.-Q.; Xiang, S.-K.; Sun, Z.-P.; Guan, B.-T.; Hu, P.; Zhao, K.-Q.; Shi, Z.-J. *Tetrahedron Lett.* **2008**, *49*, 4310.
- [22] Esquivias, J.; Arrayas, R. G.; Carretero, J. C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2006**, *45*, 629.
- [23] Liu, C.-R.; Li, M.-B.; Yang, C.-F.; Tian, S.-K. *Chem. Commun.* **2008**, 1249.
- [24] Wang, Z.-Y.; Sun, X.-Y.; Wu, J. *Tetrahedron* **2008**, *64*, 5013.
- [25] (a) Thirupathi, P.; Kim, S. S. *Eur. J. Org. Chem.* **2010**, 1798.
(b) Thirupathi, P.; Kim, S. S. *J. Org. Chem.* **2010**, *75*, 5240.
- [26] (a) He, Q.-L.; Sun, F.-L.; Zheng, X.-J.; You, S.-L. *Synlett* **2009**, 1111.
(b) Sun, F.-L.; Zheng, X.-J.; Gu, Q.; He, Q.-L.; You, S.-L. *Eur. J. Org. Chem.* **2010**, 47.
- [27] Paresh, N. C.; Arnab, K. M.; Swapna, S. M.; Sujit, R. *Tetrahedron* **2013**, *69*, 2816.
- [28] Khosropour, A. R.; Esmailpoor, K.; Moradie, A. *J. Iran. Chem. Soc.* **2006**, *3*, 81.
- [29] Paul, A. M.; Khandekar, A. C.; Khadilkar, B. M. *J. Chem. Res., Synop.* **2003**, 168.
- [30] Ohishi, T.; Kojima, T.; Matsuoka, T.; Shiro, M.; Kotsuki, H. *Tetrahedron Lett.* **2001**, *42*, 2493.
- [31] Abaev, V. T.; Tsiunchik, F. A.; Gutnov, A. V.; Butin, A. V. *Tetrahedron Lett.* **2006**, *47*, 4029.
- [32] Nair, V.; Abhilash, K. G.; Vidya, N. *Org. Lett.* **2005**, *7*, 5857.
- [33] Nair, V.; Vidya, N.; Abhilash, K. G. *Synthesis* **2006**, 3647.
- [34] Podder, S.; Choudhury, J.; Roy, U. K.; Roy, S. *J. Org. Chem.* **2007**, *72*, 3100.
- [35] Mibu, N.; Sumoto, K. *Chem. Pharm. Bull.* **2000**, *48*, 1810.
- [36] (a) Li, Z.; Duan, Z.; Kang, J.; Wang, H.; Yu, L.; Wu, Y. *Tetrahedron* **2008**, *64*, 1924.
(b) Li, Z.; Duan, Z.; Wu, Y. *Chin. Chem. Lett.* **2009**, *20*, 511.
(c) Li, Z.; Zhao, C.; Liu, X.; Xu, D.; Yu, X. *Henan Sci.* **2011**, *29*(2), 145 (in Chinese).
(李中贤, 赵灿方, 刘小培, 徐丹, 余学军, 河南科学, **2011**, *29*(2), 145.)
- [37] Kodomari, M.; Nagamatsu, M.; Akaike, M.; Aoyama, T. *Tetrahedron Lett.* **2008**, *49*, 2537.
- [38] Prakash, G. K. S.; Panja, C.; Shakhmin, A.; Shah, E.; Mathew, T.; Olah, G. A. *J. Org. Chem.* **2009**, *74*, 8659.
- [39] Li, H.; Yang, J.; Liu, Y.; Li, Y. *J. Org. Chem.* **2009**, *74*, 6797.
- [40] Jaratjaroonphong, J.; Sathalalai, S.; Techasavapak, P.; Reutrakul, V. *Tetrahedron Lett.* **2009**, *50*, 6012.
- [41] Chandrasekhar, S.; Khatun, S.; Rajesh, G.; Raji Reddy, C. *Tetrahedron Lett.* **2009**, *50*, 6693.
- [42] Leng, Y.; Chen, F.; Zuo, L.; Duan, W. *Tetrahedron Lett.* **2010**, *51*, 2370.
- [43] Mohammadpoor-Baltork, I.; Moghadam, M.; Tangestaninejad, S.; Mirkhani, V.; Mohammadiannejad-Abbasabadi, K.; Khavasi, H. R. *Eur. J. Org. Chem.* **2011**, 1357.
- [44] Barbero, M.; Cadamuro, S.; Dughera, S.; Magistris, C.; Venturello, P. *Org. Biomol. Chem.* **2011**, *9*, 8393.
- [45] Thirupathi, P.; Neupane, L. N.; Lee, K. H. *Tetrahedron* **2011**, *67*, 7301.
- [46] Wilsdorf, M.; Lechnitz, D.; Reissig, H.-U. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 2494.
- [47] Muthyala, R.; Katritzky, A. R.; Lan, X. *Dyes Pigm.* **1994**, *25*, 303.
- [48] Niwa, T.; Yorimitsu, H.; Oshima, K. *Org. Lett.* **2007**, *9*, 2373.
- [49] Yu, J.-Y.; Kuwano, R. *Org. Lett.* **2008**, *10*, 973.
- [50] (a) Bellomo, A.; Zhang, J.; Trongsirivat, N.; Walsh, P. J. *Chem. Sci.* **2013**, *4*, 849.
(b) Zhang, J.; Bellomo, A.; Creamer, A. D.; Dreher, S. D.; Walsh, P. J. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 13765.
- [51] Taylor, B. L. H.; Harris, M. R.; Jarvo, E. R. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 7790.
- [52] Harris, M. R.; Hanna, L. E.; Greene, M. A.; Moore, C. E.; Jarvo, E. R. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 3303.
- [53] Zhou, Q.; Srinivas, H. D.; Dasgupta, S.; Watson, M. P. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 3307.
- [54] Xia, Y.; Hu, F.; Liu, Z.; Qu, P.; Ge, R.; Ma, C.; Zhang, Y.; Wang, J. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 1784.
- [55] Gordon, P. E.; Fry, A. J. *Tetrahedron Lett.* **2001**, *42*, 831.
- [56] Cannella, R.; Clerici, A.; Pastori, N.; Regolini, E.; Porta, O. *Org. Lett.* **2005**, *7*, 645.
- [57] (a) Ahmad, R.; Riahi, A.; Langer, P. *Tetrahedron Lett.* **2009**, *50*,

1490.

(b) Ahmad Khera, R.; Ullah, I.; Ahmad, R.; Riahi, A.; Hung, N. T.; Sher, M.; Villinger, A.; Fischer, C.; Langer, P. *Tetrahedron* **2010**,

66, 1643.

[58] Gonzalez, J.; Gonzalez, J.; Perez-Calleja, C.; Lopez, L. A.; Vicente, R. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, 52, 5853.

(Lu, Y.)