方便、有效的方法合成 2-氨基-1,3-二氰基-4-芳基-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯衍生物

谢瑞伦^a 宗志敏^{*,a} 魏贤勇^a 高亚年^b 陈明^b 荣良策^{*,b}^(a) 中国矿业大学化工学院 徐州 221008)^(b) 江苏师范大学化学化工学院 徐州 221116)

摘要 芳香醛、环十二酮和丙二腈在苄胺存在下于 95%乙醇中反应,方便地合成了一系列 2-氨基-1,3-二氰基-4-芳基-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯衍生物,苄胺作为碱催化此类的反应还未见报道。产物的结构经过红外、核磁和高分辨质谱确定。本方法具有反应时间短、容易操作、产率高等优点,是合成此类化合物的一条有效途径。

关键词 轮烯;环十二酮;丙二腈;多组分反应

A Facile and Efficient Synthesis of 2-Amino-1,3-dicarbonitrile-4-aryl-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-decahydrobenzo[12]annulene Derivatives

Xie, Ruilun^a Zong, Zhimin^{*,a} Wei, Xianyong^a Gao, Yanian^bCheng, Ming^b Rong, Liangce^{*,b}^(a) School of Chemical Engineering and Technology, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221008)^(b) College of Chemistry and Chemical Engineering, Jiangsu Normal University, Xuzhou 221116)

Abstract A facile and efficient synthesis of 2-amino-1,3-dicarbonitrile-4-aryl-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-decahydrobenzo[12]-annulene derivatives by the reaction of aromatic aldehydes, cyclododecanone, and malononitrile in the presence of benzylamine in 95% EtOH is reported. Benzylamine as base to catalyze this kind of reaction has not been reported. This protocol has the advantages of short reaction time, mild conditions, and easy work-up. The products were identified by IR, ¹H NMR and HRMS. The reported method is the efficient approach for the synthesis of these compounds.

Keywords annulene; cyclododecanone; malononitrile; multicomponent reactions

多组分反应 (Multicomponent reactions, 简称: MCRs), 是将至少 3 个或 3 个以上的原料放入到一个反应器中, 无需分离中间产物, 一步构建目标产物的合成方法, 因此多组分反应具有操作简单、反应效率高、易于获得结构复杂的化合物, 是一种原子经济性的合成方法, 被认为是合成分子多样性和复杂性的化合物的有效手段之一^[1-3]。

在苯环结构上, 氨基位于两个氰基之间, 3 个基团处于相邻的位置, 是典型的吸-供-吸(A-D-A)体系的化合物, 这种化合物能形成良好的共轭体系, 具有非常优秀的光学性质, 一般用于制备新型荧光材料^[4]、人工光合系统^[5]和半导体、非线性光学材料^[6,7]等。由于这类化

合物的诸多用途, 近几年来有很多文献报道了此类结构化合物的合成。例如环戊酮与环己酮^[8]在无溶剂条件下简单研磨即可获得目标产物, 环庚酮在 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯(DBU)的催化下也可获得类似结构的化合物^[9], 而杂环 *N*-甲基-4-哌啶酮^[10]、二环底物四氢-1-萘酮^[11]、2,3-二氢-1-茚酮^[12]、脂肪族丙酮^[13]和芳基乙酮^[14]都可应用于不同结构的 2-氨基-1,3-二氰基化合物的合成。近年来还有其它的方法^[15-18]也被有效地应用于这类结构化合物的合成研究, 而大环酮应用于本结构的合成报道却非常少见, 本文报道多组分条件下使用环十二酮合成类似的 2-氨基-1,3-二氰基衍生物。反应如 Eq. 1 所示。

* E-mail: zong_zhimin@163.com; lrong@jsnu.edu.cn or lrong2005@yahoo.com

Received November 21, 2013; revised January 10, 2014; published online January 22, 2014.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 20936007, 51134021, 51074153, 21276268), the National Basic Research Program of China (Nos. 2011CB201302, 2012CB215302).

国家自然科学基金(No. 20936007, 51134021, 51074153, 21276268)和国家基础研究计划(Nos. 2011CB201302, 2012CB215302)资助项目。

4a: Ar = C₆H₅, **4b:** Ar = 4-FC₆H₄, **4c:** Ar = 4-BrC₆H₄, **4d:** Ar = 2,4-Cl₂C₆H₃, **4e:** Ar = 2-CH₃OC₆H₄, **4f:** Ar = 4-CH₃OC₆H₄, **4g:** Ar = 2,5-(CH₃O)₂C₆H₃, **4h:** Ar = 3,4-(CH₃O)₂C₆H₃, **4i:** Ar = 3,4-OCH₂O-C₆H₃, **4j:** Ar = 3,4,5-(CH₃O)₃C₆H₂

1 实验部分

1.1 仪器和试剂

熔点使用北京科仪电光仪器厂生产的 TX5 显微熔点仪测定(温度未经校正); 红外光谱采用 FT/IR-8101 型红外光谱仪测定(KBr 压片); 核磁共振氢谱采用 Bruker-400 MHz 型核磁共振仪测定, CDCl₃, DMSO-*d*₆ 为溶剂, TMS 为内标; 高分辨质谱采用 Bruker micrO-TOF-Q-II 高分辨质谱仪测定。所用试剂均为分析纯或化学纯, 使用前未经纯化。

1.2 2-氨基-1,3-二氰基-4-芳基-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯衍生物合成

芳醛(1 mmol), 环十二酮(1 mmol), 丙二腈(2.5 mmol), 苄胺(33 μ L)和 95%乙醇(10 mL)放在 25 mL 圆底烧瓶中, 80 $^{\circ}$ C 反应约 2 h, 薄层色谱(TLC)检测反应进程, 结束反应后冷至室温并有固体析出, 抽滤, 固体粗产物用 95% EtOH 重结晶、干燥, 得黄色固体 **4**。

2-氨基-4-苯基-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯-1,3-二氰基(**4a**): 产率 83%. m.p. 210~211 $^{\circ}$ C; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 1.13~1.30 (m, 2H, CH₂), 1.21~1.23 (m, 3H, CH₂, CH), 1.39 (s, 7H, CH₂, CH), 1.54 (s, 4H, CH₂), 1.72~1.74 (m, 1H, CH), 2.30~2.33 (m, 2H, CH₂), 2.81~2.85 (m, 1H, CH), 6.45 (s, 2H, NH₂), 7.27 (d, *J*=7.2 Hz, 2H, ArH), 7.49 (d, *J*=7.2 Hz, 3H, ArH); IR (KBr) ν : 3348, 3240, 2929, 2863, 2223, 1638, 1561, 1542, 1523, 1508, 1496, 1476, 1445, 1363, 1300, 1274, 1228, 1180, 1131, 1075, 1029, 779, 749, 704 cm⁻¹; HRMS calcd for C₂₄H₂₇N₃Na [M+Na]⁺: 380.2103, found 380.2110.

2-氨基-4-(4-氟苯基)-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯-1,3-二氰基(**4b**): 产率 80%. m.p. 156~158 $^{\circ}$ C; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 1.15~1.26 (m, 5H, CH₂, CH), 1.40 (s, 7H, CH₂, CH), 1.54 (s, 4H, CH₂), 1.7~1.73 (m, 1H, CH₂), 2.32 (br, 2H, CH), 2.82 (m, 1H, CH), 6.46 (s, 2H, NH₂), 7.34 (d, *J*=7.6 Hz, 4H, ArH); IR (KBr) ν : 3366, 3235, 2988, 2924, 2849, 2221, 1699, 1633, 1607,

1560, 1542, 1512, 1474, 1446, 1341, 1300, 1273, 1227, 1158, 1092, 1077, 1017, 845, 834 cm⁻¹; HRMS calcd for C₂₄H₂₆FN₃Na [M+Na]⁺: 398.2008, found 398.2012.

2-氨基-4-(4-溴苯基)-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯-1,3-二氰基(**4c**): 产率 78%. m.p. 202~203 $^{\circ}$ C; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 1.17~1.23 (m, 5H, CH₂), 1.39 (s, 7H, CH₂), 1.54 (s, 4H, CH₂), 1.72~1.73 (m, 1H, CH), 2.29~2.31 (m, 2H, CH₂), 2.82 (t, *J*=8.0 Hz, 1H, CH), 6.48 (br, 2H, NH₂), 7.26 (d, *J*=8.4 Hz, 2H, ArH), 7.70 (d, *J*=8.4 Hz, 2H, ArH); IR (KBr) ν : 3478, 3348, 3240, 2912, 2847, 2211, 1638, 1588, 1558, 1489, 1474, 1441, 1389, 1354, 1302, 1258, 1069, 1008, 824, 723, 670 cm⁻¹; HRMS calcd for C₂₄H₂₆BrN₃Na [M+Na]⁺: 458.1208, found 458.1215.

2-氨基-4-(2,4-二氯苯基)-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯-1,3-二氰基(**4d**): 产率 81%. m.p. 175~176 $^{\circ}$ C; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 1.1~1.25 (m, 5H, CH₂), 1.39~1.41 (m, 7H, CH₂), 1.47~1.56 (m, 4H, CH₂), 1.55~1.56 (m, 1H, CH), 2.33 (s, 1H, CH), 2.43~2.48 (m, 2H, CH₂), 2.80~2.95 (m, 1H, CH), 6.61 (s, 2H, NH₂), 7.46 (d, *J*=8.4 Hz, 1H, ArH), 7.60 (dd, *J*=1.6 Hz, 1H, *J*=8.0 Hz, ArH), 7.87 (d, *J*=1.6 Hz, 1H, ArH); IR (KBr) ν : 3475, 3353, 3223, 2919, 2217, 1637, 1561, 1477, 1445, 1274, 1101, 826, 670 cm⁻¹; HRMS calcd for C₂₄H₂₅Cl₂N₃Na [M+Na]⁺: 448.1323, found 448.1319.

2-氨基-4-(2-甲氧基苯基)-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯-1,3-二氰基(**4e**): 产率 85%. m.p. 252~253 $^{\circ}$ C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 1.25~1.32 (m, 4H, CH₂), 1.41~1.46 (m, 5H, CH₂), 1.54~1.60 (m, 5H, CH₂), 1.78~1.90 (m, 2H, CH₂), 2.18~2.30 (m, 1H, CH), 2.43~2.50 (m, 1H, CH), 2.81~2.98 (m, 2H, CH₂), 3.78 (s, 3H, OCH₃), 4.96 (s, 2H, NH₂), 7.00~7.09 (m, 3H, ArH), 7.41~7.45 (m, 1H, ArH); IR (KBr) ν : 3459, 3354, 3237, 2926, 2219, 1698, 1635, 1559, 1496, 1445, 1275, 1249, 1117, 1024, 755, 669 cm⁻¹; HRMS calcd for C₂₅H₂₉N₃NaO [M+Na]⁺: 410.2208, found 410.2215.

2-氨基-4-(4-甲氧基苯基)-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯-1,3-二氰基(**4f**): 产率 87%. m.p. 207~208 $^{\circ}$ C; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 1.15~1.22 (m, 4H, CH₂), 1.39 (s, 6H, CH₂), 1.53 (s, 4H, CH₂), 1.71~1.72 (m, 2H, CH₂), 2.34 (br, 2H, CH₂), 2.81~2.83 (m, 2H, CH₂), 3.82 (s, 3H, OCH₃), 6.37 (s, 2H, NH₂), 7.04 (d, *J*=7.6 Hz, 2H, ArH), 7.18 (d, *J*=8.0 Hz, 2H, ArH); IR (KBr) ν : 3356, 3236, 2933, 2846, 2216, 1698, 1634, 1611, 1558, 1541, 1515, 1473, 1456, 1444, 1373, 1339, 1289,

1273, 1253, 1174, 1132, 1107, 1030, 828, 669 cm^{-1} ; HRMS calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{29}\text{N}_3\text{NaO}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$: 410.2208 found 410.2213.

2-氨基-4-(2,5-二甲氧基苯基)-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯-1,3-二氰基(**4g**): 产率 75%. m.p. 212~213 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 1.16~1.24 (m, 5H, CH_2), 1.41 (m, 7H, CH_2), 1.54 (s, 4H, CH_2), 1.72~1.74 (m, 1H, CH), 2.19~2.24 (m, 1H, CH), 2.40~2.42 (m, 1H, CH_2), 2.74~2.81 (m, 1H, CH), 2.85~2.90 (m, 1H, CH), 3.67 (s, 3H, OCH_3), 3.72 (s, 3H, OCH_3), 6.35 (s, 2H, NH_2), 6.72 (s, 1H, ArH), 7.01 (d, $J=9.2$ Hz, 1H, ArH), 7.09 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, ArH); IR (KBr) ν : 3363, 3235, 2929, 2845, 2217, 1698, 1683, 1633, 1559, 1542, 1499, 1475, 1456, 1443, 1432, 1297, 1276, 1250, 1225, 1177, 1160, 1130, 1073, 1049, 1022, 872, 812, 728 cm^{-1} ; HRMS calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{31}\text{N}_3\text{NaO}_2$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$: 440.2314, found 440.2308.

2-氨基-4-(3,4-二甲氧基苯基)-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯-1,3-二氰基(**4h**): 产率 80%. m.p. 216~217 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 1.18~1.19 (m, 2H, CH_2), 1.27~1.28 (m, 2H, CH_2), 1.41 (m, 6H, CH_2), 1.54 (s, 4H, CH_2), 1.72~1.73 (s, 2H, CH_2), 2.37~2.38 (m, 2H, CH_2), 2.81~2.83 (m, 2H, CH_2), 3.74 (s, 3H, OCH_3), 3.82 (s, 3H, OCH_3), 6.39 (s, 2H, NH_2), 6.79 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, ArH), 6.86 (s, 1H, ArH), 7.05 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, ArH); IR (KBr) ν : 3430, 3353, 3248, 2939, 2215, 1646, 1606, 1558, 1516, 1466, 1406, 1255, 1236, 1177, 1140, 1028, 855, 763 cm^{-1} ; HRMS calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{31}\text{N}_3\text{O}_2$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$: 440.2314, found 440.2320.

2-氨基-4-(苯并[*d*][1,3]间二氧杂环戊烯-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯-1,3-二氰基(**4i**): 产率 79%. m.p. 183~185 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 1.25~1.38 (m, 14H, CH_2), 1.29 (s, 2H, CH_2), 1.67 (d, $J=6.4$ Hz, 2H, CH), 2.11 (d, $J=6.4$ Hz, 1H, CH), 2.69 (t, $J=7.2$ Hz, 2H, CH_2), 5.98 (s, 2H, OCH_2O), 6.79 (d, $J=6.4$ Hz, 2H, ArH), 7.02 (s, 1H, ArH), 7.18 (s, 2H, NH_2); IR (KBr) ν : 3356, 3173, 2925, 2849, 2213, 1672, 1635, 1610, 1560, 1515, 1489, 1471, 1444, 1395, 1289, 1274, 1252, 1175, 1131, 1107, 1032, 958, 928, 828, 812 cm^{-1} ; HRMS calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{27}\text{N}_3\text{NaO}_2$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$: 424.2001, found 424.2012.

2-氨基-4-(3,4,5-三甲氧基苯基)-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯-1,3-二氰基(**4j**): 产率 85%. m.p. 195~196 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 1.23 (d, $J=0.8$ Hz, 2H, CH_2), 1.34~1.42 (m, 8H, CH_2), 1.55 (s, 4H,

CH_2), 1.74 (d, $J=1.6$ Hz, 2H, CH_2), 2.36~2.40 (m, 2H, CH_2), 2.82 (t, $J=7.6$ Hz, 2H, CH_2), 3.73 (s, 3H, OCH_3), 3.76 (s, 6H, OCH_3), 6.43 (s, 2H, NH_2), 6.59 (s, 2H, ArH); IR (KBr) ν : 3415, 3349, 3250, 2929, 2847, 2215, 1652, 1586, 1561, 1509, 1469, 1450, 1412, 1367, 1294, 1284, 1240, 1178, 1128, 1005, 831, 763, 720, 670, 533 cm^{-1} ; HRMS calcd for $\text{C}_{27}\text{H}_{33}\text{N}_3\text{NaO}_3$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$: 470.2420, found 470.2415.

2 结果和讨论

2-氨基-1,3-二氰基化合物由于具有重要的光学性质, 一直受到合成工作者的关注, 已有不少的文献报道了此类化合物的合成^[8~18]. 而对于大环脂环酮应用于合成此类化合物的报道较为少见, 本文尝试使用环十二酮合成类似结构的 2-氨基-1,3-二氰基化合物. 环戊酮、环己酮在无溶剂条件下研磨即可得到目标产物^[8]. 在本合成中, 最初也是希望使用无溶剂的方法研究此反应. 我们将苯甲醛(1 mmol)、环十二酮(1 mmol)、丙二腈 (2.5 mmol)和 NaOH (0.5 mmol)混合后在研钵中仔细研磨, 但是反应结果表明主要得到是苯甲醛与丙二腈缩合的产物, 没有发现目标产物的生产, 可能是环十二酮碳环较大, 羰基部分受到碳链空间效应的影响, 在无溶剂条件下底物分子活动受到阻碍情况下难以发生反应. 我们曾经报道环庚酮在乙醇中 DBU 催化可以得到目标产物^[9], 于是又将环十二酮在乙醇中与苯甲醛、丙二腈在 DBU (30 mol%)存在下反应, 结果表明反应能够发生, 但产率较低(18%). 这个反应获得的有效信息是: 在乙醇中, 适当的催化剂存在下是可以获得产物的. 于是我们对反应条件进行了筛选. 选择了实验室常用的溶剂 95%乙醇(10 mL)与以上反应底物在不同催化剂存在下, 反应温度为 40 $^{\circ}\text{C}$ 情况下研究反应的可行性, 反应结果见表 1. 从表 1 可以看到, 酸性催化剂对反应没有催化效果(表 1, Entries 8~10), 而碱性催化剂对反应都有不同程度的催化效果, 但是以苄胺的催化效果最好(表 1, Entry 4). 于是选择苄胺作为本反应的催化剂, 并在不同的温度下继续研究反应的收率, 结果表明反应温度为 80 $^{\circ}\text{C}$ 时可以获得最大收率(表 1, Entry 14). 我们也使用其他有机溶剂, 发现极性溶剂甲醇、乙腈、四氢呋喃(THF)都可以应用于本产物的合成, 但产率并没有比在乙醇反应有明显的提高, 而在非极性溶剂甲苯、苯等中反应不能发生.

于是我们选择乙醇为反应溶剂、苄胺为反应催化剂、反应的温度 80 $^{\circ}\text{C}$ 为反应最优条件. 将不同的取代基芳醛应用本研究中, 反应结果表明芳环的取代基对反应没有明显的影响, 无论是吸电子基(F, Br, Cl), 还是供

电子基团(CH₃O), 反应都可以顺利进行并以较高的产率获得目标产物, 同时, 芳环上取代基的个数、位置对反应的结果影响都不明显。

表 1 化合物 4a 反应条件的筛选
Table 1 Catalyst optimization of compound 4a

序号	催化剂	温度/°C	产率 ^a /%
1	DBU	40	18
2	(CH ₃) ₃ N	40	24
3	C ₅ H ₁₀ NH	40	20
4	C ₆ H ₅ CH ₂ NH ₂	40	55
5	NaOH	40	43
6	K ₂ CO ₃	40	10
7	Na ₂ CO ₃	40	11
8	H ₂ SO ₄	40	0
9	<i>p</i> -TSA	40	0
10	H ₃ BO ₃	40	0
11	C ₆ H ₅ CH ₂ NH ₂	50	60
12	C ₆ H ₅ CH ₂ NH ₂	60	65
13	C ₆ H ₅ CH ₂ NH ₂	70	75
14	C ₆ H ₅ CH ₂ NH ₂	80	83
15	C ₆ H ₅ CH ₂ NH ₂	80	84 ^b

^a 反应时间为 2 h, 催化剂为 30 mol%。 ^b 反应时间为 4 h。

化合物的结构通过红外、核磁和高分辨质谱分析确定, 参照文献已报道的其他酮合成的类似结构的化合物, 可以确定 4 的结构完全正确。

我们采用一锅法多组分反应, 有效地合成了一系列 2-氨基-1,3-二氰基-4-芳基-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯衍生物, 这些化合物合成不同于以往文献报道的方法, 苄胺作为催化此类化合物的合成还未见文献报道。同时, 环十二酮应用于此类化合物的合成报道并不多见, 本文为 2-氨基-1,3-二氰基-4-芳基-5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14-十氢苯并[12]轮烯衍生物的合成提供了一条有效的途径。

References

- [1] Murata, H.; Ishitani, H.; Iwamoto, M. *Org. Biomol. Chem.* **2010**, *8*, 1202.
- [2] Moafi, L.; Ahadi, S.; Khavasi, H. S.; Bazgir, A. *Synthesis* **2011**, 1399.
- [3] Wang, H. Y.; Zou, Y.; Tao, C. Z. *Chin. J. Org. Chem.* **2011**, *31*, 2161 (in Chinese). (王慧彦, 邹毅, 陶传洲, 有机化学, **2011**, *31*, 2161.)
- [4] Dumur, F.; Gautier, N.; Gallego-Planas, N.; Sahin, Y.; Levillain, E.; Mercier, N.; Hudhomme, P. *J. Org. Chem.* **2004**, *69*, 2164.
- [5] Xiao, Y.; Qian, X. H. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 2087.
- [6] Sepiol, J.; Milart, P. *Tetrahedron* **1985**, *41*, 5261.
- [7] Griffiths, J.; Lockwood, M.; Roozpeikar, B. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1977**, 1608.
- [8] Rong, L. C.; Han, H. X.; Jiang, H.; Tu, S. J. *Synth. Commun.* **2008**, *38*, 3530.
- [9] Rong, L. C.; Tao, S. M.; Xia, S.; Liu, L. H.; Yin, S.; Shi, Y. H. *Res. Chem. Intermed.* **2012**, *38*, 1647.
- [10] Rong, L. C.; Gao, L. J.; Han, H. X.; Jiang, H.; Dai, Y. S.; Tu, S. J. *Synth. Commun.* **2010**, *40*, 289.
- [11] Wang, X. S.; Zhang, M. M.; Li, Q.; Yao, C. S.; Tu, S. J. *Tetrahedron* **2007**, *63*, 5265.
- [12] Rong, L. C.; Han, H. X.; Jiang, H.; Tu, S. J. *Synth. Commun.* **2009**, *9*, 3493.
- [13] Cui, S. L.; Lin, X. F.; Wang, Y. G. *J. Org. Chem.* **2005**, *70*, 2866.
- [14] Shaterian, H. R.; Honarmand, M.; Oveisi, A. R. *Monatsh. Chem.* **2010**, *141*, 557.
- [15] Adib, M.; Mohammadi, B.; Ansari, S.; Bijanzadeh, H. R.; Zhu, L. *Synthesis* **2010**, 1526.
- [16] Subhash, B.; Alissa, H.; Hari, K.; Grigoriy, S. *Tetrahedron Lett.* **2011**, *52*, 1878.
- [17] Yi, C.; Blum, C.; Liu, S.; Frei, G.; Neels, A.; Renaud, P.; Leutwyler, S.; Decurtins, S. *J. Org. Chem.* **2008**, *73*, 3596.
- [18] Xin, X.; Wang, Y.; Xu, W.; Lin, Y.; Duan, H.; Dong, D. *Green Chem.* **2010**, *12*, 893.

(Li, L.; Lu, Z.)