5-核糖或木糖亚甲基-2,4-咪唑啉二酮衍生物的合成及其杀菌活性

刘斌 韩金涛 汤博 王明安*

(中国农业大学应用化学系 北京 100193)

摘要 以 1,2:5,6-*O*-二异丙叉- α -D-呋喃葡萄糖为原料, 经过吡啶重铬酸盐(PDC)氧化、NaBH₄ 还原及选择性水解, 实现 α -D-木糖环向 α -D-核糖环的 C(3)位羟基构型的转化, 然后分别在高碘酸钠氧化作用下得到糖环上 C(5)位为醛基的 α -D-木糖和 α -D-核糖衍生物, 它们分别与 2,4-咪唑啉二酮-5-膦酸酯及 2-硫代-2,4-咪唑啉二酮发生 Wittig-Horner 反应及 Knoevenagel 反应, 分离得到 3 对 5-核糖或木糖亚甲基-2,4-咪唑啉二酮衍生物顺反异构体, 它们的化学结构经 ¹H NMR, IR, MS 和 X 射线单晶衍射确证。初步生物活性测定结果表明: 在 50 μ g/mL 浓度下, 部分目标化合物均对供试菌种显现出一定的抑制活性。

关键词 2,4-咪唑啉二酮; 木糖; 核糖; 杀菌活性

Synthesis and Fungicidal Activity of *D*-Ribose and *D*-Xylose with Hydantion

Liu, Bin Han, Jintao Tang, Bo Wang, Mingan*

(Department of Applied Chemistry, China Agricultural University, Beijing 100193)

Abstract The α -D-ribose and α -D-xylose C(5)-aldehyde derivatives (**1** and **2**) were prepared through four and two steps using 1,2:5,6-di-*O*-isopropylidene- α -D-glucofuranose as raw material. Then **1** and **2** reacted with hydantoin phosphonate and 2-thiohydantoin by Wittig-Horner and Knoevenagel reaction to afford 3 pairs of *E* and *Z* isomers of target products **3**~**5**. Their structures were elucidated by ¹H NMR, ¹³C NMR, IR, MS and X-ray diffraction. The preliminary bioassay results showed that some of them have certain fungicidal activities against 7 plant pathogens at the concentration of 50 μ g/mL.

Keywords hydantoin; ribose; xylose; fungicidal activity

在天然产物中经常发现单糖苷, 一些化合物显示出良好的生物活性。如多氧霉素(Polyoxins)是一组具有广谱杀菌活性的 *L*-核糖苷衍生物类抗生素并在农业上广泛用作杀菌剂^[1], 焦土霉素(Showdomycin)和间型霉素(Formycin)是另一类具有抗细菌和抗肿瘤活性的 *L*-核糖苷衍生物^[2]。从微生物 *Actinomyces madurae* 发酵液中曾分离得到一种新颖的三唑酮 *L*-核糖苷衍生物, 显示出对拟南芥(*Arabidopsis thaliana*)和兔肌肉 AdSS 强烈的抑制活性, 其 IC₅₀ 分别为 0.2 和 0.98 μ mol/L^[3]。Handantocidin 是从 *Streptomyces hygroscopicus* 发酵液中分离得到的另一种具有独特螺核苷结构的化合物, 对拟南芥 AdSS 也显示出强烈的抑制活性, 其 IC₅₀ 为 0.165 μ mol/L, 可以控制多种野生杂草的生长^[4]。为了模拟 handantocidin 的化学结构, 合成了大量乙内酰脲和 2-硫

代乙内酰脲的糖类似物, 它们表现出优异的糖苷元磷酸化酶抑制活性和除草活性, 我们对此进行了综述^[5]。我们小组^[6]曾报道了亚环十二基和亚环己基 2,4-咪唑啉二酮和 2-硫代-2,4-咪唑啉二酮衍生物, 发现部分化合物对油菜菌核、芦笋茎枯、辣椒疫霉等植物病原菌显示出良好的抑制活性。但是迄今未见文献报道 5-醛基- α -D-核糖和 5-醛基- α -D-木糖的 2,4-咪唑啉二酮和 2-硫代-2,4-咪唑啉二酮衍生物及其生物活性。为了阐明糖环的引入以及由此产生的含糖基的双键顺反异构体可能对杀菌活性的影响, 本文将报道 5-醛基- α -D-核糖和 5-醛基- α -D-木糖的 2,4-咪唑啉二酮和 2-硫代-2,4-咪唑啉二酮衍生物的合成、*E/Z*-异构体的分离、结构表征以及它们的杀菌活性, 化合物的合成路线如 Scheme 1 所示。

* E-mail: wangma@cau.edu.cn

Received January 21, 2014; revised March 5, 2014; published online April 15, 2014.

Project supported by the National Key Technologies R&D Program (No. 2011BAE06B03).

“十二五”科技支撑计划(No. 2011BAE06B03)资助项目。

Scheme 1

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

Yanagimoto 显微熔点仪(温度计未校正); Bruker DPX 300 MHz 核磁共振仪, TMS 为内标, CDCl_3 或 $\text{DMSO}-d_6$ 为溶剂; Agilent 1100 LC-MSD-Trap 质谱仪 (ESI-MS); Bruker SMART CCD X-射线衍射仪. 本实验所用柱层析硅胶为青岛海洋化工有限公司生产(200~300 目), 所用试剂均为国产或进口分析纯, 无水溶剂用常规方法干燥处理. 2,4-咪唑啉二酮和 2-巯代-2,4-咪唑啉二酮(TH)购自 Acros Organics.

1.2 中间体的合成 1、2 和 2,4-咪唑啉二酮膦酸酯(HP)的合成

参考文献[7, 8]方法, 由 1,2:5,6-*O*-二异丙叉- α -D-呋喃葡萄糖分别经过两步和 4 步反应制得 1,2-*O*-异丙叉-5-醛基- α -D-木糖(**1**)和 1,2-*O*-异丙叉-5-醛基- α -D-核糖(**2**), 2,4-咪唑啉二酮膦酸酯(HP)参考文献[6]方法制备, 它们的熔点、 ^1H NMR 均与文献一致.

1.3 目标化合物 5-(1,2-*O*-异丙叉-5-醛基- α -D-核糖或木糖)亚甲基-2,4-咪唑啉二酮的合成

在 50 mL 单口圆底烧瓶中将 1.09 g (5.5 mmol) 化合物 **1** 用 10 mL 无水甲醇溶解, 加入制备好的甲醇/甲醇钠溶液 20 mL, 于室温搅拌再加入 2,4-咪唑啉二酮膦酸酯 1.1 g (5.5 mmol), 体系由无色变为微黄色, 反应 20 h, 体系变为亮黄色浑浊液. 抽滤, 用少量乙酸乙酯洗涤滤渣, 旋蒸浓缩滤液近干, 加入 25 mL 乙酸乙酯溶解, 以

30 mL 饱和食盐水洗涤, 用乙酸乙酯萃取(30 mL $\times$ 4)水相, 合并有机相, 无水硫酸镁干燥过夜. TLC[展开剂为 $V(\text{二氯甲烷}):V(\text{甲醇})=11:1$]监测显示为两个荧光点, **3a** 的 R_f 为 0.43, **3b** 的 R_f 为 0.35. 除去乙酸乙酯后用适量甲醇溶解, 加入少量 100~200 目硅胶拌样, 硅胶柱分离, 洗脱剂为二氯甲烷/甲醇. 旋干所得洗脱液, 出现白色固体, 用乙酸乙酯石油醚重结晶, 得白色片状晶体化合物(*E*)-5-(1,2-*O*-异丙叉-5-醛基- α -D-木糖)亚甲基-2,4-咪唑啉二酮(**3a**) 0.21 g, m.p. 175~176 $^\circ\text{C}$, ESI-MS m/z : 271 $[\text{M}+\text{H}]^+$; 白色片状晶体化合物(*Z*)-5-(1,2-*O*-异丙叉-5-醛基- α -D-木糖)亚甲基-2,4-咪唑啉二酮(**3b**) 0.14 g, m.p. 190~192 $^\circ\text{C}$, ESI-MS m/z : 271 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 总收率为 32%; 采用相同的方法以化合物 **2** 为原料制备得到淡黄色固体化合物(*E*)-5-(1,2-*O*-异丙叉-5-醛基- α -D-核糖)亚甲基-2,4-咪唑啉二酮(**5a**), m.p. 139~141 $^\circ\text{C}$, ESI-MS m/z : 271 $[\text{M}+\text{H}]^+$ 和 (*Z*)-5-(1,2-*O*-异丙叉-5-醛基- α -D-核糖)亚甲基-2,4-咪唑啉二酮(**5b**), m.p. 162~164 $^\circ\text{C}$, ESI-MS m/z : 271 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 总收率为 21%, 它们的 ^1H NMR 和 ^{13}C NMR 见表 1 和 2.

将 1.49 g (7.5 mmol) 化合物 **1** 及 25 mL 无水乙醇加入到 50 mL 单口瓶中, 加热搅拌. 待溶解后, 投入 0.58 g (5 mmol) 2-巯代-2,4-咪唑啉二酮, 体系由无色澄清液变为红色浑浊, 加入 0.45 mL (7.5 mmol) 乙醇胺, 体系变澄清, 在 60 $^\circ\text{C}$ 左右加热回流 5 h. 反应液旋至近干, 用约 150 mL 乙酸乙酯溶解, 于砂芯漏斗中用短硅胶柱过滤, 并用约 100 mL 乙酸乙酯洗脱, 得黄色澄清液. 旋干, 得

表 1 化合物 3~6 的 ^1H NMR (DMSO- d_6 , 300 MHz)^a
Table 1 The ^1H NMR spectral data of compounds 3~6 (DMSO- d_6 , 300 MHz)

Compd.	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a
C(1)—H	5.87 d (3.7)	5.83 d (3.7)	5.73 d (4.0)	5.67 d (3.9)	5.91 d (3.8)	5.87 d (3.7)	5.75 d (4.0)
C(2)—H	4.46 d (3.7)	4.44 d (3.7)	4.50 d (4.0)	4.48 d (3.9)	4.48 d (3.8)	4.46 d (3.7)	4.52 d (4.0)
C(3)—H	3.97 dd (3.6, 5.1)	3.93 dd (2.9, 5.0)	3.72 m	3.59 m	4.04 dd (3.0, 5.1)	4.00 dd (2.6, 4.9)	3.78 m
C(4)—H	4.82 dd (9.0, 3.0)	5.65 dd (9.0, 2.7)	4.54 t (8.8)	5.45 t (9.6)	4.98 dd (9.0, 3.0)	5.58 dd (8.9, 2.6)	4.71 t (9.0)
C(5)—H	5.46 d (9.0)	5.39 d (9.0)	5.35 d (8.8)	5.16 d (9.6)	5.55 d (9.0)	5.65 d (8.9)	5.45 d (9.0)
N(7)—H	10.45 s	10.20 s	10.34 s	10.21 s	12.13 s	11.94 s	12.03 s
N(9)—H	11.12 s	11.12 s	11.15 s	11.11 s	12.26 s	12.22 s	12.28 s
C(10)—CH ₃	1.24 s	1.24 s	1.27 s	1.27 s	1.25 s	1.25 s	1.28 s
C(11)—CH ₃	1.46 s	1.40 s	1.52 s	1.48 s	1.48 s	1.41 s	1.54 s
C(3)—OH	5.40 d (5.1)	5.38 d (5.0)	5.14 d (7.0)	5.10 d (6.3)	5.45 d (5.1)	5.42 d (5.1)	5.18 d (5.7)

^a括号内的数字是偶合常数。

表 2 化合物 3~6 的 ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 75 MHz)
Table 2 ^{13}C NMR spectral data of compounds 3~6 (DMSO- d_6 , 75 MHz)

Compd.	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a
C(1)	104.49	104.45	103.63	103.27	104.66	104.60	103.81
C(2)	85.51	85.63	79.03	79.48	85.61	85.57	79.11
C(3)	75.54	75.71	76.27	76.47	75.81	75.75	76.30
C(4)	76.23	74.69	74.33	72.43	76.29	74.58	74.31
C(5)	104.91	110.19	107.03	111.97	108.90	113.71	110.92
C(6)	131.79	131.39	132.68	133.43	131.59	131.50	132.67
C(8)	155.14	154.36	154.94	154.07	179.12	177.67	178.98
C(10)	164.64	164.44	164.50	164.23	164.68	164.35	164.62
C(11)	110.93	110.90	111.80	111.76	111.02	110.94	111.99
C(12)	26.72	26.98	26.63	26.80	26.81	26.91	26.74
C(13)	26.31	26.53	26.48	26.81	26.31	26.43	26.52

粗产物 1.66 g. 用乙酸乙酯/石油醚重结晶, 对所得固体重结晶多次, 得浅黄色晶体颗粒化合物(E)-5-(1,2-O-异丙叉-5-醛基- α -D-木糖)亚甲基-2-硫代-2,4-咪唑啉二酮(4a) 0.45 g. 母液加入硅胶拌样过柱, 采用二氯甲烷/甲醇洗脱体系, 从 60:1 至 20:1 进行梯度洗脱(TLC 监测, 展开体系为 $V(\text{二氯甲烷}):V(\text{甲醇})=35:1$, 4a 的 R_f 为 0.34, 4b 的 R_f 为 0.18), 又得到 4a 0.10 g, 共 0.55 g, m.p. 190~192 °C, ESI-MS m/z : 287 $[\text{M}+\text{H}]^+$; 黄色絮状固体化合物(Z)-5-(1,2-O-异丙叉-5-醛基- α -D-木糖)亚甲基-2-硫代-2,4-咪唑啉二酮(4b) 44 mg, m.p. 195~197 °C, ESI-MS m/z : 287 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 总收率为 41%; 采用相同的方法以化合物 2 为原料制得黄色固体化合物(E)-5-(1,2-O-异丙叉-5-醛基- α -D-核糖)亚甲基-2-硫代-2,4-咪唑啉二酮(6a), m.p. 173~175 °C, ESI-MS m/z : 287 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 收率为 20%, 它们的 ^1H NMR 和 ^{13}C NMR 如表 1 和表 2 所示。

1.4 化合物 3a 的晶体衍射

将 30 mg 高纯度的化合物 3a 置于 50 mL 三角瓶中, 用甲醇加热将其溶解, 待固体溶解完全后再加入少量乙酸乙酯, 用保鲜膜将瓶口封好, 并扎 3~5 个针孔, 置于阴凉处, 让溶剂自然挥发, 大约一个星期瓶中长出符合

单晶衍射所需的晶体。晶体衍射分析: 在低温条件 [173(2) K] 下, 将 1 粒 0.50 mm×0.33 mm×0.16 mm 大小的晶体置于 Bruker SMART CCD IP 四圆衍射仪中, 采用石墨单色器, Mo $K\alpha$ ($\lambda=0.071073$ nm) 射线, 用 Xscan 程序收集数据, 采用 ω - 2θ 扫描方式, 在 $3.14^\circ < \theta < 27.51^\circ$ 范围内收集到 3357 个衍射点, 其中 1595 个独立衍射点, $R(\text{int})=0.0268$. 强度数据经半经验吸收校正, 在微机上使用 SHELXTL-97 程序直接法解出结构, 并由 SHELXL-97 程序采用最小二乘法进行结构精修, 得到化合物 3a 的晶体结构如图 1 所示。化合物 3a 结构参数: $M_r=288.26$, $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_7$, Monoclinic, $C2$, $-17 \leq h \leq 16$, $-11 \leq k \leq 7$, $-15 \leq l \leq 15$, $a=1.3196(7)$ nm, $b=0.8569(4)$ nm, $c=1.1827(6)$ nm, $\beta=100.487(6)^\circ$, $V=1.3151(12)$ nm³, $D_c=1.456$ g/cm³, $F(000)=608$, $Z=4$, $S=1.063$, $R_1=0.0479$, $wR_2=0.1321$ [$I>2\sigma(I)$], $R_1=0.0491$, $wR_2=0.1333$ [all data]. 化合物 3a 的晶体结构数据已存于剑桥晶体结构数据库中, CCDC 号为 878441.

1.5 生物活性测定

7 种植物病原菌由中国农业大学植物病理学实验室分离保存。用分析天平称取一定量的原药, 加 DMSO 溶解, 定容制备成浓度为 5000 $\mu\text{g/mL}$ 的溶液, 然后再制备

图1 化合物3a的晶体结构和晶胞堆积图

Figure 1 X-ray structure and the packing diagram in the unit cell of 3a

成 50 $\mu\text{g/mL}$ 的含毒马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA)平板供试验用. 采用菌丝生长速率法^[9], 以 PDA 培养基在平皿中培养测定目标化合物的杀菌活性, 将培养好的各种病原菌, 在无菌操作条件下用直径 5 mm 的灭菌打孔器, 自菌落边缘切取菌饼, 用接种器将菌饼接种于含药平板中央, 菌丝面向下, 盖上皿盖, 置于 25 $^{\circ}\text{C}$ 培养箱中培养, 根据空白对照培养皿中菌落的生长情况调查病原菌菌丝生长情况, 待空白对照中的菌落充分生长后, 以十字交叉法测量各处理的菌落直径, 每个样品平行测定 3 次, 取其平均值. 以空白对照菌落增长直径和药剂处理的菌落增长直径的差值与空白对照菌落增长直径的比值来计算各药剂处理对各种病原菌的菌丝生长抑制率, 化合物 3~6 的杀菌活性测定结果见表 3.

表3 化合物3~6对7种病原菌的杀菌活性(抑制率/%) (50 $\mu\text{g/mL}$)Table 3 The fungicidal activity (inhibition rate/%) of compounds 3~6 against 7 plant fungus (50 $\mu\text{g/mL}$)

Compd.	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	Carbendazim
桃褐腐菌(<i>M. fructicola</i>)	21.5	7.2	27.7	27.3	31.4	31.9	26.5	
棉花立枯菌(<i>R. solani</i>)	12.0	32.7	2.8	0	46.6	47.1	49.6	90.2
黄瓜炭疽菌(<i>C. orbiculare</i>)	76.2	47.1	50.0	50.1	44.0	56.6	44.0	86.4
西瓜枯萎菌(<i>F. oxysporum</i>)	20.0	10.5	8.0	7.1	38.8	33.3	10.5	83.3
苹果炭疽菌(<i>C. gloeosporioides</i>)	50.0	56.6	40.7	40.1	37.0	37.1	59.1	
苹果腐烂菌(<i>V. mali</i>)	29.5	33.3	49.6	51.0	33.3	33.3	17.4	
番茄早疫病(<i>A. solani</i>)	33.3	33.3	19.6	19.8	33.3	34.0	33.3	73.9

2 结果与讨论

2.1 化合物的合成、晶体结构、双键构型及核磁共振波谱分析

参照文献[7, 8]顺利地以 1,2:5,6-*O*-二异丙叉- α -*D*-呋喃葡萄糖为原料制备了中间体 1 和 2, 再通过 Wittig-Horner 和 Knoevenagel 反应制备了两个 5-碳糖的 2,4-咪唑啉二酮和 2-硫代-2,4-咪唑啉二酮衍生物 3~6. 在薄层板上显示原料并未完全反应, 且由于两个主要产物点的 R_f 值相差较小, 采用硅胶柱层析或薄层层析分离并反复重结晶后, 才成功得到了 3 对 *E/Z*-异构体, 均以 *E*-异构体为主要产物, 而化合物 6 只分离得到 1 个 *E*-异构体产物, 收率都较低, 说明两个 5-碳糖的反应活性较差. 尝试以三氟乙酸-水体系、对甲苯磺酸-甲醇体系和无水 HCl -甲醇体系脱除 3~6 的异丙叉保护基, 因产物体系复杂、极性大、在薄层分离时出现严重的拖尾, 分离未获成功^[10~12]. 其中以代表性的化合物 3a 进行了晶体衍射, 其晶体结构如图 1 所示, 结果表明它的双键构型为 *E*-式, 在晶胞中含有 1:1 的结晶水, 水分子与 3a 分子中杂原子之间通过氢键自组装有序堆积形成晶体, 相应地化合物 3b 的双键构型确定为 *Z*-式.

在此基础上, 根据化合物的 COSY, HSQC 谱对它们的 ^1H NMR 和 ^{13}C NMR 信号进行了归属, 结果如表 1 和表 2 所示. 在它们的 ^1H NMR 谱中, 两个相距较远的甲基质子变化较小, 杂环羰基变为硫羰基以及羟基和双键构型的改变使得 C(1)—H, C(2)—H, C(3)—H, C(4)—H, C(5)—H, 杂环上的两个 N—H, 以及活泼羟基质子化学位移均有规律的改变. 如 2,4-咪唑啉二酮和 2-硫代-2,4-咪唑啉二酮衍生的 *E/Z*-异构体, 当 C(3)—OH 构型改变时, C(1)—H, C(3)—H, C(4)—H, C(5)—H 以及 O—H 都向高场移动 δ 0.15~0.25, 而只有 C(2)—H 向低场移动 δ 0.04~0.05; 当 C(3)—OH 构型不变时, 只有 C(4)—H 向低场移动 δ 0.60~0.90、C(5)—H 质子向高场移动 δ 0.07~0.20; 当 2,4-咪唑啉二酮改变为 2-硫代-2,4-咪唑啉二酮时, 只有 C(5)—H 向低场移动 δ 0.10~0.25, 其余质子也变化不大. 在此结果基础上, 对它们的 2D

NOESY 谱进行分析, 如化合物 **3a** 和 **3b** 在 2D NOESY 谱中清晰的观测到 H-1 和 H-2 以及 H-4 和 H-5 之间的 NOE 相关, 而 H-2 和 H-3 以及 H-3 和 H-4 之间并没有明显的 NOE 相关, 这与其分子中质子的相对空间取向一致, 同时还说明 C(4)和 C(5)之间的碳碳单键在溶液中可以自由旋转, **4a** 和 **4b** 的情况与之相似, 由此化合物 **4a** 和 **4b** 的双键构型分别确定为 *E*-式和 *Z*-式; 化合物 **5a** 和 **5b**, 由于 C(3)羟基构型的改变, 除导致质子化学位移的改变外, 在 2D NOESY 谱中清晰的观测到 H-1 和 H-2, H-2 和 H-3 以及 H-4 和 H-5 之间的 NOE 相关, 这也与其分子中质子的相对空间取向一致, 这证明了合成反应中 C(3)羟基构型的翻转是成功的, 通过与 **3a** 和 **3b**, **4a** 和 **4b** 的 NOE 比较, 化合物 **5a** 和 **5b** 的双键构型分别确定为 *E*-式和 *Z*-式; 类似地化合物 **6a** 的双键构型确定为 *E*-式。

在它们的 ^{13}C NMR 谱中, 所有 2,4-咪唑啉二酮和 2-硫代-2,4-咪唑啉二酮衍生的 *E/Z*-异构体, 当 C(3)—OH 构型改变时, 只有 C(3)化学位移向低场移动 δ 0.50~0.80, 而 C(2), C(4), C(5), C(6)均向高场移动 δ 1.0~6.5, 当 C(3)—OH 构型不变, 而由 2,4-咪唑啉二酮改变为 2-硫代-2,4-咪唑啉二酮时, 仅 C(5)和 C(8)分别向低场移动 δ 3.5~4.0 和 23.0~24.0, 其余位置化学位移改变很小。

2.2 化合物的杀菌活性

测试了目标化合物对 7 种植物病原菌的杀菌活性, 结果如表 3 所示。所有化合物在测试浓度下对 7 种植物病原菌均有一定的抑制作用, 但是抑制率超过 50%的并不多, 说明该类化合物的杀菌活性较差。不同构型的 *E/Z*-异构体对 7 种病原菌的抑制率相差不大, 只有 **3a** 对黄瓜炭疽病菌的抑制活性显著好于 **3b** 的抑制活性。选择对黄瓜炭疽病菌抑制率达 76.2%的化合物 **3a** 进行了精密毒力测定, 测得其 EC_{50} 为 11.27 $\mu\text{g/mL}$, 这与前文^[6]合成的亚环十二基和亚环己基 2,4-咪唑啉二酮和 2-硫代-2,4-咪唑啉二酮衍生物相比, 杀菌活性明显降低, 这说明用单糖替换原有的部分活性基团并没有预期的效果, 且含糖基的不同构型的 *E/Z*-异构体对测试病原菌的抑制活性影响不显著。

References

[1] (a) Isono, K.; Asahi, K.; Suzuki, S. *J. Am. Chem. Soc.* **1969**, *91*, 7490.

- (b) Zhou, D.; Staake, M.; Patterson, S. E. *Org. Lett.* **2008**, *10*, 2179.
- [2] (a) Boettcher, T.; Sieber, S. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 6964.
(b) Korouli, S.; Lougiakis, N.; Marakos, P.; Pouli, N. *Synlett* **2008**, 181.
- [3] Schmitzer, P. R.; Graupner, P. R.; Chapin, E. L.; Fields, S. C.; Gilbert, J. R.; Gray, J. A.; Peacock, C. L.; Gerwick, B. C. *J. Nat. Prod.* **2000**, *63*, 777.
- [4] (a) Nakajima, M.; Itoi, K.; Takamatsu, Y.; Kinoshita, T.; Okazaki, T.; Kawakubo, K.; Shindo, M.; Honma, T.; Tohjigamori, M.; Haneishi, T. *J. Antibiot.* **1991**, *44*, 293.
(b) Haruyama, H.; Takayama, T.; Kinoshita, T.; Kondo, M.; Nakajima, M.; Haneishi, T. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. I* **1991**, 1637.
- [5] (a) Wang, J. M.; Han, J. T.; Kuang, Y.; Jin, S. H.; Wang, M. A. *Chin. J. Pestic. Sci.* **2008**, *10*, 392 (in Chinese).
(王进敏, 韩金涛, 匡宇, 金淑惠, 王明安, 农药学报, **2008**, *10*, 392.)
(b) Wang, J. M.; Kuang, Y.; Han, J. T.; Jin, S. H.; Wang, M. A. *Chin. J. Pestic. Sci.* **2009**, *11*, 1 (in Chinese).
(王进敏, 匡宇, 韩金涛, 金淑惠, 王明安, 农药学报, **2009**, *11*, 1.)
- [6] (a) Chen, S. C.; Zhang, C. Y.; Liu, J. P.; Wang, D. Q.; Wang, M. A. *Chin. J. Org. Chem.* **2010**, *30*, 1768 (in Chinese).
(陈守聪, 张春艳, 刘吉平, 王道全, 王明安, 有机化学, **2010**, *30*, 1768.)
(b) Lei, J. P.; Han, J. T.; Xu, Z. H.; Dong, H. B.; Wang, M. A. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, *32*, 1993 (in Chinese).
(雷建平, 韩金涛, 徐志红, 董宏波, 王明安, 有机化学, **2012**, *32*, 1993.)
(c) Lei, J. P.; Dong, H. B.; Xu, Z. H.; Tang, B.; Wang, M. A. *Chin. J. Pestic. Sci.* **2012**, *14*, 445 (in Chinese).
(雷建平, 董宏波, 徐志红, 汤博, 王明安, 农药学报, **2012**, *14*, 445.)
(d) Lei, J. P.; Dong, H. B.; Xu, Z. H.; Tang, B.; Wang, M. A. *Chin. J. Pestic. Sci.* **2012**, *14*, 669 (in Chinese).
(雷建平, 董宏波, 徐志红, 汤博, 王明安, 农药学报, **2012**, *14*, 669.)
- [7] (a) Tadano, K.; Miyazaki, M.; Ogawa, S.; Suami, T. *J. Org. Chem.* **1988**, *53*, 1574.
(b) Gramera, R. E.; Park, A.; Whistler, R. L. *J. Org. Chem.* **1963**, *28*, 3230.
- [8] (a) Pitsch, S. *Helv. Chim. Acta* **1997**, *80*, 2286.
(b) Kiss, J.; D'Souza, R.; Taschner, P. *Helv. Chim. Acta* **1975**, *58*, 311.
- [9] Chen N. C. *The Bioassay Technology for Pesticides*, Agricultural University Press, Beijing, **1991** (in Chinese).
(陈年春, 农药生物测定技术, 北京农业大学出版社, 北京, **1991**.)
- [10] Chemla, P. *Tetrahedron Lett.* **1993**, *34*, 7391.
- [11] Sano, H.; Sugai, S. *Tetrahedron: Asymmetry* **1995**, *6*, 4635.
- [12] (a) Helferich, B.; Schafer, W. *Org. Synth. Coll.* **1941**, *1*, 364.
(b) Garegg, P. J.; Johansson, K.-J.; Konradsson, P.; Lindberg, B. *J. Carbohydr. Chem.* **1999**, *18*, 31.

(Li, L.; Lu, Z.)