通过点击化学方法合成鹅去氧胆酸类分子钳及其识别性能研究

赵志刚* 王晓红 石治川 程玉宇

(西南民族大学化学与环境保护工程学院 成都 610041)

摘要 通过点击化学方法设计合成了 12 个新型的含有 1,2,3-三唑结构的鹅去氧胆酸类分子钳人工受体. 所有新目标物结构均经 ^1H NMR, IR, MS 及元素分析确证. 利用紫外可见光光度滴定法测试了主体化合物对阳离子的识别作用. 实验结果表明, 主体分子对汞离子有良好的选择性识别性能.

关键词 阳离子识别; 分子钳; 点击化学; 1,2,3-三唑; 鹅去氧胆酸

Synthesis of Molecular Tweezers Derived from Chenodeoxycholic Acid through Click Reaction and Their Recognition Properties

Zhao, Zhigang* Wang, Xiaohong Shi, Zhichuan Cheng, Yuyu

(College of Chemistry and Environmental Protection Engineering, Southwest University for Nationalities, Chengdu 610041)

Abstract Twelve novel chenodeoxycholic acid-based molecular tweezer metal receptors containing 1,2,3-triazole moieties have been designed and synthesized using click chemistry method. The target compounds were characterized by ^1H NMR, IR, MS spectra and elemental analysis. Their binding properties were examined by UV-Vis spectra titration. The results indicate that these molecular tweezers showed high selectivity and affinity for Hg^{2+} ion.

Keywords cation recognition; molecular tweezer; click chemistry; 1,2,3-triazole; chenodeoxycholic acid

金属阳离子广泛存在于生物体内和我们的生活环境中. 在生物体代谢过程中, 金属阳离子起着特殊的作用, 它们维持着生物体内的水和电解质平衡以及参与 DNA 及酶的代谢过程, 是人体细胞不可或缺的^[1]. 在工业生产中, 广泛使用铅、汞、镉等剧毒重金属, 它们大都转化为阳离子被排放到自然界中, 通过食物链在组织里富集起来, 并转化为人体细胞内游离的阳离子, 对人和自然界造成巨大的危害^[2,3]. 设计易于合成且能够准确、快速检测出有毒金属阳离子的人工受体是目前研究阳离子识别的一个热点领域^[4]. 2001 年, Sharpless 等^[5-7]提出了一种快速合成大量化合物的方法, 即“click chemistry”, 其具有反应条件温和、选择性高、产率高、纯化步骤简单等优点. 通过点击化学方法合成含有 1,2,3-三唑结构的多性能的化合物成为近几年的一个研究热点^[8-13]. 1,2,3-三唑结构具有较大的偶极矩, 可参与形成氢键. 同时, 在比较苛刻的条件下, 仍具有很高的稳定性. 另外 1,2,3-三唑结构能够参与 π - π stacking 和配

位作用, 故可与客体分子之间发生良好的识别作用. 由于 1,2,3-三唑结构具有如此多优点, 故将其应用于合成具有特殊识别功能的分子钳具有重要的理论意义与实用价值. 钳体由于其具有刚性的凹面结构和天然的不对称性, 是构筑钳形人工受体的理想结构单元^[14-20]. 通过点击化学合成钳体类分子钳的研究, 国内外报道相对较少. 主要是 Hu^[21]和 Pandey 小组^[22]进行了该类钳形受体的合成及性能测试. 结果表明, 对一些金属阳离子有良好的识别性能. 纵观国内外文献, 利用点击化学来合成鹅去氧胆酸钳形人工受体还未见文献报道, 因此我们设计了一类新型的鹅去氧胆酸分子钳. 以鹅去氧胆酸为隔离基, 经过桥连得到 3,7-二叠氮乙酰氧基鹅去氧胆酸甲酯, 通过点击化学方法合成目标分子钳人工受体. 紫外可见光谱滴定结果表明, 这类钳形受体对阳离子具有识别作用, 特别对汞离子有优良的选择性识别效果. 合成路线见 Scheme 1.

* E-mail: zzg63129@163.com

Received January 25, 2014; revised March 10, 2014; published online April 15, 2014.

Project supported by the Science and Technology Department of Sichuan Province (No. 2012SZ0160) and the National Foreign Expert Bureau (No. 2013-32). 四川省科技支撑计划基金(No. 2012SZ0160)和国家外专局基金(No. 2013-32)资助项目.

Scheme 1

1 实验

1.1 仪器与试剂

核磁共振仪: Varian INOVA400 MHz, Me₄Si 作内标, CDCl₃, CDCl₃CD₃OD 混合溶液为溶剂; 红外光谱仪: 傅里叶变换红外光谱仪 PERKINEL-MER1700 型, KBr 压片; 质谱仪: FINNIGAN-LCQ^{DECA} 型; 元素分析仪: Carlo-Erba-1106 型; 旋光仪: WZZ-2B 自动旋光仪; 熔点仪: X-4 型数字显示显微熔点测定仪, 温度计未经校正; 紫外可见光谱仪: 北京普析 TU-1901 型。

所用试剂均为市售化学纯或分析纯。硅胶 H、硅胶 GF₂₅₄: 青岛海洋化工厂生产; 无水 *N,N*-二甲基甲酰胺 (DMF): 加 CaH₂ 干燥 48 h 后, 反应前新蒸使用; 无水吡啶: 加 KOH 干燥 24 h 后, 蒸馏收集 114~116 °C 馏分; 鹅去氧胆酸: Acros Organics 公司进口; 对硝基苯乙炔: Sigma 公司生产; 对甲基苯乙炔: Aladdin 公司生产; 对丙基苯乙炔: Adamas-beta Reagent 公司生产; 2-(2-丙炔氧基)苯甲醛、2-(2-丙炔氧基)-1-萘甲醛: J&K Chemical 公司进口; 苯乙炔、4-乙基苯乙炔、4-甲氧基苯乙炔、对溴苯乙炔、对氯苯乙炔、对氟苯乙炔、3-氨基苯乙炔: 上海德默医药科技有限公司生产。

1.2 中间体 2~4 的合成与表征

3α,7α-二羟基-5β-24-胆烷酸甲酯(2)的合成: 将 2.0 g (5.0 mmol) 鹅去氧胆酸 **1** 加入 100 mL 圆底烧瓶中, 依次加入 60 mL 无水甲醇和 0.2 g (1.16 mmol) 对甲苯磺酸, 室温下搅拌反应 24 h。减压蒸去甲醇, 剩余物用 40 mL 乙酸乙酯溶解, 然后用 10% 碳酸钠溶液 (10 mL × 3) 洗涤, 再用饱和食盐水 (10 mL × 3) 洗涤, 无水硫酸钠干燥, 过滤。减压蒸去乙酸乙酯后, 柱层析分离纯化 [固定相用硅胶 H, 洗脱剂: *V*(甲醇): *V*(丙酮): *V*(氯仿) = 2:20:70], 得白色固体 1.92 g, 产率 95%。m.p. 85~86 °C; [α]_D²⁰ + 18.9 (*c* 0.34, CH₂Cl₂); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 3.85 (s, 1H, 7β-H), 3.66 (s, 3H, COOCH₃), 3.50~3.42 (m, 1H, 3β-H), 0.93 (s, 3H, 19-CH₃), 0.91 (d, *J* = 6.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 0.66 (s, 3H, 18-CH₃); IR (KBr) *v*: 3350, 2985, 2910, 1745, 1183 cm⁻¹; ESI-MS *m/z* (%): 405 [(M-H)⁺, 100].

3α,7α-二氯乙酰氧基-5β-24-胆烷酸甲酯(3)的合成: 将 0.81 g (2.0 mmol) 3α,α-二羟基-5β-24-胆烷酸甲酯(2)溶于 40 mL 无水 CHCl₃ 中, 再加入 0.64 mL (8.0 mmol) 的 ClCH₂COCl, 室温搅拌下滴加吡啶的 CHCl₃ 溶液 (0.30 mL/3.70 mmol 溶于 10 mL 无水 CHCl₃), 滴加完毕后, 升温至 60 °C 回流 48 h。停止反应后, 减压蒸出多余的

CHCl₃ 和过量 ClCH₂COCl, 得乳黄色固体, 残余物用乙酸乙酯溶解, 依次用饱和碳酸氢钠(30 mL×3), 饱和食盐水(30 mL×3)洗涤, 无水硫酸钠干燥. 经硅胶柱层析[固定相用硅胶 H, 洗脱剂: *V*(乙酸乙酯): *V*(石油醚)=1:5]得白色固体 1.00 g, 产率 90%. m.p. 120~122 °C; $[\alpha]_D^{20}$ -71.8 (*c* 0.19, CH₂Cl₂); ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 5.00 (s, 1H, 7 β -H), 4.66~4.70 (m, 1H, 3 β -H), 3.99~4.08 (m, 4H, CH₂Cl), 3.67 (s, 3H, COOCH₃), 0.95 (s, 3H, 19-CH₃), 0.92 (d, *J*=6.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 0.65 (s, 3H, 18-CH₃); IR (KBr) ν : 2943, 2869, 1738, 1466, 1440, 1364, 1276, 1221, 1046, 976, 765, 695 cm⁻¹; ESI-MS *m/z* (%): 777 [(M+H)⁺, 100]. Anal. calcd for C₄₅H₅₆N₆O₆: C 69.56, H 7.26, N 10.82; found C 69.52, H 7.24, N 10.78.

3 α ,7 α -二叠氮乙酰氧基-5 β -24-胆烷酸甲酯(**4**)的合成: 将 0.86 g (1.54 mmol) 3 α ,7 α -二氯乙酰氧基-5 β -24-胆烷酸甲酯(**3**)溶于 20 mL DMF 中, 加入 0.6 g (9.24 mmol) 叠氮化钠. 60 °C 条件下反应 12 h. 停止反应之后, 加入 40 mL 水稀释反应液, 用乙酸乙酯(30 mL×3)萃取, 合并有机相, 依次用水和饱和氯化钠溶液各洗涤 1 次, 无水硫酸钠干燥. 柱层析后[固定相用硅胶 H, 洗脱剂为: *V*(乙酸乙酯): *V*(石油醚)=1:5]得白色固体 0.84 g, 产率 95%. m.p. 81~83 °C; $[\alpha]_D^{20}$ -108.3 (*c* 0.11, CH₂Cl₂); ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 5.04 (s, 1H, 7 β -H), 4.70~4.75 (m, 1H, 3 β -H), 3.79~3.92 (m, 4H, CH₂N₃), 3.66 (s, 3H, COOCH₃), 0.96 (s, 3H, 19-CH₃), 0.92 (d, *J*=6.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 0.66 (s, 3H, 18-CH₃); IR (KBr) ν : 2945, 2867, 2110, 1742, 1376, 1349, 1291, 1249, 1200, 1165, 1140, 984 cm⁻¹; ESI-MS *m/z* (%): 595 [(M+Na)⁺, 100]. Anal. calcd for C₂₉H₄₅N₆O₆: C 60.82, H 7.74, N 14.67; found C 60.74, H 7.75, N 14.65.

1.3 分子钳 5a~5l 的合成与表征

在 50 mL 干燥的圆底烧瓶中加入 0.3 g (0.52 mmol) 3 α ,7 α -二叠氮乙酰氧基-5 β -24-胆烷酸甲酯(**4**), 15 mL *t*-BuOH, 待原料溶解完后, 加入各种取代苯乙炔 1.14 mmol, 40 mol% 三乙胺, 10 mol% CuI, 油浴加热, 在 50 °C 反应 10~30 h (TLC 监测反应进程), 反应停止后, 减压蒸出多余的 *t*-BuOH, 得乳白色固体, 残余物用少量乙酸乙酯溶解. 经硅胶柱层析[固定相用硅胶 H, 洗脱剂: *V*(乙酸乙酯): *V*(石油醚)=3:10~2:1]得到目标物.

分子钳 **5a**: 白色固体, 产率 93%. m.p. 97~99 °C; $[\alpha]_D^{20}$ +242.3 (*c* 0.20, CH₂Cl₂); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.19 (s, 1H, triazole-H), 7.86 (s, 1H, triazole-H), 7.81~7.84 (m, 4H, ArH), 7.42~7.46 (m, 2H, ArH), 7.34~7.38 (m, 3H, ArH), 7.28~7.31 (m, 1H, ArH),

5.25~5.41 (m, 2H, OCOCH₂), 5.04~5.12 (m, 2H, OCOCH₂), 4.92 (s, 1H, 7 β -H), 4.61~4.65 (m, 1H, 3 β -H), 3.68 (s, 3H, COOCH₃), 0.89 (s, 3H, 19-CH₃), 0.84 (d, *J*=6.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 0.59 (s, 3H, 18-CH₃); IR (KBr) ν : 2943, 2869, 1738, 1466, 1440, 1364, 1276, 1221, 1046, 976, 765, 695 cm⁻¹; ESI-MS *m/z* (%): 777 [(M+H)⁺, 100]. Anal. calcd for C₄₅H₅₆N₆O₆: C 69.56, H 7.26, N 10.82; found C 69.52, H 7.24, N 10.78.

分子钳 **5b**: 白色固体, 产率 88%. m.p. 96~98 °C; $[\alpha]_D^{20}$ -42.9 (*c* 0.18, CH₂Cl₂); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.16 (s, 1H, triazole-H), 7.80 (s, 1H, triazole-H), 7.72~7.76 (m, 4H, ArH), 7.26~7.28 (m, 2H, ArH), 7.18 (d, *J*=8 Hz, 2H, ArH), 5.23~5.39 (m, 2H, OCOCH₂), 5.02~5.13 (m, 2H, OCOCH₂), 4.91 (s, 1H, 7 β -H), 4.60~4.66 (m, 1H, 3 β -H), 3.68 (s, 3H, COOCH₃), 2.60 (brs, 4H, ArNH₂×2), 0.88 (s, 3H, 19-CH₃), 0.82 (d, *J*=6.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 0.58 (s, 3H, 18-CH₃); IR (KBr) ν : 2942, 2871, 1741, 1507, 1459, 1363, 1275, 1227, 1139, 1045, 977, 831, 790 cm⁻¹; ESI-MS *m/z* (%): 807 [(M+H)⁺, 100]. Anal. calcd for C₄₅H₅₈N₈O₆: C 66.97, H 7.24, N 13.89; found C 66.86, H 7.23, N 13.92.

分子钳 **5c**: 白色固体, 产率 91%. m.p. 98~100 °C; $[\alpha]_D^{20}$ -56.8 (*c* 0.16, CH₂Cl₂); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.09 (s, 1H, triazole-H), 7.77 (s, 1H, triazole-H), 7.72~7.76 (m, 4H, ArH), 6.96 (d, *J*=8.8 Hz, 2H, ArH), 6.88 (d, *J*=8.4 Hz, 2H, ArH), 5.23~5.38 (m, 2H, OCOCH₂), 5.07~5.10 (m, 2H, OCOCH₂), 4.91 (s, 1H, 7 β -H), 4.61~4.66 (m, 1H, 3 β -H), 3.84 (s, 3H, ArOCH₃), 3.80 (s, 3H, ArOCH₃), 3.68 (s, 3H, COOCH₃), 0.89 (s, 3H, 19-CH₃), 0.84 (d, *J*=6.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 0.59 (s, 3H, 18-CH₃); IR (KBr) ν : 2943, 2869, 1736, 1618, 1561, 1500, 1459, 1364, 1249, 1226, 1175, 1032, 836 cm⁻¹; ESI-MS *m/z* (%): 837 [(M+H)⁺, 100]. Anal. calcd for C₄₇H₆₀N₆O₈: C 67.44, H 7.23, N 10.04; found C 67.40, H 7.21, N 10.07.

分子钳 **5d**: 白色固体, 产率 84%. m.p. 117~119 °C; $[\alpha]_D^{20}$ -66.4 (*c* 0.13, CH₂Cl₂); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.12 (s, 1H, triazole-H), 7.80 (s, 1H, triazole-H), 7.10~7.28 (m, 6H, ArH), 6.69 (d, *J*=7.2 Hz, 1H, ArH), 6.62 (d, *J*=7.2 Hz, 1H, ArH), 5.23~5.38 (m, 2H, OCOCH₂), 5.01~5.10 (m, 2H, OCOCH₂), 4.89 (s, 1H, 7 β -H), 4.61~4.66 (m, 1H, 3 β -H), 3.68 (s, 3H, COOCH₃), 0.88 (s, 3H, 19-CH₃), 0.84 (d, *J*=6.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 0.58 (s, 3H, 18-CH₃); IR (KBr) ν : 3449, 3370, 2942, 2869, 1736, 1619, 1591, 1458, 1433, 1364, 1274, 1224, 1139, 1045, 783 cm⁻¹; ESI-MS *m/z* (%): 935 [(M+H)⁺, 100].

Anal. calcd for $C_{45}H_{54}Br_2N_6O_6$: C 57.82, H 5.82, N 8.99; found C 57.73, H 5.84, N 9.02.

分子钳 **5e**: 白色固体, 产率 87%. m.p. 110~112 °C. $[\alpha]_D^{20} -59.7$ (*c* 0.16, CH_2Cl_2); 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 8.18 (s, 1H, triazole-H), 7.86 (s, 1H, triazole-H), 7.66~7.71 (m, 4H, ArH), 7.56 (d, *J*=8.4 Hz, 2H, ArH), 7.47 (d, *J*=8.4 Hz, 2H, ArH), 5.25~5.41 (m, 2H, $OCOCH_2$), 5.05~5.17 (m, 2H, $OCOCH_2$), 4.91 (s, 1H, 7 β -H), 4.62~4.67 (m, 1H, 3 β -H), 3.69 (s, 3H, $COOCH_3$), 2.40 (s, 3H, Ar-CH₃), 2.38 (s, 3H, Ar-CH₃), 0.89 (s, 3H, 19-CH₃), 0.85 (d, *J*=6.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 0.59 (s, 3H, 18-CH₃); IR (KBr) ν : 2944, 2869, 1737, 1459, 1271, 1226, 1139, 1068, 1010, 974 cm^{-1} ; ESI-MS *m/z* (%): 805 [(M+H)⁺, 100]. Anal. calcd for $C_{47}H_{60}N_6O_6$: C 70.12, H 7.51, N 10.44; found C 70.21, H 7.53, N 10.40.

分子钳 **5f**: 白色固体, 产率 91%. m.p. 159~161 °C; $[\alpha]_D^{20} -83.7$ (*c* 0.19, CH_2Cl_2); 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 8.14 (s, 1H, triazole-H), 7.84 (s, 1H, triazole-H), 7.77~7.83 (m, 4H, ArH), 7.13 (t, *J*=8.6 Hz, 2H, ArH), 7.05 (t, *J*=8.6 Hz, 2H, ArH), 5.25~5.41 (m, 2H, $OCOCH_2$), 5.06~5.18 (m, 2H, $OCOCH_2$), 4.92 (s, 1H, 7 β -H), 4.62~4.68 (m, 1H, 3 β -H), 3.69 (s, 3H, $COOCH_3$), 0.90 (s, 3H, 19-CH₃), 0.85 (d, *J*=6.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 0.60 (s, 3H, 18-CH₃); IR (KBr) ν : 2945, 2869, 1741, 1561, 1499, 1460, 1362, 1275, 1223, 1158, 1045, 977, 842, 795 cm^{-1} ; ESI-MS *m/z* (%): 845 [(M+H)⁺, 100]. Anal. calcd for $C_{45}H_{54}Cl_2N_6O_6$: C 63.90, H 6.43, N 9.94; found C 63.98, H 6.41, N 9.97.

分子钳 **5g**: 白色固体, 产率 92%. m.p. 100~102 °C; $[\alpha]_D^{20} -156.3$ (*c* 0.16, CH_2Cl_2); 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 8.16 (s, 1H, triazole-H), 7.80 (s, 1H, triazole-H), 7.72~7.76 (m, 4H, ArH), 7.26~7.28 (m, 2H, ArH), 7.18 (d, *J*=8.0 Hz, 2H, ArH), 5.23~5.39 (m, 2H, $OCOCH_2$), 5.02~5.13 (m, 2H, $OCOCH_2$), 4.92 (s, 1H, 7 β -H), 4.60~4.66 (m, 1H, 3 β -H), 3.69 (s, 3H, $COOCH_3$), 2.61~2.71 (m, 4H, Ar-CH₂×2), 1.22~1.28 (m, 6H, Ar-CH₂CH₃×2), 0.88 (s, 3H, 19-CH₃), 0.82 (d, *J*=6.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 0.59 (s, 3H, 18-CH₃); IR (KBr) ν : 2945, 2869, 1741, 1487, 1459, 1272, 1221, 1093, 1044, 976 cm^{-1} ; ESI-MS *m/z* (%): 833 [(M+H)⁺, 100]. Anal. calcd for $C_{49}H_{64}Cl_2N_6O_6$: C 70.65, H 7.74, N 10.09; found C 70.55, H 7.71, N 10.12.

分子钳 **5h**: 白色固体, 产率 88%. m.p. 98~100 °C; $[\alpha]_D^{20} -56.3$ (*c* 0.21, CH_2Cl_2); 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 8.13 (s, 1H, triazole-H), 7.80 (s, 1H, triazole-H), 7.71 (t, *J*=8.6 Hz, 4H, ArH), 7.24 (d, *J*=7.6 Hz, 2H,

ArH), 7.16 (d, *J*=7.6 Hz, 2H, ArH), 5.23~5.39 (m, 2H, $OCOCH_2$), 5.01~5.14 (m, 2H, $OCOCH_2$), 4.91 (s, 1H, 7 β -H), 4.60~4.66 (m, 1H, 3 β -H), 3.68 (s, 3H, $COOCH_3$), 2.39 (s, 3H, Ar-CH₃), 2.34 (s, 3H, Ar-CH₃), 0.88 (s, 3H, 19-CH₃), 0.84 (d, *J*=6.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 0.59 (s, 3H, 18-CH₃); IR (KBr) ν : 2943, 2868, 1741, 1459, 1379, 1362, 1274, 1215, 1138, 1044, 972 cm^{-1} ; ESI-MS *m/z* (%): 813 [(M+H)⁺, 100]. Anal. calcd for $C_{45}H_{54}F_2N_6O_6$: C 66.48, H 6.70, N 10.34; found C 66.38, H 6.730, N 10.31.

分子钳 **5i**: 白色固体, 产率 87%. m.p. 94~96 °C; $[\alpha]_D^{20} -86.6$ (*c* 0.19, CH_2Cl_2); 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 8.16 (s, 1H, triazole-H), 7.80 (s, 1H, triazole-H), 7.74 (t, *J*=8.6 Hz, 4H, ArH), 7.24 (d, *J*=8 Hz, 2H, ArH), 7.16 (d, *J*=8 Hz, 2H, ArH), 5.23~5.39 (m, 2H, $OCOCH_2$), 5.02~5.13 (m, 2H, $OCOCH_2$), 4.91 (s, 1H, 7 β -H), 4.62~4.64 (m, 1H, 3 β -H), 3.68 (s, 3H, $COOCH_3$), 2.56~2.64 (m, 4H, Ar-CH₂×2), 1.65~1.69 (m, 4H, Ar-CH₂CH₂×2), 0.93~1.04 (m, 6H, ArC₂H₄CH₃×2), 0.88 (s, 3H, 19-CH₃), 0.83 (d, *J*=6.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 0.58 (s, 3H, 18-CH₃); IR (KBr) ν : 2955, 2870, 1741, 1460, 1379, 1363, 1275, 1227, 1044, 976 cm^{-1} ; ESI-MS *m/z* (%): 861 [(M+H)⁺, 100]. Anal. calcd for $C_{51}H_{68}N_6O_6$: C 71.13, H 7.96, N 9.76; found C 71.08, H 7.94, N 9.74.

分子钳 **5j**: 黄色固体, 产率 89%. m.p. 138~140 °C; $[\alpha]_D^{20} -30.3$ (*c* 0.15, CH_2Cl_2); 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 8.31 (s, 1H, triazole-H), 8.30 (s, 1H, triazole-H), 8.28 (s, 1H, ArH), 8.25 (s, 1H, ArH), 8.23 (s, 1H, ArH), 8.07 (s, 1H, ArH), 7.99~8.02 (m, 4H, ArH), 5.14~5.46 (m, 4H, $OCOCH_2$ ×2), 4.96 (s, 1H, 7 β -H), 4.65~4.71 (m, 1H, 3 β -H), 3.68 (s, 3H, $COOCH_3$), 0.91 (s, 3H, 19-CH₃), 0.85 (d, *J*=6.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 0.61 (s, 3H, 18-CH₃); IR (KBr) ν : 2944, 2869, 1742, 1607, 1521, 1460, 1337, 1222, 1110, 1044, 976, 853, 756 cm^{-1} ; ESI-MS *m/z* (%): 889 [(M+Na)⁺, 100]. Anal. calcd for $C_{45}H_{54}N_8O_{10}$: C 62.34, H 6.28, N 12.92; found C 62.28, H 6.26, N 12.88.

分子钳 **5k**: 黄色固体, 产率 92%. m.p. 90~92 °C; $[\alpha]_D^{20} -168.2$ (*c* 0.14, CH_2Cl_2); 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 10.45 (s, 2H, CHO×2), 8.08 (s, 1H, triazole-H), 7.86 (s, 1H, triazole-H), 7.81~7.84 (m, 2H, ArH), 7.53~7.58 (m, 2H, ArH), 7.14~7.20 (m, 2H, ArH), 7.04~7.09 (m, 2H, ArH), 5.15~5.45 (m, 8H, OCH₂×2, $OCOCH_2$ ×2), 4.99 (s, 1H, 7 β -H), 4.59~4.64 (m, 1H, 3 β -H), 3.67 (s, 3H, $COOCH_3$), 0.91 (s, 3H, 19-CH₃), 0.89 (d, *J*=8.4 Hz, 3H, 21-CH₃), 0.63 (s, 3H, 18-CH₃); IR (KBr) ν : 2945, 2869, 1740, 1690, 1594, 1478, 1458, 1288, 1213, 1163,

1047, 993, 761 cm^{-1} ; ESI-MS m/z (%): 915 $[(M+Na)^+]$, 100]. Anal. calcd for $C_{49}H_{60}N_6O_{10}$: C 65.90, H 6.77, N 9.41; found C 65.79, H 6.79, N 9.43.

分子钳 **5l**: 黄色固体, 产率 89%. m.p. 103~105 $^{\circ}\text{C}$, $[\alpha]_D^{20}$ -49.2 (c 0.12, CH_2Cl_2); ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 10.87 (s, 1H, CHO), 10.85 (s, 1H, CHO), 9.21 (s, 1H, ArH), 9.19 (s, 1H, ArH), 8.10 (s, 1H, triazole-H), 7.98~8.01 (m, 2H, ArH), 7.83 (s, 1H, triazole-H), 7.73 (d, $J=8.4$ Hz, 2H, ArH), 7.58~7.62 (m, 2H, ArH), 7.36~7.43 (m, 4H, ArH), 5.18~5.45 (m, 8H, $\text{OCH}_2 \times 2$, $\text{OCOCH}_2 \times 2$), 4.97 (s, 1H, 7 β -H), 4.64~4.67 (m, 1H, 3 β -H), 3.66 (s, 3H, COOCH_3), 0.89 (s, 3H, 19- CH_3), 0.86 (d, $J=6$ Hz, 3H, 21- CH_3), 0.61 (s, 3H, 18- CH_3); IR (KBr) ν : 2943, 2871, 1736, 1619, 1591, 1510, 1460, 1437, 1365, 1342, 1269, 1213, 1154, 1048, 1019, 814 cm^{-1} ; ESI-MS m/z (%): 1015 $[(M+Na)^+]$, 100]. Anal. calcd for $C_{57}H_{64}N_6O_{10}$: C 68.93, H 6.50, N 8.46; found C 68.84, H 6.48, N 8.42.

1.4 识别性能测试

以氯仿-甲醇混合液作溶剂, 固定主体分子钳的浓度在 $1 \times 10^{-5} \sim 10 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 之间(由主体摩尔消光系数的大小决定所配溶液浓度的大小), 不断加入客体分子, 其浓度在 $10^{-4} \sim 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 间变化, 测定各组配合物溶液的吸光度值, 为消除客体化合物在紫外区的干扰, 采用相同浓度的客体氯仿液作参比, 同时为排除体积变化对吸光度的影响, 主体中加入客体化合物的总体积不超过 100 μL . 测定温度控制在 $(25 \pm 0.1) ^{\circ}\text{C}$.

2 结果与讨论

2.1 目标分子钳的合成

在 Click reaction 这一步, 我们以钳形受体 **5a** 的合成例, 详细考察了溶剂、温度以及催化剂浓度等对反应的影响, 其结果如表 1、表 2 和表 3 所示.

表 1 溶剂对分子钳 **5a** 产率的影响

Table 1 The effect of solvent on the yields of compound **5a**

溶剂	温度/ $^{\circ}\text{C}$	产率 $a/\%$
DMSO	50	33
DMF	50	38
THF	50	45
<i>t</i> -BuOH	50	93

a 分离纯化的产率.

由表 1 和表 2 可以看出, 选用 *t*-BuOH 作为溶剂, 在 50 $^{\circ}\text{C}$ 反应, 反应产率最高. 由表 3 可以看出, 当催化剂为 10 mol% 的 CuI 和 40 mol% 的 Et_3N 时, 产率最高. 反应时间对产率的影响也非常明显, 整个实验过程通过

表 2 温度对分子钳 **5a** 产率的影响

Table 2 The effect of temperature on the yields of compound **5a**

溶剂	温度/ $^{\circ}\text{C}$	产率 $b/\%$
<i>t</i> -BuOH	0	30
<i>t</i> -BuOH	25	61
<i>t</i> -BuOH	50	93
<i>t</i> -BuOH	75	79

b 分离纯化的产率.

表 3 催化剂浓度对分子钳 **5a** 产率的影响

Table 3 The effect of concentration of catalysts on the yields of compound **5a**

催化剂/mol%		产率 $c/\%$
CuI	Et_3N	
10	0	<10
10	20	55
10	40	93
10	60	83
0	40	<10
5	40	62
15	40	85

c 分离纯化的产率.

TLC 监测, 发现时间过短, 反应不够完全, 不仅产率很低而且副产物比较多. 综合上述实验结果找到了合成目标物的最佳条件是: *t*-BuOH 为溶剂, 40 mol% 三乙胺, 10 mol% CuI, 在 50 $^{\circ}\text{C}$, 油浴加热反应 10~30 h.

2.2 目标物 **5a**~**5l** 的结构确证

目标物 **5a**~**5j**: 在 ^1H NMR 谱图中, δ 8.32~7.77 ppm 为三唑环上的 C—H 的化学位移, 而且其质子数为两个, 与连接在两个手臂上的三唑环上的碳氢质子数相符合, δ 8.28~6.62 左右的多重峰为桥联在两手臂上芳环的化学位移; 在 IR 谱图中, 在 1700 cm^{-1} 附近出现甲酯羰基($\text{C}=\text{O}$)的伸缩振动吸收峰; 从质谱图中可见, 所有目标化合物均能给出分子离子峰, 其 m/z 与相应分子式的分子量是一致的. 元素分析结果表明, 所有化合物的组成与其实验式相符. 目标物 **5k**, **5l**: 在 ^1H NMR 谱图中, δ 10.87~10.45 的单峰为芳环上的醛基结构, 其质子数与结构一致, δ 8.10~7.83 的单峰为三唑环上的 C—H 的化学位移, 而且其质子数为两个, 与连接在两个手臂上的三唑环上的碳氢质子数相符合, δ 7.84~7.04 的多重峰为桥联在两手臂上芳环的化学位移. 综上所述, 化合物 **5a**~**5l** 所有光谱和元素分析数据与其结构式符合, 表明所合成的化合物为目标化合物.

2.3 主客体配合物的形成及其化学计量

在紫外光谱滴定实验中, 固定主体分子钳(H)浓度, 向主体溶液中不断加入不同浓度的客体阳离子(G)溶液, 随着客体阳离子的不断加入, 主体生色团的最大吸收呈

规律性下降,表明主客体分子之间并发生了识别配合作用(图1)。由图2的Job's plot可知,主体分子钳**5k**与客体阳离子形成配合物的配合比例是1:1。对所考察的客体阳离子,根据Hildebrand-Benesi^[23]方程(1),如若主体与客体之间形成了1:1型超分子配合物,则 $1/\Delta A$ 对 $1/[G]_0$ 作图,给出良好的线性关系。由图3良好的线性关系可得知,被考察的分子钳**5k**与客体金属阳离子形成了1:1型超分子配合物。由直线的截距和斜率所得的数据可计算出配合物的结合常数(K_a)和自由能变化($-\Delta G^0$)。所考察的主体分子钳**5a**, **5h**, **5k**, **5l**的结合常数(K_a)和自由能变化($-\Delta G^0$)见表4。

$$\frac{1}{\Delta A} = \frac{1}{\alpha K_a [G]_0} + \frac{1}{\alpha} \quad (1)$$

图1 分子钳**5k** ($2.4 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)中加入汞离子的紫外光谱变化图

Figure 1 UV-Vis spectra of molecular tweezer **5k** ($2.4 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) in the presence of Hg^{2+} (a) 0; (b) 3.20×10^{-5} ; (c) 4.80×10^{-5} ; (d) 6.40×10^{-5} ; (e) 8.00×10^{-5} ; (f) 9.60×10^{-5} ; (g) 11.20×10^{-5} ; (h) $12.80 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Hg}^{2+}$ with λ_{max} at 254.0 nm

图2 分子钳**5k**与汞离子形成1:1型配合物的工作曲线
Figure 2 Job' plot showing 1:1 complex formation for compound **5k** and Hg^{2+}

由表4可看出,这类主体对所考察的阳离子具有良好的识别能力,主体与底物间形成了1:1型超分子配合物,主客体在金属配合作用力、 π - π stacking作用等非

图3 25 °C时,在 CHCl_3 - CH_3OH 中,分子钳**5k**与 Hg^{2+} 形成1:1配合物的 $1/\Delta A$ 对 $1/[G]_0$ 作图

Figure 3 Typical plot of $1/\Delta A$ versus $1/[G]_0$ for the 1:1 inclusion complex of molecular tweezer **5k** with Hg^{2+} in $\text{CHCl}_3/\text{CH}_3\text{OH}$ at 25 °C

表4 25 °C下分子钳**5a**, **5h**, **5k**, **5l**与阳离子形成包结配合物的结合常数(K_a)和自由能变化($-\Delta G^0$)

Table 4 Association constants (K_a) and Gibbs free energy changes ($-\Delta G^0$) for the inclusion complexes of cations with molecular tweezers **5a**, **5h**, **5k**, **5l** in $\text{CHCl}_3/\text{CH}_3\text{OH}$ ($V:V=7:2$) at 25 °C

Host	Guest	$K_a/(\text{L} \cdot \text{mol}^{-1})$	$-\Delta G^0/(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$
5a	Hg^{2+}	896.521	16.82
	Cu^{2+}	281.633	13.95
	Mg^{2+}	106.203	11.54
	Pb^{2+}	512.411	15.43
5h	Hg^{2+}	3761.06	20.40
	Cu^{2+}	424.063	14.99
	Mg^{2+}	539.343	15.58
	Pb^{2+}	107.032	11.58
5k	Hg^{2+}	8328.08	22.37
	Cu^{2+}	434.191	15.05
	Mg^{2+}	2524.97	19.41
	Pb^{2+}	626.964	15.96
5l	Hg^{2+}	6565.87	21.78
	Cu^{2+}	462.512	15.20
	Mg^{2+}	27.2301	8.890
	Pb^{2+}	139.532	12.23

共价键力的协同作用下进行识别配合。其次,上述分子钳受体对所考察的阳离子的识别性能具有一定的相似性,被考察的分子钳受体对汞离子的识别效果好于对其他阳离子的识别效果。这可能由于这些钳形受体与汞离子在尺寸、形状上的匹配比其它金属阳离子匹配好,故对汞离子显示出了更好的选择性。分子钳对客体所表现出的不同程度的识别效果,表明了受体的微环境不同,可造成其对客体识别能力的差异。

2.4 计算机分子模拟

我们利用计算机 Chem 3D 程序模拟研究了主客体间的配合作用,以期得到主客体发生配合作用时的构象.经分子模拟,表明受体 **5a**~**5l** 具有多种构象异构体.以受体 **5k** 为例,当其处于最低能量构象时,受体的钳形构象如图 4 所示,图 5 是它与客体汞离子配合物的最低能量构象.从图 5 中可看出,汞离子能较好的嵌入主体裂穴,诱导其产生配合作用.

图 4 分子钳 **5k** 的最低能量构象

Figure 4 Minimum energy conformation of molecular tweezer **5k**

图 5 分子钳 **5k** 与汞离子配合物的最低能量构象

Figure 5 Minimum energy conformation for the inclusion complex of molecular tweezer **5k** with Hg^{2+}

2.5 ^1H NMR 研究

以 $\text{CDCl}_3/\text{CD}_3\text{OD}$ ($V:V=7:2$) 作溶剂,配制浓度为 $1 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 左右的主体分子钳溶液,进行核磁谱图的第一次测定.测定完后,加入与主体分子钳等质量的客体分子,轻轻震荡,使主客体充分络合.放置一段时间后,在同一条件下,进行磁谱图的第二次测定.最后对比两次谱图的变化(主客体在配合前后的化学位移变化).我们通过主客体作用前后化学位移值的变化,从而了解主体与客体分子发生作用的位置.图 6 为分子钳 **5k** 与汞离子配合前后的核磁对比图.

从表 5 中可看出, Hg^{2+} 对主体 **5k** 的核磁的影响.识别作用前,主体分子钳 **5k** 中三唑环结构中的碳氢质子 (CH) 的核磁化学位移值分别为 δ 8.076, 7.856. 配合后,

图 6 分子钳 **5k** (A) 和 **5k** 与汞离子形成的配合物 (B) 的核磁对比图

Figure 6 Nuclear magnetic resonance spectra of **5k** (A) and complex **5k**· Hg^{2+} (B)

化学位移值分别为 δ 8.744, 8.690, 分别向低场移动 δ 0.6680, 0.8340, 分子钳 **5k** 中的双醛羰基 (CHO) 分别向高场移动 δ 0.2000, 0.2500. 这充分说明主体 **5k** 与客体 Hg^{2+} 之间发生了配合作用. 主体结构中的三唑环和醛羰基共同与客体形成配位共价键, 促使主客体之间达到了很好的识别效果.

表 5 分子钳 **5k** 与汞离子形成配合物前后的部分核磁数据对比图

Table 5 Nuclear magnetic resonance spectra data for the complex of host **5k** with Hg^{2+}

Proton	Host δ	Complex δ	$\Delta\delta_{\text{H}} = \delta(\text{complex}) - \delta(\text{host})$
Triazole-H	8.076	8.744	0.6680
Triazole-H	7.856	8.690	0.8340
CHO	10.45	10.25	-0.2000
CHO	10.45	10.20	-0.2500

3 结论

利用点击化学, 设计合成了 12 个新的含有 1,2,3-三唑结构的鹅去氧胆酸类分子钳人工受体. 通过紫外滴定法以及核磁法我们考察了这种钳形人工受体对阳离子的识别配合性能. 结果表明, 这类受体对金属阳离子具有很好的识别能力. 特别是分子钳 **5k**, **5l** 对 Hg^{2+} 有优良的选择性识别能力, 最大结合常数可达 $8328.08 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$. 同时, 具有不同的取代基的手臂的同类型分子钳受体对金属离子的识别能力也是有差异的. 这种由于主体手臂芳环取代基的位置变化所造成的微环境效应对识别性能的影响, 不仅在理论上对研究人工受体的设计合成和微环境效应具有重要意义, 而且使其在化学传感器领域中具有潜在的应用前景.

References

- [1] Clarkson, T. W. *Am. J. Clin. Nutr.* **1995**, *61*, 682.
- [2] Tchounwou, P. B.; Ayensu, W. K.; Ninashvili, N.; Sutton, D.; En-

- viron. Toxicol. **2003**, 18, 149.
- [3] An, L.; Cai, Y. H.; Yan, C. G. *Chin. J. Appl. Chem.* **2005**, 22, 980 (in Chinese).
(安琳, 蔡亚华, 颜朝国, 应用化学, **2005**, 22, 980.)
- [4] Silva, A. P. de; Gunaratne, H. Q. N.; Gunnlaugsson, T.; Huxley, A. J. M.; McCoy, C. P.; Rademacher, J. T.; Rice, T. E. *Chem. Rev.* **1997**, 97, 1515.
- [5] Kolb, H. C.; Finn, M. G.; Sharpless, K. B. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2001**, 40, 2004.
- [6] Demko, Z. P.; Sharpless, K. B. *Angew. Chem., Int. Ed.*, **2002**, 41, 2110.
- [7] Lewis, W. G.; Green, L. G.; Grynszpan, F.; Radic, Z.; Carlier, P. R.; Taylor, P.; Finn, M. G.; Sharpless, K. B. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2002**, 41, 1053.
- [8] Schweinfurth, D.; Hardcastle, K. L.; Bunz, U. H. F. *Chem. Commun.* **2008**, 1053.
- [9] Barreto, A. de F. S.; Vercillo, O. E.; Birkett, M. A.; Caulfield, J. C.; Wessjohann, L. A.; Andrade, C. K. Z. *Org. Biomol. Chem.* **2011**, 9, 5024.
- [10] Cecioni, S.; Faure, S.; Darbost, U.; Bonnamour, I.; Parrot-Lopez, H.; Roy, O.; TAILLEFUMIER, C.; Wimmerova, M.; Praly, J.-P.; Imbert, A.; Vidal, S. *Chem. Eur. J.* **2011**, 17, 2146.
- [11] Maeda, C.; Yamaguchi, S.; Ikeda, C.; Shinokubo, H.; Osaka, A. *Org. Lett.* **2008**, 10, 549.
- [12] Wang, J.; He, X.; Gao, L.; Sheng, L.; Shi, X.; Li, J.; Chen, G. *Chin. J. Chem.* **2011**, 29, 1227.
- [13] Fazio, M. A.; Lee, O. P.; Schuster, D. I. *Org. Lett.* **2008**, 10, 4979.
- [14] Lowe, A. J.; Long, B. M.; Pfeffer, F. M. *Chem. Commun.* **2013**, 49, 3376.
- [15] Oh, H.; Han, S. K.; Kim, B. H. *Heteroat. Chem.* **2012**, 23, 187.
- [16] Hu, J.; Lu, J. R.; Ju, Y. *Chem. Asian J.* **2011**, 6, 2636.
- [17] Verzele, D.; Madder, A. *Eur. J. Org. Chem.* **2013**, 673.
- [18] Jadhav, J. R.; Bae, C. H.; Kim, H. S. *Tetrahedron Lett.* **2011**, 52, 1623.
- [19] Li, W. N.; Xu, Q.; Li, Y.; Zhu, W.; Cui, J. C.; Ju, Y.; Li, G. T. *Tetrahedron Lett.* **2013**, 54, 3868.
- [20] Li, D. Z.; Yang, Y. X.; Yang, C.; Hu, B. W.; Huo, B. L.; Xue, L. W.; Wang, A. Z. *Tetrahedron* **2014**, 70, 1223.
- [21] Hu, J.; Zhang, M.; Yu, L. B.; Ju, Y. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2010**, 20, 4342.
- [22] Kumar, A.; Pandey, P. S. *Tetrahedron Lett.* **2009**, 50, 5842.
- [23] Benesi, H. A.; Hildebrand, J. H. *J. Am. Chem. Soc.* **1949**, 71, 2703.

(Qin, X.)