亲电碘环化反应合成双碘代苯并吡喃衍生物和双碘代
1,2-二氢喹啉衍生物罗倩^{a,b} 谢永新^{*,a} 陈朝阳^{*,a} 闫世友^a 邓文叶^a
刘义^{a,b} 王璐璐^a^(a) 中国科学院特殊环境功能材料与器件重点实验室 新疆电子信息材料与器件重点实验室
中国科学院新疆理化技术研究所 乌鲁木齐 830011)^(b) 中国科学院大学 北京 100049)**摘要** 采用不同取代的二苯醚二炔化合物及 *N*-磺酰基取代的苯胺二炔为底物, 以 ICl 为亲电试剂, 在温和条件下通过亲电碘环化能快速实现一系列双碘代苯并吡喃衍生物及双碘代 1,2-二氢喹啉衍生物的合成; 该反应操作简单、条件温和、收率良好, 产物结构经 NMR, IR 及 MS 分析数据得以证实。**关键词** 二炔二醚; 亲电碘环化; 1,2-二氢喹啉; 苯并吡喃Synthesis of Bis(iodo-benzopyran) Derivatives and Bis(iodo-2*H*-quinoline) Derivatives by Electrophilic CyclizationLuo, Qian^{a,b} Xie, Yongxin^{*,a} Chen, Zhaoyang^{*,a} Yan, Shiyu^a
Deng, Wenye^a Liu, Yi^{a,b} Wang, Lulu^a^(a) Key Laboratory of Functional Materials and Devices for Special Environments of Chinese Academy of Sciences,
Xinjiang Key Laboratory of Electronic Information Materials and Devices; Xinjiang Technical Institute of
Physics & Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011)^(b) Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049)**Abstract** Electrophilic cyclization was developed from the reaction of diyne diethers and *N*-sulfonyl substituted anilines with ICl under mild conditions, which produced bis(iodo-benzopyran) derivatives and bis(iodo-2*H*-quinoline) derivatives fastly in good yields. All of above compounds have been confirmed by NMR, IR and MS analysis.**Keywords** diyne diethers; electrophilic cyclization; 2*H*-quinoline; benzopyran

环化反应和环状化合物的合成一直是化学家们的研究热点, 它的合成方法多种多样, 如过渡金属催化的环化反应就是构建复杂杂环化合物非常直接有效的方法之一^[1]. 2012 年, Mo 等^[2]报道了使用金催化二炔二醚一锅法合成二苯并吡喃环结构的化合物(Eq. 1).

然而, 过渡金属催化的环化反应并不适用所有的杂环化合物的合成, 同时, 昂贵的过渡金属也会增加反应成本. 近年来, 因为碘具有较好的亲电性而备受人们关注, 关于碘环化反应的热点更是致力于碘的炔基活化反应^[3]. 许多重要的杂环化合物, 例如苯并噻吩类^[4]、呋喃

和苯并呋喃类^[5]、吡咯类^[6]、吲哚类^[7]、香豆素和吡喃酮类^[8]、喹啉和异喹啉类^[9]等化合物的报道均用这种方法合成. 2013 年, Mo 和 Lee 等^[10]基于其前期研究, 采用亲电试剂 ICl 取代过渡金属金来催化二炔二醚合成二苯并

* E-mail: xieyx@ms.xjb.ac.cn; czy@ms.xjb.ac.cn

Received February 16, 2014; revised May 1, 2014; published online August 11, 2014.

Project supported by the Natural Science Foundation of Xinjiang Uygur Autonomous Region of China (No.2013211A052).

新疆维吾尔自治区自然科学基金(No. 2013211A052)资助项目.

吡喃环结构的化合物, 并获得了理想的试验结果. 越来越多新的碳碳键方法的出现, 被有效地应用于复杂分子结构的合成中, 成为化学合成中活跃的研究领域, 碘环化反应为杂环化合物的合成提供了有效的方法^[11]. 基于此方法, 本文采用不同取代的二苯醚己二炔或苯胺己二炔作原料, 以 ICl 作为亲电试剂在一定条件下合成了更多的、一系列碘代苯并吡喃衍生物和碘代二氢喹啉衍生物.

1 结果与讨论

1.1 反应体系的优化

以 1,6-二苯氧基-2,4-己二炔为底物, 通过改变亲电试剂 (I₂, NIS, ICl)、碱 (NaHCO₃, K₂CO₃, KOBu-*t*, Cs₂CO₃)、溶剂 (CH₂Cl₂, THF) 和反应时间, 对反应条件进行了筛选. 结果见表 1.

表 1 反应条件筛选^a

Table 1 Optimization of reaction conditions

序号	亲电试剂	碱	溶剂	时间/h	产率 ^b /%
1	I ₂ (2 equiv.)	NaHCO ₃ (2 equiv.)	THF	24	0
2	I ₂ (2 equiv.)	K ₂ CO ₃ (2 equiv.)	THF	24	0
3	I ₂ (2 equiv.)	KOBu- <i>t</i> (2 equiv.)	THF	24	0
4	NIS (2 equiv.)	NaHCO ₃ (2 equiv.)	CH ₂ Cl ₂	24	0
5	NIS (2 equiv.)	K ₂ CO ₃ (2 equiv.)	CH ₂ Cl ₂	24	0
6	NIS (2 equiv.)	KOBu- <i>t</i> (2 equiv.)	CH ₂ Cl ₂	24	0
7	ICl (2 equiv.)	NaHCO ₃ (2 equiv.)	CH ₂ Cl ₂	0.5	86
8	ICl (2 equiv.)	KOBu- <i>t</i> (2 equiv.)	CH ₂ Cl ₂	0.5	65
9	ICl (2 equiv.)	K ₂ CO ₃ (2 equiv.)	CH ₂ Cl ₂	0.5	34
10	ICl (2 equiv.)	Cs ₂ CO ₃ (2 equiv.)	CH ₂ Cl ₂	0.5	28
11	ICl (2 equiv.)		CH ₂ Cl ₂	0.5	88
12	ICl (5 equiv.)		CH ₂ Cl ₂	0.5	14

^a除非特别指出, 所有反应均在室温下以 0.25 mmol **1a**、2 mL 溶剂为标准条件下进行; ^b 反应产率均为柱层析分离产率.

通过表 1 可知, 当使用 I₂ 作亲电试剂, 四氢呋喃 (THF) 作溶剂, NaHCO₃ 作碱, 室温反应 24 h, 没有得到产物. 我们在亲电试剂和溶剂不变的情况下改变碱, 其结果一样没有产物 (表 1, 序号 1~3); 我们选择 NIS 参与反应, 在溶剂 CH₂Cl₂ 下, 分别加入碱 NaHCO₃, K₂CO₃, KOBu-*t*, 室温下反应, 然而, 反应 24 h 后仍然未得到产物; 当选择活性较高的 ICl 为亲电试剂, NaHCO₃ 作碱, CH₂Cl₂ 为溶剂的实验条件, 反应在室温下 1 min 之内就得到了产率为 86% 的产物 (表 1, 序号 7); 随后, 我们又考察了碱对反应的影响, 当使用更强的碱时, 发现产物的产率反而降低, 在没有碱参与的使用条件下, 产物产

率达到 88% (表 1、序号 11), 可能由于少量的酸对反应并没有影响, 而过量的碱的存在对产物的稳定性有影响, 降低产物产率; 最后我们尝试提高亲电试剂 ICl 的用量, 研究亲电试剂用量对反应的影响, 结果表明, 当加入 5 equiv. 的 ICl 时, 产率只有 14%, 分析可能原因是由于 ICl 过量, 过量的高活性的 ICl 导致了产物分解. 因此, 优化后的该反应条件选择: 2 equiv. 的 ICl、溶剂 CH₂Cl₂、室温下反应 60 s 内不等.

1.2 反应底物的选择

通过对反应体系的选择, 得到了较优的反应体系. 下一步我们在最优化的反应条件下, 将反应物扩大, 选择不同的二炔化合物合成双碘代苯并吡喃衍生物和双碘代 1,2-二氢喹啉衍生物, 试验结果如表 2.

在较优的反应条件下, 采用不同取代的二苯醚己二炔或苯胺己二炔作原料, 合成了一系列的双碘代苯并吡喃衍生物和双碘代二氢喹啉衍生物 (表 2, 序号 1~15) 来检验该反应体系的兼容性. 通过表 2 可以看出, 大部分反应在短时间内否可以完成. 具有给电子效应的取代基如 4-甲基苯氧基取代的己二炔的亲电环化产率可达 94% (表 2, 序号 2), 而其他给电子基团取代的己二炔亲电环化反应产率在 55%~80% 左右 (表 2, 序号 3~7). 由此我们分析, 电子效应对反应有一定的影响, 当给电子能力降低时, 反应产率升高. 根据以上, 采用含有酯基以及卤素基团的二苯醚己二炔化合物为原料考察吸电子基团对产物产率的影响 (表 2, 序号 8~12), 结果并未达到反应预期的规律. 此外, 我们还研究了以不同取代的苯胺己二炔为原料合成双碘代二氢喹啉衍生物. 由于 *N*-磺酰基取代的苯胺己二炔具有较高的极性以及 ICl 具有极高的活性, 反应需在低温下进行. 降低反应温度至 0 °C, 以二氯甲烷为溶剂, 发现 *N*-磺酰基取代的苯胺己二炔在 ICl 参与下成功的进行碘环化反应 (表 2, 序号 13~15).

2 反应机理

反应机理可能是: (1) 在 I⁺ 的进攻下, 碳碳叁键断裂形成环状碘鎓离子; (2) 与芳香环上的碳原子发生分子内的亲核反应形成双碘代苯并吡喃中间体和双碘代二氢喹啉中间体; (3) 最后脱去两分子的 HCl 得到产物 (图 1).

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

熔点测定仪: Stuart SMP-3 熔点测定仪; 核磁共振仪: Bruker Avance DPX300, CDCl₃ 或 DMSO-*d*₆ 为溶剂, TMS 为内标; 高分辨质谱仪 (HRMS): LCMS-IT-TOF; FTIR: BIO-RAD FTS165. 所有试剂均为市售分析纯,

表 2 亲电碘环化合成双碘代苯并吡喃衍生物和双碘代二氢喹啉衍生物

Table 2 Synthesis of polycyclic aromatic iodides by ICl-induced intramolecular cyclization

序号	产物	产率 ^a /%	序号	产物	产率 ^a /%
1		88	9		72
2		94	10		74
3		64	11		37
4		56	12		56
5		79	13 ^b		40
6		55	14 ^b		31
7		64	15 ^b		43

续表

序号	产物	产率 ^a /%	序号	产物	产率 ^a /%
8	8b	58			

^a 反应产率均为柱层析分离产率; ^b 反应在 0 °C 温度下进行。

图 1 反应机理

Figure 1 Proposed mechanism of cyclization

从 Alfa-Asear, J&K 或北京偶合科技有限公司购买, 无水四氢呋喃通过标准方法进行无水处理后使用, 其它试剂及溶剂使用前未经过纯化。

3.2 化合物的合成

3.2.1 1,6-二苯氧基-2,4-己二炔及其衍生物的合成

苯基炔丙基醚衍生物用 1 equiv. 的苯酚、1.5 equiv. 炔丙基和 2 equiv. 的碳酸钾在 *N,N*-二甲基甲酰胺(DMF) 溶剂中室温条件下反应制备, 然后在 50 mL 的烧瓶中加入苯基炔丙基醚衍生物(6 mmol), 4 mL DMF 溶解, 加入 30 mg CuCl (5 mol%), 0.1 mL 四甲基乙二胺和 1 mL 吡啶, 在氧气氛围中室温搅拌 6~12 h. 反应结束后加入 30 mL DMF, 然后用小的硅胶柱过滤除去催化剂, 滤液倾入 100 mL 的冰水中, 析出沉淀, 过滤, 用水洗涤, 真空干燥得到米黄色粉末物质^[4]。

3.2.2 双碘代苯并吡喃衍生物的合成

在 50 mL 的圆底烧瓶中加入 1,6-二苯氧基-2,4-己二炔衍生物(0.25 mmol), 2 mL CH₂Cl₂ 溶解, 再加入 ICl (0.5 mmol), 室温搅拌, 60 s 内反应结束, 0%~9% 二氯甲烷/石油醚硅胶柱层析纯化得双碘代苯并吡喃衍生物 **1b**~**12b**。

3,3'-二碘-2,2'-二氢-[4,4']苯并吡喃(**1b**): 黄色固体. m.p. 164~165 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 7.12 (t, *J*=12.0 Hz, 2H), 6.68~6.90 (m, 6H), 5.02 (s, 4H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 153.02, 140.18, 130.09, 125.10, 122.05, 120.88, 116.23, 93.33, 74.32; IR (KBr) ν: 3064, 2851, 1596, 1482, 1454, 1221, 1117, 1036, 561 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₁₈H₁₂I₂O₂ [M+H]⁺ 514.8927, found 514.8956.

3,3'-二碘-6,6'-二甲基-2,2'-二氢-[4,4']苯并吡喃(**2b**): 黄色固体. m.p. 173~174 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 6.92 (d, *J*=8.1, 1.3 Hz, 2H), 6.72 (d, *J*=8.2 Hz, 2H), 6.62 (d, *J*=1.1 Hz, 2H), 5.02~4.91 (m, 4H), 2.11 (s, 6H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 150.86, 140.37, 131.43, 130.62, 125.31, 120.82, 115.99, 93.54, 74.34, 20.77; IR (KBr) ν: 2925, 2857, 1609, 1459, 1378, 1219, 997, 816, 542 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₀H₁₆I₂O₂ [M+H]⁺ 542.9240, found 542.9228.

3,3'-二碘-8,8'-二甲基-2,2'-二氢-[4,4']苯并吡喃(**3b**): 黄色固体. m.p. 176~178 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 7.05 (d, *J*=7.3 Hz, 2H), 6.80~6.68 (m, 4H), 5.09 (d, *J*=3.7 Hz, 4H), 2.23 (s, 6H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 151.02, 140.69, 131.71, 125.65, 122.93, 121.36, 120.59, 92.91, 74.29, 15.65; IR (KBr) ν: 2923, 2853, 1604, 1584, 1460, 1260, 1214, 1003, 787, 561 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₀H₁₆I₂O₂ [M+H]⁺ 542.9240, found 542.9286.

3,3'-二碘-5,7,5',7'-四甲基-2,2'-二氢-[4,4']苯并吡喃(**4b**): 橙黄色固体. m.p. 72 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 6.56 (dd, *J*=34.5, 17.2 Hz, 4H), 4.81 (t, *J*=4.3 Hz, 4H), 2.37 (s, 6H), 2.16 (s, 6H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 154.84, 143.06, 139.97, 126.68, 123.33, 115.30, 113.61, 112.53, 74.80, 56.11, 22.73, 21.24; IR (KBr) ν: 3459, 2919, 1721, 1592, 1451, 1293, 1154, 1063, 828, 581 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd C₂₂H₂₀I₂O₂ [M+H]⁺ 570.9553, found 570.9616.

3,3'-二碘-6,6'-二乙基-2,2'-二氢-[4,4']苯并吡喃(**5b**):

黄色固体. m.p. 158~159 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.02 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 6.82 (d, $J=8.5$ Hz, 2H), 6.71 (s, 2H), 5.04 (d, $J=4.3$ Hz, 4H), 2.47 (q, $J=7.6$ Hz, 4H), 1.09 (t, $J=16$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 151.06, 140.54, 137.96, 129.28, 124.48, 120.96, 116.02, 93.33, 74.44, 28.07, 15.80; IR (KBr) ν : 2980, 2865, 1607, 1491, 1372, 1225, 1005, 820, 706, 563 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{I}_2\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 570.9553, found 570.9516.

3,3'-二碘-6,6'-二叔丁基-2,2'-二氢-[4,4']苯并吡喃(**6b**): 黄色固体. m.p. 145~146 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.24~7.07 (m, 2H), 6.78 (d, $J=18.3$, 5.2 Hz, 4H), 4.96 (s, 4H), 1.07 (s, 18H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 150.76, 144.68, 140.76, 126.72, 122.32, 120.70, 115.45, 92.65, 74.48, 34.07, 31.25; IR (KBr) ν : 1915, 1859, 1603, 1460, 1364, 1229, 1109, 999, 820, 569 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{28}\text{I}_2\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 627.0197, found 627.0111.

3,3'-二碘-2,2'-二氢-[4,4']联苯并吡喃(**7b**): 黄色固体. m.p. 146~148 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.14 (d, $J=8.7$ Hz, 2H), 7.85 (d, $J=12.0$ Hz, 4H), 7.19~7.32 (m, 6H), 4.96 (dd, $J=16.0$, 12.5 Hz, 4H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 153.58, 141.37, 131.08, 129.00, 128.47, 127.96, 125.71, 123.68, 122.90, 117.08, 116.64, 85.09, 74.22; IR (KBr) ν : 3052, 2925, 1590, 1511, 1459, 1383, 1229, 1015, 814, 749, 637 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{16}\text{I}_2\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 614.9240, found 614.9255.

3,3'-二碘-2,2'-二氢-[4,4']苯并吡喃-6,6'-二羧酸二乙酯(**8b**): 橙黄色固体. m.p. 64~66 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.75~8.15 (m, 2H), 7.67 (s, 1H), 7.06 (d, $J=8.5$ Hz, 2H), 6.87 (d, $J=4.5$ Hz, 1H), 5.23~4.08 (m, 4H), 4.35 (dd, $J=14.3$, 7.1 Hz, 4H), 1.29~1.46 (m, 6H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 167.0, 163.21, 148.5, 131.71, 131.61, 126.10, 116.38, 114.92, 80.23, 79.56, 60.94, 14.35; IR (KBr) ν : 3365, 2981, 1713, 1605, 1489, 1246, 1105, 1019, 845, 766, 615 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{20}\text{I}_2\text{O}_6$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 658.9349, found 658.9219.

6,6'-二氯-3,3'-二碘-2,2'-二氢-[4,4']苯并吡喃: 黄色固体. m.p. 200~201 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.15 (dd, $J=8.6$, 2.5 Hz, 2H), 6.82 (dd, $J=7.8$, 5.6 Hz, 4H), 5.08 (q, $J=14.9$ Hz, 4H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 151.61, 138.79, 130.04, 127.05, 124.31, 121.67, 117.82, 95.68, 74.38; IR (KBr) ν : 2925, 2853, 1603, 1480, 1403, 1233, 1094, 999, 820, 733, 637, 529 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{10}\text{Cl}_2\text{I}_2\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 582.8147, found

582.8185.

8,8'-二氯-3,3'-二碘-2,2'-二氢-[4,4']苯并吡喃: 黄色固体. m.p. 186 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.25 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 6.85~6.71 (m, 4H), 5.03~5.23 (m, 4H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 148.85, 139.43, 130.90, 123.41, 122.32, 121.82, 121.56, 94.71, 74.72; IR (KBr) ν : 3069, 2844, 1601, 1559, 1455, 1231, 1146, 997, 781, 639, 563 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{10}\text{Cl}_2\text{I}_2\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 582.8147, found 582.8195.

8,8'-二溴-3,3'-二碘-2,2'-二氢-[4,4']苯并吡喃: 黄色固体. m.p. 196~198 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.61 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 6.85 (d, $J=8.5$ Hz, 2H), 6.59 (t, $J=16.7$ Hz, 2H), 5.24~5.09 (m, 4H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 149.81, 139.36, 133.83, 124.13, 122.93, 121.74, 110.38, 94.73, 74.78; IR (KBr) ν : 2927, 2846, 1675, 1557, 1457, 1231, 1086, 996, 731, 625, 563 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{10}\text{Br}_2\text{I}_2\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 670.7137, found 670.7177.

3,8,3',8'-四碘-2,2'-二氢-[4,4']苯并吡喃: 黄色固体. m.p. 160~161 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.61 (d, $J=8.7$ Hz, 2H), 6.85 (d, $J=8.5$ Hz, 2H), 6.59 (t, $J=16.5$ Hz, 2H), 5.25~5.10 (m, 4H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 152.27, 139.76, 139.36, 125.17, 123.78, 120.94, 94.64, 84.11, 74.99; IR (KBr) ν : 2925, 2857, 1586, 1455, 1378, 1277, 999, 739 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{10}\text{I}_4\text{O}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 766.6860, found 766.6922.

3.2.3 双碘代二氢喹啉衍生物的合成

在 50 mL 的圆底烧瓶中加入 *N*-磺酰基苯胺二炔衍生物(0.25 mmol), 2 mL CH_2Cl_2 溶解, 再加入 ICl (0.75 mmol), 0 °C 搅拌, 60 s 内反应结束后, 0%~25%二氯甲烷/石油醚硅胶柱层析纯化得双碘代二氢喹啉衍生物 **13b**~**15b**.

3,3'-二碘-1,1'-二-(甲苯-4-磺酰基)-1,2,1',2'-四氢-[4,4']二喹啉(**13b**): 黄色固体. m.p. 123~123.5 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.17 (d, $J=4.2$ Hz, 2H), 6.96 (d, $J=4.7$ Hz, 4H), 6.60 (dd, $J=14.4$, 5.3 Hz, 2H), 6.01 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 4.92 (d, $J=4.7$ Hz, 2H), 4.54 (d, $J=4.1$ Hz, 2H), 3.93 (d, $J=12.6$ Hz, 2H), 1.79 (s, 6H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 143.84, 142.00, 137.13, 134.04, 130.88, 129.98, 128.78, 127.54, 126.15, 125.67, 125.05, 96.45, 56.21, 29.69; IR (KBr) ν : 2925, 2855, 1596, 1451, 1358, 1167, 1086, 895, 832, 656, 561 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{32}\text{H}_{26}\text{I}_2\text{N}_2\text{O}_4\text{S}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 820.9423, found 820.9462.

3-碘-4-(3-碘-2*H*-色烯-4-炔)-1-(甲苯-4-磺酰)-1,2-二

氢喹啉(**14b**): 黄色固体. m.p. 192~193 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.83 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.56 (d, $J=8.1$ Hz, 2H), 7.25 (s, 1H), 7.17 (d, $J=8.4$ Hz, 4H), 7.01 (d, $J=4.0$ Hz, 2H), 6.86 (d, 1H), 6.72 (d, 1H), 6.35 (t, $J=8.5$ Hz, 1H), 5.43 (d, $J=8.6$ Hz, 1H), 5.20 (d, $J=20.1$ Hz, 1H), 4.84~4.96 (m, 2H), 4.61 (d, $J=16.0$ Hz, 1H), 2.34 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 153.00, 143.84, 141.61, 140.42, 137.12, 133.97, 129.90, 129.07, 127.54, 126.69, 126.34, 125.99, 125.55, 124.60, 121.64, 120.72, 116.16, 95.19, 94.97, 74.40, 56.14, 21.79; IR (KBr) ν : 2927, 2855, 1742, 1597, 1478, 1349, 1163, 1036, 158, 662, 559 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{19}\text{I}_2\text{NO}_3\text{S}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 667.9175, found 667.9122.

6-溴-3-碘-4-(3-碘-6-甲基-2H-色烯-4-炔)-1-(甲苯-4-磺酰)-1,2-二氢喹啉(**15b**): 黄色固体. m.p. 179~181 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.63 (t, $J=8.6$ Hz, 3H), 7.28~7.38 (m, 1H), 7.16 (t, $J=8.4$ Hz, 2H), 6.87~6.94 (m, 2H), 6.68 (d, $J=8.2$ Hz, 1H), 6.27 (s, 1H), 4.72~5.00 (m, 4H), 2.26 (s, 3H), 2.06 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 150.85, 144.23 (s), 140.73 (s), 140.37, 137.07, 133.42, 131.82, 131.42, 130.81, 130.21, 128.35, 128.12, 127.77, 126.33, 124.85, 120.76, 119.69, 116.19, 96.49, 93.86, 74.20, 55.95, 21.56, 20.76; IR (KBr) ν : 2923, 2855, 1596, 1464, 1352, 1163, 1088, 812, 706, 664, 567 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{20}\text{BrI}_2\text{NO}_3\text{S}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 759.8437, found 759.8472.

References

- [1] (a) Aubert, C.; Buisine, O.; Malacria, M. *Chem. Rev.* **2002**, *102*, 813.
(b) Wang, X. Y.; Li, Z. Z. *Chin. J. Org. Chem.* **2014**, *34*, 566 (in Chinese).
(王小勇, 李治章, 有机化学, **2014**, *34*, 566.)
(c) Rubin, M.; Gevorgyan, V. *Chem. Rev.* **2007**, *107*, 3117.
(d) Nakamura, I.; Yamamoto, Y. *Chem. Rev.* **2004**, *104*, 2127.
(e) Kitamura, T. *Eur. J. Org. Chem.* **2009**, 1111.
(f) Yan, G. B.; Yu, J.; Zhang, L. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, *32*, 294 (in Chinese).
(严国兵, 于健, 张玲, 有机化学, **2012**, *32*, 294.)
- [2] Mo, J.; Eom, D.; Lee, E.; Lee, P. H. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 3684.
- [3] (a) Zhao, L. B.; Guan, Z. H.; Han, Y.; Xie, Y. X.; He, S.; Liang, Y. M. *J. Org. Chem.* **2007**, *72*, 10276.
(b) Goto, K.; Yamamoto, G. *Tetrahedron Lett.* **2001**, *42*, 4875.
(c) Marshall, J. A.; Yanik, M. M. *J. Org. Chem.* **1999**, *64*, 3798.
(d) Kim, I.; Choi, J.; Won, H. K.; Lee, G. H. *Tetrahedron Lett.* **2007**, *48*, 6863.
(e) Cherry, K.; Thibonnet, J.; Duchne, A.; Parrain, J. L. *Tetrahedron Lett.* **2004**, *45*, 2063.
(f) Sakai, N.; Annaka, K.; Fujita, A.; Sato, A.; Konakahara, T. *J. Org. Chem.* **2008**, *73*, 4160.
(g) Sakai, N.; Annaka, K.; Konakahara, T. *Tetrahedron Lett.* **2006**, *631*.
- [4] (a) Yue, D.; Larock, R. C. *J. Org. Chem.* **2002**, *67*, 1905.
(b) Hessian, K.; Flynn, B. *Org. Lett.* **2003**, *5*, 4377.
(c) Larock, R. C.; Yue, D. *Tetrahedron Lett.* **2001**, *62*, 6001.
- [5] (a) Arcadi, A.; Cacchi, S.; Giancarlo, F.; Marinelli, F.; Moro, L. *Synlett* **1999**, 1432.
(b) Arcadi, A.; Cacchi, S.; Giuseppe, S.; Fabrizi, G.; Marinelli, F. *Org. Lett.* **2002**, *4*, 2409.
(c) Xie, Y. X.; Liu, X. Y.; Wu, L. Y.; Han, Y.; Zhao, L. B.; Fan, M. J.; Liang, Y. M. *Eur. J. Org. Chem.* **2008**, 1013.
(d) Yue, D.; Yao, T.; Larock, R. C. *J. Org. Chem.* **2005**, *70*, 10292.
- [6] Knight, D. W.; Redfern, A. L.; Gilmore, J. *Chem. Commun.* **1998**, 2207.
- [7] (a) Yue, D.; Larock, R. C. *Org. Lett.* **2004**, *6*, 1905.
(b) Trincado, J.; Rubio, E.; Gonzalez, J. M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2003**, *42*, 2406.
- [8] (a) Rossi, R.; Carpita, A.; Bellina, F.; Stabile, P.; Mannina, L. *Tetrahedron* **2003**, *59*, 2067.
(b) Barluenga, J.; Vazquez-Villa, H.; Balles-teros, A.; Gonzalez, J. M. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, *125*, 9028.
(c) Peng, A. Y.; Ding, Y. X. *Org. Lett.* **2004**, *6*, 1119.
- [9] Huang, Q.; Hunter, J. A.; Larock, R. C. *J. Org. Chem.* **2002**, *67*, 3437.
- [10] Mo, J.; Choi, W.; Min, J.; Kim, C. E.; Eom, D.; Kim, S. H.; Lee, P. H. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 11382.
- [11] (a) Chen, Y.; Cho, C. H.; Larock, R. C. *Org. Lett.* **2009**, *11*, 173.
(b) Du, H. A.; Tang, R. Y.; Deng, C. L.; Liu, Y.; Li, J. H. *Adv. Synth. Catal.* **2011**, *353*, 2739.
(c) Du, H. A.; Zhang, X. G.; Tang, R. Y.; Li, J. H. *J. Org. Chem.* **2009**, *74*, 7844.
(d) Saito, T.; Horikoshi, T.; Otani, T. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 6513.
(e) Yadav, J. S.; Reddy, B. V. S.; Rao, C. V. *J. Chem. Soc.* **2002**, *11*, 1401.
(f) Luo, S. P.; Tang, R. Y.; Zhong, P.; Li, J. H. *Chin. J. Org. Chem.* **2009**, *29*, 1924 (in Chinese).
(罗培松, 汤日元, 钟平, 李金恒, 有机化学, **2009**, *29*, 1924.)
(g) Diaba, F.; Ricou, E. Bonjoch, J. *Org. Lett.* **2007**, *9*, 2633.
(h) Ma, S. M.; Lu, L. H. *J. Org. Chem.* **2005**, *70*, 7629.
(i) Liu, Y. H.; Zhou, S. L. *Org. Lett.* **2005**, *7*, 4609.

(Li, L.; Fan, Y.)