发展高效的不对称 Suzuki-Miyaura 偶联反应及其合成应用

徐广庆 赵庆 汤文军*

(中国科学院上海有机化学研究所 生命有机化学国家重点实验室 上海 200032)

摘要 为解决不对称 Suzuki-Miyaura 交叉偶联反应中活性和选择性问题, 我们设计并发展了一系列结构刚性的手性联芳基单膦配体. 在发展高活性的大位阻交叉偶联反应方面, 成功地实现了邻位四取代芳基芳基之间的 Suzuki-Miyaura 交叉偶联, 并发展了官能团化的大位阻交叉偶联, 在邻位二取代芳基溴苯与二级烷基硼酸之间的大位阻芳基烷基交叉偶联中也取得进展. 在发展高立体选择性的交叉偶联反应方面, 我们采用手性大位阻单膦配体和底物间次级作用相结合的设计理念, 利用苯并噁唑啉酮辅基和芳基间的 $\pi-\pi$ 作用, 成功地发展了高立体选择性的邻位酰基化芳基芳基间不对称 Suzuki-Miyaura 偶联; 利用极性基团双(2-氧代-3-噁唑啉基)次膦酰基(BOP)辅基和芳基间的极性 π 作用, 成功地实现了应用性强的邻位氧基取代芳基芳基间高效不对称 Suzuki-Miyaura 偶联. 最后我们首次将高效的不对称 Suzuki-Miyaura 偶联方法学应用于天然产物合成, 完成了手性联芳基天然产物 Korupensamine A 和 Korupensamine B 的高效不对称合成, 并完成天然产物 Michellamine B 的立体选择性全合成.

关键词 单膦配体; 大位阻; Suzuki-Miyaura 偶联; 不对称; 次级作用; 全合成

Development of Efficient Asymmetric Suzuki-Miyaura Cross-Coupling and Applications in Synthesis

Xu, Guangqing Zhao, Qing Tang, Wenjun*

(State Key Laboratory of Bio-organic and Natural Products Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Science, Shanghai 200032)

Abstract A series of structurally rigid, sterically bulky biaryl monophosphorus ligands were designed and synthesized to investigate the reactivity and stereoselectivity of asymmetric Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. High efficiencies were achieved in sterically demanding cross-couplings for the synthesis of tetra-*ortho*-substituted biaryls with various functionalities. Sterically demanding aryl-alkyl Suzuki-Miyaura couplings between di-*ortho*-substituted aryl halides and secondary alkylboronic acids were also successful. In achieving efficient asymmetric Suzuki-Miyaura coupling, we implemented a new concept by employment of a chiral biaryl monophosphorus ligand developed in the group as well as utilization of a secondary interaction between two coupling partner. Using a $\pi-\pi$ interaction of a benzooxazolidinone substituent with one aryl partner, we developed enantioselective biaryl couplings containing *ortho*-carbonyl substituents. High enantioselectivities were also achieved in biaryl coupling containing *ortho*-oxy substituents by utilizing a polar- π interaction between a polar bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphonic (BOP) substituent and one aryl partner. The methodology enabled us for the first time to implement efficient asymmetric Suzuki-Miyaura coupling in total synthesis and accomplish the syntheses of chiral biaryl natural products korupensamines A and B, ultimately a concise and stereoselective synthesis of michellamine B.

Keywords monophosphorus ligand; sterically demanding; Suzuki-Miyaura coupling; secondary interaction; total synthesis

具有手性联芳基结构的天然产物在自然界中存在很多, 目前已有超过数千个被分离报道^[1]. 其中诸多天然产物表现出良好的生理活性. 例如, Steganacin(图 1)

呈现出较强的抗肿瘤活性^[1c]; 而轴手性异构体 Korupensamine A 和 Korupensamine B 则具有较好的抗疟疾活性(对恶性疟原虫 *Plasmodium falciparum* 的抗疟

* E-mail: tangwenjun@sioc.ac.cn

Received June 19, 2014; revised July 22, 2014; published online August 11, 2014.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21272254), the Science and Technology Commission of Shanghai Municipality (No. 13PJ1410900), and the "Thousand Plan" Youth Program.

国家自然科学基金(No. NSFC-21272254)、上海浦江人才计划(No. STCSM-13PJ1410900)、中组部青年千人计划资助项目.

活性 IC_{50} 分别为 0.18 和 0.31 $\mu\text{g/mL}$ ^[1d]; 它们的二聚体 Michellamine B 则具有优良的抗 HIV 活性(对 HIV-1 包括耐 AZT 的 G910-6 株和耐 Pyridinone 的 A17 株以及 HIV-2 呈现出显著的抗病毒作用, 其 EC_{50} 分别为 5 和 9 $\mu\text{mol/L}$)^[1e]; 临床上广泛使用的万古霉素(Vancomycin)在其分子中也存在一个手性联芳基的结构单元. 由于这些天然产物所表现出良好且广泛的生理活性, 加上这些手性联芳基结构本身存在的合成挑战, 促使化学家们不断探索和发展构建手性联芳基结构的方法^[1a]. 经过几十年的研究发展, 目前构建这一手性联芳基结构的不对称合成方法主要可分为 3 类: (1)手性辅基诱导的不对称偶联反应; (2) Bringmann 教授发展的“内酯”策略^[1a]; (3)催化不对称偶联反应^[2,3]. 第一种方法需要采用等物质的量的手性辅基, 成本较高, 现已很少采用; “内酯”策略

图 1 具有手性联芳基结构的天然产物
Figure 1 Axially chiral biaryl natural products

尽管效率较高, 但对底物结构有较大的依赖性, 局限性较高; 通过催化不对称交叉偶联来构建轴手性通用性好, 产生废物少, 无论从原子经济性和官能团兼容性方面均占较大优势. 然而已经报道的催化不对称交叉偶联方法学仍然具有较大的缺陷, 在天然产物的合成应用中甚是罕见, 目前仍然缺乏高效、实用的不对称交叉偶联方法学. 由于天然产物结构相对更加复杂, 偶联片段位阻往往更大, 且具有较敏感的官能团, 许多已知的偶联方法往往表现出较低活性. 因此, 如何更好地解决交叉偶联反应中的活性和选择性问题是高效构建手性联芳基天然产物的关键所在.

催化的不对称交叉偶联反应的发展始于 20 世纪 80 年代. Hayashi 小组^[2a]率先报道了由镍催化的不对称 Kumada-Tamao-Corriu 偶联, 随后 Espinet 小组^[2b]报道了不对称 Negishi 偶联. 由于有机硼试剂的稳定性及多官能团容忍性, 不对称 Suzuki-Miyaura 偶联反应成为近些年的研究热点^[4a-4k]. 尽管催化不对称交叉偶联反应已经有了很大的发展, 但是目前这一催化反应普遍面临的问题是: 催化活性相对较低, 底物范围窄, 官能团容忍性差等. 而我们小组则从目前所面临的这些难题出发, 致力于发展一个高活性、高立体选择性、官能团容忍性强的催化体系以解决活性和选择性的双重问题, 并将这一催化反应高效地应用于具有较好生理活性的手性联芳基天然产物的合成中. 本研究专题介绍我们课题组在解决大位阻 Suzuki-Miyaura 偶联和不对称 Suzuki-Miyaura 偶联反应中的研究思路和最新进展, 以及将不对称 Suzuki-Miyaura 偶联反应应用于手性联芳基类天然产物的高效合成中的研究过程.

1 碳(sp²)-碳(sp²)间的大位阻 Suzuki-Miyaura 偶联反应

2001 年, 美国麻省理工学院的 Fu 教授^[5a]报道了一类普适性强的 Negishi 偶联反应. 他们小组采用 $\text{Pd}[\text{P}(\text{Bu}-t)_3]_2$ 作为催化剂可以高活性地催化芳(烯)基氯化物与芳(烷)基锌试剂之间的偶联, 并且该方法可适用于一定位阻的底物. 这一研究表明大位阻单膦配体在钯催化的偶联反应中表现出较好的活性. 随后化学工作者们开始发展各种大位阻单膦配体以实现更加高效、普适的偶联反应.

美国麻省理工学院的 Buchwald 小组^[5b]在 2002 年首次报道了四邻位取代的大位阻 Suzuki-Miyaura 偶联反应, 他们采用具有菲环的联芳基膦配体(Eq. 1)衍生的催化体系, 可以以较高产率得到邻位带有甲基、甲氧基、苯基、一级烷基的四取代的联芳基化合物. 随后他们小组^[5c]又发展了一个普适性更强的配体 S-Phos, 对于大位阻的 Suzuki-Miyaura 偶联反应也具有很好的活性.

通过研究偶联反应的催化循环(Scheme 1), 反应的决速步骤通常是转金属化过程. 大位阻单膦配体较双齿膦配体相比, 由于空配位的存在更利于转金属化的发生, 同时空间位阻更大的配体更利于还原消除过程的进行. 虽然 Buchwald 教授所发展 S-Phos 在钯催化的交叉偶联中表现出较好的广谱性, 但是对于邻位二级烷基取代的溴苯这类大位阻的偶联底物仍然表现出较差的活性. 需要指出的是, S-Phos 结构中二环己基膦基团的旋转性可以导致 S-Phos 的 Pd 复合物在反应过程中存在着两种不同的构象(Scheme 2): 构象 **A** 中的钯中心离配体的联芳基骨架较近, 导致该钯复合物的立体位阻较大; 构象 **B** 中钯中心则离配体的联芳基骨架较远, 该钯复合物的立体位阻较小. Buchwald 认为大位阻的构象 **A** 的存在是 S-Phos 在交叉偶联中表现出高活性的主要原因.

为发展更高效的交叉偶联反应配体, 我们设想消除 S-Phos 结构固有的构象模糊性缺陷, 发展设计一类仅能表现构象 **A** 的联芳基单膦配体. 为此, 我们设计将磷原

子固定在一个五元环上, 从而固定磷原子上孤对电子的取向, 彻底消除由于碳磷键旋转造成的构象异构体, 实现了配体的构象单一性(Eq. 2); 同时, 由于磷原子直接与苯环相连, 磷原子的还原性则有效地降低, 使配体更易稳定储存, 操作简单; 另外, 这种联芳基膦配体具有磷手性中心, 这有利于我们进一步发展不对称催化反应.

以此为基本骨架, 我们小组^[6]先合成了一系列单膦配体 **L1**~**L4**, 并对 2,4,6-三异丙基苯硼酸和 2-苯基溴苯之间的大位阻交叉反应进行研究(Eq. 3). 实验结果表明, 与目前通用的商业可得的单膦配体相比, 只有配体 **L4** (BI-DIME)取得较高产率(89%). 这是 2,4,6-三异丙基芳基硼酸与邻位单取代溴苯间高效偶联的首次报道. 该配体对邻位双取代芳基硼酸与一系列单邻位取代的

芳基卤代物的偶联反应均表现出非常高的活性(表 1). 采用 K_3PO_4 为碱, Pd-BI-DIME 为催化剂, 邻位具有甲基、异丙基、甲氧基、苯基等芳基硼酸均可顺利反应, 而且该偶联可以容忍酰基及有配位能力的杂环底物. 不仅是芳基溴代物, 芳基氯代物也可适用于此催化体系, 邻位叔丁基的底物也可以顺利地发生偶联反应(表 1, Entry 4).

但是, 当我们将底物的位阻进一步增大时, 同样的催化体系对邻位四取代芳基化合物的合成表现出较低的收率(表 2). 我们经过对 Pd 源、溶剂、添加剂、碱等一系列条件的优化, 发现 $Pd(OAc)_2$ 较 Pd_2dba_3 转化率更高. 碱对该反应有较大的影响. 相对于 K_3PO_4 , 更弱的无机碱如 $NaHCO_3$, K_2CO_3 , KF 给出的产率普遍较低; 有机碱如三乙胺、DBU 的效果更差; 而大位阻的无机强

表 1 BI-DIME 为配体的大位阻 Suzuki-Miyaura 交叉偶联底物范围

Table 1 Sterically hindered Suzuki-Miyaura cross-couplings catalyzed by BI-DIME

Entry	Aryl halide	Boronic acid	Product	[Pd]/mol%	Yield/%
1				1	96
2				1	94
3				1	91
4				2	80
5				1	87
6				1	89
7				1	95
8				0.5	95
9				1	99

续表

Entry	Aryl halide	Boronic acid	Product	[Pd]/mol%	Yield/%
10				1	85
11				1	98

表 2 碱及配体对四取代大位阻 Suzuki-Miyaura 交叉偶联的影响

Table 2 Base and ligand effect of tetra-*ortho*-substituted biaryl cross-couplings

Entry	Ligand	Base	Yield/%
1	BI-DIME	NaHCO ₃	<1
2	BI-DIME	KF	<1
3	BI-DIME	CsF	33
4	BI-DIME	K ₂ CO ₃	20
5	BI-DIME	Cs ₂ CO ₃	47
6	BI-DIME	K ₃ PO ₄	60
7	BI-DIME	NaOH	56
8	BI-DIME	NaO <i>t</i> -Bu	99
9	BI-DIME	TEA	<1
10	BI-DIME	DBU	1
11	BI-DIME	DABCO	<1
12	S-Phos	NaO <i>t</i> -Bu	4
13	Ru-Phos	NaO <i>t</i> -Bu	5
14	X-Phos	NaO <i>t</i> -Bu	3
15	DPPF	NaO <i>t</i> -Bu	22
16	PCy ₃	NaO <i>t</i> -Bu	10
17	P(<i>t</i> -Bu) ₃	NaO <i>t</i> -Bu	<1
18	PPh ₃	NaO <i>t</i> -Bu	3

碱 NaO*t*-Bu 给出几乎定量的产率. 在同等条件下, 我们也尝试了其他常用于 Suzuki-Miyaura 偶联的配体. 我们惊奇地发现所有尝试的其它配体对此类底物的偶联效率均不理想. 这进一步证明配体 BI-DIME 在对大位阻的底物偶联中所表现出的特殊优势, 并首次实现了双异丙基邻位四取代联芳基化合物的高效偶联. 我们^[7]接着

对底物的普适性进行了研究(表 3). 2,4,6-三异丙基苯基硼酸可以与双邻位带有甲基、甲氧基或苄基的芳基溴代物(表 3, Entries 1~3)均实现高效偶联. 同时, 该偶联还可以容忍乙基、苄氧乙基取代, 甚至杂环底物(表 2, Entries 4~6). 在 2.5 mol% 钯催化剂存在下, 四邻位异丙基取代的联芳基偶联也获得成功(表 3, Entry 8). 同时, 对于氯代杂环底物及具有膦氧官能团大位阻底物也可实现高效偶联(表 3, Entries 10, 11). 这一催化体系为合成超大位阻联芳基化合物提供了一种高效方法.

尽管 BI-DIME 与 S-Phos 的结构具有一定的相似性, 但是两个配体在大位阻交叉偶联中表现出较大的活性差异. 于是我们对两种配体的钯复合物的结构进行了比较. 我们认为配体 BI-DIME 中苯并五元环的刚性结构, 使得其空间位阻较 S-Phos 更大, 从而使得反应液中钯物种更趋向以单膦配位的 LPd 络合物存在, 而不利双膦配位的 L₂Pd 物种的形成. 值得注意的是, 单膦配位的 LPd 络合物是目前普遍接受的催化活性物种^[8]. 我们从 Pd(II)与配体形成的络合物的 X 单晶衍射比较证实了这一假设(Scheme 3). [PdCl₂[(S)-Phos]₂]与[PdCl₂[(S)-BI-DIME]₂]的晶体结构有显著的不同; 在[PdCl₂[(S)-Phos]₂]中 S-Phos 的联芳基结构朝向远离 Pd(II)中心, 而[PdCl₂[(S)-BI-DIME]₂]中 BI-DIME 的联芳基结构更加靠近 Pd(II)中心. 这就导致 BI-DIME 的 L₂Pd 中心的空间位阻更大, 更易于一个配体的进一步解离形成活性的 LPd 物种. 另外, 我们^[7]也合成了[Pd(0)(S-BI-DIME)₂]物种, 并实现了单晶结构表征(Scheme 4). 与 Pd(0)(S-Phos)₂的单晶结构对比, 我们可以明显地发现络合物中 P—Pd—P 键角的不同. Pd(0)(S-Phos)₂中为 164.50°; 而[Pd(0)(S-BI-DIME)₂]中为 167.90°. P—Pd—P 键角的增大进一步表明 BI-DIME 的刚性结构导致空间位阻变大, 从而使得双配位的 L₂Pd(0)物种更加易于解离为活性催化物种 LPd(0). 同时, 位阻更大的 BI-DIME 也更有利于还原消除过程, 从而使得在大位阻 Suzuki-Miyaura 偶联中 BI-DIME 表现出更高的活性. 基于大位阻强碱能进一步促

表 3 邻位四取代大位阻芳基-芳基交叉偶联
Table 3 Sterically hindered tetra-*ortho*-substituted aryl-aryl cross-coupling

Entry	Aryl halide	Boronic acid	Product	[Pd]/mol%	Yield/%
1				1	97
2				1	95
3				1	91
4				1	97
5				1	86
6				1	70
7				1	97
8				2.5	48
9				1	96
10				1	97

续表

Entry	Aryl halide	Boronic acid	Product	[Pd]/mol%	Yield/%
11				1	95

Scheme 3

Scheme 4

进偶联反应收率和通过对于钯催化剂物种的进一步捕捉, 我们提出了大位阻交叉偶联的机理(Scheme 5). 如 Scheme 5 所示, 当 BI-DIME 作为配体时, 配体 BI-DIME 与 Pd(0)结合的催化物种 **I** 与芳基卤代物底物首先发生氧化加成形成中间体 **II**. **II** 在反应体系中有二聚体 **II** 和单体 **V** 两种存在形式. 实验表明, 二聚体 **II** 能稳定存在, 而且已分离得到, 不利于进一步转金属化的发生, 影响偶联效率. 然而, 当向反应体系中加入大位阻强碱如 NaOt-Bu 时, 二聚体 **II** 会进一步被破坏, 形成活性催化物种 **III**; **III** 与 2,4,6-三异丙基苯硼酸发生转金属过程生

成中间体 **IV**, 最后还原消除生成产物, 并再生 Pd(0)催化物种 **I** 继续催化循环.

发展高效的大位阻 Suzuki-Miyaura 偶联反应方法学对于合成含官能团的联芳基化合物或天然产物具有重要的应用价值. 然而, 大位阻 Suzuki-Miyaura 偶联反应在官能团的兼容性和低催化剂用量方面的研究报道仍很少见. 我们前面发展的方法中使用了大位阻的强碱如 NaOt-Bu 使得偶联能够高效进行. 然而, 诸多重要的官能团如醛基、酯基、酰基等并不能容忍如此强碱条件, 而且邻位带有官能团的芳基硼酸通常在强碱的条件下容易发生脱硼反应. 显然此催化体系对于官能团化、具有较好合成价值的大位阻底物具有较大的局限性. 因此, 我们期望通过改良配体来发展一种能够容忍多样官能团的大位阻 Suzuki-Miyaura 偶联体系. Buchwald 小组^[5b]报道的具有菲环的联芳基单膦配体在大位阻的 Suzuki-Miyaura 偶联反应研究中具有开创性的意义 (Scheme 6). 他们指出配体中的菲环是良好的催化活性的基础, 并且通过 X 射线单晶衍射分析证实了菲环中的 9, 10 位的碳碳键与钯中心的配位作用. 结合我们小组单膦配体高度可调节性的优点以及合成的简易性双重角度考虑, 我们^[7]设计并合成了蒽基取代的配体 **L5** (AntPhos) (Scheme 6). 我们以 **L5** 为配体, K₃PO₄ 为碱进行底物研究(表 4), 在 1 mol% Pd 用量情况下对于带有醛基(表 4, Entry 1, 3)、羰基(表 4, Entry 6)、硝基(表 4, Entry 8)、氰基(表 4, Entry 4)、磷酸酯(表 4, Entry 9)、氟原子、三氟甲基(表 4, Entries 5, 7)等大位阻底物都具有很好的兼容性. 这一催化体系对于合成一系列大位阻官能团化的联芳基化合物提供了有效的合成方法. 随后, 我们也对配体 **L5** 与 Pd(0)形成的络合物进行单晶结构分析(图 2). [Pd(0)(R-L5)₂]中 Pd 中心与蒽环上的 1,2 位碳有配位, 我们认为这一弱配位键的存在不仅有助于稳定单膦配位的钯络合物[Pd(0)R-L5], 更有利于稳定二价钯络合物 [Pd(II)R-L5], 抑制二价钯络合物的二聚, 从而延长催化剂寿命, 提高反应收率.

我们推测该反应的催化循环, 如 Scheme 7 所示. 由于 Antphos 中蒽环上的 1,2 位碳与钯中心的弱配位键的存在导致二聚体 **IV** 易于解离为单膦配位的活性物种 **II**,

Scheme 5

表 4 L5 为配体的大位阻、官能团化 Suzuki-Miyaura 交叉偶联

Table 4 Functionalized sterically hindered Suzuki-Miyaura cross-couplings catalyzed by L5

Entry	Aryl halide	Boronic acid	Product	[Pd]/mol%	Yield/%
1				1	70
2				1	99
3				1	81
4				1	88
5				1	91

续表

Entry	Aryl halide	Boronic acid	Product	[Pd]/mol%	Yield/%
6				1	82
7				1	85
8				1	92
9				1	90
10				1	97
11				1	95

Scheme 6

有利于下一步转金属化的发生。在弱碱如 K_3PO_4 的存在下即可方便地发生转金属过程。随后，还原消除得到偶联产物并再生零价钯。该配位对进一步稳定活性催化物种，延长催化剂寿命，降低催化剂用量至关重要。

图2 $Pd(0)[(R)-L5]_2$ 络合物的 X 单晶衍射结构Figure 2 The X-ray structure of $Pd(0)[(R)-L5]_2$

2 碳(sp^2)-碳(sp^3)大位阻 Suzuki-Miyaura 偶联反应

过渡金属催化下碳(sp^2)-碳(sp^3)的直接偶联是合成一系列烷基取代的芳香性化合物的重要方法。其策略通常采用芳基卤代物与烷基金属试剂偶联或者是芳基金

Scheme 7

属试剂与卤代烷烃偶联完成。由于芳基卤代物容易获得,二烷基硼试剂又具有一定的稳定性,因此发展烷基硼试剂与芳香卤代物的直接交叉偶联引起许多科研小组^[9]的关注。然而,目前已知的反应方法只能适用于一级烷基硼试剂,对于二级烷基硼试剂的研究仅有几例^[10],而且反应底物主要局限于没有位阻的芳基卤代物,这大大限制了此方法学的实用性。

碳(sp²)-碳(sp³)大位阻偶联反应中普遍存在的研究难点有两点:(1)与芳基硼酸相比,烷基硼酸通常空间位阻更大,转金属化过程更慢;(2)烷基硼酸转金属后,形成的烷基钯物种容易发生 β -氢消除反应(Scheme 8)。该副反应的发生导致最终生成芳基卤代物脱卤还原产物和烯烃。如何提高转金属化的速率及抑制 β -氢消除副反应是解决这一问题的关键所在。结合我们小组在大位阻 Suzuki-Miyaura 交叉偶联反应中的优势及特点,我们希望发展一类可以实现大位阻芳基卤代物与二级甚至三级烷基硼酸的高效偶联方法学。

我们^[11]以 2-溴-1,3,5-三甲基苯和环己基硼酸为模板底物进行研究,经过对配体、碱、溶剂等条件的优化(表 5),发现以 K₃PO₄ 为碱, L5 为配体在 Pd(OAc)₂ 存在下可以以 92% 的产率得到偶联产物,同时得到 8% 的脱溴产物。与 Pd₂(dba)₃ 相比, Pd(OAc)₂ 对反应活性有大幅度提升,同时有效地减少了还原产物的生成。而通常使用的其他单膦配体如 S-Phos, X-Phos, Ru-Phos, PPh₃ 等都得

到较多还原产物。双膦配体如 DPPB, DPPF 等效果也很差。通过对配体 BI-DIME, L5~L7 的对比可见,配体中蒽基结构对提高反应活性及抑制 β -氢消除有着重要作用。我们认为其原因与前面研究类同,即配体 L5 中蒽基-1,2 位碳与 Pd 配位作用(图 2)有利于单膦钯活性催化物种的生成,同时在转金属后由于该配位的存在有效地抑制 β -氢消除,从而大大降低了还原产物的生成。

我们对底物的普适性进行了研究(表 6)。采用 L5 为配体, K₃PO₄ 为碱在 1 mol% Pd(OAc)₂ 催化剂用量下,邻位双取代的甲基、乙基、异丙基溴代芳烃都能够与环结构二级硼酸给出较高收率,同时反应还可以容忍甲氧基、硝基、氰基等官能团化底物。该方法为合成一些结构新颖的化合物诸如“分子齿轮”提供了有效手段(Eq. 4)。“分子齿轮”类化合物主要通过 3 分子炔基化合物的聚合得到,反应通常对于区域选择性难以控制,且对于位阻较大化合物合成较为困难。通过交叉偶联合成该类“分子齿轮”对于研究其物理化学特性具有重要意义。

3 不对称 Suzuki-Miyaura 交叉偶联研究

上面研究已经表明,我们小组发展的单膦配体在大位阻 Suzuki-Miyaura 交叉偶联中具有非常高的活性。解决了交叉偶联反应的活性问题后,我们现在将集中讨论发展不对称的 Suzuki-Miyaura 交叉偶联以高效合成手性联芳基化合物。根据 Suzuki-Miyaura 催化循环(Scheme 1),大位阻单膦配体在提高偶联活性上具有优势,然而

Scheme 8

表 5 大位阻芳基烷基交叉偶联
Table 5 Sterically demanding aryl alkyl cross-coupling

Entry	Ligand	[Pd]	Base	Yield/%	Starting material/%	Reduction/%
1	BI-DIME	$\text{Pd}_2(\text{dba})_3$	K_3PO_4	53	27	20
2	BI-DIME	$\text{Pd}_2(\text{dba})_3$	NaOH	20	65	15
3	BI-DIME	$\text{Pd}_2(\text{dba})_3$	$\text{NaO}t\text{-Bu}$	71	0	29
4	BI-DIME	$\text{Pd}_2(\text{dba})_3$	CsF	6	80	14
5	BI-DIME	$\text{Pd}_2(\text{dba})_3$	Cs_2CO_3	7	80	13
6	BI-DIME	$\text{Pd}(\text{OAc})_2$	K_3PO_4	87	0	13
7	L5	$\text{Pd}(\text{OAc})_2$	K_3PO_4	92	0	8
8	L6	$\text{Pd}(\text{OAc})_2$	K_3PO_4	18	12	70
9	L7	$\text{Pd}(\text{OAc})_2$	K_3PO_4	15	20	65
10	DPPB	$\text{Pd}(\text{OAc})_2$	K_3PO_4	5	52	43
11	DPPE	$\text{Pd}(\text{OAc})_2$	K_3PO_4	2	51	47
12	S-Phos	$\text{Pd}(\text{OAc})_2$	K_3PO_4	16	25	59
13	Ru-Phos	$\text{Pd}(\text{OAc})_2$	K_3PO_4	14	43	43
14	X-Phos	$\text{Pd}(\text{OAc})_2$	K_3PO_4	3	27	70
15	DPPF	$\text{Pd}(\text{OAc})_2$	K_3PO_4	10	57	33
16	PCy_3	$\text{Pd}(\text{OAc})_2$	K_3PO_4	10	10	80
17	PPh_3	$\text{Pd}(\text{OAc})_2$	K_3PO_4	7	0	93

表 6 二级烷基硼酸与大位阻芳基溴代物交叉偶联底物

Table 6 Sterically hindered aryl-alkyl cross-couplings

Entry	Aryl halide	Boronic acid	Product	Yield/%
1		$(\text{HO})_2\text{B}$ -cyclohexyl		74
2		$(\text{HO})_2\text{B}$ -cyclohexyl		82
3		$(\text{HO})_2\text{B}$ -cyclohexyl		70
4		$(\text{HO})_2\text{B}$ -cyclohexyl		80
5		$(\text{HO})_2\text{B}$ -cyclopentyl		80
6		$(\text{HO})_2\text{B}$ -cyclopentyl		75
7		$(\text{HO})_2\text{B}$ -cyclopentyl		79
8		$(\text{HO})_2\text{B}$ -cyclopentyl		79
9		$(\text{HO})_2\text{B}$ -cyclopentyl		81
10		$(\text{HO})_2\text{B}$ -cyclobutyl		92
11		$(\text{HO})_2\text{B}$ -cyclobutyl		90

续表

Entry	Aryl halide	Boronic acid	Product	Yield/%
12		$(\text{HO})_2\text{B}$ -cyclopropyl		99
13		$(\text{HO})_2\text{B}$ -cyclopropyl		99

由于还原消除过程通常决定反应的对映选择性, 单膦配体与双膦配体相比金属周围空间更加开放, 立体控制则更加困难. 因此, 我们设想能否采用大位阻单膦配体结合底物间相互作用的策略发展一种高效、高选择性的不对称催化体系^[12], 并能够适用于带有重要官能团的底物间的偶联, 使该催化体系更加具有实用性.

我们^[13]首先合成了光学纯的磷手性单膦配体(*S*)-BI-DIME 及 **L8**~**L10**, 并以具有重要合成价值的醛基底物 1-溴-2-萘甲醛与 1-萘硼酸之间的偶联进行研究(表 7, Entries 1, 2). 结果发现 **L8** 较(*S*)-BI-DIME 对映选择性有所提高, 但是均处于较低水平. 随后我们对底物进行修

饰, 以进一步考究不同因素对偶联选择性的影响. 当底物由醛变为酰胺后(**8b**), 我们发现其 *ee* 值有较大幅度提高. 为了进一步提高对映选择性并且增强产物的应用价值, 我们把酰胺换做更加容易脱除的噁唑啉酮环(**8c**). 在 **L8** 为配体条件下, 其 *ee* 值达到 87%. 当更加容易转化的苯并噁唑啉酮作为底物时(**8d**), 其 *ee* 值高达 96%, 并且产率高达 95% (表 7, Entry 5). 当催化剂用量降至 1 mol% 时, 其产率和对映选择性均能很好的保持(表 7, Entry 9). 对于底物(**8d**), (*S*)-BI-DIME 无论是活性和选择性都处于中等水平. **L9** 与 **L10** 则具有较高的活性和选择性. 随后, 我们以 **L8** 为配体对底物范围进行研究(表 8),

表 7 底物和配体在不对称 Suzuki-Miyaura 交叉偶联中的影响
Table 7 Ligand and substrate screening of asymmetric Suzuki-Miyaura cross-coupling

Entry	R (bromide)	Ligand	[Pd]/mol%	Yield/%	<i>ee</i> /%
1	H (8a)	(<i>S</i>)-BI-DIME	5	85	4
2	H (8a)	L8	5	90	20
3	NMe ₂ (8b)	L8	5	90	79
4		L8	5	96	87
5		L8	5	92	96
6		(<i>S</i>)-BI-DIME	5	50	45
7		L9	5	92	90
8		L10	5	99	92
9		L8	1	95	96

反应可以容忍甲氧基, 二甲氨基等官能团(表 8, Entries 2, 3). 对于吲哚及苯并噻唑底物的不对称偶联, 由于偶联产物本身在加热条件下容易消旋化, 至今研究甚少. 由于我们的偶联反应能在室温下进行, 这些偶联产物首次能以中等偏上的 *ee* 值得到(表 8, Entries 5, 6). 此外, 这些偶联产物中的苯并噻唑啉酮可以方便地水解为羧酸或还原为醇(Scheme 9), 很容易转化为其他多样所需的官能团, 扩大了产物的应用范围.

表 8 不对称 Suzuki-Miyaura 交叉偶联反应底物范围

Table 8 Substrate scope of asymmetric Suzuki-Miyaura coupling

Entry	Product	Time/h	Yield/%	<i>ee</i> /%
1		4	95	96
2		4	95	96
3		4	94	94
4		4	94	88
5		36	95	68

续表

Entry	Product	Time/h	Yield/%	<i>ee</i> /%
6		4	95	82
7		4	85	70

Scheme 9

我们结合产物的绝对构型, 通过 DFT/B3LYP FT 计算模拟出还原消除过程中的最低能量过渡态(Scheme 10). 结果表明在还原消除过程中, 硼酸的萘环部分与溴代物中的苯并噻唑啉酮存在 π - π 作用. 这一起级作用的存在, 使得其过渡态能量降低约 2 kcal/mol. 我们认为正是这一起级作用的存在, 结合我们膦配体的手性使得交叉偶联具有优秀的对映选择性.

Scheme 10

进一步研究发现, 萘基膦酸酯底物也可适用于该催化体系(表 9). 邻位甲基或异丙基取代苯硼酸所取得对映选择性为 80%(表 9, Entries 1, 2), 而 2-苯基苯硼酸

及 1-萘硼酸所给出的对映选择性可以达到 90% 以上. 此类底物较高的对映选择性很可能源于配体和底物间的氢键作用^[4b]. 此类偶联产物可以方便地转化为手性联萘基单膦配体^[4b,4k]. 该催化体系对于邻位酰基及磷酸基官能团取代的底物均表现出优秀的活性和对映选择性. 这两类底物的邻位都有一个相对刚性的酰基结构, 有助于还原消除过程中次级作用的增强.

表 9 萘基磷酸二乙酯底物的不对称 Suzuki-Miyaura 偶联
Table 9 Asymmetric Suzuki-Miyaura coupling of ethyl 1-bromo-naphthyl-2-phosphinate

Entry	Product	Temp./°C	Yield/%	ee/%
1		r.t.	95	80
2		40	75	80
3		40	74	96
4		r.t.	88	90
5		r.t.	90	82

实现对邻位氧官能团化底物的高立体选择性 Suzuki-Miyaura 偶联至今是一个极大的挑战(表 10), 这

是由于 C—O 键的容易旋转导致底物构象不固定. 由于诸多手性联芳基天然产物中都存在邻位氧官能团化的联芳基结构, 实现对邻位氧官能团化底物的不对称 Suzuki-Miyaura 偶联显得相当重要. 因此, 我们继续尝试利用手性单膦配体结合底物间次级作用的策略来解决这一难题. 我们^[14]尝试合成了带有多种辅助基团的底物(表 10). 辅助基团的选择基于两点: (1)容易合成, 且较方便地转化; (2)能够提供分子间的次级作用如 π - π 、极性- π 、氢键等. 我们仍然以 **L8** 为配体进行尝试, 发现特戊酰基、苯甲酰基、萘甲酰基及噁唑啉酮基的酯化底物均给出 $\approx 70\%$ *ee* 值. 而当我们尝试带有较大极性的 BOP 基团的底物(表 10, Entry 6), 其对映选择性可以高达 94%. 当采用配体 **L11** 时, 偶联产物 *ee* 值可以达到 99%. 二苯基磷酸辅基(表 10, Entry 5)尽管空间位阻上较 BOP 辅助基团相当, 然而其对映选择性却仅有 72%, 可见空间位阻不是诱导高选择性主要原因. 我们^[15]分析认为在还原消除过程中高度极化的 BOP 基团与芳基硼酸部分的萘基存在一个极性- π 作用(图 3), 结合手性单膦配体作用下导致高立体选择性的联芳基产物的生成. 从底物适用性上也可以佐证这一作用的存在. 该体系对于具有延伸 π -体系的芳基硼酸表现优秀的对映选择性(表 10, Entries 8~12). 简单 π -体系的芳基硼酸如 2-甲基苯硼酸和 2-苄氧基苯硼酸分别得到较低的 *ee* 值 (20%和 40%). 当采用 **L12** 作为配体时, 萘基磷酸二乙酯与 2-甲酰基苯硼酸也可以以 95%产率, 95%的 *ee* 值得到偶联产物. 可见, 该体系不仅适用于邻位氧官能团化的底物, 并实现了邻位酰基化底物的高活性和高选择性偶联. 酰基和氧基能较方便地转化为多种官能团, 大大提高了产物的应用价值.

图 3 Pd(II)-L11 催化体系模型

Figure 3 Model of Pd(II)-L11 catalyst

4 通过不对称 Suzuki-Miyaura 交叉偶联高效合成天然产物 Korupensamine A, Korupensamine B 及 Michellamine B

有了上述方法学的发展, 我们计划通过不对称 Suzuki-Miyaura 交叉偶联反应高效合成天然产物

表 10 不对称 Suzuki-Miyaura 偶联
Table 10 Asymmetric Suzuki-Miyaura coupling

Entry	Product	Ligand	Yield/%	ee/%
1	9a	L8	97	72
2	9b	L8	95	76
3	9c	L8	96	76
4	9d	L8	90	65
5	9e	L8	97	72
6	9f (BOP)	L8	95	94
7	9g	L11	96	99
8	9h	L11	95	93
9	9i	L11	94	92
10	9j	L11	98	91
11	9k	L8	95	90

续表

Entry	Product	Ligand	Yield/%	ee/%
12	9k	L8	91	90
13	9l	L12	95	95

Korupensamine A 和 Korupensamine B, 并最终完成其二聚体 Michellamine B 的合成工作. 基于我们的设计 (Scheme 11), Michellamine B 可以由保护基保护的 Korupensamine A 以及 Korupensamine B 的前体 **10** 和 **11** 交叉偶联得到, 而 Korupensamine A 和 Korupensamine B 则可由片段 **12** 和 **13** 通过交叉偶联得到.

首先, 片段 **12** 中的萘环结构可通过 Diels-Alder (D-A) 反应构建 (Scheme 12), 即 3,3-二甲基丙烯酸甲酯 (**14**) 在 LDA 作用下与 TMSCl 反应得到双烯体 **15**, 随后与对苯醌发生 D-A 反应, 在体系中直接加入醋酸, 就可以得到萘醌结构 **16**. 化合物 **16** 经过还原, 官能团保护和脱保护等一系列转换得到萘基甲磺酸酯 **19**. **19** 通过 Miyaura 硼化反应得到硼酸酯化合物 **20**, 随后将 **20** 水解为萘基硼酸 **12**, 总计 9 步反应, 总收率为 34%, 且每一步都方便易行, 产物较容易通过重结晶方式分离纯化. 溴化物片段的合成 (Scheme 13) 可以从 3,5-二甲氧基苯甲

醛出发, 经过 Nitro-aldol 反应得到 *E* 式硝基烯 **22**, 随后还原酰化以较高选择性得到 *E* 式烯酰胺 **23**. 该 *E* 式烯酰胺可以通过我们小组发展的不对称氢化反应以 97% 的 *ee* 值高效氢化得到所需构型的产物 **24**^[16]. 随后 **24** 经过苄基保护, Bischler-Napieralski 关环, NaBH₄ 还原, 以 > 10/1 *dr* 转化成反式四氢异喹啉化合物 **26**. **26** 再经过溴化, 选择性脱除单苄基得到结构 **28**. 进一步引入 BOP 基团得到不对称 Suzuki-Miyaura 偶联所需的片段 **29**. 完成硼酸及溴化物片段的合成后, 我们进行了交叉偶联尝试 (表 11). 对于 BOP 基保护的底物 **29**, 配体 **L8** 只提供 *dr*: 69/31 (*M/P*) 的选择性; 而配体 *ent*-**L8** 在同样条件下则提供 *dr*: 20/80 (*M/P*) 的选择性. 这个结果表明, 虽然在手性配体作用下产物的轴手性会随着配体手性的翻转而翻转, 但是 *dr* 值却不存在完全对映关系. 显然底物中四氢异喹啉本身的手性对偶联的对映选择性有所

Scheme 11

影响. 虽然通过优化条件偶联产物 *dr* 值最高达到 87/13 (表 11, Entry 5), 但这结果离此前发展的不对称 Suzuki-Miyaura 偶联方法学中的报道的 *ee* 值相差较大. 我们认为其原因一方面在于底物四氢异喹啉本身的手性结构会存在与配体之间匹配与否的问题; 另一方面在于芳基溴化物部分本身并不是完全的芳香萘基结构. 由于我们报道的方法学中反应底物采用的是刚性的萘基结构, 这也可能是 *ee* 值不同的原因.

为了更加高效地合成 Korupensamine A 和 Korupensamine B, 结合我们在不对称 Suzuki-Miyaura 方法学中积累的经验, 我们对合成路线进行了调整 (Scheme 14). 其关键策略在于先完成轴手性的构建, 然后再完成四氢异喹啉部分的合成. 用于偶联的溴化物 **33** 可由 3,5-二羟基苯甲醛经过叔丁基二甲基硅基(TBS)保护, 溴化, BOP 保护 3 步反应得到. 随后是关键的不对称 Suzuki-Miyaura 偶联反应. 我们以 **L11** 为配体实现了溴化物 **33** 与萘基硼酸 **12** 之间的高效不对称交叉偶联, *P* 构型的联芳基产物 **34** 的产率为 96%, *ee* 值高达 93%,

反应可以放大到克级规模. 联芳基化合物 **34** 经过保护基的转变, Nitro-Aldol 反应, 还原得到烯酰胺 **35**. 随后, 我们尝试采用 **L13** (Scheme 12) 为配体对烯酰胺 **25** 进行铑催化不对称氢化. 然而, 所得 *dr* 值仅为 60/40, 可见 **L13** 不适用于该类型底物的氢化. 我们经过一系列配体的筛选和新配体的发展, 最终发现苯并五元碳环结构配体 **L14** 为配体时氢化 *dr* 值可以达到 92/8. 所生成的手性胺 **37** 经过苄基保护, Bischler-Napieralski 关环, NaBH₄ 还原, 以 6/1 *dr* 值转化生成反式构型产物 **38**. **38** 随后经过 Pd/C 氢化脱除全部的苄基即可得到天然产物 Korupensamine A. 线性步骤为 13 步, 总收率达到 24%.

我们用同样的策略, 在不对称 Suzuki-Miyaura 偶联过程中采用 *ent*-**L11** 为配体, 以同样的收率和 *ee* 值得到 *M* 构型的联芳基产物 **39** (Scheme 15). **39** 经过相似的转化得到烯酰胺 **40**. 采用 **L14** 为配体对 **40** 尝试不对称氢化得到手性胺 **41** 的 *dr* 值高达 90/10. 手性胺 **41** 经过四氢异喹啉骨架的构建及保护基的脱除完成天然产物 Korupensamine B 的立体选择性合成.

Scheme 12

Scheme 13

表 11 不对称 Suzuki-Miyaura 偶联^a
Table 11 Asymmetric Suzuki-Miyaura cross-coupling

Entry	Substrate	Ligand	Solvent	Yield ^b /%	dr ^c (M/P)
1	27	L8	BuOH/H ₂ O=4/1	95	75/25
2	29	L8	BuOH/H ₂ O=4/1	95	69/31
3	29	ent-L8	BuOH/H ₂ O=4/1	94	20/80
4	29	L11	BuOH/H ₂ O=4/1	92	82/18
5	29	L11	Toluene/H ₂ O=5/1	61	87/13
6	29	S-Phos	BuOH/H ₂ O=4/1	85	49/51

^a Reaction conditions: bromide (0.1 mmol), boronic acid (0.15 mmol), Pd(OAc)₂ (5 mol%), ligand (6 mol%), solvent (1 mL). ^b Isolated yield. ^c Chiral-PC-Column, *V*(Hexane)/*V*(*i*-PrOH)=95/5, 1 mL/min.

Scheme 14

在完成天然产物 Korupensamine A 和 Korupensamine B 的合成后, 我们力争完成其二聚体 Michellamine B 的合成(Scheme 16). 于是, 苄基保护的 Korupensamine A 前体 38 经过溴化得到溴代产物 43; 42 经过同样的溴化方法再在 *n*-BuLi 的作用下与硼酸三异丙酯反应得到硼酸 44. 接着溴代物 43 与硼酸 44 在

Pd(PPh₃)₄ 催化下, 以 DMF 为溶剂实现交叉偶联得到产物 45. 最后 45 通过氢化脱去全部苄基得到天然产物 Michellamine B. 至此, 我们通过高效的不对称 Suzuki-Miyaura 偶联完成了 Michellamine B 的立体选择性全合成.

Scheme 15

Scheme 16

5 总结与展望

为解决不对称 Suzuki-Miyaura 交叉偶联反应中所面临的活性和选择性的问题, 我们小组设计并发展了一系列新型的苯并五元环为骨架的联芳基类单膦配体. 该骨架配体由于结构刚性, 空间位阻较大等特点在大位阻 Suzuki-Miyaura 交叉偶联中表现出优秀的活性, 拓宽了交叉偶联的适用范围. 我们利用 BI-DIME 为配体首次实现了 2,4,6-三异丙基苯硼酸这一空前位阻底物的四取代高效偶联; 采用 AntPhos (**L5**) 为配体在弱碱 K_3PO_4 作用下实现了含醛基、硝基、氰基、酯基等官能团化底物的大位阻交叉偶联; AntPhos 还可以高效催化邻位双取代溴代物与二级烷基硼酸的偶联, 为合成一系列诸如

“分子齿轮”等结构化合物提供了有效策略. 随后, 我们采用手性大位阻单膦配体和底物间次级作用相结合的设计理念, 利用苯并噁唑啉酮辅基和芳基间的 $\pi-\pi$ 作用, 成功地发展了高立体选择性的邻位酰基化芳基芳基间不对称 Suzuki-Miyaura 偶联; 利用极性基团 BOP 辅基和芳基间的极性- π 作用, 成功地实现了应用性强的邻位氧基取代芳基芳基间高效不对称 Suzuki-Miyaura 偶联. 并利用此催化体系高效构建了天然产物 Korupensamine A 和 Korupensamine B 中的轴手性, 采用我们小组发的不对称氢化方法完成了分子中四氢异喹啉手性胺部分的立体选择性合成. 这是首次通过高效的不对称 Suzuki-Miyaura 交叉偶联及不对称氢化完成此类手性联

芳基天然产物的合成. 在此基础上, 我们完成了 Michellamine B 的高效立体选择性全合成. 这些结果充分表明我们小组所发展的单膦配体在大位阻 Suzuki-Miyaura 偶联中表现出重要的应用价值, 所发展的不对称 Suzuki-Miyaura 交叉偶联体系适用于多种官能团化的底物, 并有望应用于一系列手性联芳基类天然产物的简便合成.

作者简介

徐广庆, 博士研究生. 2009 年毕业于青岛科技大学化工学院, 现为中国科学院上海有机化学研究所在读博士研究生(导师: 汤文军研究员), 主要从事有机膦配体催化的不对称反应研究及其在天然产物合成中的应用.

赵庆, 博士研究生. 2013 年毕业于中国科学院上海有机化学研究所(导师: 汤文军研究员), 现于巴黎综合理工学院攻读博士研究生, 主要从事金催化的有机合成反应的研究.

汤文军, 研究员, 博士生导师, 于 1995 年毕业于华东理工大学精细化工系; 1998 年于中国科学院上海有机化学研究所获硕士学位; 2003 年于美国宾夕法尼亚州立大学获博士学位; 2003~2005 年在美国 Scripps 研究所从事博士后研究; 2005~2009 年在美国 Boehringer Ingelheim 药业公司药物工艺部门(Chemical Develop-

ment)先后任高级科学家(Senior Scientist)和首席科学家(Principal Scientist); 2011 年 7 月起任中国科学院上海有机化学研究所研究员、课题组长; 2012 年 2 月入选第七批国家“千人计划(青年项目)”. 主要研究方向为: 不对称催化、天然产物全合成、药物工艺.

References

- [1] (a) Bringmann, G.; Gulder, T.; Gulder, T. A. M.; Breuning, M. *Chem. Rev.* **2011**, *111*, 563.
(b) Bringmann, G.; Mortimer, A. J. P.; Keller, P. A.; Gresser, M. J.; Garner, J.; Breuning, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2005**, *44*, 5384.
(c) Wang, R. W.-J.; Rebhun, L. I.; Kupchan, S. M. *Cancer Res.* **1977**, *37*, 3071.
(d) Allock, Y. F.; Manfredi, K. P.; Blunt, J. W.; Cardellina, J. H., II; Schäffer, M.; Gulden, K.-P.; Bringmann, G.; Lee, A. Y.; Clardy, J.; Francois, G.; Boyd, M. R. *J. Org. Chem.* **1994**, *59*, 6349.
(e) Boyd, M. R.; Hallock, Y. F.; Cardellina, J. H.; Manfredi, K. P.; Blunt, J. W.; McMahon, J. B.; Buckheit, R. W.; Bringmann, G.; Schäffer, M.; Cragg, G. M.; Thomas, D. W.; Jato, J. G. *J. Med. Chem.* **1994**, *37*, 1740.
- [2] (a) Hayashi, T.; Hayashizaki, K.; Kiyoi, T.; Ito, Y. *J. Am. Chem. Soc.* **1988**, *110*, 8153.
(b) Genov, M.; Fuentes, B.; Espinet, P.; Pelaz, B. *Tetrahedron: Asymmetry* **2006**, *17*, 2593.
- [3] (a) Liu, Z.; Zhang, Y.; Wang, J. *Chin. J. Org. Chem.* **2013**, *33*, 687 (in Chinese).
(刘振兴, 张艳, 王剑波, 有机化学, **2013**, *33*, 687.)
(b) Xie, W.; Zuo, Z.; Zi, W.; Ma, D. *J. Chin. J. Org. Chem.* **2013**, *33*, 869 (in Chinese).
(谢卫青, 左智伟, 资伟伟, 马大为, 有机化学, **2013**, *33*, 869.)
- [4] (a) Yin, J. J.; Buchwald, S. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2000**, *122*, 12051.
(b) Shen, X.; Jones, G. O.; Watson, D. A.; Bhayana, B.; Buchwald, S. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 11278.
(c) Cammidge, A. N.; Crépy, K. V. L. *Chem. Commun.* **2000**, 1723.
(d) Cammidge, A. N.; Crépy, K. V. L. *Tetrahedron* **2004**, *60*, 4377.
(e) Bermejo, A.; Ros, A.; Fernández, R.; Lassaletta, J. M. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 15798.
(f) Uozumi, Y.; Matsuura, Y.; Arakawa, T.; Yamada, Y. M. A. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 2708.
(g) Sawai, K.; Tatum, R.; Nakahodo, T.; Fujihara, H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 6917.
(h) Zhang, S.-S.; Wang, Z. Q.; Xu, M.-H.; Lin, G.-Q. *Org. Lett.* **2010**, *12*, 5546.
(i) Genov, M.; Almorin, A.; Espinet, P. *Chem. Eur. J.* **2006**, *12*, 9346.
(j) Yamamoto, T.; Akai, Y.; Nagata, Y.; Sugimoto, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 8844.
(k) Wang, S.; Li, J.; Miao, T.; Wu, W.; Li, Q.; Zhuang, Y.; Zhou, Z.; Qiu, L. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 1966.
- [5] (a) Dai, C.; Fu, G. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, *123*, 2719.
(b) Yin, J. J.; Rainka, M. P.; Zhang, X.-X.; Buchwald, S. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2002**, *124*, 1162.
(c) Barder, T. F.; Walker, S. D.; Martinelli, J. R.; Buchwald, S. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 4085.
- [6] Tang, W.; Capacci, A. G.; Wei, X.; Li, W.; White, A.; Patel, N. D.; Savoie, J.; Gao, J. J.; Rodriguez, S.; Qu, B.; Haddad, N.; Lu, B. Z.; Krishnamurthy, D.; Yee, N. K.; Senanayake, C. H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, *49*, 5879.
- [7] Zhao, Q.; Senanayake, C. H.; Tang, W. *Chem. Eur. J.* **2013**, *19*,

- 2261
- [8] Martin, R.; Buchwald, S. L. *Acc. Chem. Res.* **2008**, *41*, 1461
- [9] Jana, R.; Pathak, T. P.; Sigman, M. S. *Chem. Rev.* **2011**, *111*, 1417.
- [10] (a) Dreher, S. P.; Dormer, P. G.; Sandrock, D. C.; Molander, G. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 9257.
(b) Han, C.; Buchwald, S. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 7532
- [11] Li, C.; Xiao, G.; Zhao, Q.; Liu, H.; Wang, T.; Tang, W. *Org. Chem. Front.* **2014**, *1*, 225
- [12] Liu, G.; Xu, G.; Luo, R.; Tang, W. *Synlett* **2013**, 2465
- [13] Tang, W.; Patel, N. D.; Xu, G.; Xu, X.; Savoie, J.; Ma, S.; Hao, M.-H.; Keshipetty, S.; Capacci, A. G.; Wei, X.; Zhang, Y.; Gao, J. J.; Li, W.; Rodriguez, S.; Lu, B. Z.; Yee, N. K.; Senanayake, C. H. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 2258
- [14] Xu, G.; Fu, W.; Liu, G.; Senanayake, C. H.; Tang, W. *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 570
- [15] (a) Cozzi, F.; Cinquini, M.; Annuziata, R.; Siegel, J. S. *J. Am. Chem. Soc.* **1993**, *115*, 5330.
(b) Chen, C.-T.; Siegel, J. S. *J. Am. Chem. Soc.* **1994**, *116*, 5959.
(c) Pace, C. J.; Gao, J. *Acc. Chem. Res.* **2013**, *46*, 907
- [16] Liu, G.; Liu, X.; Cai, Z.; Jiao, G.; Xu, G.; Tang, W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 4235.

(Qin, X.)