光照条件下链状醚 α -碳-氢键官能团化反应研究孙 京^a 彭新华^{*,a} 郭 浩^{*,b}^(a) 南京理工大学化工学院 南京 210094^(b) 复旦大学化学系 上海 200433

摘要 发展了一套新型的可以实现链状醚 α -碳-氢键官能团化的方法. 该方法无需任何添加剂, 仅在紫外光的激发下, 室温下即可温和且高效地完成芳香醛、酮类化合物与链状醚类化合物的加成反应, 从而可以清洁且高选择性地生成 β -羟基醚类化合物. 研究了激发光能量及反应温度对该反应的影响, 并对该反应可能的机理进行了讨论.

关键词 光化学; 碳-氢键官能团化; 机理; 自由基反应; 绿色化学

Photoinduced α -C—H Bond Functionalization of Linear EthersSun, Jing^a Peng, Xinhua^{*,a} Guo, Hao^{*,b}^(a) School of Chemical Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094^(b) Department of Chemistry, Fudan University, Shanghai 200433

Abstract A new and effective method for the direct functionalization of ethereal C—H bond was reported. This reaction undergoes smoothly under UV irradiation at room temperature without any additive, which presents a new environmentally friendly protocol to access β -hydroxyl ethers highly selectively. In addition, a possible mechanism of this reaction was proposed.

Keywords photochemistry; C-H functionalization; mechanism; radical reactions; green chemistry

碳-氢键官能团化反应一直是有机化学中的研究热点. 近年来, 化学家们在这一领域做出了大量的工作^[1,2]. 目前, 实现 $C(sp^3)$ -H 键官能团化的常用方法包括: 通过过渡金属催化的碳-氢键活化过程来实现^[3], 通过自由基过程来实现^[4,5]. 这些方法都需要加入添加剂, 例如: 过渡金属催化剂^[3]或者自由基引发剂^[4,5]等. 而这些添加剂的加入显然是对环境不友好的. 因此, 化学家们一直在努力寻找更加绿色的可以实现碳-氢键官能团化的方法. 我们在之前的研究工作中, 成功发展了光照条件下四氢呋喃对芳香醛或芳香酮的加成反应^[6], 从而为高效合成 β -羟基四氢呋喃衍生物提供了新的方法. 该反应的突出特点就是直接利用清洁的光能作为能量来源, 使反应底物芳香醛或芳香酮达到激发态, 从而直接与四氢呋喃发生化学反应, 使四氢呋喃的 α -碳-氢键发生官能团化, 生成目标产物. 在整个过程中, 不需要添加任何添加剂. 因此, 是一个对环境非常友好的绿色化学反应. 在有机化学反应中, 环状醚类化合物与链

状醚类化合物的反应性, 既存在着很大的相似性, 又往往有所不同. 为了研究该反应的底物普适范围, 我们在自己^[6]及其他^[7]小组工作的基础之上, 继续研究了链状醚类化合物的 α -碳-氢键官能团化反应. 我们希望在里报道一些近期所获得的研究结果.

1 结果与讨论

1.1 实验讨论

首先, 选取对甲氧基二苯甲酮(**1a**)和乙醚(**2a**)作为标准底物, 对其在紫外光照条件下的反应性进行了仔细的研究(表 1). 实验结果表明: 在 365 nm 紫外光条件下, 该反应在室温下进行 35 h 可以转化完全, 以 15% 的分离产率得到了目标产物 **3aa**(表 1, Entry 1). 为了提高反应的产率, 我们尝试着提高激发光的能量. 当激发光波长为 313 nm 时, 反应的产率提高到了 30%(表 1, Entry 2). 当激发光波长为 254 nm 时, 反应的产率大大提高, 达到

* E-mail: xinhpeng@njut.edu.cn, hao_guo@fudan.edu.cn

Received May 29, 2014; revised August 11, 2014; published online September 9, 2014.

Project supported by the Scientific Research Foundation for the Returned Overseas Chinese Scholars, State Education Ministry (No. 【45-5】).

教育部留学回国人员科研启动基金(No. 【45-5】)资助项目.

了 61%(表 1, Entry 3). 进一步提高激发光波长至 185 & 254 nm 时, 反应的产率明显下降, 只有 43%, 同时生成了少量无法分离鉴定的副产物(表 1, Entry 4). 于是, 我们选取 254 nm 作为最佳光照条件. 在这之后, 我们又研究了温度效应对反应的影响. 当将反应温度降低到 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 反应的转化率和产率都明显降低(表 1, Entry 5). 而当升高反应温度而令其在回流条件下进行时, 反应的产率同样有所降低, 同时伴有少量无法分离鉴定的副产物生成(表 1, Entry 6). 最终, 根据上述实验事实, 确定了该反应的最佳反应条件为: 常温下在 254 nm 的紫外光照条件下进行. 于是, 我们将光照条件下的醚类 α -碳-氢键官能团化反应成功地由环状醚类体系扩展到了链状醚类体系. 从而实现了链状醚类对芳香酮类化合

物的直接加成, 为高效合成 β -羟基醚类化合物提供了新的方法.

1.2 普适性研究

在最佳反应条件下, 我们对该反应体系的底物普适性进行了考察, 如表 2 所示. 二芳基酮类化合物能够顺利地 与乙醚、叔丁基甲醚或者苯甲醚进行光化学反应, 以中等到良好的产率得到目标产物(表 2, Entries 1~4). 芳基烷基酮可以与乙醚进行光化学反应, 以中等的产率和 1:1 的比例得到一对苏式和赤式产物的混合物(表 2, Entry 5). 但是, 芳基烷基酮与苯甲醚的反应在转化完全后, 却不能分离到任何目标产物(表 2, Entry 6). 接下来,

表 1 反应条件优化^a

Table 1 Optimization of the reaction conditions

Entry	Wavelength/nm	Temperature	Time/h	Isolated yield/% of 3aa
1	365	r.t.	35	15
2	313	r.t.	22	30
3	254	r.t.	12	61
4	185 & 254	r.t.	11	43 ^b
5	254	$-20\text{ }^{\circ}\text{C}$	33	6 ^c
6	254	reflux	10	44 ^b

^a All reactions were carried out using a Matrix-10 reactor with sixteen ultraviolet lamps (10 W per lamp) as the irradiation source in deaerated ether ($c=20\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$) under argon atmosphere; ^b some unidentified products were observed; ^c 50% of **1a** was recovered.

表 2 链状醚与芳香醛、酮的反应^a

Table 2 The photoreaction of linear ethers with aromatic aldehydes or ketones

Entry	1 (R ¹ , R ²)	2 (R ³ , R ⁴)	Time/h	3	Isolated yield/% of 3
1	1a (4-MeO, 4-MeOC ₆ H ₄)	2a (Me, Et)	12	3aa	61
2	1a (4-MeO, 4-MeOC ₆ H ₄)	2b (H, Bu- <i>t</i>)	11.5	3ab	71
3	1b (H, C ₆ H ₅)	2c (Me, C ₆ H ₅)	11.5	3bc	45
4	1c (F, 4-FC ₆ H ₄)	2a (Me, Et)	3	3ca	46
5	1d (4-MeO, Me)	2a (Me, Et)	14	3da	56 ^b
6	1d (4-MeO, Me)	2c (Me, C ₆ H ₅)	24.5	3dc	Trace
7	1e (4-MeO, H)	2a (Me, Et)	2	3ea	65 ^b
8	1e (4-MeO, H)	2b (H, Bu- <i>t</i>)	4	3eb	60
9	1e (4-MeO, H)	2c (Me, C ₆ H ₅)	15.5	3ec	NR (95) ^c
10	1f (4-Bu- <i>t</i> , H)	2a (Me, Et)	2.5	3fa	56 ^b
11	1g (H, H)	2a (Me, Et)	2	3ga	56 ^b
12	1h (4-NO ₂ , H)	2a (Me, Et)	11.5	3ha	Trace
13	1i (4-CF ₃ , H)	2a (Me, Et)	15	3ia	Trace

^a All reactions were carried out using a Matrix254-10 reactor with sixteen 254 nm lamps (10 W per lamp) as the irradiation source in deaerated ether ($c=20 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$) under argon atmosphere; ^b *threo*-**3** : *erythro*-**3** = 1 : 1^[8]; ^c recovered yield of **1e**.

我们研究了芳香醛类化合物在标准条件下的反应性. 实验结果表明, 当苯环上连有甲氧基这种强给电子基团时, 能够与乙醚或者叔丁基甲醚快速反应, 以中等的产率生成目标产物(表 2, Entries 7, 8). 然而, 当令其与苯甲醚进行反应时, 没有任何反应发生(表 2, Entry 9). 之后, 我们又研究了芳香醛底物芳环上的电子效应对其反应性的影响, 发现当芳环上连有弱给电子基团或氢原子时, 目标反应同样能够顺利进行(表 2, Entries 10, 11). 然而, 当芳环上连有强拉电子基团时, 此反应不能顺利生产目标产物(表 2, Entries 12, 13).

1.3 机理解释

根据上述实验结果及相关文献报道^[4b,6,7,11,12], 我们提出了该反应可能的机理(Scheme 1). 首先, 在紫外光照条件下, 对甲氧基二苯甲酮吸收能量达到较高能级的激发态. 之后, 经过快速系间窜越(ISC)回到三线态^[4b,11]. 处于三线态的羰基官能团具有一定的自由基性质, 它可以攫取乙醚的 α -氢从而生成羟游基 **A**^[4b,11]和链状醚自由基 **B**. 这两个自由基进一步发生偶联反应, 便生成了最终产物. 这样的机理可以很好地解释上述实验事实. 较高的激发光能量能够促进对甲氧基二苯甲酮三线态的生成, 从而有利于获得较高的产率(表 1, Entries 1~3); 而当激发光能量过高时, 对甲氧基二苯甲酮将达到很高能级的激发态, 从而非常容易分解, 因此使反应产率有所降低(表 1, Entry 4). 当降低反应温度时, 自由基偶联反应的速率将会随着降低, 因而, 低温下的反应速率比较低(表 1, Entry 5). 升高温度时, 虽然会提高自由基偶联反应的速率, 但也同时会促进其它的一些副反应, 从而降低目标产物的收率(表 1, Entry 6).

图式 1 可能的反应机理

Scheme 1 The possible reaction mechanism

2 结论

我们成功地将光照条件下的醚类 α -碳-氢键官能团化反应由环状醚类体系扩展到了链状醚类体系. 对激发光能量以及温度效应对反应的影响进行了细致的研究, 从中总结了相应的规律, 对底物普适性进行了研究. 并

提出了反应可能的机理. 由于该反应不需要添加任何添加剂, 因此, 为高效合成 β -羟基醚类化合物提供了新的更加绿色的方法.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

所有光化学反应均在 Matrix-10 型光反应器中进行. 熔点检测采用 WRS-2 熔点仪; ¹H NMR (400 MHz)和 ¹³C NMR (100 MHz)检测采用 AVANCE III 400 核磁共振仪; 红外检测采用 AVATAR 360 型(FT-IR)红外光谱仪(美国 Nicolet 公司); MS (ESI)检测采用 1100 LC/MSD SL 质谱仪(美国 Agilent 公司); HRMS (ESI)检测采用 APEX IIITM ESI-FTICRMS 质谱仪(美国 Bruker Daltonics 公司); HRMS (EI) 检测采用 Water GCT CA176 质谱仪. 无水乙醚、无水叔丁基甲醚与无水苯甲醚均由实验室蒸馏所制; 其它试剂和药品全部从市场直接购买.

3.2 实验方法

光反应标准方法^[6]. 在无水无氧、氩气保护条件下, 向 10 mL 石英反应管中依次加入芳香醛或酮 **1** (0.20 mmol)以及链状醚 **2** (10 mL), 之后经氩气脱气 10 min. 在 Matrix254-10 光反应器中室温反应至 TLC 监测反应物转化完全. 经快速柱层析纯化得到产物 **3**.

1,1-二(4-甲氧基苯基)-2-乙氧基-1-丙醇(**3aa**): 产率 61%, 无色液体. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.40 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 7.29 (d, $J=9.2$ Hz, 2H), 6.84~6.76 (m, 4H), 4.24 (q, $J=6.4$ Hz, 1H), 3.75 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 3.69~3.61 (m, 1H), 3.44~3.34 (m, 1H), 3.12 (s, 1H), 1.09 (t, $J=7.2$ Hz, 3H), 1.01 (d, $J=6.4$ Hz, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 158.02, 157.97, 139.1, 137.1, 127.7, 127.0, 113.2, 113.1, 79.4, 78.6, 64.5, 55.1, 15.5, 13.6; IR (neat) ν : 3564, 1608, 1506, 1465 cm^{-1} ; MS (ESI) m/z : 339 ($M+\text{Na}^+$); HRMS (ESI) calcd for C₁₉H₂₄NaO₄ 339.1567, found 339.1574.

1,1-二(4-甲氧基苯基)-2-叔丁氧基-1-乙醇(**3ab**): 产率 71%, 无色液体. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.32 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 6.83 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 3.80~3.76 (m, 2H), 3.79 (s, 3H), 3.78 (s, 3H), 3.53 (s, 1H), 1.21 (s, 9H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 158.4, 137.6, 127.9, 113.2, 73.6, 68.2, 55.18, 55.15, 27.6; IR (neat) ν : 3554, 1614, 1506, 1460 cm^{-1} ; MS (ESI) m/z : 353 ($M+\text{Na}^+$); HRMS (ESI) calcd for C₂₀H₂₆NaO₄ 353.1723, found 353.1722.

1,1-二苯基-2-苯氧基-1-乙醇(**3bc**)^[12]: 产率 45%, 白色固体. m.p. 97~98 °C (lit.^[12] 99~100 °C); ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.55~6.85 (m, 15 H), 4.46 (s, 2H), 3.42 (s, 1H).

1,1-二(4-氟苯基)-2-乙氧基-1-丙醇(**3ca**): 产率 46%, 无色液体. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.47~7.42 (m, 2H), 7.36~7.30 (m, 2H), 7.01~6.91 (m, 4H), 4.27 (q, J =6.4 Hz, 1H), 3.73~3.64 (m, 1H), 3.44~3.35 (m, 1H), 3.16 (s, 1H), 1.10 (t, J =7.2 Hz, 3H), 1.00 (d, J =6.4 Hz, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 161.4, 142.3, 127.9, 114.8, 79.4, 78.4, 64.6, 15.5, 13.4; IR (neat) ν : 3491, 1598, 1507 cm⁻¹; HRMS (EI) calcd for C₁₇H₁₈F₂O₂ 292.1275, found 292.1272.

2-(4-甲氧基苯基)-3-乙氧基-2-丁醇(**3da**) (*threo*-**3da** : *erythro*-**3da** = 1 : 1): 产率 56%, 无色液体. *threo*-**3da**: ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.42~7.30 (m, 2H), 6.89~6.83 (m, 2H), 3.80 (s, 3H), 3.72~3.25 (m, 3H), 3.13 (s, 1H), 1.47 (s, 3H), 1.14 (t, J =7.2 Hz, 3H), 0.88 (d, J =6.4 Hz, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 158.5, 137.9, 127.1, 113.3, 82.3, 76.0, 65.2, 55.2, 27.4, 15.5, 14.1; IR (neat) ν : 3537, 1613, 1510, 1461 cm⁻¹; MS (ESI) m/z : 246.9 (M+Na⁺); HRMS (ESI) calcd for C₁₃H₂₀NaO₃ 247.1305, found 247.1307. *erythro*-**3da**: ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.42~7.30 (m, 2H), 6.89~6.83 (m, 2H), 3.80 (s, 3H), 3.72~3.25 (m, 3H), 2.74 (s, 1H), 1.56 (s, 3H), 1.21 (t, J =6.8 Hz, 3H), 1.01 (d, J =6.4 Hz, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 158.0, 137.3, 126.5, 113.3, 81.6, 75.8, 65.1, 55.2, 22.6, 15.5, 13.9; IR (neat) ν : 3537, 1613, 1510, 1461 cm⁻¹; MS (ESI) m/z : 246.9 (M+Na⁺); HRMS (ESI) calcd for C₁₃H₂₀NaO₃ 247.1305, found 247.1307.

1-(4-甲氧基苯基)-2-乙氧基-1-丙醇(**3ea**)^[9] (*threo*-**3ea** : *erythro*-**3ea** = 1 : 1): 产率 65%, 无色液体. *threo*-**3ea**: ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.27 (d, J =8.4 Hz, 2H), 6.87 (d, J =8.8 Hz, 2H), 4.33 (d, J =8.4 Hz, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.69~3.40 (m, 3H), 3.36~3.31 (brs, 1H), 1.25 (t, J =6.8 Hz, 3H), 0.98 (d, J =6.4 Hz, 3H). *erythro*-**3ea**: ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.27 (d, J =8.4 Hz, 2H), 6.87 (d, J =8.8 Hz, 2H), 4.80 (d, J =3.2 Hz, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.69~3.40 (m, 3H), 2.68~2.63 (brs, 1H), 1.20 (t, J =7.2 Hz, 3H), 0.96 (d, J =6.4 Hz, 3H).

1-(4-甲氧基苯基)-2-叔丁氧基-1-乙醇(**3eb**): 产率 60%, 黄色液体. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.32 (d, J =8.4 Hz, 2H), 6.89 (d, J =8.8 Hz, 2H), 4.77~4.70 (m, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.50~3.43 (m, 1H), 3.35~3.24 (m,

1H), 1.22 (s, 9H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 159.5, 132.3, 127.5, 113.8, 72.8, 67.8, 55.3, 27.6; IR (neat) ν : 3567, 1610, 1561, 1513, 1467 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₁₃H₂₀NaO₃ 247.1305, found 247.1308.

1-(4-叔丁基苯基)-2-乙氧基-1-丙醇(**3fa**) (*threo*-**3fa** : *erythro*-**3fa** = 1 : 1): 产率 56%, 无色液体. *threo*-**3fa**: ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.38~7.32 (m, 2H), 7.30~7.26 (m, 2H), 4.36 (d, J =8.0 Hz, 1H), 3.72~3.41 (m, 3H), 3.30 (s, 1H), 1.31 (s, 9H), 1.27 (t, J =6.0 Hz, 3H), 0.99 (d, J =6.0 Hz, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 151.0, 137.5, 127.0, 125.2, 80.1, 78.1, 64.5, 37.1, 31.4, 15.6, 13.4; IR (neat) ν : 3467, 1516, 1464 cm⁻¹; MS (ESI) m/z : 258.9 (M+Na⁺); HRMS (ESI) calcd for C₁₅H₂₄NaO₂ 259.1669, found 259.1680. *erythro*-**3fa**: ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.38~7.32 (m, 2H), 7.30~7.26 (m, 2H), 4.86 (d, J =3.4 Hz, 1H), 3.72~3.41 (m, 3H), 2.56 (s, 1H), 1.31 (s, 9H), 1.22 (t, J =6.8 Hz, 3H), 0.99 (d, J =6.4 Hz, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 150.1, 137.1, 126.0, 125.0, 79.0, 74.8, 64.4, 37.1, 31.4, 15.6, 13.4; IR (neat) ν : 3467, 1516, 1464 cm⁻¹; MS (ESI) m/z : 258.9 (M+Na⁺); HRMS (ESI) calcd for C₁₅H₂₄NaO₂ 259.1669, found 259.1680.

1-苯基-2-乙氧基-1-丙醇(**3ga**) (*threo*-**3ga** : *erythro*-**3ga** = 1 : 1): 产率 56%, 黄色液体. *threo*-**3ga**: ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.38~7.26 (m, 5H), 4.38 (d, J =8.0 Hz, 1H), 3.76~3.42 (m, 3H), 3.36 (brs, 1H), 1.25 (t, J =6.4 Hz, 3H), 0.98 (d, J =6.4 Hz, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 140.7, 128.3, 128.0, 127.3, 80.1, 79.0, 64.5, 15.6, 13.3; IR (neat) ν : 3470, 1446, 1375 cm⁻¹; MS (ESI) m/z : 202.9 (M+Na⁺); HRMS (ESI) calcd for C₁₁H₁₆NaO₂ 203.1043, found 203.1041. *erythro*-**3ga**: ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.38~7.26 (m, 5H), 4.89 (d, J =3.6 Hz, 1H), 3.76~3.42 (m, 3H), 2.66 (brs, 1H), 1.22 (t, J =6.4 Hz, 3H), 0.99 (d, J =6.0 Hz, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 140.5, 128.1, 127.3, 126.3, 78.3, 74.8, 64.4, 15.5, 13.3; IR (neat) ν : 3470, 1446, 1375 cm⁻¹; MS (ESI) m/z : 202.9 (M+Na⁺); HRMS (ESI) calcd for C₁₁H₁₆NaO₂ 203.1043, found 203.1041.

References and note

- [1] (a) Goldberg, K. I.; Goldman, A. S. *Activation and Functionalization of C-H Bonds*, American Chemical Society, Washington, DC, 2004.
(b) Dyker, G. *Handbook of C-H Transformations: Applications in Organic Synthesis*, Wiley-VCH, Weinheim, 2005.
(c) Yu, J. Q.; Shi, Z. *C-H Activation*, Springer-Verlag, Berlin, 2010.

- [2] (a) Jia, C.; Kitamura, T.; Fujiwara, Y. *Acc. Chem. Res.* **2001**, *34*, 633.
 (b) Yu, S.; Ma, S. *Chin. J. Org. Chem.* **2002**, *22*, 307 (in Chinese). (余世超, 麻生明, 有机化学, **2002**, *22*, 307.)
 (c) Díaz-Requejo, M. M.; Pérez, P. J. *Chem. Rev.* **2008**, *108*, 3379.
 (d) Chen, X.; Engle, K. M.; Wang, D. H.; Yu, J. Q. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 5094.
 (e) Giri, R.; Shi, B. F.; Engle, K. M.; Maugel, N.; Yu, J. Q. *Chem. Soc. Rev.* **2009**, *38*, 3242.
 (f) Lyons, T. W.; Sanford, M. S. *Chem. Rev.* **2010**, *110*, 1147.
 (g) McMurray, L.; O'Hara, F.; Gaunt, M. J. *Chem. Soc. Rev.* **2011**, *40*, 1885.
 (h) Boorman, T. C.; Larrosa, I. *Chem. Soc. Rev.* **2011**, *40*, 1910.
 (i) Lewis, J. C.; Coelho, P. S.; Arnold, F. H. *Chem. Soc. Rev.* **2011**, *40*, 2003.
 (j) Hartwig, J. F. *Acc. Chem. Res.* **2012**, *45*, 864.
 (k) Pan, F.; Shi, Z. *Acta Chim. Sinica* **2012**, *70*, 1679 (in Chinese). (潘菲, 施章杰, 化学学报, **2012**, *70*, 1679.)
 (l) Liu, W.; Bi, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, *32*, 1041 (in Chinese). (刘伟, 毕艳兰, 有机化学, **2012**, *32*, 1041.)
- [3] (a) Chatani, N.; Asaumi, T.; Yorimitsu, S.; Ikeda, T.; Kakiuchi, F.; Murai, S. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, *123*, 10935.
 (b) Murahashi, S. I.; Nakae, T.; Terai, H.; Komya, N. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 11005.
 (c) Li, Z.; Yu, R.; Li, H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 7497.
 (d) Kubiak, R.; Prochnow, I.; Doye, S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 1153.
 (e) Zhang, S.; Tu, Y.; Fan, C.; Zhang, F.; Shi, L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 8761.
 (f) Li, F.; Jiang, T.; Cai, H.; Wang, G. *Chin. J. Chem.* **2012**, *30*, 2041.
 (g) Ma, Y.; Li, W.; Yu, B. *Acta Chim. Sinica* **2013**, *71*, 541 (in Chinese). (马玉勇, 李薇, 俞飏, 化学学报, **2012**, *71*, 541.)
- [4] (a) Bertrand, S.; Hoffmann, N.; Pete, J. P. *Eur. J. Org. Chem.* **2000**, 2227.
 (b) Bauer, A.; Westkämper, F.; Grimme, S.; Bach, T. *Nature* **2005**, *436*, 1139.
- [5] For ethereal C—H bond functionalization, see:
 (a) Yoshimitsu, T.; Tsunoda, M.; Nagaoka, H. *Chem. Commun.* **1999**, 1745.
 (b) Mosca, R.; Fagnoni, M.; Mella, M.; Albin, A. *Tetrahedron* **2001**, *57*, 10391.
 (c) Yamada, K.; Fujihara, H.; Yamamoto, Y.; Miwa, Y.; Taga, T.; Tomioka, K. *Org. Lett.* **2002**, *4*, 3509.
 (d) Yoshimitsu, T.; Arano, Y.; Nagaoka, H. *J. Org. Chem.* **2003**, *68*, 625.
 (e) Yamada, K.; Yamamoto, Y.; Tomioka, K. *Org. Lett.* **2003**, *5*, 1797.
 (f) Fernández, M.; Alonso, R. *Org. Lett.* **2003**, *5*, 2462.
 (g) Yoshimitsu, T.; Makino, T.; Nagaoka, H. *J. Org. Chem.* **2003**, *68*, 7548.
 (h) Yamamoto, Y.; Yamada, K.; Tomioka, K. *Tetrahedron Lett.* **2004**, *45*, 795.
 (i) Yamada, K.; Yamamoto, Y.; Maekawa, M.; Tomioka, K. *J. Org. Chem.* **2004**, *69*, 1531.
 (j) Yoshimitsu, T.; Arano, Y.; Nagaoka, H. *J. Org. Chem.* **2005**, *70*, 2342.
 (k) Akindele, T.; Yamamoto, Y.; Maekawa, M.; Umeki, H.; Yamada, K.; Tomioka, K. *Org. Lett.* **2006**, *8*, 5729.
 (l) Shikanai, D.; Murase, H.; Hata, T.; Urabe, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 3166.
 (m) Jurberg, I. D.; Odabachian, Y.; Gagosz, F. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 3543.
- [6] Hao, X.; Liu, C.; Liu, C.; Chen, Y.; Zhao, X.; Song, M.; Qian, R.; Guo, H. *Tetrahedron Lett.* **2013**, *54*, 6964.
- [7] Yoshida, Z.; Kimura, M. *Tetrahedron* **1975**, *31*, 221.
- [8] The structure of product **3** was determined by ¹H NMR analysis according to corresponding literature reported data^[6,9,10].
- [9] Yoshimitsu, T.; Arano, Y.; Nagaoka, H. *J. Org. Chem.* **2005**, *70*, 2342.
- [10] Yuan, Z.; Li, X. *Chin. J. Magn. Res.* **2003**, *20*, 307 (in Chinese). (原忠, 李锐, 波谱学杂志, **2003**, *20*, 307.)
- [11] Bertrand, S.; Hoffmann, N.; Humbel, S.; Pete, J. P. *J. Org. Chem.* **2000**, *65*, 8690.
- [12] Eisch, J. J.; Galle, J. E.; Piotrowski, A.; Tsai, M. *J. Org. Chem.* **1982**, *47*, 5051.

(Li, L.; Lu, Z.)