黄酮醇类化合物的合成研究进展

梅青刚^{a,b} 袁伟成^a 王 淳^{*,b}^(a) 中国科学院成都有机化学研究所 成都 610041)^(b) 中国科学院成都生物研究所 成都 610041)

摘要 黄酮醇即 3-羟基黄酮, 是一类独特的黄酮化合物, 广泛存在于植物界中, 具有许多重要的生物活性和药理作用, 其化学合成研究一直备受关注. 综述了黄酮醇骨架的 4 种主要合成方法: Auwers 法, 查尔酮氧化关环即 Algar-Flynn-Oyamada (AFO) 反应, Baker-Venkatarman 法, 黄酮 DMDO (3,3-二甲基双环氧乙烷) 氧化法; 并对多羟基黄酮醇的区域选择性甲基化、异戊烯基化和糖苷化等衍生化方法进行了概述.

关键词 黄酮醇; 合成; AFO 反应; 衍生化; 区域选择性

Progress in the Synthesis of 3-Hydroxyflavones

Mei, Qinggang^{a,b} Yuan, Weicheng^a Wang, Chun^{*,b}^(a) Chengdu Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041)^(b) Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041)

Abstract Flavonols, also known as 3-hydroxyflavones, are a kind of unique flavonoids that widely distributed in the plant kingdom, and have been associated with a wide variety of biological activities and pharmaceutical applications. Four principal synthetic approaches to flavonol skeleton including Auwers synthesis, Algar-Flynn-Oyamada reaction (AFO), Baker-Venkatarman synthesis and flavone oxidation by 3,3-dimethyldioxirane (DMDO) are summarized. The regioselective methylation, prenylation and glycosylation of polyhydroxyl flavonols are presented as well.

Keywords flavonol; synthesis; AFO reaction; derivatization; regioselectivity

黄酮醇即 3-羟基黄酮, 是一类独特的黄酮化合物, 广泛存在于植物界中, 数量众多, 结构复杂多样, 具有许多重要的生物活性和药理作用. 它们不仅能够清除人体内的自由基, 具备抗氧化功效; 还能解毒抗炎, 阻断血小板的凝集, 抑制癌症的发生, 对人类的许多疾病具有治疗作用; 而且, 还能增强心脑血管血流量, 调节代谢, 提高人体免疫力^[1~3]. 黄酮醇的药用价值已为人们所熟知, 西兰花、西红柿、洋葱和苹果等蔬菜水果, 茶叶和红酒等饮品都富含黄酮醇, 经常食用有助于降低冠心病的发病率^[4].

在植物的生长繁殖过程中, 黄酮醇同样扮演着重要角色. 黄酮醇类化合物使植物呈现各种花色, 吸引传粉者, 保护植物免受紫外光、昆虫、细菌、真菌和病毒的伤害, 还作为植物激素的调控者. 玉米和矮牵牛花的花粉突变体, 因缺少了黄酮醇而不能发芽; 然而, 倘若在

授粉时添加山柰酚, 这种缺陷就能予以弥补, 突变体花粉仍能正常生长发育^[5].

此外, 黄酮醇及其衍生物还是一类典型的具有激发态分子内质子转移(ESIPT)特性的荧光化合物, 互变异构诱导产生双荧光现象, 其荧光行为对分子环境诸如极性、氢键作用等非常敏感, 被誉为多参数、多功能的第二代荧光探针^[6]. 作为一种溶剂变色染料, 有望制成分子荧光传感器, 用于监测生物分子间的反应^[7,8]. 近年研究发现, 用噻吩作为 B 环合成的黄酮醇类似物, 可作为散装异质结太阳能电池的一种材料^[9].

黄酮醇这些独特的生物活性和优良的物理化学性质, 引起了研究者的广泛兴趣, 其化学合成方法研究日益受到重视. 本文就近年来黄酮醇及其衍生物的合成研究作一综述.

* E-mail: wangchun@cib.ac.cn

Received August 29, 2014; revised September 12, 2014; published online September 16, 2014.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21172214).

国家自然科学基金(No. 21172214)资助项目.

1 黄酮醇骨架的合成

黄酮醇骨架的合成, 关键点不仅仅在于苯并 γ -吡喃酮环的形成, 还在于 3-羟基的引入. 这两个步骤可以合二为一, 同时完成, 如: Auwers 法、查尔酮氧化关环即 AFO 反应; 也可以分步进行, 即先合成黄酮, 再引入羟基, 如: Baker-Venkatarman 法、黄酮 DMDO 氧化法.

1.1 Auwers 合成法

Auwers 法^[10,11]是较早的黄酮醇合成法, 由 Auwers 于 1908 年发现. 苯并呋喃与苯甲醛缩合, 溴化生成 2-溴-2-(α -溴苄基)苯并呋喃酮, 然后经醇碱处理发生重排, 转变为黄酮醇(Scheme 1).

图式 1 Auwers 法合成黄酮醇

Scheme 1 Auwers synthesis of flavonol

由于该反应的底物适用面较窄, 中间体二溴化物制备较难, 反应步骤较多, 产率偏低, 因此在有机合成中的实际应用较少.

1.2 Algar-Flynn-Oyamada (AFO)反应

查耳酮氧化关环即 Algar-Flynn-Oyamada (AFO)反应, 最初由爱尔兰的 Algar, Flynn 和日本的 Oyamada 在 1934 年同时报道, 后经 Ozawa 及 Smith 等的改进, 成为制备黄酮醇类化合物的经典方法, 被广泛运用于各类黄

图式 2 汪小组 AFO 反应合成黄酮醇的路线

Scheme 2 Synthetic route of flavonols via AFO reaction used by Wang

酮醇的合成^[12]. 基本反应是: 在碱性溶液中, 2'-羟基查尔酮与过氧化氢作用, 氧化环合一步进行, 生成黄酮醇. 原料 2'-羟基查尔酮, 一般由苯乙酮和苯甲醛缩合制得.

湖南大学汪秋安研究小组^[13]在这方面做了大量的研究工作. 2006 年, 他们以廉价易得的间苯二酚和 3,5-二羟基苯甲酸为原料, 先将其转化为邻羟基苯乙酮和取代苯甲醛, 继而在碱性条件下发生醛酮缩合反应, 然后, 在 $H_2O_2/NaOH$ 体系中, 查尔酮氧化环合一步进行, 以 21%~32% 的总收率合成了系列黄酮醇类化合物 (Scheme 2).

人们对 AFO 反应的底物进行了拓展研究. 3',4'-二羟基黄酮醇有良好的抗氧化活性和血管舒张活性, 但水溶性较差 ($<10^{-7} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$). Yap 等^[14]以取代氨基苯乙酮为原料, 经过醛酮的 Claisen-Schmidt 缩合, 查尔酮碱性 H_2O_2 氧化闭环, 成功地合成了氨基黄酮醇 (Scheme 3). 水解后在 6-位引入羧基, 大大增强了 3',4'-二羟基黄酮醇的水溶性, 其钠盐在水中的溶解度达到 $10^{-1} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Black 研究小组^[15]首次将 AFO 反应应用于吡啶类黄酮醇的合成. 他们以取代乙酰基吡啶为原料, 与苯甲醛缩合得到吡啶查尔酮; 然后, 用 $H_2O_2/NaOH$ 氧化得到环氧化物中间体; 最后, 在 KOH/THF 体系中, 以中等收率合成了吡啶黄酮醇类化合物 (Scheme 4). 反应立体效应明显, 当吡啶 2,3-位都被苯基取代时, 吡啶查尔酮环氧化物中间体不能接受氨基的进攻, 不能得到相应的黄酮醇或橙酮.

AFO 反应在一些天然产物的合成中也得到了运用. Chrysosplenol D 最初是从我国传统药材黄花蒿 (*Artemisia annua* L.) 中提取的化合物^[16]. 研究发现, 该化合物能抑制恶性疟原虫和金黄色葡萄球菌体内的多

图式 3 Yap 小组水溶性黄酮醇的合成路线

Scheme 3 Synthetic route of water-soluble flavonols used by Yap

图式 4 吲哚黄酮醇类似物的合成路线

Scheme 4 Synthetic route of indole analogues of flavonols

药耐药性射流泵功能, 故而能加强青蒿素的抗疟活性以及诺氟沙星的抑菌活性^[17]. 虽然后来在多种植物中均有发现, 但天然丰度都较低. 2008 年, Kraus 科研小组^[18]实现了其化学合成, 以三甲氧基邻羟基苯乙酮为原料, 与二苄氧基苯甲醛羟醛缩合先制得查尔酮. 在随后的 AFO 反应中, 由于邻位甲氧基的存在, 他们使用了过量的 H_2O_2 和 NaOH , 并延长了反应时间, 先以 60% 的产率制得了二氢黄酮醇, 再用 I_2 氧化, 以 78% 的产率制得了黄酮醇, 完成 AFO 氧化环合反应. 最终, 以 31% 的总产率实现了 Chrysosplenol D 的人工合成 (Scheme 5). 这种先制得二氢黄酮醇再用 I_2 氧化脱氢的方法, 将传统的 AFO 反应分为两步进行, 产率适中, 中间体二氢黄酮醇易于纯化贮存, 这对于 AFO 反应的深入研究具有一定指导意义.

2010 年, Lewin 课题组^[19]以甜橙中含量丰富的橙皮苷为原料, 运用改进的 AFO 法, 分 2 次加入 30% 的 H_2O_2 溶液, 低温下反应 2 d, 然后用乙酸调节体系的 pH 值至 6, 再加入焦亚硫酸钠回流 2 h, 最后在酸性条件下脱糖, “一锅”内合成了 4'-甲基槲皮素 (Scheme 6). 这种改进将氧化、酸化和脱氢在“一锅”内连续进行, 操作简便易行, 适合于大量的制备; 但反应时间长, 产率较低, 脱糖后收率仅为 14%.

Pandurangan 等^[20]结合上述两种改进方法, 用 $\text{H}_2\text{O}_2/\text{NaOH}$ 氧化得到查尔酮环氧化物, 该环氧化物在酸性条件下选择性开环生成二氢黄酮醇, 再加入焦亚硫酸钾溶液回流, 以中等收率合成了黄酮醇类化合物

(Scheme 7). 该方法选用 MOM 作保护基, 得到了 AFO 反应的两个关键中间体, MOM 保护基在酸化生成二氢黄酮醇时一并脱除; 而且, 选用焦亚硫酸钾氧化脱氢, 后处理方便, 避免了 I_2 氧化的繁琐步骤, 尽管产率有所下降, 但对于多羟基黄酮醇的合成, 不失为一种较好的改进方法.

2012 年, Gunduz 等^[21]对经典的 AFO 反应进一步进行了改进, 发展了“一锅法” AFO 环合法. 以邻羟基苯乙酮与取代苯甲醛为原料, 在氢氧化钠甲醇溶液中回流反应 3 h, 冷却至室温后, 直接加入 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氢氧化钠和 35% 的 H_2O_2 溶液搅拌 2~3 h, “一锅”内连续操作合成了黄酮醇及其类似物(噻吩取代的 3-羟基黄酮) (Scheme 8). 反应没有查尔酮和橙酮等副产物生成, 粗产物只需用 EtOAc 萃取或者简单的过滤处理, 就可以得到目标产物. 该方法显著的特点是: 利用甲酰基苯硼酸“一锅”操作合成了 4'-羟基黄酮醇, 而用其它方法很难一步完成; 简化了查尔酮中间体的制备步骤, 合成时间大大缩短, 分离纯化简单易行, 产率明显提高, 最高可达 79%, 值得进一步研究完善.

人们对 AFO 反应的机理进行了广泛的研究^[22~24], 下面是 Geismann 等^[25]提出的一种可能的反应机理 (Scheme 9): 查尔酮在过氧化氢作用下转化为环氧化物中间体, 然后酚氧负离子对环氧化物进行亲核进攻, 环化为二氢黄酮醇, 继而被氧化为黄酮醇. 若环氧化物中的酚氧负离子对羰基 β -位进行进攻, 则生成二氢黄酮醇; 进攻羰基 α -位, 则生成副产物五元环的橙酮.

图式 5 Chrysosplenol D 的合成路线
Scheme 5 Synthetic route of chrysosplenol D

图式 6 由橙皮苷合成 4'-甲基槲皮素
Scheme 6 Synthesis of tamarixetin from hesperidin

图式 7 Pandurangan 等多羟基黄酮醇的合成路线
Scheme 7 Synthetic route of polyhydroxyl flavonols used by Pandurangan

图式 8 Gunduz 等的黄酮醇“一锅”合成法
Scheme 8 “One-pot” synthesis of flavonols used by Gunduz

图式 9 AFO 反应合成黄酮醇的可能机理
Scheme 9 Possible mechanism of AFO reaction

反应机理能够解释许多实验现象. 例如, 对于 6'-位没有取代基或者取代基体积较小的查尔酮, 应用 AFO 反应得到黄酮醇类化合物的收率较高(Schemes 2 和 5); 而当 6'-位取代基体积过大时, 其对羰基(C=O)的立体位阻作用致使 2'-酚羟基与羰基 β -位的距离增大, 与 α -位的距离拉近, 因此, 副产物五元环橙酮的量增加^[26], 而黄酮醇的收率明显下降(Scheme 7).

然而, 该反应机理也备受质疑——是否形成环氧化物中间体^[22,23]. 在上述条件下, 2'-羟基查尔酮环氧化物中间体一直未能分离得到^[15]; 但是, 当 2'-羟基被 OMOM、甲氧基等取代时, 在同样条件下, 分离得到唯一的产物查尔酮环氧化物(Scheme 7).

AFO 反应, 从发现至今已有 80 年的历史, 仍然是目前人们普遍采用的一种黄酮醇合成法. 其廉价易得的底物原料, 普通寻常的反应试剂, 简单易行的操作步骤, 是其它方法难以企及的. 但是, 反应产率受底物及条件的影响较大, 规律性还不够明朗, 反应有橙酮、二氢黄酮醇、2-苄基-2-羟基二氢苯并呋喃-3-酮以及 2-芳基苯并呋喃-3-羧酸等副产物生成, 在大规模生产和应用上仍有一定的局限性. 人们正围绕 AFO 反应的机理研究, 分离纯化可能的中间体, 探索影响反应的因素, 以期减少副反应的发生, 从而最终提高 AFO 反应的产率.

1.3 Baker-Venkataraman 法

由 Allan-Robinson 反应演变而来的 Baker-Venkataraman 法^[27,28], 是通用的黄酮类化合物合成方法. 包括 3 个步骤: 邻羟基苯乙酮与芳甲酰氯(芳甲酸酐或芳甲酸)在吡啶中生成酯; 然后, 在碱性条件下发生 Baker-Venkataraman 重排反应, 得到 β -丙二酮化合物, 经酸催化闭环生成黄酮类化合物(Scheme 10).

当 R 基团为烷基(通常为甲基或苄基)或苯甲酰基时, 闭环生成的 3-O-位取代黄酮脱去烷基或苯甲酰基, 就得到了黄酮醇化合物. 苯甲酰氧基的导入, 可以通过引入溴原子间接进行^[29](Scheme 11).

人们对 Baker-Venkataraman 法的改进, 多集中于使用不同的碱催化体系(如碳酸钾、叔丁醇钾、有机锂试剂), 硅烷基羟基保护以及相转移催化法等, 将邻羟基苯乙酮直接转化为 β -丙二酮, 使得酯化和重排两步反应能够一步进行.

更多的研究者尝试将重排和环合两步合二为一. Tanaka 等^[30]在合成一种对花粉的黄酮醇半乳糖基转移酶(F3GalTase)的形成具有光催化作用的山柰酚衍生物时, 先将邻羟基苯乙酮与芳香甲酸在 DMAP 等催化下形成酯; 然后在碳酸钾/吡啶体系中, 酯直接脱水闭环生成 3-苄氧基黄酮; 最后脱去苄基, 得到黄酮醇化合物(Scheme 12).

图式 10 Baker-Venkataraman 法合成黄酮的路线
Scheme 10 Baker-Venkataraman synthesis of flavones

图式 11 Baker-Venkatarman 法合成黄酮醇的路线
Scheme 11 Baker-Venkatarman synthesis of flavonols

图式 12 Tanaka 小组合成黄酮醇衍生物的路线
Scheme 12 Synthesis route of flavonols used by Tanaka

2007年, Shaw课题组^[31]在合成4个不同基团保护的黄酮醇衍生物时,采用了几乎完全相同的方法。酯直接脱水闭环,产率不高,仅为40%左右(Scheme 13)。值得注意的是,环合时,本例中是5-MOM保护基脱除;而在上例中,主要得到7-TBDPS保护基脱除产物。

Chen等^[32]在合成5,7-二羟基-3-O-β-D-半乳糖基黄酮醇时,更进一步缩短了反应步骤,实现了从邻羟基苯乙酮到黄酮醇的“一锅法”合成。邻羟基苯乙酮与苯甲酸酐在苯甲酸酐中于170℃搅拌3h后,加入氢氧化钾和

乙醇回流0.5h,之后,在水溶液中通入CO₂气体,方便地制得了黄酮醇(Scheme 14)。该合成方法用苯甲酸酐作酯化试剂,生成的酯在碱性条件下脱水闭环,随后在水溶液中脱去苯甲酰基,再用饱和CO₂气体酸化;这种改进方法将酯化、重排、脱水闭环、苯甲酰基脱除多步反应合并为两步,在“一锅”内连续操作,大大简化了手续,具有时间短、操作简单、溶剂环境友好等优点,同时产率也有所提高。不过这种方法,适用于较简单的底物,对于多取代底物,还需要进一步研究。

图式 13 Shaw 小组合成黄酮醇衍生物的路线
Scheme 13 Synthetic route of flavonols use by Shaw

图式 14 Chen 小组合成黄酮醇衍生物的路线

Scheme 14 Synthetic route of flavonols use by Chen

利用 Baker-Venkataraman 法合成黄酮醇类化合物, 需要经过中间体黄酮, 才能得到黄酮醇, 步骤较多, 总收率也往往不高; 但是, 各步反应易于操作, 中间体的纯化也易于进行, 更重要的是, 反应底物廉价易得, 人们还可以根据底物情况, 灵活使用. 因此, 这种传统方法依然具有良好的应用前景.

1.4 黄酮 DMDO 氧化

Costa 等^[33]早年报道了一种黄酮转化为黄酮醇的方法. 先用二异丙基氨基锂(LDA)使黄酮的 3-位氢去质子化生成锂盐, 然后用硼酸甲酯处理, 乙酸酸化, H_2O_2 氧化, 再经水解得到黄酮醇. 该方法黄酮醇的收率较高, 但由于锂盐的制备和硼酸甲酯处理都需要在 $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ 进行, 反应条件苛刻, 操作步骤较多, 不适于大量的制备. 人们转而致力于寻找通过氧化黄酮而插入羟基的方法. 但黄酮分子中, 共轭双键由于受到羰基吸电子和烷氧基供电子的协同作用, 因而, 对于不论是亲电的还是亲核的氧化试剂, 其均表现为惰性. H_2O_2 曾用来氧化异黄酮、查尔酮和橙酮, 但是, 用 *m*-CPBA, H_2O_2 这类经典的酸碱性氧化剂以及 $KMnO_4$, SeO_2 , NiO_2 , $Tl(OAc)_3$ 等金属类氧化剂, 对黄酮的直接氧化都未能成功.

二甲基双环氧乙烷(DMDO)是一种温和的烯烃环氧化试剂. 不论是富电子烯烃, 还是缺电子诸如 α,β -不饱和酸、酯、酮等的共轭烯烃, 都能被它环氧化. 1991 年, Adam 科研小组^[34]首次将 DMDO 应用于黄酮的环氧化, 后来也用于查尔酮和异黄酮的环氧化. 他们采用间歇式地滴加过量数倍的 DMDO 的丙酮溶液, 合成了黄酮的

C(2)~C(3)环氧化产物, 产率 90%以上. 该环氧化产物是热力学不稳定化合物, 尤其是 4'-位为供电子基团时, 在催化量的对甲苯磺酸作用下开环, 得到几乎定量的黄酮醇(Scheme 15). 之后, 在山柰酚和槲皮素衍生物的合成中, 这种利用 DMDO 氧化黄酮为黄酮醇的方法, 因其良好的产率而得到了广泛的应用^[35,36].

2005 年, Hecht 及其合作者^[37]以柚皮素为原料, 经过查尔酮的 $I_2/DMSO$ 氧化环合, 黄酮的 DMDO 氧化, 高效地合成了山柰酚糖苷衍生物 SL0101, 一种对核糖体蛋白质激酶 p90 Rsk 具有显著抑制活性的天然产物, 探索了一条从黄酮到天然黄酮醇衍生物的便捷合成途径(Scheme 16).

DMDO 本身不稳定, 贮存时间短, 且制备过程繁琐, 反应条件苛刻, 在一定程度上制约了黄酮醇类化合物的合成研究. 2009 年, Adams 等^[38]对 DMDO 环氧化反应进行改进, 将 DMDO 的制备和氧化反应合二为一, 用新鲜的 DMDO 原位反应制备黄酮醇. 后经吴峥等^[26]的进一步改进, 采用间歇式滴加过硫酸氢钾复合盐溶液的方法, 对黄酮的共轭双键进行环氧化反应, 合成黄酮醇的产率达 95%以上. 改进后, 既简化了合成 DMDO 的步骤, 又提高了黄酮醇的产率. 该合成方法区域选择性较好, 几乎没有副产物生成, 后处理相对简单, 且整个反应体系能在水溶液中进行, 不需要相转移催化剂, 反应过程中没有有毒物质产生, 达到了当今绿色化学的基本要求.

图式 15 黄酮 DMDO 氧化法合成黄酮醇

Scheme 15 Synthesis of flavonols via flavones oxidation by DMDO

图式 16 山奈酚糖苷衍生物 SL0101 的合成路线

Scheme 16 Synthetic route of kaempferol glycoside SL0101

2011 年, Compton 等^[39]研究发现, 黄酮的 DMDO 氧化受电子效应的影响显著. 当黄酮的 5-, 7-位被甲氧基取代时, 除了生成相应的黄酮醇外, 羟基还会插入 A 环, 生成多个副产物(Scheme 17), 并且随着 DMDO 量的增加各个副产物的量均会增加; 但是, 当 5-或 7-位的甲氧基换为吸电子的乙酰氧基或苯甲酰氧基时, 主产物黄酮醇的收率则显著增加.

另一种氧化黄酮的试剂是高价碘试剂: 碘苯二乙酯 $[\text{PhI}(\text{OAc})_2]$. 氧化得到的缩酮直接酸水解, 失去 3 分子甲醇, 得到相应的黄酮醇, 总产率在 60% 左右^[40,41] (Scheme 18).

利用 DMDO 等试剂氧化黄酮, 制备黄酮醇, 拓展了黄酮醇的合成底物, 而且产率较高; 对于某些易于得到的天然黄酮或黄烷酮原料, 不失为一种制备黄酮醇的简易方法. 但是, 人们对 DMDO 等试剂所适用的黄酮底物特征, 尚未得到规律性的认识, 尚需在合成实践中不断探索.

2 黄酮醇衍生物的合成

黄酮醇衍生物的合成, 是进一步研究这类化合物的

生物活性和成药性的重要手段. 由于多羟基黄酮醇结构的特殊性, 其衍生化反应必然涉及到区域选择性问题. 这里重点概述黄酮醇的选择性甲基化、异戊烯基化和糖苷化反应.

2.1 黄酮醇的 O-位选择性甲基化

天然黄酮醇类化合物, 其母核上或多或少含有甲氧基. 构效关系研究表明, A 环或 B 环上甲氧基的存在, 是一些黄酮醇类化合物具有显著细胞毒活性的重要因素^[42~44]. 然而, 黄酮醇母核上的多个酚羟基, 要实现其选择性甲基化, 难度较大. 毋庸置疑, 多羟基黄酮醇的直接烷基化产物, 必然是各种 O-位烷基化产物的混合物, 难于分离. 因此, 对黄酮醇类化合物进行区域选择性甲基化, 一直是人们热衷研究的课题.

早在 20 世纪 60 年代, Jurd^[45,46]对槲皮素的烷基化进行了详细的研究, 发现 O-位全乙酰化槲皮素的乙酰基被烷基(苄基)取代的顺序为: $7 > 4' > 3 > 5 > 3'$. 而后, Rao 小组^[47]用硫酸二甲酯对槲皮素直接甲基化, 发现黄酮的 O-位甲基化遵循以下特定顺序: $4' > 7 > 3 > 3' > 5$, 甲基化的难易取决于各个酚羟基的相对活性. 2002 年,

图式 17 5,7-二甲氧基黄酮的 DMDO 氧化

Scheme 17 Reaction of 5,7-dimethoxyflavone with DMDO

图式 18 黄酮碘苯二乙酯氧化法合成黄酮醇

Scheme 18 Synthesis of flavonols via flavones oxidation by iodobenzene diacetate

Bouktaib 等^[48]采用连续的保护和脱保护, 实现了槲皮素 5 个酚羟基的单甲基化, 酚羟基表现出相对活性: $7 > 3 \approx 4' > > 5$; 然而, 在对二苯甲缩酮保护的槲皮素苄基化时, 3-位苄基化产物为主产物(Scheme 19), 显示相对活性: $3 > 7$. 邻二羟基二苯甲缩酮的存在, 使得 7-和 3-羟基活性顺序发生反转. 这一实验结论也被后来一些研究者所证实^[49,50].

2010 年, 何玲等^[51]进一步探索了槲皮素的单甲基化. 在微波辅助和相转移催化剂作用下, 利用硼络合物作保护基, 实现了槲皮素的区域选择性苄基化, 进而高产率地合成了 4 个单甲基化衍生物(Scheme 20). 该方法所选用的保护和脱保护试剂灵活多样, 且操作方便, 缩短了反应时间, 产率也有所提高, 值得进一步研究.

综合上述文献, 黄酮醇酚羟基的相对活性大致表现为: $7 > 4' \approx 3 > 3' > 5$. 5-羟基与羰基($C=O$)的氢键作用

致使其活性最弱, 利用这一点, 通过苄基等保护其它酚羟基, 易于实现甲基化; 而 3-和 3'-羟基活性与 4'-位差异不大, 同时由于空间因素的影响, 甲基化较难实现. 但是, 通过灵活运用保护和脱保护手段, 实现黄酮醇各个酚羟基的区域选择性甲基化, 大都能获得满意的产率. 然而, 向某些天然黄酮醇的 A 环直接导入甲氧基等基团, 却一直困扰着人们. 2010 年, Lewin 科研小组^[19]报道了一种通过卤原子间接导入甲氧基的方法. 合成路线设计巧妙, 先用 NBS 在黄酮醇 A 环的 6-位和 8-位引入溴原子, 再经碘甲烷在 3,7-位导入甲氧基, 最后在 CuBr 催化下, 发生溴甲氧基化亲核取代反应. 以橙皮苷为原料, 5 步反应合成了 5,3'-二羟基-3,6,7,8,4'-五甲氧基黄酮(1 种具有显著的抗有丝分裂细胞毒活性的天然产物)(Scheme 21). 但是, 最后一步产物较为复杂, 8-位甲氧基化较困难, 产率仅为 20%.

图式 19 槲皮素的 7-*O*-甲基化
Scheme 19 7-*O*-Methylation of quercetin

图式 20 何小组槲皮素的选择性单甲基化
Scheme 20 Selective monomethylation of quercetin used by He

图式 21 由橙皮苷半合成多甲氧基黄酮

Scheme 21 Semisynthesis of polymethoxyflavone from Hesperidin

2.2 黄酮醇的异戊烯基化

异戊烯基化在芳香天然产物特别是黄酮、异黄酮、香豆素、蒽醌的结构多样性中扮演重要的角色^[52]。目前报道的异戊烯基化黄酮超过 1000 个。从药用植物中发现的许多异戊烯基化黄酮具有更为广泛、更强的生理活性,如抗肿瘤、抗雄激素、抗利什曼虫、抗 NO 的产生等^[53]。不同存在形式的异戊烯基侧链,可使黄酮类化合物的亲脂性得到提高,有助于其在生物体中透过细胞膜,通过增加与生物膜的结合能力、改善与蛋白的作用,而导致黄酮显著的生理活性改变^[54]。Pinostrobin 对 cAMP 磷酸二酯酶的抑制活性仅为 8-prenylpinostrobin 的 1/6^[55],其细胞毒活性为后者的 1/3 至 1/4^[56]。8-位具有异戊烯基、法呢烯基、lavandyl 的黄酮在多药耐药 [multidrug resistance protein 1 (MRP1)/ATP-binding cassette C1(ABCC1) inhibitor] 中更具有潜力^[57]。增加异戊烯基更是提高黄酮类化合物细胞毒活性的结构要求^[58]。

在黄酮醇母核上引入异戊烯基的早期报道,见于 Jain 等^[59]对山柰酚衍生物的合成。他们用 2-甲基-3-丁

烯-2-醇试剂,在 $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ 作用下,与部分甲基化的山柰酚偶联,得到的产物是 6-和 8-异戊烯基以及 6,8-二异戊烯基衍生物的混合物,再利用柱层析分离纯化(Scheme 22)。这种异戊烯基直接连接到黄酮醇母核上的方法,羟基不需要保护,反应一步进行,操作简单;但是,原料反应不完全,产率低,难以控制其位置选择性,常常得到单异戊烯基化和双异戊烯基化产物的混合物,难于分离。

在黄酮结构中引入异戊烯基的常用方法,是利用 Claisen 重排反应——连接到苯环的 *O*-位异戊烯基团,在碱性条件下加热重排到酚羟基的邻位或对位,成为 *C*-位异戊烯基团。2014 年, Nemoto 小组^[60]采用该法合成了 5'-异戊烯基槲皮素。他们用 2-甲基-3-丁烯-2-基碳酸异丁基酯试剂,先将 2-甲基-3-丁烯-2-基引入到部分保护的槲皮素的 4'-羟基上,然后在乙酸酐作用下发生 Claisen 重排,得到邻位重排产物,产率为 95%。脱去保护基后,得到 5'-异戊烯基槲皮素(Scheme 23)。

图式 22 黄酮醇类化合物的直接异戊烯基化

Scheme 22 Direct prenylation of flavonols

图式 23 Claisen 重排反应合成 5'-异戊烯基槲皮素

Scheme 23 Synthesis of uralenol via Claisen rearrangement

2005 年, Daskiewicz 等^[61]用异戊烯基溴试剂, 先将异戊烯基引入到槲皮素的 5-羟基上, 再加热发生 Claisen 重排, 得到对位重排产物 8-异戊烯基槲皮素, 产率为 50% (Scheme 24).

为了提高 Claisen 对位重排反应的收率, Al-Maharik 等^[62]在合成天然产物 lupiwightone 时, 首次选用 β -双酮类稀土金属铈配合物 $\text{Eu}(\text{fod})_3$ [三(6,6,7,7,8,8,8-七氟-2,2-二甲基-3,5-辛二酮)铈], 作为 Claisen 重排反应的催化剂, 对位重排的产率达到 68% (Scheme 25).

2013 年, 我们课题组^[63]在合成脱水淫羊藿素时, 对

铈催化剂 $\text{Eu}(\text{fod})_3$ 促进的 Claisen 对位重排反应与高温重排反应进行了比较 (Scheme 26). 使用铈催化剂, 在氯苯中 80 °C 反应过夜, 异戊烯基重排到 8-位的收率为 42%; 而在 *N,N*-二乙基苯胺中加热到 217 °C, 反应 3 h, 收率不到 30%. 这种使用铈催化剂的策略提高了对位重排的选择性, 而且大大降低了反应温度, 从而抑制了部分副反应的发生, 使得后处理相对简单化. 但是, 稀土金属价格昂贵, 而且具有毒性和不稳定性等问题, 应用受到一定限制.

图式 24 Claisen 对位重排反应合成 8-异戊烯基槲皮素

Scheme 24 Synthesis of 8-prenylated quercetin via *para*-Claisen rearrangement 图式 25 $\text{Eu}(\text{fod})_3$ 催化的 Claisen 对位重排反应合成 lupiwightoneScheme 25 Synthesis of lupiwightone via *para*-Claisen rearrangement catalyzed by $\text{Eu}(\text{fod})_3$

图式 26 脱水淫羊藿素的合成路线

Scheme 26 Synthetic route of icaritin

此外, 异戊烯基的引入, 文献报道的方法还有: 碱催化的异戊烯基溴与苯酚的反应^[64]、异戊烯基溴与芳基锂试剂的反应^[65]、异戊烯基溴与芳香硼酸化合物或芳香三氟硼酸钾盐的 Suzuki-Miyaura 反应^[66]、铈催化的二甲基丙二烯与芳香底物的偶联反应^[67]、烯丙基醇与苯酚的 Mitsunobu 反应-Claisen 重排-烯炔复分解串联反应^[56]等。但是, 这些方法往往选用催化剂较贵, 实验操作复杂, 副产物多并且难于分离。本课题组正致力于黄酮类化合物的异戊烯基化研究, 期望探索一种成本低廉、操作简单、收率良好的具有普遍意义的异戊烯基引入方法。

2.3 黄酮醇的糖苷化

在天然黄酮苷中, 以槲皮素和山柰酚为代表的黄酮醇类化合物约占 80%, 是许多药用植物的有效成分, 具有抗氧化、抗炎抗真菌、抗 HIV-1、抗 MRSA 以及预防过敏、保肝、雌性激素样作用等多种生理活性^[68~71]。当前黄酮苷类化合物主要从植物中提取分离, 而植物中的含量又很低, 提取成本很高, 这无疑限制了其开发应用。因此, 黄酮糖苷的合成, 始终是人们关注的热点问题。

黄酮糖苷合成常用的方法有 Koenigs-Knorr 法^[31,37]、三氯乙酰亚胺酯法^[72]、相转移催化法^[73]。Koenigs-Knorr 法, 简单、成熟, 但是使用有毒、易爆并且价格昂贵的银盐或汞盐作催化剂, 反应条件苛刻, 后处理也较为繁琐; 而且方法受底物与催化剂等的影响明显, 应用于黄酮醇苷的合成产率较低。

Schmidt 三氯乙酰亚胺酯法, 糖供体稳定性好, 易于保存, 反应立体选择性好。该方法在寡糖和糖苷的合成中应用广泛, 收率较高, 但应用于黄酮醇苷的合成中, 收率仍然不理想。

相转移催化法, 通常以溴代乙酰化糖作糖供体, 丙

酮、氯仿或 DMF 为溶剂, 在碱性条件下(通常为 KOH 或 K_2CO_3), 通过相转移催化剂(通常为 TMEA 或 TBAB)作用生成糖苷。该方法反应体系简单、操作简便、条件温和、立体选择性好, 通过不断改进, 收率得到明显提高, 是黄酮醇糖苷化最常用的方法。Li 等^[74]利用 TBAB 作相转移催化剂, 在黄酮醇的 3-位分别引入 4 种不同的糖基(葡萄糖、木糖、半乳糖和阿拉伯糖), 合成了 16 个糖苷(Scheme 27), 产率都在 50%左右。

在对山柰酚和槲皮素的糖苷化中, Yu^[75,76]和 Du 等^[77]课题组发现, 3-羟基糖苷化的适宜方法是相转移催化法。最佳反应条件是: 在 $CHCl_3/aq. K_2CO_3$ ($V:V=1:1$) 体系中, 以溴代乙酰化糖作糖供体, TBAB 为相转移催化剂, 50 °C 反应 8 h, 收率较高(50%~91%)。相反, 对于 3'-、4'-和 7-羟基的糖苷化, 适宜使用糖基三氯乙酰亚胺酯法, CH_2Cl_2 作溶剂, $AgOTf$ 为催化剂, 可达到中等收率(52%)。

2006 年, Needs 等^[78]在合成槲皮素的 3-和 3'-O-葡萄糖酸时, 进一步指出: 溴代乙酰化糖和糖基三氯乙酰亚胺酯, 这两种不同的糖供体的区域选择性不同(Scheme 28)。以溴代乙酰化糖作供体, Ag_2O 作催化剂, $CaSO_4$ 为脱水剂, 在 0 °C 时于吡啶中反应 16 h, 只得到 3-位糖基化产物, 总产率为 40%; 相反, 以糖基三氯乙酰亚胺酯作供体, $BF_3 \cdot Et_2O$ 作催化剂, 3 Å 分子筛为脱水剂, 在 CH_2Cl_2 中室温反应过夜, 只得到 3'-位糖基化产物, 总产率为 11%。

在黄酮醇 3-羟基的糖苷化中, 苷元上其余羟基的保护和脱保护常常比较繁琐; 同时, 3-羟基的氢键作用, 导致糖苷化的产率不高。为了克服这两个致命弱点, Oyama 等^[79]将糖基的引入置于黄酮醇骨架的构建之前,

图式 27 Li 小组黄酮醇 3-O-糖苷的合成路线

Scheme 27 Synthetic route of 3-O-glycosylated flavonols used by Li

图式 28 Needs 小组槲皮素 3-和 3'-O-糖苷衍生物的合成路线

Scheme 28 Synthetic route of quercetin 3- and 3'-O-glycosylated derivatives used by Needs

将保护反应和糖基化反应合二为一, 缩短了反应步骤, 总产率有所提高(Scheme 29). 但是, 这种合成思路也有一定的局限性. 首先, 在向酮羰基的 β -位引入糖基时, 要用苄基保护的糖基三氯乙酰亚胺酯, 不能使用乙酰基保护的糖供体, 可能是因为乙酰基易于水解, 从而使糖供体失去活性; 而且, 引入糖基时伴随着硅烷基的部分脱落, 需要再次上保护基. 其次, 在随后的 Baker-Vekataraman 反应与脱水环合步骤中, 需要较高的温度, 产率也不高. 这些因素都制约着该方法的推广应用.

黄酮醇糖苷化的文献报道较多, 但总体产率不高, 步骤繁多且分离复杂, 其化学合成面临诸多挑战, 而模拟生物酶催化正在给这一领域注入新的活力.

黄酮醇的衍生化, 除了上述 3 类主要的衍生化反应, 此外还有: Sagrera 等^[41]报道的双黄酮醇衍生物的合成, Porco 小组^[80]发展的黄酮醇与桂皮酸酯的[3+2]光环化加成反应, 合成具有环戊醇并苯并呋喃骨架的潜在抗癌药物洛克米兰酸酯类化合物等. 这些结构新颖、性质独特的衍生物的合成, 丰富了黄酮醇大家族, 推动了对新

型合成方法的研究, 更为新药的发展提供了新的思路 and 方向.

3 结束语

黄酮醇类化合物独特而重要的生物和药理活性, 使得其合成方法研究一直备受有机化学和药物化学家们的重视. 由于黄酮醇类化合物结构复杂、反应位点多, 区域选择性往往难于控制, 常常需要多步的保护和脱保护; 同时, 其固有的特性如溶解性差、对酸碱性敏感等, 使得分离和纯化处理亦较为繁杂, 因此, 其合成和修饰的产率普遍不高. 这些都是对黄酮醇类化合物进行深入研究所面临的极具挑战性的课题. 但是, 随着有机合成新方法和新技术的不断涌现, 研究的不断深入, 相信在不久的将来会出现更加有效、更加经济和环保的合成黄酮醇的方法. 本文旨在能够对从事黄酮醇类化合物合成研究的工作者们有所裨益.

图式 29 Oyama 小组槲皮素 3-O-糖苷衍生物的合成路线

Scheme 29 Synthetic route of quercetin 3-O-glycosylated derivatives used by Oyama

References

- [1] Amado, N. G.; Fonseca, B. F.; Cerqueira, D. M.; Neto, V. M.; Abreu, J. G. *Life Sci.* **2011**, 89(15~16), 545.
- [2] Santos, M. C. S.; Goncalves, C. F. L.; Vaisman, M.; Ferreira, A. C. F.; Carvalho, D. P. *Food Chem. Toxicol.* **2011**, 49(10), 2495.
- [3] Yang, L. J.; Lu, D. F.; Guo, J. J.; Meng, X. L.; Zhang, G. L.; Wang, F. J. *Ethnopharmacol.* **2013**, 145(3), 715.
- [4] Huxley, R. R.; Neil, H. *Eur. J. Clin. Nutr.* **2003**, 57, 904.
- [5] Miller, K. D.; Strommer, J.; Taylor, L. P. *Plant Mol. Biol.* **2002**, 48(3), 233.
- [6] Klymchenko, A. S.; Ozturk, T.; Demchenko, A. P. *Tetrahedron Lett.* **2002**, 43(39), 7079.
- [7] Xu, S. J.; Shao, Y.; Ma, K.; Cui, Q. H.; Liu, G. Y.; Wu, F.; Li, M. J. *Analyst* **2011**, 136(21), 4480.
- [8] Zamotaiev, O. M.; Postupalenko, V. Y.; Shvadchak, V. V.; Pivovarenko, V. G.; Klymchenko, A. S.; Mely, Y. *Bioconjugate Chem.* **2011**, 22(1), 101.
- [9] Chen, D. Y.; Chen, C. L.; Cheng, Y. M.; Lai, C. H.; Yu, J. Y.; Chen, B. S.; Hsieh, C. C.; Chen, H. C.; Chen, L. Y.; Wei, C. Y.; Wu, C. C.; Chou, P. T. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2010**, 2(6), 1621.
- [10] Auwers, K.; Muller, K. *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **1908**, 41, 4233.
- [11] Bird, C. W.; Cookson, R. C. *J. Org. Chem.* **1959**, 24(3), 441.
- [12] Wang, Z. R. *Comprehensive Organic Name Reactions and Reagents*, John Wiley & Sons, Inc. **2010**, pp. 52~56.
- [13] Wang, Q. A.; Fang, W. Q.; Liao, T. G. *J. Hunan Univ. (Nat. Sci.)* **2006**, 33(6), 98 (in Chinese).
(汪秋安, 方伟琴, 廖头根, 湖南大学学报(自然科学版), **2006**, 33(6), 98.)
- [14] Yap, S.; Loft, K. J.; Woodman, O. L.; Williams, S. J. *ChemMedChem* **2008**, 3, 1572.
- [15] Black, D. S.; Kumar, N.; Mitchell, P. S. R. *J. Org. Chem.* **2002**, 67(8), 2464.
- [16] Rodriguez, E.; Carman, N. J.; Vander Velde, G.; McReynolds, J. H.; Mabry, T. J.; Irwin, M. A.; Geissman, T. A. *Phytochemistry* **1972**, 11(12), 3509.
- [17] Stermitz, F. R.; Scriven, L. N.; Tegos, G.; Lewis, K. *Planta Med.* **2002**, 68(12), 1140.
- [18] Kraus, G.; Roy, S. J. *Nat. Prod.* **2008**, 71, 1961.
- [19] Lewin, G.; Maciuk, A.; Thoret, S.; Aubert, G.; Dubois, J.; Cresteil, T. *J. Nat. Prod.* **2010**, 73(4), 702.
- [20] Pandurangan, N.; Bose, C.; Banerji, A. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2011**, 21(18), 5328.
- [21] Gunduz, S.; Goren, A. C.; Ozturk, T. *Org. Lett.* **2012**, 14(6), 1576.
- [22] Bennett, M.; Burke, A. J.; O'Sullivan, W. I. *Tetrahedron* **1996**, 52(20), 7163.
- [23] Stevens, J. F.; Miranda, C. L.; Frei, B.; Buhler, D. R. *Chem. Res. Toxicol.* **2003**, 16(10), 1277.
- [24] Bhattacharyya, S.; Hatua, K. *RSC Adv.* **2014**, 4(16), 18702.
- [25] Geissman, T. A.; Fukushima, D. K. *J. Am. Chem. Soc.* **1948**, 70(5), 1686.
- [26] Wu, Z.; Cai, S. L.; Fan, W. J.; Wang, Q. A. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, 32, 1296 (in Chinese).
(吴峥, 蔡双莲, 范文金, 汪秋安, 有机化学, **2012**, 32, 1296.)
- [27] Bois, F.; Beney, C.; Mariotte, A. M.; Boumendjel, A. *Synlett* **1999**, 9, 1480.
- [28] Ganguly, A. K.; Kaur, S.; Mahata, P. K.; Biswas, D.; Pramanik, B. N.; Chan, T. M. *Tetrahedron Lett.* **2005**, 46, 4119.
- [29] Fougereousse, A.; Gonzalez, E.; Brouillard, R. *J. Org. Chem.* **2000**, 65(2), 583.
- [30] Tanaka, H.; Stohlmeyer, M. M.; Wandless, T. J.; Taylor, L. P. *Tetrahedron Lett.* **2000**, 41(50), 9735.
- [31] Urgaonkar, S.; Shaw, J. T. *J. Org. Chem.* **2007**, 72(12), 4582.
- [32] Chen, L. L.; Li, J.; Luo, C.; Liu, H.; Xu, W. J.; Chen, G.; Liew, O. W.; Zhu, W. L.; Puah, C. M.; Shen, X.; Jiang, H. L. *Bioorg. Med. Chem.* **2006**, 14(24), 8295.
- [33] Costa, A. M.; Dean, F. M.; Jones, M. A.; Varma, R. S. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. I* **1985**, 799.
- [34] Adam, W.; Golsch, D.; Hadjirapolou, L.; Patonay, T. *J. Org. Chem.* **1991**, 56(26), 7292.
- [35] Lee, Y. J.; Wu, T. D. *J. Chin. Chem. Soc.* **2001**, 48(2), 201.
- [36] Chu, H. W.; Wu, H. T.; Lee, Y. J. *Tetrahedron* **2004**, 60(11), 2647.
- [37] Maloney, D. J.; Hecht, S. M. *Org. Lett.* **2005**, 7(6), 1097.
- [38] Adams, T. E.; Sous, M. E.; Hawkins, B. C.; Hirner, S.; Holloway, G.; Khoo, M. L.; Owen, D. J.; Savage, G. P.; Scammells, P. J.; Rizzacasa, M. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, 131(4), 1607.
- [39] Compton, B. J.; Larsen, L.; Weavers, R. T. *Tetrahedron* **2011**, 67(4), 718.
- [40] Moriarty, R. M.; Prakash, O.; Musallam, H. A. *J. Heterocycl. Chem.* **1985**, 22(2), 583.
- [41] Sagrera, G.; Seoane, G. *Synthesis* **2010**, 2776.
- [42] Beutler, J. A.; Hamel, E.; Vlietinck, A. J.; Haemers, A.; Rajan, P.; Roitman, J. N.; Cardellina II, J. H.; Boyd, M. R. *J. Med. Chem.* **1998**, 41(13), 2333.
- [43] Lopez-Lazaro, M.; Galvez, M.; Martin-Cordero, C.; Ayuso, M. J. *Stud. Nat. Prod. Chem.* **2002**, 27, 891.
- [44] Li, W. X.; Cui, C. B.; Cai, B.; Wang, H. Y.; Yao, X. S. *J. Asian Nat. Prod. Res.* **2005**, 7(4), 615.
- [45] Jurd, L. *J. Am. Chem. Soc.* **1958**, 80, 5531.
- [46] Jurd, L. *J. Org. Chem.* **1962**, 27, 1294.
- [47] Rao, K. V.; Owoyale, J. A. *J. Heterocycl. Chem.* **1976**, 13(6), 1293.
- [48] Bouktaib, M.; Lebrun, S.; Atmani, A.; Rolando, C. *Tetrahedron* **2002**, 58(50), 10001.
- [49] Chen, Z. W.; Hu, Y. Z.; Wu, H. H.; Jiang, H. D. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2004**, 14(15), 3949.
- [50] Li, N. G.; Shi, Z. H.; Tang, Y. P.; Yang, J. P.; Lu, T. L.; Zhang, F.; Huang, Y. W.; Wang, Z. J.; Duan, J. A. *Chin. Chem. Lett.* **2011**, 22(1), 5.
- [51] Zhou, Z. H.; Fang, Z.; Jin, H.; Chen, Y.; He, L. *Synthesis* **2010**, 3980.
- [52] Yazaki, K.; Sasaki, K.; Tsurumaru, Y. *Phytochemistry* **2009**, 70, 1739.
- [53] Alhassan, A. M.; Abdullahi, M. I.; Uba, A.; Umar, A. *Trop. J. Pharm. Res.* **2014**, 13(2), 307.
- [54] Clark, M. K.; Scott, S. A.; Wojtkowiak, J.; Chirco, R.; Mathieu, P.; Reiners, J. J.; Mattingly, R. R.; Borch, R. F.; Gibbs, R. A. *J. Med. Chem.* **2007**, 50(14), 3274.
- [55] Nikaido, T.; Ohmoto, T.; Kinoshita, T.; Sankawa, U.; Monache, F. D.; Botta, B.; Tomimori, T.; Miyaichi, Y.; Shirataki, Y.; Yokoe, I.; Komatsu, M. *Chem. Pharm. Bull.* **1989**, 37(5), 1392.
- [56] Poerwono, H.; Sasaki, S.; Hattori, Y.; Higashiyama, K. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2010**, 20(7), 2086.
- [57] Bobrowska-Hagerstrand, M.; Wrobel, A.; Mrowczynska, L.; Soderstrom, T.; Shirataki, Y.; Motohashi, N.; Molnar, J.; Michalak, K.; Hagerstrand, H. *Oncol. Res.* **2003**, 13, 463.
- [58] Li, F.; Awale, S.; Tezuka, Y.; Kadota, S. *Biol. Pharm. Bull.* **2009**, 32(12), 2075.
- [59] Jain, A. C.; Gupta, R. K. *Aust. J. Chem.* **1975**, 28(3), 607.
- [60] Kawamura, T.; Hayashi, M.; Mukai, R.; Terao, J.; Nemoto, H. *Synthesis* **2014**, 46(2), 170.
- [61] Daskiewicz, J. B.; Depeint, F.; Viornery, L.; Bayet, C.; Comte-Sarrazin, G.; Comte, G.; Gee, G. M.; Johnson, I. T.; Ndjoko, K.; Hostettmann, K.; Barron, D. J. *J. Med. Chem.* **2005**, 48(8), 2790.
- [62] Al-Maharik, N.; Botting, N. P. *Tetrahedron* **2003**, 59, 4177.

- [63] Mu, G. M.; Pu, W. C.; Zhou, M.; Liu, Y.; Yang, H. J.; Wang, C. *Chin. J. Org. Chem.* **2013**, 33(6), 1298 (in Chinese). (牟关敏, 蒲文臣, 周敏, 刘燕, 杨海君, 王淳, 有机化学, **2013**, 33(6), 1298.)
- [64] Yang, J. H.; Jiang, S. Z.; Zhao, Y. M.; Li, Y. F.; Ji, C. B.; Liu, W. Y. *Chin. Chem. Lett.* **2009**, 20(9), 1062.
- [65] Park, B. H.; Lee, H. J.; Lee, Y. R. *J. Nat. Prod.* **2011**, 74(4), 644.
- [66] Gerbino, D. C.; Mandolesi, S. D.; Schmalz, H. G.; Podesta, J. C. *Eur. J. Org. Chem.* **2009**, 3964.
- [67] Zhang, Y. J.; Skucas, E.; Krische, M. J. *Org. Lett.* **2009**, 11(18), 4248.
- [68] Ahn, M. J.; Kim, C. Y.; Lee, J. S.; Kim, T. G.; Kim, S. H.; Lee, C. K.; Lee, B. B.; Shin, C. G.; Huh, H.; Kim, J. *Planta Med.* **2002**, 68(5), 457.
- [69] Smith, J. A.; Maloney, D. J.; Hecht, S. M.; Lannigan, D. A. *Bioorg. Med. Chem.* **2007**, 15(14), 5018.
- [70] You, H. J.; Ahn, H. J.; Ji, G. E. *J. Agric. Food Chem.* **2010**, 58(20), 10886.
- [71] Veitch, N. C.; Grayer, R. J. *Nat. Prod. Rep.* **2011**, 28, 1626.
- [72] Caldwell, S. T.; Petersson, H. M.; Farrugia, L. J.; Mullen, W.; Crozier, A.; Hartley, R. C. *Tetrahedron* **2006**, 62(31), 7257.
- [73] Ren, X. H.; Shen, L. L.; Muraoka, O.; Cheng, M. S. *J. Carbohydr. Chem.* **2011**, 30, 119.
- [74] Li, Z. T.; Ngojeh, G.; DeWitt, P.; Zheng, Z.; Chen, M.; Lainhart, B.; Li, V.; Felpo, P. *Tetrahedron Lett.* **2008**, 49, 7243.
- [75] Li, M.; Han, X. W.; Yu, B. *Tetrahedron Lett.* **2002**, 43, 9467.
- [76] Yang, W. Z.; Sun, J. S.; Lu, W. X.; Li, Y.; Shan, L.; Han, W.; Zhang, W. D.; Yu, B. *J. Org. Chem.* **2010**, 75(20), 6879.
- [77] Du, Y. G.; Wei, G. H.; Linhardt, R. J. *Tetrahedron Lett.* **2003**, 44, 6887.
- [78] Needs, P. W.; Kroon, P. A. *Tetrahedron* **2006**, 62, 6862.
- [79] Oyama K.; Kawaguchi, S.; Yoshida, K.; Kondo, T. *Tetrahedron Lett.* **2007**, 48, 6005.
- [80] Roche, S. P.; Cencic, R.; Pelletier, J.; Porco Jr., J. A. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, 49(37), 6533.

(Qin, X.)