2-氰基-3-[1-(4-取代苯氧基苯基)乙胺基]烯酸乙氧乙酯的合成及除草活性

杨晓兵 毕常芬 胡方中* 狄红静 程心心

李 丹 阚晓丽 马嘉雪 邹小毛

(南开大学元素有机化学国家重点实验室 南开大学元素有机化学研究所
天津化学化工协同创新中心 天津 300071)

摘要 以取代苯酚 **4** 和对氟苯乙酮(**5**)为原料, 经 4 步反应合成关键中间体 1-(4-取代苯氧基苯基)乙胺(**9**), 再与 3 种中间体 2-氰基-3-乙氧基-2-戊烯酸乙氧乙酯(**1**)、2-氰基-3,3-二甲硫基丙烯酸乙氧乙酯(**2**)和 2-氰基-3-氯-4,4,4-三氟丁烯酸乙氧乙酯(**3**)分别发生缩合反应, 合成了 3 个系列共 35 个新 2-氰基-3-[1-(4-取代苯氧基苯基)乙胺基]烯酸乙氧乙酯类化合物(**10**, **11** 和 **12**)。所有新化合物的结构均经过 ^1H NMR, ^{13}C NMR, ^{19}F NMR 和 HRMS 的确证, 并测试了目标化合物的除草活性, 部分化合物在剂量为 93.75 g/ha 时, 对双子叶植物油菜和苋菜的抑制率为 100%。

关键词 2-氰基烯酸酯类化合物; 苯氧基苯乙胺; 合成; 除草活性

Synthesis and Herbicidal Activity of 2-Ethoxyethyl-2-cyano-3-(1-(4-(substitued phenoxy)phenyl)ethylamino) Alkenates

Yang, Xiaobing Bi, Changfen Hu, Fangzhong* Di, Hongjing Cheng, Xinxin

Li, Dan Kan, Xiaoli Ma, Jiaxue Zou, Xiaomao

(State Key Laboratory and Institute of Elemento-Organic Chemistry, Collaborative Innovation Center of Chemical Science and Engineering (Tianjin), Nankai University, Tianjin 300071)

Abstract Key intermediates, 1-(4-substituedphenoxyphenyl)ethanamines (**9**), which were prepared from starting material substituted phenols **4** and *p*-fluoroacetophenone (**5**), were condensed with 2-ethoxyethyl 2-cyano-3-ethoxypent-2-enoate (**1**) or 2-ethoxyethyl-2-cyano-3,3-bis(methylthio)acrylate (**2**) or 2-ethoxyethyl-3-chloro-2-cyano-4,4,4-trifluorobut-2-enoate (**3**), giving three series of 2-ethoxyethyl 2-cyano-3-(1-(substitued phenoxyphenyl)ethylamino) alkenates (**10**, **11** and **12**). All of the new compounds have been characterized by ^1H NMR, ^{13}C NMR, ^{19}F NMR, IR and HRMS. The herbicidal activities of the title compounds were tested, which indicated that some of the title compounds showed 100% inhibition against *Brassica campestris* and *Amaranthus retroflexus* L. at a dose of 93.75 g/ha.

Keywords 2-cyanoalkenates; phenoxyphenyl ethylamine; synthesis; herbicidal activity

自 1956 年 Wessels 等^[1]第一次报道抑制光合作用的除草剂以来, 至今已有 50 多年的历史。光合作用光系统 II (photosystem II, PS II) 抑制剂是指抑制或阻碍光合作用光系统 II 中电子传递的试剂。人们已经证实有许多除草剂是 PS II 抑制剂^[2-4]。20 世纪 80 年代, Deisenhorfer 等^[5]成功地分离并解析了绿色红假单胞菌(*Rps. viridis*) 光合反应中心结构。在众多 PSII 电子传递抑制剂中, 氰

基丙烯酸酯类因其较高的生物活性, 一直受到广大研究者的重视^[5,6]。1992 年, Buman 等^[7]对吡啶甲胺基氰基丙烯酸酯类化合物 Hill 反应抑制活性进行研究, 发现其比含苯环类似结构的化合物除草活性要高一些, 由此引起了一系列关于这类化合物除草活性的研究报道。1998 年, 杨华铮等^[8]用分子模拟法对氰基丙烯酸酯(酰胺)类化合物的抑制活性进行了研究, 建立了豌豆光合作用反

* E-mail: fzhu@nankai.edu.cn

Received August 12, 2014; revised October 8, 2014; published online October 13, 2014.

Project supported by the National "Twelfth Five-Year" Plan for Science & Technology (No. 2011BAE06B03-12).

国家“十二五”科技支撑计划(No. 2011BAE06B03-12)资助项目。

应中心 D1 蛋白模型, 考察了化合物和 D1 蛋白的结合方式及作用机理, 研究了分子结构各部分间的相互作用及对其 Hill 反应活性的影响(图 1). 结果表明: (1)酯基侧链上的氧原子与 SER268 侧链羟基上的氢形成氢键; (2)酯羰基上的氧原子与 SER264 侧链羟基上氢形成氢键; (3)氰基上的氮原子与 LEU271 主链酰胺上的氢形成氢键; (4)氰基丙烯酸酯类化合物的芳香环靠近 PHE265, PHE211, PHE274 和 PHE255 形成的疏水性口袋, 之间产生范德华力相互作用和 π - π 堆积相互作用. β 位 R^1 基团的立体效应、Ar 基团的变化、Ar 与 NH 之间亚甲基的数目, 都能明显地影响氰基丙烯酸酯类化合物的除草活性.

图 1 氰基丙烯酸酯类化合物与受体 D1 蛋白结合简图

Figure 1 The schematic diagram of the binding of cyanoacrylates and the receptor D1 proteins

为了进一步探索上述疏水性口袋的深度和宽度, 我们设计在芳环 A 的对位再引入一个取代苯氧基, 得到 2-氰基-3-(对取代苯氧基)取代烯酸乙氧酯类化合物, 研究 B 环上取代基的变化对除草活性的影响. 合成路线如 Scheme 1 所示. 取代苯酚 4 与对氟苯乙酮 5 通过缩合反应得到对取代苯氧基苯乙酮 6, 然后被 NaBH_4 还原得到醇 7, 7 与叠氮磷酸二苯酯(DPPA)在 DBU/甲苯体系中反应得到叠氮化合物 8, 8 在 $\text{H}_2/\text{Pd-C}$ 条件下还原得到胺 9, 9 分别与原料 3-乙氧基-2-氰基-2-戊烯酸乙氧酯(1), 2-氰基-3,3-二甲硫基丙烯酸乙氧酯(2)和 2-氰基-3-氯-4,4,4-三氟丁烯酸乙氧酯(3)在乙醇中反应得到目标化合物 10, 11 和 12.

所有目标化合物均通过 ^1H NMR, ^{13}C NMR, ^{19}F NMR 和 HRMS 等确证. 生物活性测试结果表明, 部分化合物在剂量为 93.75 g/ha 时, 对双子叶植物油菜和菟菜的抑制率为 100%.

1 结果与讨论

1.1 目标化合物的合成

1.1.1 Williamson 醚化反应

在合成取代苯氧基苯乙酮 6 过程中, 按照文献[9, 10]采用 N,N -二甲基乙酰胺(DMAC)回流的方法, 温度较高, 比较危险. 当用 N,N -二甲基甲酰胺(DMF)作溶剂时, 温

度较高 DMF 会发生热分解, 致使副产物 4-(N,N -二甲基氨基)苯乙酮会比较多; 反应温度控制在 130 $^\circ\text{C}$ 左右时最好, 副产物较少. 反应结束进行后处理时, 先把 DMF 减压旋除, 再进行提纯, 有利于产率的提高. 另外, 在除去 DMF 之后加入少量的水搅拌, 有些产物会析出, 简化了反应的后处理.

1.1.2 叠氮化反应

按照文献[19]的方法制备叠氮化合物 8 时, 一般底物的量不要太大. 因为该反应是一个放热反应, 而温度的升高会导致副产物 4-取代苯氧基苯乙烯的生成.

1.1.3 催化氢化反应

按照文献[20]的方法用 Pd/C 和氢气对叠氮化合物 8 进行还原氢化时发现: 苯环上若有氯原子, 要控制反应条件, 否则氯很容易被脱除. 对于温度、催化剂的量、反应时间都要严格的控制: 温度保持室温; 底物为 3 mmol 时催化剂的量为 0.02 g 10% Pd-C; 反应时间控制在 1.7~2 h, 时间延长, 氯原子会被脱除.

1.2 生物活性与构效关系研究

对目标化合物采用苗后处理(茎叶处理)进行初步活性测试, 测试对象为双子叶杂草(油菜和菟菜)和单子叶杂草(稗草和马唐), 以 NK-9717 作对照, 结果见表 1[11]. 生物活性测试结果表明大多目标化合物具有较好的防除双子叶杂草的活性, 部分化合物在剂量为 93.75 g/ha 时, 对双子叶植物油菜和菟菜的抑制率为 100%. 对单子叶杂草的抑制活性一般.

从表 1 可以看出, R^1 对于化合物除草活性的影响呈现一定的规律, R^1 为 SCH_3 和 CH_2CH_3 时, 相应的化合物对油菜和菟菜具有很高的抑制活性. 考虑到 R^1 基团在疏水性口袋的结合位点及本身取代基的特性, 它在整个药剂分子骨架中, 并不与 D1 蛋白上的残基产生明显相互作用力, 它的影响主要体现于立体空间的扭转, 直接影响整个分子骨架的空间立体构象, 从而与 D1 蛋白不同作用位点间的结合力. CF_3 的引入使得系列化合物 12 的活性比相应的化合物 10 和 11 都要低, 可能是由于 CF_3 强拉电子作用使得整个分子的电性特征发生变化, 致使化合物的活性降低.

对于同系列的目标化合物, 因 $(R^3)_n$ 的不同, 其除草活性也有差别. 化合物 11 中, $(R^3)_n$ 为 4-Cl, 4-F, 4-Me, H 和 4-MeO 时, 当 B 环 4 位为 H 时, 化合物 11j 的活性最高, 其在 45 g/ha 剂量下, 对油菜和菟菜的抑制率分别为 100%和 95.7%; 而 B 环 4 位为 MeO 时, 化合物 11m 在 45 g/ha 剂量下, 对油菜没有抑制活性, 说明在 B 环的对位有大基团不利于活性的提高. 当取代基 $(R^2)_n$ 为 Cl 时, 化合物 11a, 11b 和 11c 在 93.75 g/ha 剂量下对油菜和菟

a (R^2)_n=4-Cl; **b** (R^2)_n=2-Cl; **c** (R^2)_n=3-Cl; **d** (R^2)_n=4-F; **e** (R^2)_n=3-CF₃; **f** (R^2)_n=3,4-F₂; **g** (R^2)_n=2,4-F₂; **h** (R^2)_n=2-Cl-4-F; **i** (R^2)_n=2-Cl-4-CF₃; **j** (R^2)_n=H; **k** (R^2)_n=4-Me; **l** (R^2)_n=3-Me; **m** (R^2)_n=4-MeO

图式 1 目标化合物的合成

Scheme 1 Synthesis of the title compounds

菜的抑制率变化不明显; 当取代基(R^2)_n为 Me 时, **11k** 和 **11l** 在 93.75 和 45 g/ha 剂量下对油菜和苋菜抑制率变化也不明显. 当 B 环 3 位为 Cl, Me 和 CF₃ 时, 它们的除草活性都不如化合物 **11j**. 当在苯环上引入两个基团时, 化合物 **11f**, **11g**, **11h**, **11i** 的除草活性都没有显著提高, 且都低于 **11j**.

综上所述, 标题化合物与 D1 蛋白结合时, B 环的引入有利于除草活性的提高, 说明由 PHE265, PHE211, PHE274 和 PHE255 形成的疏水性口袋(图 1)有一定的深度; B 环上 4-位小基团的引入有利于活性的提高, B 环上多取代基团的引入对活性的提高没有贡献, 说明 B 环与 D1 蛋白结合空腔具有一定的宽度.

2 结论

本文以取代苯酚 **4** 和对氟苯乙酮(**5**)为原料, 对氰基丙烯酸酯类化合物结合 D1 蛋白的疏水性口袋深度和宽度进行探索, 合成了 3 个系列 2-氰基-3-[1-(4-取代苯氧基苯基)乙胺基]烯酸乙氧乙酯类化合物, 并对其进行了

除草活性测试. 生物活性实验表明部分化合物在剂量为 93.75 g/ha 时, 对双子叶植物油菜和苋菜的抑制率为 100%. 通过对化合物结构和除草活性之间关系的分析, 化合物与 D1 蛋白结合时, B 环的引入有利于除草活性的提高, 说明 B 环与 D1 蛋白结合的空间(图 1)有一定的深度; B 环上 4-位小基团的引入有利于活性的提高, B 环上多取代基团的引入对活性的提高没有贡献, 说明 B 环与 D1 蛋白结合空腔具有一定的宽度.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

Brucker 400M 型核磁共振仪(CDCl₃ 为溶剂, TMS 为内标); Varian QFT-ESI 型高分辨质谱仪; Thomas-Hoover 型熔点仪(温度未经校正); 柱层析使用的硅胶为青岛海洋化工厂生产; 实验试剂和原料均为分析纯或化学纯; 均经过常规处理后使用. 原料 3-乙氧基-2-氰基-2-戊烯酸乙氧乙酯(**1**), 2-氰基-3,3-二甲硫基丙烯酸乙氧乙酯(**2**) 和 2-氰基-3-氯-4,4,4-三氟丁烯酸乙氧乙酯(**3**)按照文献

表 1 化合物 10, 11 和 12 对油菜和菟丝的生物活性

Table 1 Biological activity (%) of compounds 10, 11 and 12 against *Brassica campestris* and *Amaranthus retroflexus* L.

化合物	剂量/(g·ha ⁻¹)	抑制率/%		化合物	剂量/(g·ha ⁻¹)	抑制率/%	
		油菜	菟菜			油菜	菟菜
10a	375	100	100	11b	375	100	100
	93.75	100	77.4		93.75	100	85.2
10b	187.5	100	96.4	11c	375	100	99.0
	93.75	100	62.6		93.75	98.5	90.5
10c	375	100	100	11d	93.75	90.6	100
	93.75	100	92.3		45	50.2	63.4
10d	187.5	100	100	11e	93.75	38.4	100
	93.75	96.5	100		45	0	77.0
10e	45	52.0	62.7	11f	375	100	100
	187.5	89.6	100		93.75	100	69.1
10f	93.75	41.0	97.9	11g	375	100	100
	375	100	95.2		93.75	100	94.7
10g	93.75	100	53.1	11h	375	100	100
	375	100	96.8		93.75	100	76.9
10h	93.75	100	57.3	11i	375	90.7	98.4
	375	100	100		93.75	100	98.6
10i	93.75	100	88.7	11j	45	100	95.7
	375	92.1	66.7		22.5	36.7	39.7
10j	187.5	92.9	100	11k	93.75	97.7	100
	93.75	86.1	99.3		45	31.9	79.2
10k	187.5	98.0	100	11l	93.75	88.6	100
	93.75	93.4	100		45	44.5	76.3
10l	45	48.1	78.5	11m	93.75	74.4	100
	187.5	100	100		45	0	72.7
10m	93.75	76.9	100	12a	375	100	100
	45	40.9	41.1		375	100	24.6
11a	187.5	100	100	12b	375	90.0	85.8
	93.75	75.4	97.2		375	100	84.3
11b	45	51.7	74.3	12c	375	99.0	95.3
	375	100	100		375	78.4	39.7
11c	93.75	98.5	97.8	12d	375	25.0	15.0
	45	40.8	87.8		375	90.0	100
NK-9717 ^a	93.75	67.7	30.9	12e	375	100	94.2

[12~15]合成。

3.2 1-(4-取代苯氧基)乙胺(9)的合成

参照文献[16~20]方法, 将取代苯酚 **4** 与对氟苯乙酮 **5** 经 Williamson 醚化、NaBH₄ 还原、叠氮化、Pd/C 催化氢化反应制得相应 1-(4-取代苯氧基)乙胺(9)。

3.3 2-氰基-3-[1-[4-(4-氯苯氧基)苯基]乙基]胺基-3-戊烯酸乙氧酯(10a)的合成

在 25 mL 圆底烧瓶中依次加入 0.28 g (1.13 mmol) 1-[4-(4-氯苯氧基)苯基]乙胺、8 mL 重蒸乙醇和 0.22 g (0.96 mmol) 2-氰基-3-乙氧基戊烯酸乙氧酯, 室温搅拌, TLC 检测至原料点消失, 脱溶, 柱层析[展开剂: *V*(石油

醚): *V*(乙酸乙酯)=15:1]提纯得 0.20 g 淡黄色液体 **10a**, 产率 47.1%。¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ: 10.26 (d, ³*J*_{H-H}=7.8 Hz, 1H, NH), 7.29 (d, ³*J*_{H-H}=8.2 Hz, 2H, Ar-H), 7.19 (d, ³*J*_{H-H}=8.0 Hz, 2H, Ar-H), 6.97 (d, ³*J*_{H-H}=8.0 Hz, 2H, Ar-H), 6.93 (d, ³*J*_{H-H}=8.2 Hz, 2H, Ar-H), 4.81~4.70 (m, 1H, CH), 4.29 (t, ³*J*_{H-H}=5.0 Hz, 2H, CH₂), 3.69 (t, ³*J*_{H-H}=5.0 Hz, 2H, CH₂), 3.57 (q, ³*J*_{H-H}=7.0 Hz, 2H, CH₂), 2.63~2.42 (m, 2H, CH₂), 1.59 (d, ³*J*_{H-H}=6.7 Hz, 3H, CH₃), 1.20 (t, ³*J*_{H-H}=7.0 Hz, 3H, CH₃), 1.14 (t, ³*J*_{H-H}=7.6 Hz, 3H, CH₃); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ: 174.34, 169.12, 156.67, 155.40, 137.74, 129.85, 128.67,

126.96, 120.32, 119.23, 118.58, 71.03, 68.19, 66.87, 63.71, 53.20, 24.70, 24.58, 15.21, 12.21; HRMS (ESI) calcd for $C_{24}H_{27}ClN_2NaO_4 [M+Na]^+$ 465.1552, found 465.1550.

采用与 **10a** 相同的路线, 合成目标化合物 **10b**~**10m**

2-氰基-3-{1-[4-(2-氯苯氧基)苯基]乙基}胺基-3-戊烯酸乙氧乙酯(**10b**): 淡黄色液体, 产率 37.6%. 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 10.25 (d, $^3J_{H-H}=7.8$ Hz, 1H, NH), 7.45 (dd, $^3J_{H-H}=8.0$ Hz, $^4J_{H-H}=1.3$ Hz, 1H, Ar-H), 7.23 (dd, $^3J_{H-H}=7.8$ Hz, $^4J_{H-H}=1.2$ Hz, 1H, Ar-H), 7.18 (d, $^3J_{H-H}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 7.11 (td, $^3J_{H-H}=7.7$ Hz, $^4J_{H-H}=1.1$ Hz, 1H, Ar-H), 6.99 (d, $^3J_{H-H}=8.1$ Hz, 1H, Ar-H), 6.94 (d, $^3J_{H-H}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 4.81~4.69 (m, 1H, CH), 4.29 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.70 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.58 (q, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 2H, CH_2), 2.62~2.38 (m, 2H, CH_2), 1.58 (d, $^3J_{H-H}=6.7$ Hz, 3H, CH_3), 1.20 (t, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 3H, CH_3), 1.13 (t, $^3J_{H-H}=7.6$ Hz, 3H, CH_3); ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 100 MHz) δ : 174.36, 169.10, 156.76, 151.91, 137.36, 130.91, 128.09, 126.87, 126.15, 125.23, 121.30, 118.59, 118.13, 70.97, 68.20, 66.86, 63.69, 53.21, 24.69, 24.57, 15.20, 12.18; HRMS (ESI) calcd for $C_{24}H_{27}ClN_2NaO_4 [M+Na]^+$ 465.1552, found 465.1545.

2-氰基-3-{1-[4-(3-氯苯氧基)苯基]乙基}胺基-3-戊烯酸乙氧乙酯(**10c**): 淡黄色液体, 产率 39.8%. 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 10.28 (d, $^3J_{H-H}=7.8$ Hz, 1H, NH), 7.27~7.18 (m, 3H, Ar-H), 7.09 (dd, $^3J_{H-H}=8.0$ Hz, $^4J_{H-H}=2.0$ Hz, 1H, Ar-H), 7.01 (d, $^3J_{H-H}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 6.98 (d, $^4J_{H-H}=2.0$ Hz, 1H, Ar-H), 6.89 (dd, $^3J_{H-H}=8.2$ Hz, $^4J_{H-H}=2.2$ Hz, 2H, Ar-H), 4.83~4.71 (m, 1H, CH), 4.31 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.71 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.58 (q, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 2H, CH_2), 2.65~2.42 (m, 2H, CH_2), 1.61 (d, $^3J_{H-H}=6.7$ Hz, 3H, CH_3), 1.21 (t, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 3H, CH_3), 1.16 (t, $^3J_{H-H}=7.6$ Hz, 3H, CH_3); ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 100 MHz) δ : 174.36, 169.12, 157.78, 156.13, 138.14, 135.13, 130.62, 127.02, 123.65, 119.73, 119.07, 118.55, 116.96, 71.09, 68.19, 66.87, 63.72, 53.22, 24.71, 24.59, 15.20, 12.20; HRMS (ESI) calcd for $C_{24}H_{27}ClN_2NaO_4 [M+Na]^+$ 465.1552, found 465.1552.

2-氰基-3-{1-[4-(4-氟苯氧基)苯基]乙基}胺基-3-戊烯酸乙氧乙酯(**10d**): 桔黄色液体, 产率 39.6%. 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 10.26 (d, $^3J_{H-H}=7.8$ Hz, 1H, NH), 7.19 (d, $^3J_{H-H}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 7.07~6.97 (m, 4H, Ar-H), 6.95 (d, $^3J_{H-H}=8.7$ Hz, 2H, Ar-H), 4.81~4.70 (m, 1H, CH), 4.30 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.71 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.58 (q, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 2H, CH_2),

2.60~2.44 (m, 2H, CH_2), 1.59 (d, $^3J_{H-H}=6.8$ Hz, 3H, CH_3), 1.21 (t, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 3H, CH_3), 1.15 (t, $^3J_{H-H}=7.6$ Hz, 3H, CH_3); ^{19}F NMR ($CDCl_3$, 376 MHz) δ : -119.39; ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 100 MHz) δ : 174.33, 169.12, 159.04 (d, $^1J_{C-F}=243.3$ Hz), 157.50, 152.36 (d, $^4J_{C-F}=2.3$ Hz), 137.21, 126.86, 120.83 (d, $^3J_{C-F}=8.4$ Hz), 118.56, 116.44 (d, $^2J_{C-F}=23.5$ Hz), 71.03, 68.19, 66.87, 63.70, 53.21, 24.68, 24.57, 15.19, 12.18; HRMS (ESI) calcd for $C_{24}H_{27}FN_2NaO_4 [M+Na]^+$ 449.1847, found 449.1841.

2-氰基-3-{1-[4-(3-三氟甲基苯氧基)苯基]乙基}胺基-3-戊烯酸乙氧乙酯(**10e**): 淡黄色液体, 产率 38.4%. 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 10.29 (d, $^3J_{H-H}=7.7$ Hz, 1H, NH), 7.46 (t, $^3J_{H-H}=7.9$ Hz, 1H, Ar-H), 7.37 (d, $^3J_{H-H}=7.7$ Hz, 1H, Ar-H), 7.26~7.21 (m, 3H, Ar-H), 7.16 (d, $^3J_{H-H}=8.1$ Hz, 1H, Ar-H), 7.02 (d, $^3J_{H-H}=8.2$ Hz, 2H, Ar-H), 4.86~4.71 (m, 1H, CH), 4.31 (t, $^3J_{H-H}=5.0$ Hz, 2H, CH_2), 3.71 (t, $^3J_{H-H}=5.0$ Hz, 2H, CH_2), 3.58 (q, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 2H, CH_2), 2.69~2.30 (m, 2H, CH_2), 1.62 (d, $^3J_{H-H}=6.7$ Hz, 3H, CH_3), 1.21 (t, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 3H, CH_3), 1.16 (t, $^3J_{H-H}=7.6$ Hz, 3H, CH_3); ^{19}F NMR ($CDCl_3$, 376 MHz) δ : -62.71; ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 100 MHz) δ : 174.36, 169.12, 157.33, 155.96, 138.36, 132.34 (q, $^2J_{C-F}=32.8$ Hz), 130.44, 127.13, 123.64 (q, $^1J_{C-F}=273.5$ Hz), 121.85, 120.08 (q, $^3J_{C-F}=3.7$ Hz), 119.76, 118.52, 115.57 (q, $^3J_{C-F}=3.7$ Hz), 71.15, 68.19, 66.87, 63.73, 53.21, 24.71, 15.18, 12.17; HRMS (ESI) calcd for $C_{25}H_{27}F_3N_2NaO_4 [M+Na]^+$ 499.1815, found 499.1815.

2-氰基-3-{1-[4-(3,4-二氟苯氧基)苯基]乙基}胺基-3-戊烯酸乙氧乙酯(**10f**): 黄色液体, 收率 58.5%. 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 10.27 (d, $^3J_{H-H}=7.9$ Hz, 1H, NH), 7.22 (d, $^3J_{H-H}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 7.17~7.08 (m, 1H, Ar-H), 6.99 (d, $^3J_{H-H}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 6.88~6.78 (m, 1H, Ar-H), 6.75~6.69 (m, 1H, Ar-H), 4.85~4.70 (m, 1H, CH), 4.31 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.71 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.58 (q, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 2H, CH_2), 2.65~2.44 (m, 2H, CH_2), 1.61 (d, $^3J_{H-H}=6.7$ Hz, 3H, CH_3), 1.22 (t, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 3H, CH_3), 1.16 (t, $^3J_{H-H}=7.6$ Hz, 3H, CH_3); ^{19}F NMR ($CDCl_3$, 376 MHz) δ : -134.17 (d, $^3J_{F-F}=20.8$ Hz, 1F), -144.01 (d, $^3J_{F-F}=20.8$ Hz, 1F); ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 100 MHz) δ : 174.34, 169.13, 156.47, 152.84 (dd, $^3J_{C-F}=8.5$ Hz, $^4J_{C-F}=2.9$ Hz), 150.63 (dd, $^1J_{C-F}=251.0$ Hz, $^2J_{C-F}=14.1$ Hz), 146.79 (dd, $^1J_{C-F}=244.8$ Hz, $^2J_{C-F}=12.9$ Hz), 138.09, 127.04, 119.28, 118.54, 117.68 (d, $^2J_{C-F}=18.8$ Hz), 114.58 (dd, $^3J_{C-F}=5.8$ Hz, $^4J_{C-F}=3.7$ Hz), 108.64 (d, $^2J_{C-F}=19.8$ Hz), 71.12, 68.19, 66.88,

63.73, 53.18, 24.71, 24.59, 15.20, 12.21; HRMS (ESI) calcd for $C_{24}H_{26}F_2N_2NaO_4$ $[M + Na]^+$ 467.1753, found 467.1751.

2-氰基-3-{1-[4-(2,4-二氟苯氧基)苯基]乙基}胺基-3-戊烯酸乙氧乙酯(**10g**): 黄色固体, 产率 45.0%. m.p. 64~66 °C; 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 10.24 (d, $^3J_{H-H}=7.8$ Hz, 1H, NH), 7.17 (d, $^3J_{H-H}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 7.11~7.02 (m, 1H, Ar-H), 6.99~6.82 (m, 4H, Ar-H), 4.79~4.69 (m, 1H, CH), 4.29 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.69 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.57 (q, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 2H, CH_2), 2.62~2.38 (m, 2H, CH_2), 1.57 (d, $^3J_{H-H}=6.7$ Hz, 3H, CH_3), 1.20 (t, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 3H, CH_3), 1.13 (t, $^3J_{H-H}=7.6$ Hz, 3H, CH_3); ^{19}F NMR ($CDCl_3$, 376 MHz) δ : -114.22 (d, $^4J_{F-F}=5.1$ Hz, 1F), -125.26 (d, $^3J_{F-F}=4.8$ Hz, 1F); ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 100 MHz) δ : 174.35, 169.11, 159.04 (dd, $^1J_{C-F}=247.3$ Hz, $^3J_{C-F}=10.3$ Hz), 157.32, 154.42 (dd, $^1J_{C-F}=253.3$ Hz, $^3J_{C-F}=12.2$ Hz), 139.31 (dd, $^2J_{C-F}=11.7$ Hz, $^4J_{C-F}=3.9$ Hz), 137.25, 126.84, 123.15 (dd, $^3J_{C-F}=9.7$ Hz, $^3J_{C-F}=1.8$ Hz), 118.55, 117.08, 115.54 (dd, $^2J_{C-F}=22.9$ Hz, $^4J_{C-F}=4.0$ Hz), 105.59 (d, $^2J_{C-F}=26.9$ Hz, $^2J_{C-F}=22.1$ Hz), 71.01, 68.19, 66.86, 63.70, 53.16, 24.67, 24.56, 15.19, 12.16; HRMS (ESI) calcd for $C_{24}H_{26}F_2N_2NaO_4$ $[M + Na]^+$ 467.1753, found 467.1752.

2-氰基-3-{1-[4-(2-氯-4-氟苯氧基)苯基]乙基}胺基-3-戊烯酸乙氧乙酯(**10h**): 桔黄色液体, 产率 44.2%. 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 10.24 (d, $^3J_{H-H}=7.9$ Hz, 1H, NH), 7.21 (dd, $^3J_{H-F}=8.0$ Hz, $^4J_{H-H}=2.8$ Hz, 1H, Ar-H), 7.17 (d, $^3J_{H-H}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 7.04~6.94 (m, 2H, Ar-H), 6.88 (d, $^3J_{H-H}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 4.80~4.71 (m, 1H, CH), 4.29 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.69 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.57 (q, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 2H, CH_2), 2.62~2.39 (m, 2H, CH_2), 1.58 (d, $^3J_{H-H}=6.7$ Hz, 3H, CH_3), 1.20 (t, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 3H, CH_3), 1.13 (t, $^3J_{H-H}=7.6$ Hz, 3H, CH_3); ^{19}F NMR ($CDCl_3$, 376 MHz) δ : -116.05; ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 100 MHz) δ : 174.34, 169.10, 158.85 (d, $^1J_{C-F}=247.8$ Hz), 156.99, 148.03 (d, $^4J_{C-F}=3.3$ Hz), 137.33, 127.25 (d, $^3J_{C-F}=10.8$ Hz), 126.91, 122.56 (d, $^3J_{C-F}=9.0$ Hz), 118.55, 117.97 (d, $^2J_{C-F}=26.0$ Hz), 117.55, 115.01 (d, $^2J_{C-F}=23.0$ Hz), 71.02, 61.19, 66.86, 63.70, 53.17, 24.68, 24.55, 15.19, 12.17; HRMS (ESI) calcd for $C_{24}H_{25}ClFN_2O_4$ $[M - H]^-$ 459.1487, found 459.1489.

2-氰基-3-{1-[4-(2-氯-4-三氟甲基苯氧基)苯基]乙基}胺基-3-戊烯酸乙氧乙酯(**10i**): 淡黄色液体, 产率 37.0%. 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 10.29 (d, $^3J_{H-H}=7.9$

Hz, 1H, NH), 7.75 (d, $^4J_{H-H}=1.6$ Hz, 1H, Ar-H), 7.47 (dd, $^3J_{H-H}=8.6$ Hz, $^4J_{H-H}=1.3$ Hz, 1H, Ar-H), 7.27 (d, $^3J_{H-H}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 7.03 (d, $^3J_{H-H}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 6.99(d, $^3J_{H-H}=8.6$ Hz, 1H, Ar-H), 4.86~4.75 (m, 1H, CH), 4.31 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.71 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.58 (q, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 2H, CH_2), 2.64~2.42 (m, 2H, CH_2), 1.62 (d, $^3J_{H-H}=6.7$ Hz, 3H, CH_3), 1.22 (t, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 3H, CH_3), 1.16 (t, $^3J_{H-H}=7.6$ Hz, 3H, CH_3); ^{19}F NMR ($CDCl_3$, 376 MHz) δ : -62.10; ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 100 MHz) δ : 174.34, 169.11, 155.48, 155.29, 138.90, 128.22 (q, $^3J_{C-F}=3.6$ Hz), 127.21, 126.65 (q, $^2J_{C-F}=33.9$ Hz), 125.72, 125.17 (q, $^3J_{C-F}=3.6$ Hz), 123.27 (q, $^1J_{C-F}=273.2$ Hz), 119.56, 119.41, 118.48, 71.20, 68.18, 66.86, 63.74, 53.15, 24.70, 24.56, 15.18, 12.20; HRMS (ESI) calcd for $C_{25}H_{25}ClF_3N_2O_4$ $[M - H]^-$ 509.1455, found 509.1466.

2-氰基-3-[1-(4-苯氧基苯基)乙基]胺基-3-戊烯酸乙氧乙酯(**10j**): 淡黄色液体, 产率 41.9%. 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 10.26 (d, $^3J_{H-H}=7.8$ Hz, 1H, NH), 7.35 (t, $^3J_{H-H}=7.9$ Hz, 1H, Ar-H), 7.19 (d, $^3J_{H-H}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 7.13 (t, $^3J_{H-H}=7.4$ Hz, 1H, Ar-H), 7.06~6.88 (m, 4H, Ar-H), 4.80~4.71 (m, 1H, CH), 4.30 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.71 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.58 (q, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 2H, CH_2), 2.65~2.40 (m, 2H, CH_2), 1.60 (d, $^3J_{H-H}=6.8$ Hz, 3H, CH_3), 1.21 (t, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 3H, CH_3), 1.16 (t, $^3J_{H-H}=7.6$ Hz, 3H, CH_3); ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 100 MHz) δ : 174.35, 169.09, 157.10, 156.70, 137.22, 129.84, 126.79, 123.66, 119.14, 118.60, 70.95, 68.18, 66.86, 63.67, 53.26, 24.67, 24.55, 15.14, 12.14; HRMS (ESI) calcd for $C_{24}H_{28}N_2NaO_4$ $[M + Na]^+$ 431.1941, found 431.1935.

2-氰基-3-{1-[4-(4-甲基苯氧基)苯基]乙基}胺基-3-戊烯酸乙氧乙酯(**10k**): 淡黄色液体, 产率 33.5%. 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 10.25 (d, $^3J_{H-H}=8.2$ Hz, 1H, NH), 7.20~7.09 (m, 4H, Ar-H), 6.96 (d, $^3J_{H-H}=8.2$ Hz, 2H, Ar-H), 6.91 (d, $^3J_{H-H}=8.1$ Hz, 2H, Ar-H), 4.80~4.69 (m, 1H, CH), 4.30 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.70 (t, $^3J_{H-H}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.58 (q, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 2H, CH_2), 2.62~2.44 (m, 2H, CH_2), 2.34 (s, 3H, Ar- CH_3), 1.59 (d, $^3J_{H-H}=6.7$ Hz, 3H, CH_3), 1.21 (t, $^3J_{H-H}=7.0$ Hz, 3H, CH_3), 1.15 (t, $^3J_{H-H}=7.6$ Hz, 3H, CH_3); ^{13}C NMR ($CDCl_3$, 100 MHz) δ : 174.35, 169.12, 157.66, 154.19, 136.80, 133.41, 130.35, 126.73, 119.35, 118.61, 70.94, 68.20, 66.88, 63.69, 53.27, 24.69, 15.19, 12.17; HRMS (ESI) calcd for $C_{25}H_{30}N_2NaO_4$ $[M + Na]^+$ 445.2098, found 445.2093.

2-氰基-3-{1-[4-(3-甲基苯氧基)苯基]乙基}胺基-3-戊烯酸乙氧乙酯(**10l**): 淡黄色液体, 产率 31.9%. ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 10.26 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.8$ Hz, 1H, NH), 7.22 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.9$ Hz, 1H, Ar-H), 7.18 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 6.97 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 6.94 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.6$ Hz, 2H, Ar-H), 6.83 (s, 1H, Ar-H), 6.80 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.1$ Hz, 1H, Ar-H), 4.80~4.71 (m, 1H, CH), 4.30 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.70 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.58 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH_2), 2.63~2.44 (m, 2H, CH_2), 2.33 (s, 3H, Ar- CH_3), 1.59 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.8$ Hz, 3H, CH_3), 1.21 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH_3), 1.15 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.6$ Hz, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 174.36, 169.13, 157.22, 156.63, 140.09, 137.08, 129.56, 126.79, 119.85, 119.07, 118.61, 116.16, 70.96, 68.21, 66.87, 63.69, 53.27, 24.69, 24.58, 21.40, 15.20, 12.18; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{30}\text{N}_2\text{NaO}_4$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 445.2098, found 445.2089.

2-氰基-3-{1-[4-(4-甲氧基苯氧基)苯基]乙基}胺基-3-戊烯酸乙氧乙酯(**10m**): 淡黄色液体, 产率 32.9%. ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 10.24 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.8$ Hz, 1H, NH), 7.15 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 6.97 (d, $^3J_{\text{H-H}}=9.1$ Hz, 2H, Ar-H), 6.92 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 6.89 (d, $^3J_{\text{H-H}}=9.1$ Hz, 2H, Ar-H), 4.80~4.67 (m, 1H, CH), 4.30 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.81 (s, 3H, Ar- OCH_3), 3.70 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.1$ Hz, 2H, CH_2), 3.58 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH_2), 2.64~2.42 (m, 2H, CH_2), 1.58 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.8$ Hz, 3H, CH_3), 1.21 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH_3), 1.14 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.6$ Hz, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 174.34, 169.12, 158.33, 156.17, 149.63, 136.46, 126.70, 121.02, 118.62, 117.91, 114.95, 70.92, 68.20, 66.87, 63.68, 55.67, 53.25, 24.68, 24.58, 15.19, 12.17; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{30}\text{N}_2\text{NaO}_4$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 461.2047, found 461.2041.

3.4 2-氰基-3-甲硫基-3-{1-[4-(4-氯苯氧基)苯基]乙基}胺基丙烯酸乙氧乙酯(**11a**)的合成

在 100 mL 圆底烧瓶中依次加入 1.03 g (4.17 mmol) 1-[4-(4-氯苯氧基)苯基]乙胺、25 mL 无水乙醇和 0.91 g (3.47 mmol) 2-氰基-3,3-二甲硫基丙烯酸乙氧乙酯, 室温搅拌, TLC 检测至原料反应完全, 脱溶, 柱层析提纯得 1.52 g 淡黄色液体 **11a**, 产率 95.2%. ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 10.38 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.2$ Hz, 1H, NH), 7.29 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.3$ Hz, 2H, Ar-H), 7.21 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.0$ Hz, 2H, Ar-H), 6.97 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.2$ Hz, 2H, Ar-H), 6.93 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.5$ Hz, 2H, Ar-H), 5.35~5.08 (m, 1H, CH), 4.30 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.9$ Hz, 2H, CH_2), 3.70 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.9$ Hz, 2H, CH_2),

3.57 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH_2), 2.59 (s, 3H, SCH_3), 1.59 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.8$ Hz, 3H, CH_3), 1.20 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 172.00, 168.44, 156.54, 155.47, 137.65, 129.83, 128.62, 127.37, 120.31, 119.12, 118.19, 74.85, 68.12, 66.89, 64.10, 55.17, 23.81, 18.41, 15.19; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{23}\text{H}_{25}\text{ClN}_2\text{NaO}_4\text{S}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 483.1116, found 483.1107.

采用与 **11a** 相同的路线, 合成目标化合物 **11b**~**11m**.

2-氰基-3-甲硫基-3-{1-[4-(2-氯苯氧基)苯基]乙基}胺基丙烯酸乙氧乙酯(**11b**): 淡黄色液体, 产率 92.1%. ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 10.38 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.4$ Hz, 1H, NH), 7.46 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.0$ Hz, 1H, Ar-H), 7.26~7.17 (m, 3H, Ar-H), 7.12 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.7$ Hz, 1H, Ar-H), 7.01 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.1$ Hz, 1H, Ar-H), 6.93 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.4$ Hz, 2H, Ar-H), 5.28~5.19 (m, 1H, CH), 4.31 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH_2), 3.70 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH_2), 3.58 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH_2), 2.58 (s, 3H, SCH_3), 1.60 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.8$ Hz, 3H, CH_3), 1.21 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 171.96, 168.41, 156.61, 152.00, 137.30, 130.88, 128.07, 127.29, 126.09, 125.15, 121.24, 118.20, 118.05, 74.88, 68.12, 66.87, 64.08, 55.19, 23.80, 18.38, 15.20; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{23}\text{H}_{25}\text{ClN}_2\text{NaO}_4\text{S}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 483.1116, found 483.1114.

2-氰基-3-甲硫基-3-{1-[4-(3-氯苯氧基)苯基]乙基}胺基丙烯酸乙氧乙酯(**11c**): 淡黄色液体, 产率 95.2%. ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 10.41 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.3$ Hz, 1H, NH), 7.30~7.21 (m, 3H, Ar-H), 7.10 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.0$ Hz, 1H, Ar-H), 7.01 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.4$ Hz, 2H, Ar-H), 6.99 (s, 1H, Ar-H), 6.90 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.2$ Hz, 1H, Ar-H), 5.33~5.17 (m, 1H, CH), 4.33 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.9$ Hz, 2H, CH_2), 3.72 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.9$ Hz, 2H, CH_2), 3.58 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH_2), 2.61 (s, 3H, SCH_3), 1.62 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.8$ Hz, 3H, CH_3), 1.22 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 172.01, 168.43, 157.85, 155.97, 138.06, 135.10, 130.61, 127.43, 123.58, 119.62, 119.04, 118.19, 116.94, 74.90, 68.12, 66.89, 64.11, 55.19, 23.83, 18.40, 15.20; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{23}\text{H}_{25}\text{ClN}_2\text{NaO}_4\text{S}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 483.1116, found 483.1111.

2-氰基-3-甲硫基-3-{1-[4-(4-氟苯氧基)苯基]乙基}胺基丙烯酸乙氧乙酯(**11d**): 淡黄色液体, 产率 74.1%. ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 10.38 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.6$ Hz, 1H, NH), 7.19 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.4$ Hz, 2H, Ar-H), 7.08~6.96 (m, 4H, Ar-H), 6.94 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.5$ Hz, 2H, Ar-H), 5.28~5.15 (m, 1H, CH), 4.31 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.9$ Hz, 2H, CH_2), 3.71

(t, $^3J_{\text{H-H}}=4.9$ Hz, 2H, CH₂), 3.58 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 2.59 (s, 3H, SCH₃), 1.59 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.7$ Hz, 3H, CH₃), 1.21 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -119.42; ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 171.94, 168.19, 158.76 (d, $^1J_{\text{C-F}}=243.2$ Hz), 157.11, 152.24 (d, $^4J_{\text{C-F}}=2.5$ Hz), 136.95, 127.09, 120.59 (d, $^3J_{\text{C-F}}=8.3$ Hz), 118.25, 116.20 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.4$ Hz), 74.64, 67.91, 66.63, 63.87, 54.98, 23.58, 18.16, 14.98; HRMS (ESI) calcd for C₂₃H₂₄FN₂NaO₄S [M-H]⁻ 443.1441, found 443.1443.

2-氰基-3-甲硫基-3-{1-[4-(3-三氟甲基苯氧基)苯基]乙基}胺基丙烯酸乙氧乙酯(**11e**): 桔红色固体, 产率 79.7%. m.p. 53~55 °C; ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.40 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.4$ Hz, 1H, NH), 7.46 (t, $^3J_{\text{H-H}}=8.0$ Hz, 1H, Ar-H), 7.37 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.8$ Hz, 1H, Ar-H), 7.29~7.22 (m, 3H, Ar-H), 7.16 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.1$ Hz, 1H, Ar-H), 7.02 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 5.30~5.18 (m, 1H, CH), 4.32 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.1$ Hz, 2H, CH₂), 3.71 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.1$ Hz, 2H, CH₂), 3.58 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 2.60 (s, 3H, SCH₃), 1.62 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.2$ Hz, 3H, CH₃), 1.21 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -62.70; ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 171.99, 168.41, 157.37, 155.78, 138.26, 132.28 (q, $^2J_{\text{C-F}}=32.6$ Hz), 130.39, 127.50, 123.61 (q, $^2J_{\text{C-F}}=273.3$ Hz), 121.79, 119.98 (q, $^3J_{\text{C-F}}=3.8$ Hz), 119.62, 118.11, 115.52 (q, $^3J_{\text{C-F}}=3.8$ Hz), 74.96, 68.08, 66.86, 64.09, 55.15, 23.78, 18.35, 15.14; HRMS (ESI) calcd for C₂₄H₂₅F₃N₂NaO₄S [M+Na]⁺ 517.1379, found 517.1371.

2-氰基-3-甲硫基-3-{1-[4-(3,4-二氟苯氧基)苯基]乙基}胺基丙烯酸乙氧乙酯(**11f**): 黄色液体, 产率 84.7%. ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.38 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.4$ Hz, 1H, NH), 7.22 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 7.16~7.07 (m, 1H, Ar-H), 6.96 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.5$ Hz, 2H, Ar-H), 6.86~6.78 (m, 1H, Ar-H), 6.75~6.67 (m, 1H, Ar-H), 5.28~5.17 (m, 1H, CH), 4.30 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.69 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.57 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 2.58 (s, 3H, SCH₃), 1.59 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.87$ Hz, 3H, CH₃), 1.20 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -134.22 (d, $^3J_{\text{F-F}}=21.5$ Hz, 1F), -144.12 (d, $^3J_{\text{F-F}}=21.6$ Hz, 1F); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 171.98, 168.42, 156.34, 152.95 (dd, $^3J_{\text{C-F}}=8.1$ Hz, $^4J_{\text{C-F}}=2.8$ Hz), 150.55 (dd, $^1J_{\text{C-F}}=250.5$ Hz, $^2J_{\text{C-F}}=14.0$ Hz), 146.76 (dd, $^1J_{\text{C-F}}=244.9$ Hz, $^2J_{\text{C-F}}=12.8$ Hz), 138.03, 127.45, 119.17, 118.10, 117.64 (d, $^2J_{\text{C-F}}=18.4$ Hz), 114.54 (dd, $^3J_{\text{C-F}}=5.8$ Hz, $^3J_{\text{C-F}}=3.7$ Hz), 108.59 (d, $^2J_{\text{C-F}}=19.8$

Hz), 74.97, 68.11, 66.87, 64.11, 55.15, 23.79, 18.39, 15.17; HRMS (ESI) calcd for C₂₃H₂₄F₂N₂NaO₄S [M+Na]⁺ 485.1317, found 485.1310.

2-氰基-3-甲硫基-3-{1-[4-(2,4-二氟苯氧基)苯基]乙基}胺基丙烯酸乙氧乙酯(**11g**): 淡黄色液体, 产率 96.7%. ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.37 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.4$ Hz, 1H, NH), 7.19 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 7.11~7.03 (m, 1H, Ar-H), 6.99~6.83 (m, 4H, Ar-H), 5.29~5.16 (m, 1H, CH), 4.31 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.70 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.58 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 2.58 (s, 3H, SCH₃), 1.59 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.8$ Hz, 3H, CH₃), 1.21 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -114.35 (d, $^4J_{\text{F-F}}=4.2$ Hz, 1F), -125.30 (d, $^4J_{\text{F-F}}=4.9$ Hz, 1F); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 171.96, 168.41, 158.99 (dd, $^1J_{\text{C-F}}=247.1$ Hz, $^3J_{\text{C-F}}=10.4$ Hz), 157.19, 154.41 (dd, $^1J_{\text{C-F}}=253.1$ Hz, $^3J_{\text{C-F}}=12.4$ Hz), 139.39 (dd, $^2J_{\text{C-F}}=11.9$ Hz, $^4J_{\text{C-F}}=4.0$ Hz), 137.16, 127.25, 123.12 (dd, $^3J_{\text{C-F}}=9.8$ Hz, $^3J_{\text{C-F}}=1.8$ Hz), 118.16, 116.98, 111.51 (dd, $^2J_{\text{C-F}}=22.8$ Hz, $^4J_{\text{C-F}}=4.0$ Hz), 105.56 (dd, $^2J_{\text{C-F}}=26.8$ Hz, $^2J_{\text{C-F}}=22.1$ Hz), 74.89, 68.11, 66.87, 64.08, 55.15, 23.78, 18.36, 15.17; HRMS (ESI) calcd for C₂₃H₂₄F₂N₂NaO₄S [M+Na]⁺ 485.1317, found 485.1317.

2-氰基-3-甲硫基-3-{1-[4-(2-氯-4-氟苯氧基)苯基]乙基}胺基丙烯酸乙氧乙酯(**11h**): 白色固体, 收率 95.7%. m.p. 64~66 °C; ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.36 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.2$ Hz, 1H, NH), 7.25~7.14 (m, 3H, Ar-H), 7.04~6.93 (m, 2H, Ar-H), 6.88 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.9$ Hz, 2H, Ar-H), 5.27~5.15 (m, 1H, CH), 4.29 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.8$ Hz, 2H, CH₂), 3.69 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.8$ Hz, 2H, CH₂), 3.56 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 2.57 (s, 3H, SCH₃), 1.58 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.7$ Hz, 3H, CH₃), 1.20 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -116.17; ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 171.94, 168.40, 158.80 (d, $^1J_{\text{C-F}}=247.8$ Hz), 156.84, 148.11 (d, $^4J_{\text{C-F}}=3.3$ Hz), 137.25, 127.31, 127.19 (d, $^3J_{\text{C-F}}=10.8$ Hz), 122.50 (d, $^3J_{\text{C-F}}=9.0$ Hz), 118.14, 117.94 (d, $^2J_{\text{C-F}}=26.1$ Hz), 117.46, 114.98 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.1$ Hz), 74.91, 68.10, 66.86, 64.08, 55.14, 23.76, 18.37, 15.17; HRMS (ESI) calcd for C₂₃H₂₃ClF₂N₂NaO₄S [M-H]⁻ 477.1051, found 477.1061.

2-氰基-3-甲硫基-3-{1-[4-(2-氯-4-三氟甲基苯氧基)苯基]乙基}胺基丙烯酸乙氧乙酯(**11i**): 桔红色固体, 产率 93.7%. m.p. 53~54 °C; ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.40 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.4$ Hz, 1H, NH), 7.70 (d, $^4J_{\text{H-H}}=1.2$ Hz, 1H, Ar-H), 7.46 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.5$ Hz, 1H, Ar-H), 7.27 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.5$ Hz, 2H, Ar-H), 7.02 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H,

Ar-H), 6.99 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.7$ Hz, 1H, Ar-H), 5.33~5.20 (m, 1H, CH), 4.32 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.71 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.58 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 2.60 (s, 3H, SCH₃), 1.62 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.8$ Hz, 3H, CH₃), 1.22 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -62.08; ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 172.06, 168.43, 155.57, 155.14, 138.86, 128.22 (q, $^3J_{\text{C-F}}=3.7$ Hz), 127.61, 126.58 (q, $^2J_{\text{C-F}}=33.5$ Hz), 125.15 (q, $^3J_{\text{C-F}}=3.7$ Hz), 123.63 (q, $^1J_{\text{C-F}}=273.2$ Hz), 119.48, 119.33, 75.04, 68.11, 66.89, 64.13, 55.13, 23.79, 18.41, 15.17; HRMS (ESI) calcd for C₂₄H₂₃ClF₃N₂NaO₄S [M-H]⁻ 527.1019, found 527.1025.

2-氰基-3-甲硫基-3-[1-(4-苯氧苯基)乙基]胺基丙烯酸乙氧乙酯(**11j**): 淡黄色液体, 产率 99.0%. ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.38 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.3$ Hz, 1H, NH), 7.35 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.9$ Hz, 2H, Ar-H), 7.20 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 7.12 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.4$ Hz, 1H, Ar-H), 7.07~6.91 (m, 4H, Ar-H), 5.30~5.15 (m, 1H, CH), 4.31 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.1$ Hz, 2H, CH₂), 3.70 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.1$ Hz, 2H, CH₂), 3.58 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 2.59 (s, 3H, SCH₃), 1.60 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.8$ Hz, 3H, CH₃), 1.21 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 171.94, 168.43, 156.98, 156.81, 137.16, 129.84, 127.23, 123.62, 119.14, 119.06, 118.18, 74.91, 68.13, 68.88, 64.09, 55.24, 23.81, 18.39, 15.18; HRMS (ESI) calcd for C₂₃H₂₅N₂O₄S [M-H]⁻ 425.1535, found 425.1533.

2-氰基-3-甲硫基-3-{1-[4-(4-甲基苯氧基)苯基]乙基}胺基丙烯酸乙氧乙酯(**11k**): 淡黄色液体, 产率 95.6%. ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.37 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.4$ Hz, 1H, NH), 7.18 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 7.14 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.3$ Hz, 2H, Ar-H), 6.95 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 6.91 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.4$ Hz, 2H, Ar-H), 5.27~5.18 (m, 1H, CH), 4.30 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.70 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.57 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 2.58 (s, 3H, SCH₃), 2.33 (s, 3H, ArCH₃), 1.59 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.8$ Hz, 3H, CH₃), 1.21 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 171.91, 168.41, 157.51, 154.25, 136.72, 133.31, 130.34, 127.16, 119.34, 118.49, 118.22, 74.80, 68.13, 66.86, 64.07, 55.24, 23.81, 20.74, 18.37, 15.19; HRMS (ESI) calcd for C₂₄H₂₈N₂NaO₄S [M+Na]⁺ 463.1667, found 463.1666.

2-氰基-3-甲硫基-3-{1-[4-(3-甲基苯氧基)苯基]乙基}胺基丙烯酸乙氧乙酯(**11l**): 浅粉色液体, 产率 83.2%. ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.38 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.5$ Hz, 1H, NH), 7.25~7.14 (m, 3H, Ar-H), 6.97 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.6$ Hz, 2H, Ar-H), 6.94 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.6$ Hz, 1H, Ar-H), 6.83 (s, 1H, Ar-H), 6.80 (dd, $^3J_{\text{H-H}}=8.1$ Hz, $^4J_{\text{H-H}}=2.2$ Hz, 1H, Ar-H), 5.28~5.19 (m, 1H, CH), 4.37 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.1$ Hz, 2H, CH₂), 3.70 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.1$ Hz, 2H, CH₂), 3.58 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 2.59 (s, 3H, SCH₃), 2.34 (s, 3H, ArCH₃), 1.60 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.8$ Hz, 3H, CH₃), 1.21 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 171.88, 168.37, 157.03, 156.64, 140.00, 136.94, 129.50, 127.16, 124.42, 119.79, 118.90, 118.16, 116.11, 74.80, 68.09, 66.81, 64.03, 55.20, 23.76, 21.36, 18.33, 15.15; HRMS (ESI) calcd for C₂₄H₂₈N₂NaO₄S [M+Na]⁺ 463.1667, found 463.1654.

2-氰基-3-甲硫基-3-{1-[4-(4-甲氧基苯氧基)苯基]乙基}胺基丙烯酸乙氧乙酯(**11m**): 淡黄色液体, 产率 84.3%. ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.37 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.4$ Hz, 1H, NH), 7.17 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 6.98 (d, $^3J_{\text{H-H}}=9.0$ Hz, 2H, Ar-H), 6.91 (d, $^3J_{\text{H-H}}=9.0$ Hz, 2H, Ar-H), 6.89 (d, $^3J_{\text{H-H}}=9.0$ Hz, 2H, Ar-H), 5.27~5.15 (m, 1H, CH), 4.31 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.1$ Hz, 2H, CH₂), 3.81 (s, 3H, OCH₃), 3.70 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.1$ Hz, 2H, CH₂), 3.58 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 2.59 (s, 3H, SCH₃), 1.57 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.8$ Hz, 3H, CH₃), 1.21 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 170.90, 168.42, 158.20, 156.14, 149.69, 136.36, 127.13, 121.01, 118.22, 117.80, 114.94, 74.80, 68.13, 66.87, 64.07, 55.67, 55.23, 23.80, 18.38, 15.19; HRMS (ESI) calcd for C₂₄H₂₈N₂NaO₄S [M+Na]⁺ 479.1617, found 479.1618.

3.5 2-氰基-4,4,4-三氟-3-{1-[4-(4-氯苯氧基)苯基]乙基}胺基-2-丁烯酸乙氧乙酯(**12a**)的合成

在 50 mL 圆底烧瓶中加入 0.64 g (2.59 mmol) 1-[4-(4-氯苯氧基)]苯乙胺及 15 mL 重蒸的二氯甲烷, 冷却至 -2 °C 以下, 先后滴加 0.59 g (2.16 mmol) 2-氰基-3-氯-4,4,4-三氟丁烯酸乙氧乙酯与 5 mL 二氯甲烷的混合液, 0.44 g 三乙胺与 5 mL 二氯甲烷的混合液。维持在此温度下搅拌 20 min, 然后在室温下搅拌, TLC 检测至 2-氰基-3-氯-4,4,4-三氟丁烯酸乙氧乙酯反应完全, 饱和食盐水洗 3 次, 然后再用二氯甲烷萃取水相 1 次, 合并有机相, 无水硫酸钠干燥, 抽滤, 脱溶, 柱层析[V(石油醚): V(乙酸乙酯)=10:1]提纯, 得 0.86 g 桔黄色液体 **12a**, 产率 68.9%。

^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.65 (d, $^3J_{\text{H-H}}=9.1$ Hz, 1H, NH), 7.30 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.9$ Hz, 2H, Ar-H), 7.22 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 6.98 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 6.94 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.9$ Hz, 2H, Ar-H), 5.02~4.87 (m, 1H, CH), 4.36 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.71 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.56 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 2.59 (s, 3H, SCH₃), 1.57 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.8$ Hz, 3H, CH₃), 1.21 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 170.90, 168.42, 158.20, 156.14, 149.69, 136.36, 127.13, 121.01, 118.22, 117.80, 114.94, 74.80, 68.13, 66.87, 64.07, 55.67, 55.23, 23.80, 18.38, 15.19; HRMS (ESI) calcd for C₂₄H₂₈N₂NaO₄S [M+Na]⁺ 479.1617, found 479.1618.

$^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 1.63 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.7$ Hz, 3H, CH₃), 1.20 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -61.57; ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 168.56, 156.99, 155.33, 154.43 (q, $^2J_{\text{C-F}}=32.6$ Hz), 136.42, 129.87, 128.80, 127.04, 120.44, 119.13, 118.98 (q, $^1J_{\text{C-F}}=283.6$ Hz), 114.20, 72.57 (q, $^3J_{\text{C-F}}=1.4$ Hz), 67.81, 66.95, 65.17, 55.68 (q, $^4J_{\text{C-F}}=3.2$ Hz), 24.42, 15.14; HRMS (ESI) calcd for C₂₃H₂₂ClF₃N₂NaO₄ [M+Na]⁺ 505.1112, found 505.1114.

采用与 **12a** 相同的路线, 合成目标化合物 **12b~12l**.

2-氰基-4,4,4-三氟-3-{1-[4-(2-氯苯氧基)苯基]乙基}胺基-2-丁烯酸乙氧乙酯(**12b**): 淡黄色液体, 产率 55.4%. ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.67 (d, $^3J_{\text{H-H}}=9.0$ Hz, 1H, NH), 7.49 (dd, $^3J_{\text{H-H}}=8.0$ Hz, $^4J_{\text{H-H}}=1.5$ Hz, 1H, Ar-H), 7.30~7.20 (m, 3H, Ar-H), 7.15 (td, $^3J_{\text{H-H}}=14.6$ Hz, $^3J_{\text{H-H}}=7.7$ Hz, $^4J_{\text{H-H}}=1.3$ Hz, 1H, Ar-H), 7.04 (dd, $^3J_{\text{H-H}}=8.1$ Hz, $^4J_{\text{H-H}}=1.4$ Hz, 1H, Ar-H), 6.96 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 5.01~4.93 (m, 1H, CH), 4.38 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.71 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.59 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 1.65 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.6$ Hz, 3H, CH₃), 1.22 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -61.56; ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 168.56, 157.06, 154.41 (q, $^2J_{\text{C-F}}=32.7$ Hz), 151.83, 136.01, 130.92, 128.09, 126.97, 125.30, 121.44, 118.98 (q, $^1J_{\text{C-F}}=282.0$ Hz), 118.03, 114.24, 72.49 (q, $^3J_{\text{C-F}}=1.4$ Hz), 67.81, 66.94, 65.15, 55.69 (q, $^4J_{\text{C-F}}=3.5$ Hz), 24.39, 15.14; HRMS (ESI) calcd for C₂₃H₂₂ClF₃N₂NaO₄ [M+Na]⁺ 505.1112, found 505.1115.

2-氰基-4, 4, 4-三氟-3-{1-[4-(4-氟苯氧基)苯基]乙基}胺基-2-丁烯酸乙氧乙酯(**12d**): 桔黄色液体, 产率 61.3%. ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.65 (d, $^3J_{\text{H-H}}=9.0$ Hz, 1H, NH), 7.20 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 7.07~6.96 (m, 4H, Ar-H), 6.94 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.8$ Hz, 2H, Ar-H), 4.99~4.88 (m, 1H, CH), 4.38~4.36 (m, 2H, CH₂), 3.71 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.57 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 1.62 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.7$ Hz, 3H, CH₃), 1.19 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -61.59 (s, 3F, CF₃), -119.30 (s, 1F, Ar-F); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 168.56, 159.07 (d, $^1J_{\text{C-F}}=243.4$ Hz), 157.76, 154.39 (q, $^2J_{\text{C-F}}=32.6$ Hz), 152.26 (d, $^4J_{\text{C-F}}=2.3$ Hz), 135.90, 126.97, 120.94 (d, $^3J_{\text{C-F}}=8.2$ Hz), 118.45, 118.98 (q, $^1J_{\text{C-F}}=282.8$ Hz), 116.46 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.3$ Hz), 114.26, 72.48 (q, $^3J_{\text{C-F}}=1.8$ Hz), 67.81, 66.92, 65.15, 55.70 (q, $^4J_{\text{C-F}}=3.1$ Hz), 24.39, 15.13; HRMS (ESI) calcd for C₂₃H₂₁F₄N₂NaO₄ [M-H]⁻ 465.1438, found 465.1439.

2-氰基-4,4,4-三氟-3-{1-[4-(3-三氟甲基苯氧基)苯基]乙基}胺基-2-丁烯酸乙氧乙酯(**12e**): 淡黄色液体, 产率 52.7%. ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.68 (d, $^3J_{\text{H-H}}=9.1$ Hz, 1H, NH), 7.46 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.9$ Hz, 1H, Ar-H), 7.38 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.7$ Hz, 1H, Ar-H), 7.28~7.24 (m, 3H, Ar-H), 7.17 (dd, $^3J_{\text{H-H}}=8.1$ Hz, $^4J_{\text{H-H}}=1.9$ Hz, 1H, Ar-H), 7.03 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 5.02~4.92 (m, 1H, CH), 4.38 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.72 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.57 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 1.65 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.6$ Hz, 3H, CH₃), 1.20 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -61.590 (s, 3F, CF₃), -62.71 (s, 3F, CF₃); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 168.56, 157.21, 156.25, 154.43 (q, $^2J_{\text{C-F}}=32.6$ Hz), 137.04, 132.33 (q, $^2J_{\text{C-F}}=32.8$ Hz), 130.47, 127.21, 123.64 (q, $^1J_{\text{C-F}}=273.5$ Hz), 121.97, 120.15 (q, $^3J_{\text{C-F}}=3.7$ Hz), 119.63, 118.98 (q, $^1J_{\text{C-F}}=282.6$ Hz), 115.72 (q, $^3J_{\text{C-F}}=3.7$ Hz), 114.20, 72.65 (q, $^3J_{\text{C-F}}=1.4$ Hz), 67.80, 66.92, 65.18, 55.66 (q, $^4J_{\text{C-F}}=3.1$ Hz), 24.42, 15.12; HRMS (ESI) calcd for C₂₄H₂₂F₆N₂NaO₄ [M+Na]⁺ 539.1376, found 539.1378.

2-氰基-4,4,4-三氟-3-{1-[4-(3,4-二氟苯氧基)苯基]乙基}胺基-2-丁烯酸乙氧乙酯(**12f**): 桔黄色液体, 产率 43.4%. ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.65 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.9$ Hz, 1H, NH), 7.23 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.5$ Hz, 2H, Ar-H), 7.17~7.10 (m, 1H, Ar-H), 6.98 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.5$ Hz, 2H, Ar-H), 6.88~6.79 (m, 1H, Ar-H), 6.78~6.68 (m, 1H, Ar-H), 5.05~4.83 (m, 1H, CH), 4.36 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.9$ Hz, 2H, CH₂), 3.71 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.9$ Hz, 2H, CH₂), 3.56 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 1.63 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.6$ Hz, 3H, CH₃), 1.20 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -61.59 (s, 3F), -134.17 (d, $^3J_{\text{F-F}}=21.0$ Hz, 1F), -143.94 (d, $^3J_{\text{F-F}}=21.8$ Hz); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 168.55, 156.75, 154.42 (q, $^2J_{\text{C-F}}=32.5$ Hz), 152.76 (dd, $^3J_{\text{C-F}}=8.3$ Hz, $^4J_{\text{C-F}}=2.6$ Hz), 150.56 (dd, $^1J_{\text{C-F}}=250.8$ Hz, $^2J_{\text{C-F}}=14.0$ Hz), 146.84 (dd, $^1J_{\text{C-F}}=245.1$ Hz, $^2J_{\text{C-F}}=12.7$ Hz), 136.80, 127.12, 119.18, 118.98 (d, $^1J_{\text{C-F}}=282.9$ Hz), 117.68 (d, $^2J_{\text{C-F}}=19.3$ Hz), 114.68 (dd, $^3J_{\text{C-F}}=6.0$ Hz, $^4J_{\text{C-F}}=3.7$ Hz), 114.17, 108.73 (d, $^3J_{\text{C-F}}=19.9$ Hz), 72.67, 67.80, 66.93, 65.18, 55.64 (q, $^4J_{\text{C-F}}=3.2$ Hz), 24.42, 15.12; HRMS (ESI) calcd for C₂₃H₂₁F₅N₂NaO₄ [M+Na]⁺ 507.1314, found 507.1308.

2-氰基-4,4,4-三氟-3-{1-[4-(2,4-二氟苯氧基)苯基]乙基}胺基-2-丁烯酸乙氧乙酯(**12g**): 桔黄色液体, 产率 50.0%. ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.64 (d, $^3J_{\text{H-H}}=9.1$ Hz, 1H, NH), 7.19 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.7$ Hz, 2H, Ar-H), 7.11~7.03 (m, 1H, Ar-H), 6.99~6.82 (m, 4H, Ar-H), 4.98~4.88

(m, 1H, CH), 4.35 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.70 (t, $^3J_{\text{H-H}}=5.0$ Hz, 2H, CH₂), 3.56 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 1.61 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.7$ Hz, 3H, CH₃), 1.19 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -61.60 (s, 3F, CF₃), -114.15 (d, $^4J_{\text{F-F}}=5.0$ Hz, 1F), -125.24 (d, $^4J_{\text{F-F}}=5.1$ Hz); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 168.54, 159.07 (dd, $^1J_{\text{C-F}}=247.3$ Hz, $^3J_{\text{C-F}}=10.2$ Hz), 157.56, 154.44 (dd, $^1J_{\text{C-F}}=253.2$ Hz, $^3J_{\text{C-F}}=12.3$ Hz), 154.39 (q, $^2J_{\text{C-F}}=32.5$ Hz), 139.22 (dd, $^2J_{\text{C-F}}=11.9$ Hz, $^4J_{\text{C-F}}=3.9$ Hz), 135.94, 126.96, 123.23 (dd, $^3J_{\text{C-F}}=9.8$ Hz, $^3J_{\text{C-F}}=1.8$ Hz), 118.97 (q, $^1J_{\text{C-F}}=283.0$ Hz), 117.00, 114.23, 111.57 (dd, $^2J_{\text{C-F}}=22.9$ Hz, $^4J_{\text{C-F}}=3.8$ Hz), 105.57 (dd, $^2J_{\text{C-F}}=26.7$ Hz, $^2J_{\text{C-F}}=22.1$ Hz), 72.49 (q, $^3J_{\text{C-F}}=1.5$ Hz), 67.80, 66.91, 65.15, 55.63 (q, $^4J_{\text{C-F}}=3.4$ Hz), 24.37, 15.12; HRMS (ESI) calcd for C₂₃H₂₀F₅N₂NaO₄ [M - H]⁻ 483.1343, found 483.1344.

2-氰基-4,4,4-三氟-3-[1-(4-苯氧基苯基)乙基]胺基-2-丁烯酸乙氧乙酯(**12j**): 淡黄色液体, 产率 53.4%。 ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.66 (d, $^3J_{\text{H-H}}=9.0$ Hz, 1H, NH), 7.35 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, Ar-H), 7.13 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.4$ Hz, 1H, Ar-H), 7.01 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.4$ Hz, 2H, Ar-H), 6.99 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.5$ Hz, 2H, Ar-H), 5.02~4.88 (m, 1H, CH), 4.37 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.9$ Hz, 2H, CH₂), 3.71 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.9$ Hz, 2H, CH₂), 3.57 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 1.63 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.6$ Hz, 3H, CH₃), 1.20 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -61.56; ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 168.57, 157.41, 156.61, 154.39 (q, $^2J_{\text{C-F}}=32.5$ Hz), 135.91, 129.88, 126.93, 123.77, 119.27, 119.04, 118.99 (q, $^1J_{\text{C-F}}=282.8$ Hz), 114.29, 72.45 (q, $^3J_{\text{C-F}}=1.7$ Hz), 67.82, 66.93, 65.15, 55.74 (q, $^4J_{\text{C-F}}=3.2$ Hz), 24.42, 15.15; HRMS (ESI) calcd for C₂₃H₂₂F₃N₂NaO₄ [M - H]⁻ 447.1532, found 447.1534.

2-氰基-4,4,4-三氟-3-[1-(4-(4-甲基苯氧基)苯基)乙基]胺基-2-丁烯酸乙氧乙酯(**12k**): 桔黄色液体, 产率 62.1%。 ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.66 (d, $^3J_{\text{H-H}}=9.1$ Hz, 1H, NH), 7.19 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.6$ Hz, 2H, Ar-H), 7.15 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.3$ Hz, 2H, Ar-H), 6.96 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.7$ Hz, 2H, Ar-H), 6.92 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.4$ Hz, 1H, Ar-H), 5.01~4.87 (m, 1H, CH), 4.36 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.9$ Hz, 2H, CH₂), 3.71 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.9$ Hz, 2H, CH₂), 3.57 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 2.34 (s, 3H, Ar-CH₃), 1.62 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.7$ Hz, 3H, CH₃), 1.20 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -61.56; ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 168.57, 157.97, 154.38 (q, $^2J_{\text{C-F}}=32.4$ Hz), 154.08, 135.45, 133.50, 130.38, 126.86, 119.48, 119.00 (q, $^1J_{\text{C-F}}=283.6$ Hz),

118.49, 114.30, 72.37 (q, $^3J_{\text{C-F}}=2.1$ Hz), 67.83, 66.93, 65.14, 55.76 (q, $^4J_{\text{C-F}}=3.4$ Hz), 24.39, 20.75, 15.16; HRMS (ESI) calcd for C₂₄H₂₄F₃N₂NaO₄ [M - H]⁻ 461.1688, found 461.1690.

2-氰基-4,4,4-三氟-3-[1-[4-(3-甲基苯氧基)苯基]乙基]胺基-2-丁烯酸乙氧乙酯(**12l**): 桔黄色液体, 产率 60.1%。 ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 10.66 (d, $^3J_{\text{H-H}}=9.1$ Hz, 1H, NH), 7.25~7.16 (m, 3H, Ar-H), 6.98 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.7$ Hz, 2H, Ar-H), 6.96 (d, $^3J_{\text{H-H}}=7.6$ Hz, 1H, Ar-H), 6.84 (s, 1H, Ar-H), 6.81 (d, $^3J_{\text{H-H}}=8.0$ Hz, 1H, Ar-H), 5.01~4.89 (m, 1H, CH), 4.37 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.9$ Hz, 2H, CH₂), 3.71 (t, $^3J_{\text{H-H}}=4.9$ Hz, 2H, CH₂), 3.57 (q, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 2H, CH₂), 2.34 (s, 3H, Ar-CH₃), 1.63 (d, $^3J_{\text{H-H}}=6.7$ Hz, 3H, CH₃), 1.20 (t, $^3J_{\text{H-H}}=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ^{19}F NMR (CDCl₃, 376 MHz) δ : -61.56; ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 168.58, 157.54, 156.50, 154.40 (q, $^2J_{\text{C-F}}=32.6$ Hz), 140.12, 135.70, 129.58, 126.89, 124.62, 119.99, 119.00 (q, $^1J_{\text{C-F}}=282.9$ Hz), 118.93, 116.30, 114.30, 72.41 (q, $^3J_{\text{C-F}}=1.7$ Hz), 67.82, 66.94, 65.14, 55.75 (q, $^4J_{\text{C-F}}=3.3$ Hz), 24.40, 21.40, 15.15; HRMS (ESI) calcd for C₂₄H₂₄F₃N₂NaO₄ [M - H]⁻ 461.1688, found 461.1692.

辅助材料(Supporting Information) 化合物 **10~12** 的 ^1H NMR, ^{19}F NMR 和 ^{13}C NMR 图谱及标题化合物对单子叶稗草和马唐的除草活性结果。这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载。

References

- [1] Wessels, J. S. C.; van der Veen, R. *Biochim. Biophys. Acta* **1956**, 19, 548.
- [2] Buchel, K. H. *Pestic. Sci.* **1972**, 3(1), 89.
- [3] Phillips, J. N.; Huppertz, J. L. Z. *Naturforsch.* **1987**, 42C, 684.
- [4] Banham, W. K.; Huppertz, J. L.; Phillips, J. N. Z. *Naturforsch.* **1993**, 48C, 136.
- [5] Deisenhofer, J.; Epp, O.; Miki, K.; Huber, R.; Michel, H. *Nature* **1985**, 318(6047), 618.
- [6] (a) Wang, T.-T.; Bing, G.-F.; Zhang, X.; Qin, Z.-F.; Yu, H.-B.; Qin, X.; Dai, H.; Fang, J.-X. *Chin. J. Org. Chem.* **2009**, 29, 1287 (in Chinese). (王婷婷, 邵贵方, 张欣, 秦振芳, 于海波, 秦雪, 戴红, 方建新, *有机化学*, **2009**, 29, 1287.)
(b) Wang, T.-T.; Miao, W.-K.; Wu, S.-S.; Bing, G.-F.; Zhang, X.; Qin, Z.-F.; Yu, H.-B.; Qin, X.; Fang, J.-X. *Chin. J. Chem.* **2011**, 29(5), 959.
(c) Liu, Y.-X.; Cui, Z.-P.; Liu, B.; Cai, B.-L.; Li, Y.-H.; Wang, Q.-M. *J. Agric. Food Chem.* **2010**, 58(5), 2685.
- [7] Buman, R. A.; Gealy, D. R.; Fuerst, E. P. *Pestic. Biochem. Physiol.* **1992**, 43(1), 22.
- [8] Liu, H. Y.; Sha, Y. L.; Lu, R. J.; Yang, H. Z.; Lai, L. H. *Chin. Sci. Bull.* **1998**, 43(4), 397 (in Chinese). (刘华银, 沙印林, 陆荣健, 杨华铮, 来鲁华, *科学通报*, **1998**, 43(4), 397.)

- [9] Dimmock, J. R.; Puthucode, R. N.; Smith, J. M.; Hetherington, M.; Quail, J. W.; Pugazhenti, U.; Lechler, T.; Stables, J. P. *J. Med. Chem.* **1996**, *39*, 3984.
- [10] Vashishtha, S. C.; Zello, G. A.; Nienaber, K. H.; Balzarini, J.; Clercq, E. D.; Stables, J. P.; Dimmock, J. R. *Eur. J. Med. Chem.* **2004**, *39*, 27.
- [11] Wang, Q.; Sun, H.; Cao, H.; Cheng, M.; Huang, R. *J. Agric. Food Chem.* **2003**, *51*, 5030.
- [12] Wang, X. J.; Huang, Z. T. *Acta Chim. Sinica* **1989**, *47*(9), 890 (in Chinese).
(王肖君, 黄志镗, 化学学报, **1989**, *47*(9), 890.)
- [13] Wu, Y.-C.; Wu, C.; Zou, X. M.; Hu, F. Z.; Yang, H. Z. *Chin. Chem. Lett.* **2005**, *16*(10), 1293.
- [14] Wu, Y.-C. *M.S. Thesis*, Nankai University, Tianjin, **1999** (in Chinese).
(吴彦超, 硕士论文, 南开大学, 天津, **1999**.)
- [15] Li, C.-H. *M.S. Thesis*, Nankai University, Tianjin, **2010** (in Chinese).
(李春晖, 硕士论文, 南开大学, 天津, **2010**.)
- [16] Gorczynski, M. J.; Leal, R. M.; Moobery, S. L.; Bushweller, J. B.; Brown, M. L. *Bioorg. Med. Chem.* **2004**, *12*(5), 1029.
- [17] Trust, R. I.; McEvoy, F. J.; Albright, J. D. *J. Med. Chem.* **1979**, *22*(9), 1068.
- [18] Naimi-Jamal, M. R.; Mokhtari, J.; Dekamin, M. G.; Kaupp, G. *Eur. J. Org. Chem.* **2009**, *21*, 3567.
- [19] Thompson, A. S.; Humphrey, G. R.; DeMarco, A. M.; Mathre, D. J.; Grabowski, E. J. J. *J. Org. Chem.* **1993**, *58*, 5886.
- [20] Sørbye, K.; Tautermann, C.; Carlsen, P.; Fiksdahl, A. *Tetrahedron: Asymmetry* **1998**, *9*, 681.

(Qin, X.)