基于 Friedel-Crafts 反应的 3-吲哚取代苯硼唑的水相合成

张慧明^a 沈少春^{a,b} 杨笑迪^{*,c} 孙兴文^{*,a}^a 复旦大学化学系 上海 200433^b 上海石油化工研究院 上海 201208^c 复旦大学先进材料实验室 上海 200433

摘要 报道了一种基于 Friedel-Crafts 反应的 3-吲哚取代苯硼唑的水相合成方法. 以邻甲酰苯硼酸和吲哚为原料, 无需外加催化剂, 在室温下使用纯水为反应介质, 以中等到定量的产率得到 3-吲哚取代的苯硼唑类化合物. 该方法具有操作简单、合成效率高、环境友好的优点.

关键词 Friedel-Crafts 反应; 3-吲哚取代苯硼唑; 水相合成

Synthesis of 3-Indolyl-substituted Benzoboroxole via Friedel-Crafts Reaction in Water

Zhang, Huiming^a Shen, Shaochun^{a,b} Yang, Xiaodi^{*,c} Sun, Xingwen^{*,a}^a Department of Chemistry, Fudan University, Shanghai 200433^b Sinopec Shanghai Research Institute, Petrochemical Technology, Shanghai 201208^c Laboratory of Advanced Materials, Fudan University, Shanghai 200433

Abstract A highly efficient and catalyst free approach for the synthesis of 3-indolyl-substituted benzoboroxole via Friedel-Crafts reaction in water was developed successfully using readily accessible 2-formylbenzeneboronic acid and indole as the starting material and water as solvent at room temperature. An array of desired 3-indolyl-substituted benzoboroxoles was synthesized in moderate to near quantitative yield.

Keywords Friedel-Crafts reaction; 3-indole-substituted benzoboroxole; synthesis in water

芳基硼酸或硼酸酯广泛应用于过渡金属催化的偶联反应及其他有机合成^[1]. 图 1 所示的硼酸衍生物被称为“苯硼唑”(benzoboroxole)^[2], 由于五元环的存在, 其稳定性被认为较一般硼酸分子更高.

图 1 苯硼唑

Figure 1 Benzoboroxole

Torssell^[3]在 1957 年首次报道了研究过程中发现的副产物苯硼唑; 而后, Snyder 小组^[4]发展了苯硼唑及其类似物的合成. 近来, 研究发现含有苯硼唑骨架的分子

有着突出的生理活性; 以单体分子 **1** 为例, 它可以通过与糖苷或寡糖结合从而表现出不同的生理活性^[5]; 基于苯硼唑易与糖分子结合的性质, Liu^[6a]和 Wang 等^[6b]分别报道了用于富集糖分子和糖蛋白的苯硼唑功能材料; 2011 年, Kiser 小组^[7]利用苯硼唑分子与艾滋病(HIV)病毒包膜上的糖残基结合, 从而阻止其进入细胞继续感染, 发展出一种新型杀菌素, 该成果有望成为一种艾滋病的新疗法. 除此之外, 苯硼唑分子还有着一些其他的特殊活性与用途(图 2); 如 5-氟代苯硼唑分子 AN2690 (**2**)被用于治疗真菌性甲癣; 而 5-氯代苯硼唑分子 AN2718 (**3**)被用于治疗脚气; 化合物 AN2728 (**4**)能用于治疗皮炎、牛皮癣^[8]; 而化合物 **5** 是杀虫剂的主要成分^[9]; 化合物 **6** 是有机化学中的重要偶联剂^[10]; 化合物 **7** 则是工业用的蓝色染料^[11].

* E-mail: yangxiaodi@fudan.edu.cn; sunxingewen@fudan.edu.cn

Received October 18, 2014; revised October 28, 2014; published online November 3, 2014.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 20802009, 21303023).

国家自然科学基金(Nos. 20802009, 21103023)资助项目.

图2 一些具有生物活性及用途的苯硼唑类化合物

Figure 2 Several bio-active benzoboroxole compounds

3-取代苯硼唑类化合物的合成方法已经有一些报道: 1999年, Zhdankin等^[12]从邻卤代苄醇出发, 与丁基锂作用后与三异丙基硼酸酯反应, 酸化后得到3,3-二取代苯硼唑; 2001年, Falck小组^[13]利用邻位烯烃取代苯硼酸在NBS作用下成环得到3-取代苯硼唑类分子, 产率最高达到92%; 2010年, Mereddy小组^[14]通过Baylis-Hillman反应, 制备了具有多种取代基的3-乙烯基取代苯硼唑类化合物。苯硼唑已经展示的多样的生理活性与用途, 而相应的合成方法则比较有限, 因此发展含有苯硼唑骨架的合成方法无论是对其化学用途及药物活性研究都有着积极的意义。

吡啶骨架是广泛存在于天然产物和药物分子中的重要结构单元, 发展含有吡啶骨架的复杂分子合成策略一直是有机化学及药物化学的研究热点^[15~18]。2011年, 我们^[19]发展了吡啶和邻甲酰基苯甲酸通过Friedel-Crafts反应合成3-吡啶取代的苯酚类化合物的方法, 随后的药物化学研究表明, 这类化合物在抗阿尔兹海默症方面有着优秀的生理活性^[20]。作为双杂环化合物合成工作的延续, 我们设想若将吡啶骨架引入苯硼唑分子中, 发展一种高效、便捷地合成杂环取代苯硼唑类分子的方法, 无论是在药物科学还是有机方法学领域都具有积极的意义(Scheme 1)。

1 结果与讨论

1.1 反应条件筛选

首先, 我们以邻甲酰基苯硼酸(**8**)^[21]和吡啶**9**为模板底物, 在室温下对反应条件进行了筛选(Eq. 1)。

如表1所示, 吡啶(1.5 equiv.)与邻甲酰基苯硼酸(1 equiv.)在有机溶剂(甲醇或者1,2-二氯乙烷)中无需催化剂, 即可发生分子间Friedel-Crafts反应, 然后脱水后便得到预期的3-吡啶取代苯硼唑化合物, 推测认为弱酸性

Scheme 1

表1 反应尝试与条件筛选^a

Table 1 Screening and optimization of the reaction condition

Entry	n(8) : n(9a)	Solvent	Yield ^b /%
1	1 : 1.5	MeOH	57
2	1 : 1.5	DCE	68
3	1 : 1.5	H ₂ O	99
4 ^c	1 : 1.5	H ₂ O	87
5	1 : 1.2	H ₂ O	90

^a 反应条件: 0.2 mmol **8**, 1 mL 溶剂; ^b 分离产率; ^c 12 h.

的硼酸自身对该反应可能有促进作用。结合我们发展以水为反应介质的绿色合成方法的研究兴趣, 接下来尝试了纯水为溶剂的反应情况^[22]。值得高兴的是, 在纯水中, 当使用1.5 equiv.吡啶和1 equiv.邻甲酰基苯硼酸为反应原料时, 几乎以定量的产率得到了预期的3-吡啶取代苯硼唑化合物**10a**(表1, Entry 3)。减少反应时间或者减少吡啶用量, 反应产率有所下降(表1, Entries 4, 5)。

1.2 反应的普适性探讨

我们以1 equiv.邻甲酰基苯硼酸(**8**) (0.2 mmol), 1.5 equiv.吡啶(0.3 mmol)在室温下, 1 mL 纯水作溶剂为反应条件对底物进行了拓展(表2)。

表 2 水相中合成 3-吲哚取代苯硼唑化合物的底物拓展
Table 2 Synthesis of 3-indole-substituted benzoboroxole in water

Entry	Indole	Product	Yield ^a /%	Entry	Indole	Product	Yield ^a /%
1			99 (93 ^b)	7			82
2			53	8			52
3			94	9			87
4			80	10			50
5			99	11			87
6			75				

^a 分离产率; ^b 括号内的产率对应反应条件是: 5 mmol **8** 和 7.5 mmol 吲哚在 25 mL 纯水中反应 36 h.

从表 2 可以看出, 邻甲酰基苯硼酸与含有吸电子取代基的吡啶, 无论是 5-位取代还是 6-位取代的底物, 在纯水中均能很好地生成 3-吡啶取代苯硼唑类化合物, 取得中等到优秀的产率, 其中, 5-位氯取代的吡啶, 能以高达 99% 的产率得到 3-吡啶取代苯硼唑(表 2, Entry 5); 在 6-位有强吸电子取代基如硝基时, 反应也能以 75% 的产率得到目标产物(表 2, Entry 6); 对于含有给电子取代基的吡啶, 反应也可以顺利发生, 以中等到优秀的产率得到对应的 3-吡啶取代苯硼唑(表 2, Entries 7~9); 而对于 2-位苯基取代的吡啶, 可以 50% 的收率得到目标产物(表 2, Entry 10); 值得说明的是, 对于 7-氮杂吡啶, 反应也能得到 87% 的产率(表 2, Entry 11). 同时, 我们以吡啶 **9a** 和 **8** 为底物将反应放大到 5 mmol, 延长反应时间至 36 h, 反应仍保持优秀的产率得到目标化合物 **10a**, 并通过化合物 **10a** 的单晶 X 射线衍射进一步确证了产物的结构^[23](图 3).

图 3 化合物 **10a** 的单晶结构

Figure 3 Crystal structure of compound **10a**

2 结论

发展了一种在室温下, 水相中, 无需外加催化剂, 通过吡啶和邻甲酰基苯硼酸发生分子间 Friedel-Crafts 反应, 脱水合成 3-吡啶取代苯硼唑的方法. 该方法普适性较好, 对于含有吸电子、给电子取代基的吡啶, 以及 7-氮杂吡啶, 能以中等到优秀的产率得到目标产物, 最高产率达 99%; 反应具有环境友好、操作简单的优点, 而且实现了在水相中的克级制备目标产物; 对于产物的结构, 通过 X-射线单晶衍射进行了确认. 产物在抗阿尔兹海默症果蝇实验研究中表现出了优秀的生理活性, 该类化合物的其他药理学研究正在进行中.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

¹H NMR 谱和 ¹³C NMR 谱在 ECA-400 (400 MHz)、DMX-500 (500 MHz) 型核磁共振仪上测定; ESI-HRMS

在 Bruker ApeXIII 7.0 TESLA FTMS、Water Micromass GCT Premier 型高分辨质谱仪上测定. 所用药品及溶剂均为商品化的分析纯或化学纯, 未经过进一步处理; 快速柱层析在硅胶 200~300 目或 300~400 目上进行, TLC 用 HSGF254 高效板, 用 UV 灯 254, 365 nm 波长、5% 磷钼酸乙醇溶液显色.

3.2 实验方法

3.2.1 邻甲酰基苯硼酸的合成

将邻溴苯甲醛(10 mmol)溶于甲苯(50 mL)后, 加入乙二醇(12 mmol)和对甲苯磺酸(0.5 mmol, 5 mol%), 回流分水过夜; TLC 检测反应结束后, 冷却室温, 旋转蒸发除去甲苯, 然后加入 100 mL 乙酸乙酯稀释, 依次用饱和 Na₂CO₃ 溶液、水、饱和 NaCl 溶液洗涤, 有机相用无水 Na₂SO₄ 干燥后过滤, 浓缩后柱层析分离, 得到缩醛. 将缩醛溶于新蒸四氢呋喃(50 mL)中, 冷却至 -78 °C, 氮气保护下, 缓慢滴加 1.0 mol/L 正丁基锂溶液(20 mL), 滴加完毕后, 搅拌 30 min, 再往溶液中缓慢加入硼酸三甲酯(20 mmol), -78 °C 下搅拌过夜, 缓慢升温至室温后, 小心加入 5% 盐酸(50 mL), 室温搅拌 2 h. 旋转蒸发除去有机溶剂后, 乙酸乙酯萃取(30 mL×3), 无水硫酸钠干燥, 过滤, 滤液浓缩, 柱层析分离得到邻甲酰基苯硼酸 **8**^[23], 白色固体, 两步总产率 68%. ¹H NMR (DMSO-*d*₆, 400 MHz) δ : 10.13 (s, 1H), 8.38 (br, 2H), 7.88 (d, *J*=7.6 Hz, 1H), 7.66~7.58 (m, 2H), 7.51~7.58 (m, 1H).

3.2.2 目标化合物 **10a**~**10k** 的合成

室温下, 将邻甲酰基苯硼酸 **8** (0.2 mmol) 和吡啶 **9** (0.3 mmol, 1.5 equiv.) 混合后加入 1 mL 去离子水, 在室温下搅拌 24 h. 反应结束后, 用 10 mL 甲苯共沸除去水后快速柱层析得到产物 **10**. 需要说明的是, 化合物 **10a**~**10k** 在熔点测定时表现出了热不稳定性, 当加热到 80 °C 时该类化合物迅速变黑.

3-吡啶取代苯硼唑(**10a**): 浅红色固体, 产率 99%. ¹H NMR (acetone-*d*₆, 400 MHz) δ : 10.22 (s, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.84 (d, *J*=6.8 Hz, 1H), 7.46~7.37 (m, 3H), 7.31~7.26 (m, 2H), 7.20 (dd, *J*=8.4, 1.2 Hz, 1H), 7.09~7.05 (m, 1H), 6.91~6.87 (m, 1H), 6.49 (s, 1H); ¹³C NMR (acetone-*d*₆, 100 MHz) δ : 157.5, 137.3, 130.7, 130.6, 130.2, 127.2, 126.4, 124.1, 122.4, 121.6, 119.4, 119.0, 115.4, 111.5, 77.5; HRMS calcd for C₁₅H₁₁BNO₂ (M-H⁺) 248.0883, found 248.0884.

3-(5-氟)-吡啶取代苯硼唑(**10b**): 浅黄色固体, 产率 53%. ¹H NMR (acetone-*d*₆, 400 MHz) δ : 10.34 (s, 1H), 8.12 (s, 1H), 7.85~7.83 (m, 1H), 7.45~7.38 (m, 4H), 7.30~7.27 (m, 1H), 6.90~6.85 (m, 1H), 6.81 (dd, *J*=

10.0, 3.2 Hz, 1H), 6.5 (s, 1H); ^{13}C NMR (acetone- d_6 , 100 MHz) δ : 157.1, 133.9, 130.8, 130.3, 127.3, 126.2, 122.4, 112.6, 112.5, 109.8, 109.6, 104.1, 103.8, 77.3; HRMS calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{BFNO}_2$ ($\text{M}-\text{H}^+$) 266.0789, found 266.0782.

3-(6-氟)-吡啶取代苯硼啉(**10c**): 浅黄色固体, 产率 94%. ^1H NMR (acetone- d_6 , 400 MHz) δ : 10.31 (s, 1H), 8.14 (s, 1H), 7.85 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.47~7.38 (m, 2H), 7.34 (d, $J=2.8$ Hz, 1H), 7.29~7.27 (m, 1H), 7.16~7.11 (m, 2H), 6.75~6.7 (m, 1H), 6.47 (s, 1H); ^{13}C NMR (acetone- d_6 , 100 MHz) δ : 161.1, 158.8, 157.4, 137.5 (d, $J=20$ Hz), 131.0, 130.5, 127.5, 125.0, 123.3, 122.6, 120.6, 115.8, 107.8, 97.9, 77.6; HRMS calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{BFNO}_2$ ($\text{M}-\text{H}^+$) 266.0789, found 266.0751.

3-(5-溴)-吡啶取代苯硼啉(**10d**): 白色固体, 产率 80%. ^1H NMR (acetone- d_6 , 400 MHz) δ : 10.40 (s, 1H), 8.12 (s, 1H), 7.82 (d, $J=7.3$ Hz, 1H), 7.43~7.31 (m, 4H), 7.27 (dd, $J=7.4, 0.8$ Hz, 1H), 7.17 (dd, $J=8.7, 2.3$ Hz, 1H), 6.45 (s, 1H); ^{13}C NMR (acetone- d_6 , 100 MHz) δ : 157.0, 136.0, 130.9, 130.4, 128.2, 127.4, 125.7, 124.4, 122.5, 121.9, 115.3, 113.5, 112.0, 77.2; HRMS calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{BBrNO}_2$ ($\text{M}-\text{H}^+$) 325.9988, found 325.9942.

3-(5-氯)-吡啶取代苯硼啉(**10e**): 白色固体, 产率 99%. ^1H NMR (acetone- d_6 , 400 MHz) δ : 11.29 (s, 1H), 9.25 (s, 1H), 7.46~7.37 (m, 4H), 7.2 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.06 (dd, $J=8.7, 1.8$ Hz, 1H), 6.95 (d, $J=1.5$ Hz, 1H), 6.43 (s, 1H); ^{13}C NMR (acetone- d_6 , 100 MHz) δ : 157.1, 135.7, 131.3, 130.9, 127.8, 127.2, 126.8, 123.8, 122.8, 121.7, 118.5, 114.7, 113.8, 77.0; HRMS calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{BClNO}_2$ ($\text{M}-\text{H}^+$) 282.0493, found 282.0480.

3-(6-硝基)-吡啶取代苯硼啉(**10f**): 浅黄色固体, 产率 75%. ^1H NMR (acetone- d_6 , 400 MHz) δ : 10.97 (s, 1H), 8.42 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 8.23 (s, 1H), 7.86 (dd, $J=8.7, 1.8$ Hz, 2H), 7.74 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.49~7.29 (m, 4H), 6.56 (s, 1H); ^{13}C NMR (acetone- d_6 , 100 MHz) δ : 156.9, 143.2, 135.7, 131.3, 130.7, 127.5, 122.3, 119.3, 116.8, 114.1, 108.6, 76.7; HRMS calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{BN}_2\text{O}_4$ ($\text{M}-\text{H}^+$) 293.0734, found 293.0707.

3-(5-甲基)-吡啶取代苯硼啉(**10g**): 白色固体, 产率 82%. ^1H NMR (acetone- d_6 , 400 MHz) δ : 10.07 (s, 1H), 8.07 (s, 1H), 7.84 (d, $J=6.4$ Hz, 1H), 7.46~7.37 (m, 2H), 7.30~7.27 (m, 2H), 7.21 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 7.06 (t, $J=1.2$ Hz, 0.8 Hz, 1H), 6.93 (dd, $J=8.4, 2.4$ Hz, 1H), 6.48 (s, 1H), 2.29 (s, 3H); ^{13}C NMR (acetone- d_6 , 100 MHz) δ : 157.7, 135.9, 130.8, 130.4, 128.0, 127.4, 127.0, 124.2,

123.5, 122.6, 119.3, 115.2, 111.5, 77.8, 21.0; HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{13}\text{BNO}_2$ ($\text{M}-\text{H}^+$) 262.1039, found 262.1032.

3-(5-甲氧基)-吡啶取代苯硼啉(**10h**): 白色固体, 产率 52%. ^1H NMR (acetone- d_6 , 400 MHz) δ : 10.07 (s, 1H), 8.07 (s, 1H), 7.84 (d, $J=6.4$ Hz, 1H), 7.47~7.38 (m, 2H), 7.33~7.25 (m, 2H), 7.24 (d, $J=2.8$ Hz, 1H), 6.75 (m, 1H), 6.68 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 6.48 (s, 1H), 3.63 (s, 3H); ^{13}C NMR (acetone- d_6 , 100 MHz) δ : 157.6, 132.6, 130.9, 130.4, 127.9, 122.8, 115.3, 112.4, 111.9, 101.5, 77.7, 55.1; HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{13}\text{BNO}_3$ ($\text{M}-\text{H}^+$) 278.0988, found 278.0990.

3-(5-苯氧基)-吡啶取代苯硼啉(**10i**): 白色固体, 产率 87%. ^1H NMR (acetone- d_6 , 400 MHz) δ : 10.09 (s, 1H), 8.11 (s, 1H), 7.86 (d, $J=6.4$ Hz, 1H), 7.46~7.25 (m, 10H), 6.85~6.81 (m, 2H), 6.48 (s, 1H), 4.95 (d, $J=2.8$ Hz, 2H); ^{13}C NMR (acetone- d_6 , 100 MHz) δ : 157.4, 152.9, 138.1, 132.6, 130.7, 130.2, 128.4, 127.7, 127.6, 127.2, 126.9, 124.8, 122.5, 115.1, 112.4, 112.2, 102.9, 77.5, 70.1; HRMS calcd for $\text{C}_{22}\text{H}_{17}\text{BNO}_3$ ($\text{M}-\text{H}^+$) 354.1301, found 354.1305.

3-(2-苯基)-吡啶取代苯硼啉(**10j**): 浅黄色固体, 产率 50%. ^1H NMR (acetone- d_6 , 400 MHz) δ : 11.57 (s, 1H), 9.27 (s, 1H), 7.89~7.82 (m, 3H), 7.61 (t, $J=6.8$ Hz, 7.6 Hz, 2H), 7.50~7.36 (m, 4H), 7.13 (d, $J=6.4$ Hz, 1H), 7.02 (t, $J=7.2$ Hz, 7.6 Hz, 1H), 6.69 (t, $J=7.2, 8.0$ Hz, 1H), 6.41 (s, 1H), 6.25 (d, $J=8.8$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (acetone- d_6 , 100 MHz) δ : 157.2, 138.8, 136.7, 132.6, 131.4, 130.9, 121.4, 129.3, 128.7, 127.8, 126.8, 122.9, 121.9, 119.8, 119.4, 112.0, 110.2, 77.0; HRMS calcd for $\text{C}_{21}\text{H}_{15}\text{BNO}_2$ ($\text{M}-\text{H}^+$) 324.1196, found 324.1178.

3-(7-氮杂)-吡啶取代苯硼啉(**10k**): 白色固体, 产率 87%. ^1H NMR (acetone- d_6 , 400 MHz) δ : 10.76 (s, 1H), 8.21~8.20 (m, 2H), 7.85 (d, $J=6.9$ Hz, 1H), 7.52 (s, 1H), 7.46~7.40 (m, 3H), 7.29 (d, $J=7.3$ Hz, 1H), 6.94~6.91 (m, 1H), 6.47 (s, 1H); ^{13}C NMR (acetone- d_6 , 100 MHz) δ : 157.0, 143.2, 130.8, 130.3, 127.4, 124.5, 122.5, 122.4, 118.3, 115.5, 114.3, 114.0, 77.6, 77.4; HRMS calcd for $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{BN}_2\text{O}_2$ ($\text{M}-\text{H}^+$) 249.0835, found 249.0818.

3.2.3 化合物 **10a** 的单晶数据

选取大小为 0.52 mm×0.46 mm×0.33 mm 的单晶置于 Bruker SMART APEX II 单晶衍射仪中, 在 296 K 下采用 “phi and omega scans” 收集衍射数据, 数据强度经半经验吸收校正, 在 $4.28^\circ < 2\theta < 53.98^\circ$ 范围内收集到 10336 个衍射点, 其中 2842 个独立衍射点 [$R(\text{int})=0.0228$]; 使用 SAINT 程序还原衍射数据, SHELXTL 软

件进行结构解析及精修。晶体结构参数: $C_{15}H_{12}BNO_2$, $M_r=249.07$; 单斜晶系; $P2(1)/c$ 空间群; $a=9.6426(11)$ Å, $b=16.8274(19)$ Å, $c=8.1690(9)$ Å, $\alpha=90^\circ$, $\beta=99.3090(10)^\circ$, $\gamma=90^\circ$, $V=1308.0(3)$ Å³; $D_c=1.265$ g/cm³; $Z=4$; $F(000)=520$, Mo K α ($\lambda=0.71073$ Å) 射线为辐射源, $\mu=0.083$ mm⁻¹; 其他晶体结构参数: $-11 \leq h \leq 12$, $-21 \leq k \leq 19$, $-10 \leq l \leq 10$, $S=1.087$, final $R=0.0412$, $wR=0.01046$. CCDC 号为 1028717.

References

- [1] (a) Miyaoura, N.; Suzuki, A. *Chem. Rev.* **1995**, *95*, 2457.
(b) Suzuki, A. *J. Organomet. Chem.* **1999**, *576*, 147.
(c) Zhong, W.; Ye, H.; Liu, Z.; Yu, C.; Su, W. *Chin. J. Org. Chem.* **2009**, *29*, 665 (in Chinese).
(钟为慧, 叶海伟, 刘振玉, 俞传明, 苏为科, 有机化学, **2009**, *29*, 665.)
- [2] (a) Gallant, M.; Belley, M.; Carriere, M. C.; Chateaufneuf, A.; Denis, D.; Lachance, N.; Lamontagne, S.; Metters, K. M.; Sawyer, N.; Slipetz, D.; Truchon, J. F.; Labelle, M. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2003**, *13*, 3813.
(b) Yamamoto, Y.; Ishii, J.; Nishiyama, H.; Itoh, K. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 9625.
- [3] Torrsell, K. *Arkiv. Kem.* **1957**, *10*, 507.
- [4] Snyder, H. R.; Cox, C. H.; Cummings, W. M. *J. Org. Chem.* **1969**, *34*, 1669.
- [5] (a) Dowlut, M.; Hall, D. G. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 4226.
(b) Bérubé, M.; Dowlut, M.; Hall, D. G. *J. Org. Chem.* **2008**, *73*, 6471.
(c) Pal, A.; Bérubé, M.; Hall, D. G. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, *49*, 1492.
- [6] (a) Li, H. Y.; Wang, Y.; Liu, Y. C.; Liu, Z. *Chem. Commun.* **2012**, *48*, 4115.
(b) Zhang, Y. T.; Ma, W. F.; Li, D.; Yu, M.; Guo, J.; Wang, C. C. *Small* **2014**, *10*, 1379.
- [7] Mahalingam, A.; Geonnotti, A. R.; Balzarini, J.; Kiser, P. F. *Mol. Pharm.* **2011**, *8*, 2465.
- [8] (a) AN2690, AN2718 & AN2728 are being currently developed as therapeutic agents by Anacor Pharmaceuticals Inc., Palo Alto, CA, USA.
(b) Akama, T.; Baker, S. J.; Zhang, Y. K.; Hernandez, V.; Zhou, H.; Sanders, V.; Freund, Y.; Kimura, R.; Maples, K. R.; Plattner, J. J. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2009**, *19*, 2129.
(c) Baker, S. J.; Zhang, Y. K.; Akama, T.; Lau, A.; Zhou, H.; Hernandez, V.; Mao, W.; Alley, M. R. K.; Sanders, V.; Plattner, J. J. *J. Med. Chem.* **2006**, *49*, 4447.
- [9] Austin, P. W.; Kneale, C. J.; Crowley, P. J.; Clough, J. M. *WO 9533754*, **1995** [*Chem. Abstr.* **1996**, *124*, 234024].
- [10] (a) Nicolaou, K. C.; Natarajan, S.; Li, H.; Jain, N. F.; Hughes, R.; Solomon, M. E.; Ramanjulu, J. M.; Boody, C. N. C.; Takayanagi, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1998**, *37*, 2708.
(b) Nicolaou, K. C.; Li, H.; Boody, C. N. C.; Ramanjulu, J. M.; Yue, T. Y.; Natarajan, S.; Chu, X. J.; Brase, S.; Rubsam, F. *Chem.-Eur. J.* **1999**, *5*, 2584.
(c) Tan, Y. L.; White, A. J. P.; Widdowson, D. A.; Wilhelm, R.; Williams, D. J. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **2001**, 3269.
- [11] Lowe, C. R.; Sartain, F. K.; Yang, X. *WO 2006079843*, **2006** [*Chem. Abstr.* **2006**, *145*, 183775].
- [12] Zhdkankin, V. V.; Persichini III, P. J.; Zhang, L.; Fix, S.; Kiprof, P. *Tetrahedron Lett.* **1999**, *40*, 6705.
- [13] Falck, J. R.; Bondlela, M.; Venkataraman, S. K.; Srinivas, D. *J. Org. Chem.* **2001**, *66*, 7148.
- [14] Kumar, J. S.; Bashian, C. M.; Corsello, M. A.; Jonnalagadda, S. C.; Mereddy, V. R. *Tetrahedron Lett.* **2010**, *51*, 4482.
- [15] Xie, W.; Zuo, Z.; Zi, W.; Ma, D. *Chin. J. Org. Chem.* **2013**, *33*, 869 (in Chinese).
(谢卫青, 左智伟, 资伟伟, 马大为, 有机化学, **2013**, *33*, 869.)
- [16] Chen, W.; Hao, H.; Zhang, C.; Shen, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2014**, *34*, 797 (in Chinese).
(陈旺, 郝慧琳, 张晨露, 沈月毛, 有机化学, **2014**, *34*, 797.)
- [17] Feng, Y.; Zhang, H.; Cheng, G.; Cui, X. *Chin. J. Org. Chem.* **2014**, *34*, 1499 (in Chinese).
(冯亚栋, 张红, 程国林, 崔秀灵, 有机化学, **2014**, *34*, 1499.)
- [18] Tan, Y.; Luan, H.-L.; Sun, X.-W.; Yang, X.-D.; Dong, H.-Q.; Lin, G.-Q. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 10027.
- [19] (a) Lin, H.; Sun, X.-W. *Tetrahedron Lett.* **2008**, *49*, 5343.
(b) Lin, H.; Han, K.-S.; Sun X.-W.; Lin, G.-Q. *Chin. J. Org. Chem.* **2008**, *28*, 1479 (in Chinese).
(林华, 韩京成, 孙兴文, 林国强, 有机化学, **2008**, *28*, 1479.)
- [20] Lin, G.-Q.; Zhang, B.; Chen, W.-W.; Sun, X.-W.; Li, R.; Xu, M.-H. *CN 101455661*, **2009** [*Chem. Abstr.* **2009**, *151*, 156250].
- [21] Other example for the synthesis of benzoboroxole by using (2-formylphenyl)boronic acid as starting material, see: Kumar, J. S.; Alam, M. A.; Gurrapu, S.; Nelson, G.; Williams, M.; Corsello, M. A.; Johnson, J. L.; Jonnalagadda, S. C.; Mereddy, V. R. *J. Heterocycl. Chem.* **2013**, *50*, 814.
- [22] (a) Shen, S.-C.; Sun, X.-W.; Lin, G.-Q. *Green Chem.* **2013**, *15*, 896.
(b) Shen, S.-C.; Sun, X.-W.; Lin, G.-Q. *Synthesis* **2013**, *45*, 1191.
- [23] Gronowitz, S.; Hoenfeldt, A. B.; Yang, Y. H. *Chem. Scr.* **1986**, *26*, 311.

(Li, L.)